





3 5711 00020 2417

















ZOOLOGISCHE ERGEBNISSE  
EINER REISE  
IN  
NIEDERLÄNDISCH OST-INDIEN.

Digitized by the Internet Archive  
in 2015



ZOOLOGISCHE ERGEBNISSE  
EINER REISE  
IN  
NIEDERLÄNDISCH OST-INDIEN


HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. MAX WEBER,  
Professor der Zoologie in Amsterdam.

~~~~~  
VIERTER BAND.  
~~~~~

MIT 16 TAFELN UND ABBILDUNGEN IM TEXT.



69931

BUCHHANDLUNG UND DRUCKEREI

VORMALS

E. J. BRILL

LEIDEN 1897—1907.

OL  
321  
0032



# I N H A L T.

---

	Seite.
E. von Martens: Süß- und Brackwasser-Mollusken des Indischen Archipels, mit Tafel I—XII . . . . .	1.
Raphaël Blanchard: Hirudinées des Indes néerlandaises . . . . .	332.
A. Dollfus: Isopodes Terrestres des Indes Néerlandaises, avec planches XIII, XIV, XV (Abgeschlossen Juli 1898) . . . . .	357.
P. N. van Kampen, Amphibien des Indischen Archipels, mit Tafel XVI (Abgeschlossen Januar 1906) . . . . .	383.
Gesamtregister zu den vier Bänden der »Zoologischen Ergebnisse» . . . .	449.

---



# SÜSS- UND BRACKWASSER-MOLLUSKEN DES INDISCHEN ARCHIPELS.

BEARBEITET VON

**Prof. Dr. E. VON MARTENS.**

mit Tafel I—XII.



## A) ÄCHTE SÜSSWASSER-MOLLUSKEN.

Hierunter verstehe ich diejenigen Süsswasser-Mollusken, welche in den Gewässern des Binnenlandes vorkommen und also als unabhängig von der Nähe des Meeres betrachtet werden können, aber auch die im Küstenland lebenden, insofern sie mit jenen generisch übereinstimmen und nicht auf Gewässer beschränkt sind, welche regelmässig mit Salzwasser aus dem Meere sich mischen. Hieher gehören die Limnaeiden, Ampullariiden und Unioniden vollständig, die meisten Paludiniden, Melaniiden und Cyreniden und ein grosser Theil der Neritiden.

### a) LIMNAEIDAE.

Luftathmende Süsswasserschnecken ohne Deckel, meist mit verhältnissmässig dünner, glatter, einfarbiger Schale und einfachem Mündangsrand; äussere Gestalt der Schale sehr verschieden. Hauptsächlich in stehenden Gewässern; Eier ohne feste Schale, haufenweise in einer Schleimmasse (Laich) an Blätter von Wasserpflanzen abgesetzt, seltener an Schneckenschalen oder Holz.

Die Gattungen dieser Familie haben eine weite geographische Verbreitung und kommen ziemlich in allen faunistischen Hauptgebieten vor, doch weit zahlreicher an Arten und Untergattungen in der nördlichen gemässigten Zone, als in der tropischen und in der südlichen.

**Limnaea Lam.**

Normal rechts gewunden, länger als breit, mit weiter Öffnung und einer schwachen Falte am Columellarrand der Mündung. Fühler platt dreieckig; Mantelrand nicht über die Schalenmündung hinaus ausgebreitet.

1. *Limnaea brevispira* n. Taf. I, Fig. 1, 2 und Taf. XII. Fig. 1. und 3.

Testa brevispira, inflato-ovata, striatula, fusca, apice papillari; anfr. 3, celeriter crescentes, sutura sat impressa; anfr. ultimus supra et infra subaequaliter rotundatus. Apertura  $\frac{9}{10}$  longitudinis occupans, ampla, margine externo et basali arcuatis, marg. columellari latiusculo, albo, valde arcuato.

Long. 10, diam.  $7\frac{1}{2}$ , aperturae long. 9, diam.  $6\frac{1}{2}$  Mill.

Sumatra: See von Manindjau <sup>1)</sup>, nur Ein Exemplar der angegebenen Grösse und zwei viel kleinere.

Bis jetzt die einzige Art mit so kurzem Gewinde in Niederländisch-Indien, ähnlich einigen europäischen Formen, die in grössern Landseen leben, und daher wohl auch als Seeform zu betrachten.

Radula mit 53 Längsreihen. Mittelzahn sehr klein, einspitzig. Seitenzähne bedeutend grösser, vom ersten bis zum elften mit 3 Spitzen, von denen die mittlere die längste ist. Die innere Seitenspitze, anfangs wenig kleiner als die äussere, der Basis mehr genäherte, nimmt allmählig an Grösse zu, während letztere, stetig kleiner werdend, der Basis immer näher rückt. Beim zwölften Seitenzahn weist die innere Spitze an der inneren Seite ein winziges Nebenzähnchen auf, das jedoch beim folgenden Seitenzahn mit dem nun kleiner gewordenen inneren ursprünglichen Seitenzähnchen gleiche Grösse hat. Beide nähern sich nun immer mehr der Basis und stehen beim achtzehnten Seitenzahn auf gleicher Höhe mit den gleich grossen äusseren Seitenzähnchen; die Mittelspitze ist noch bedeutend länger als jene, übertrifft sie aber schon beim folgenden Seitenzahn nicht mehr. Von da an werden die Seitenzähne kammförmig; von den fünf bis sieben kleinen Zähnchen ist gewöhnlich das mittlere etwas länger.

Der Kiefer ist dunkel hornfarben, dreiteilig. Das Mittelstück derber

---

1) Bemerkungen über Höhenlage und Tiefe der verschiedenen, in dieser Arbeit genannten Seen finden sich in der Einleitung zum ersten Bande dieses Werkes.

und halbmondförmig mit abgerundeten Enden, in dem vorderen dickeren Teile sehr undeutlich querrissig; am vorderen Rande mit 3 schwachen Einkerbungen. Die gekrümmten Seitenstücke sind schmal, im vorderen und dem dem Mittelstücke genäherten Teile aus stäbchenartigen Lamellen zusammengesetzt, die nach dem hinteren und dem freien Ende in polygone Zellen übergehen.

2. *Limnaea javanica* Mouss. Taf. I. Fig. 3—7. Taf. XII, Fig. 2. und 4.

*Limnaeus succineus* (Desh.) var. *javanica* Mousson Land- u. Süßw.

Moll. Java's S. 42 — *javanicus* (Hasselt) v. Martens in Malak.

Blatt. XV, 1867 p. 222—225 und Conchol. Mitth. I. p. 87—91.

Taf. 16. — Reeve conch. icon. XVIII fig. 50. — Schepman in

Veth Midden-Sumatra p. 9.

Var. *costulata* n. Fig. 3, 4.

Testa oblongo-ovata, turgida, confertim costulata, flavofusca, nitidula, apice nigricante acutiusculo; anfr. 5, convexi, regulariter crescentes, non angulati; apertura ovata, infra latiuscula, plica columellari crassa, rufescente.

Long. 23, diam. 12, aperturae long 15, lat. 7. incluso callo parietali 10 Mill.

Java: Tjipanas.

var. *intumescens* Marts. Fig. 5.

v. Martens Mal. Bl. 1867 p. 223 und conch. Mitth. S. 88 Fig. 2—4. Böttger jav. moll. p. 150.

Letzte Windung mit einer ziemlich deutlichen Schulterkante.

Sumatra: Ajer-tegenang bei Fort de Kock,  $19\frac{1}{2}$  Mill. lang,  $12\frac{1}{2}$  breit, Mündung 15; bräunlich-gelb, ziemlich durchsichtig.

Java: See „Situ-bagendit“ bei Garut, Preanger-Regentschaften, grösstes Stück  $22\frac{1}{2}$  Mill. lang, 15 breit, Mündung 18; ziemlich hell gelbbraun. Ebenda Übergangsformen zu var. *ventrosa* und var. *porrecta*. Tjipanas.

Celebes: Fluss bei Tete-adj, 24 Mill. lang, 13 breit, Mündung  $17\frac{1}{2}$ , und ein Exemplar von Loka bei Bonthain, 15 Mill. lang,  $9\frac{1}{2}$  breit, Mündung  $10\frac{1}{2}$ , mit weissen Linien und Flecken, die auf Verlust der Schalenhaut beruhen (Fig. 5).

Ausserdem auch auf Timor von dem Verfasser gefunden.

var. *ventrosa* Marts.

v. Martens conch. Mitth. S. 88 Fig. 5.

Mittelgross, bauchig u. abgerundet, mit verhältnissmässig kurzem Gewinde.

Java: Tjipanas, 18 Mill. lang, 11 breit, Mündung 14 lang, glanzlos braun, zusammen mit var. *intumescens*. Ferner bei Buitenzorg eine zu var. *obesa* hinneigende Form, 18 Mill. lang, 12 breit, Mündung 14, zusammen mit ausgesprochener var. *porrecta*, heller gefärbt als letztere.

Celebes: in Luwu, 8 Mill. lang, 5 breit, Mündung  $6\frac{1}{2}$ ; glänzend gelbbraun.

War bis jetzt mir nur von Java bekannt.

var. *turgidula* n. Fig. 6.

Testa ovata, turgida, flava, nitida, apice obtusiusculo fusco; anfr.  $4\frac{1}{2}$ , valde convexi; antepenultimus et penultimus strigis nonnullis albis picti; apertura ovata, infra latiuscula, plica columellari tenui, at distincta.

Long. 12, diam.  $7\frac{1}{2}$ , aperturae long. 9, lat. 5 Mill.

Sumatra: Ajer-tabiet bei Pajakombo.

Ähnlich der var. *ventrosa*, aber die Naht viel tiefer eingezogen, die Schale auffallend glänzend, die weissen Streifen anscheinend nicht durch Verlust der Schalenhaut entstanden.

var. *subteres* Marts.

v. Martens conch. Mitth. S. 88 Fig. 6, 7.

Schlanker, ohne Schulterkante, Gewinde verhältnissmässig länger und mehr breit aufsitzend, daher der Naht-Einschnitt weniger markirt.

Sumatra: Sawah bei Singkarak, bis  $14\frac{1}{2}$  Mill. lang, 9 breit, Mündung  $9\frac{1}{2}$ ; gelblich, durchsichtig, rein.

Celebes: Loka bei Bonthain, 21 Mill. lang, 11 breit, Mündung 14, die meisten Stücke kleiner, trüb braun mit Uebergängen zu var. *intumescens*; kleine beschädigte Stücke vom Fluss Palopo in Luwu.

var. *angustior* Marts. Fig. 7.

Ziemlich schlank, ohne Schulterkante, mit kürzerem Gewinde.

v. Martens conch. Mitth. S. 88, Fig. 8.

Java: Sinagar, 17 Mill. lang, 10 breit, Mündung 12 lang; trüb gelblich, wenig glänzend.

Celebes: in einem Teich bei Makassar, gross, 21 Mill. lang,  $11\frac{1}{2}$  breit, Mündung 14 lang, nur ein Stück; auch von mir bei Makassar auf Nymphäa-Blättern gefunden. Fluss bei Pare-Pare; Uebergangsform zu var. ventrosa, 21 Mill. lang, 13 breit, Mündung 14; braungelb, ziemlich glänzend (Fig. 7).

Rotti: Fluss Oitelao bei Bilba und Fluss bei Talaë, von Prof. Wichmann gesammelt, 15 Mill. lang,  $9\frac{1}{2}$  breit, Mündung 11, gelblich mit helleren Striemen, ziemlich glänzend.

An diese schliesst sich zunächst die bei Mousson a. a. O. Taf. 5 Fig. 1, abgebildete Form, die durch stärkere Verengung der Mündung nach unten zu sich charakterisirt und historisch als der Typus von *L. javanica* zu betrachten ist.

var. *porrecta* Marts.

v. Martens conch. Mitth. S. 89, Fig. 9, 10.

Ziemlich gross, langgestreckt, Gewinde ziemlich lang, letzte Windung mit Andeutung von Schulterkante.

Sumatra: Kaju-tanam, 15 Mill. lang,  $9\frac{1}{2}$  breit, Mündung 11 lang; glänzend bräunlich mit zahlreichen weissen Spiralbändchen, hauptsächlich auf der Rückenseite der letzten Windung.

Java: Buitenzorg, 21 Mill. lang, 11 breit, Mündung 14 lang; einfarbig braun, glänzend; dazu zahlreiche ganz junge Stücke.

In Mousson's Sammlung sah ich 1863 Stücke mit ähnlichen weissen Spiralbändern von Buitenzorg, aber kleiner, unter dem Manuscriptnamen *L. fasciata*.

Die *Radula* von *L. Javanica* var. *angustior* von Rotti, nach der Untersuchung von Hrn. Protz, gleicht am meisten derjenigen von *Limnaea palustris* (Müll.), 1,8 mm. lang, 1,1 mm. breit, mit 61 Längsreihen. Mittelzahn sehr klein, einspitzig. Seitenzähne bedeutend grösser; der erste mit 3 Spitzen, von denen die innere sehr klein ist. Vom zweiten Seitenzahn an fehlt diese Spitze und tritt erst wieder beim sechsten Seitenzahn und zwar etwas stärker auf, während die äussere Spitze kleiner geworden und mehr nach der Basis gerückt ist. In dem Masse wie die Hauptspitze allmählig kleiner wird, wächst die innere Seiten spitze, bis beide beim neunten Seitenzahn gleiche Grösse haben.

Ebenso sind der zehnte und elfte beschaffen. Beim zwölften tritt noch eine neue innere Spitze hinzu, welche allmählig grösser wird und die ursprüngliche innere Seitenspitze immer mehr zurückdrängt. Vom sechszehnten Seitenzahn an werden dieselben immer niedriger und sechsspitzig, bis zuletzt die äussere, jetzt ganz an der Basis stehende Seitenspitze völlig verschwindet.

Der Kiefer ist dreiteilig und dunkel hornfarben. Das Mittelstück halbmondförmig und derb, 0,2 mm. lang, 0,7 mm. breit, mit ca. 25 deutlichen Querlinien. In der Mitte eine breite, ziemlich flache Platte durch 2 Längsfurchen abgegrenzt. Seitenglieder des Kiefers schmal, nach aussen noch schmaler werdend, aus vielen Längsleisten zusammengesetzt.

### **Isidora Ehrbg.**

Linksgewunden wie *Physa*, aber nicht so stark glänzend; Mantelrand nicht in fingerförmige Lappen verlängert. In der Radula Mittelzahn mit nur zwei Spitzen, Seitenzähne drei-vierspitzig.

Nur an einer Art des malayischen Archipels, *Ph. ovalina*, konnte ich die Weichtheile untersuchen, aber diese zeigte völlige Übereinstimmung mit der Radula der typischen afrikanischen *Isidoren*, vgl. die Beschreibung und Abbildung von Jickeli, Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken Nordost-Afrikas 1874, S. 196 ff. Taf. III, Fig. 2—4, im Gegensatz zu dem dreitheiligen vielgezahnten Mittelzahn und den vielzähligen Seitenzähnen von *Physa fontinalis*, bei Goldfuss in den Verhandl. d. naturhist. Vereins d. preuss. Rheinlande XIII 1856, V. 48, Taf. 7, fig. m., und Lehmann lebende Schnecken und Muscheln der Umgebung Stettins, 1873 S. 200, Taf. 16 fig. 70; ebenso verschieden sind die Zähne von *Aplexa hypnorum*, siehe Lehmann a. a. O. S. 203 Taf. 16 fig. 71. Allerdings lässt sich bis jetzt nicht bestimmen, ob alle oder wie viele der bis jetzt nur nach der Schale als *Physa* beschriebenen ostasiatischen und australischen Schnecken nach Mantel und Radula zu *Isidora* gehören, aber da sie in der stärkeren Schale, dem geringeren Glanz und manche auch in der äussern Form und Sculptur mehr zu *Isidora* als zu *Physa* passen, so scheint es mir vorläufig richtiger sie zu *Isidora* zu stellen. Taparone-Canefri hat für eine Art aus Neu-Guinea der stärkeren, sich leichter ablösenden Schalenhaut wegen die Gattung *Physastra* errichtet,



(Ann. Mus. civic. Genov. XIX 1883, p. 245, Taf. 1, Fig. 20, 21). Die Weichtheile und Radula derselben sind noch nicht bekannt; wenn dieselben sich auch mit denen von *Isidora* übereinstimmend ergeben werden, so könnte vielleicht *Physastra* als Unterabtheilung für die malayisch-australischen Arten dienen. Wie sich die australischen *Glyptophysa* (mit Sculptur und Haaren) und *Ameria* (mit Schulterkante) dazu verhalten, ist auch noch zu untersuchen. *Physa Novae-Hollandiae* ist von Lesson, Voy, de la Coquille, Zool. II 1, p. 332, pl. 16, fig. 5, lebend beobachtet und gezeichnet worden, aber weder in der Beschreibung noch in der Abbildung sind Mantellappen zu bemerken.

Wie schon erwähnt, ist Australien besonders reich an solchen *Physa*-artigen Süßwasserschnecken, vgl. E. Smith in Linnean Society's Journ., Zool. 1882 XVI, n<sup>o</sup>. 92, p. 275 ff.; sie sind dort zahlreicher als die *Limnaeen*, was auch theilweise in Afrika der Fall ist. Von da erstrecken sie sich auch auf Neu-Caledonien, die Freundschaftsinseln, Neu-Guinea und die Philippinen; auch aus der östlichen Hälfte von Niederländisch-Indien waren schon durch Lesson und den Verfasser einige bekannt, dagegen ist der Nachweis ihres Vorkommens auf Sumatra dem Forschungseifer M. Webers zu verdanken und sie sind demnach auch auf Borneo und Java noch zu erwarten. In Englisch-Vorderindien scheinen sie zu fehlen, weder Nevill (handlist of Mollusca in the Indian Museum 1878), noch Theobald und Hanley (conchologia Indica) kennen sie von da und die zwei vereinzeltten Angaben in der sonstigen Literatur sind sehr unzuverlässig: Sowerby's *Physa Aliciae* von „Indien“ ist schon durch E. Smith a. a. O. als australisch nachgewiesen; Dunker's *Physa Coromandeliana* in Malak. Blätt IX 1862 p. 150 könnte auch sehr wohl auf einem Irrthum in der Fundortsangabe beruhen, wie solche bei Mollusken der Novara-Expedition mehrfach vorgekommen, in Dunker's Sammlung, jetzt im Museum für Naturkunde in Berlin, ist eine Schnecke dieses Namens nicht vorhanden, die gekielten Umgänge deuten auf eine Art aus Australien, von wo ja die Novara auch zahlreiche Conchylien mitgebracht hat, und auch das Central Museum in Madras besass nach dessen Mollusken-Katalog 1867, also nach der Expedition der Novara, keine *Physa* von der Koromandalküste oder überhaupt aus Englisch-Indien. Für die *Physa*-artigen Schnecken würde demnach eine Grenzlinie zwischen Indien und Australien noch westlich von Sumatra zu ziehen sein.

1. *Isidora Sumatrana* n. Taf. I Fig. 26—29.

Testa turrita, dense striatula, nitida, olivaceo-fusca, apice nigricans; anfr. 7, parum convexi, ultimus basi sensim angustatus; apertura lanceolata, subverticalis, margine columellari incrassato, torto, subbiangulato, fuscescente.

a) Long. 19, diam.  $9\frac{1}{3}$ , apert. long. 10, diam.  $4\frac{1}{2}$  Mill. Fig. 28.

b) "  $17\frac{1}{2}$ , " 9, " " 9, " 5 " " 29.

c) "  $17\frac{1}{3}$ , " 7, " " 8, " 4 " " 27.

Sumatra: Ajer tegenang bei Fort de Kock.

Variirt bedeutend in dem Verhältniss der Länge zur Breite und damit in der allgemeinen Gestalt, bald mehr schlank cylindrisch (Fig. 27), bald mehr konisch (Fig. 28, 29), mit Zwischenstufen (Fig. 26).

2. *Isidora ovalina* n. Taf. I, Fig. 30, 31. und Taf. XII Fig. 5.

Testa anguste ovata, subrimata, irregulariter striata, non nitida, fusca, apice nigricans; anfr. 5—6, convexiusculi, sutura sat profunda, ultimus basi sensim attenuatus; apertura lanceolata, paulum obliqua, margine columellari subperpendiculari, leviter incrassato.

a) Long. 12, diam. 6, apert. long. 7, diam.  $3\frac{1}{2}$  Mill. Fig. 30.

b) " 12, " 6, " " 8, " 3 " " 31.

c) " 9, "  $5\frac{1}{2}$ , " " 5, "  $2\frac{1}{2}$  " ; jung.

Celebes: Loka bei Bonthain.

Auch diese Art variirt etwas in der Form an demselben Fundort, indem das Gewinde bald sich mehr erhebt, (Fig. 30), bald niedriger ist (Fig. 31). Von der folgenden *I. Minahassae* unterscheidet sie sich durch weniger gethürmte Gestalt, weniger gewölbte Umgänge und den geraden Verlauf des Collumellarrands.

Radula nach der Untersuchung von Hrn. Protz 1,8 mill. lang, 0,9 breit, mit ungefähr 35 Längsreihen. Mittelzahn wenig kleiner als die übrigen, mit zwei Spitzen. Seitenzähne bis zum elften dreispitzig, vom zwölften an vier und zuletzt fünf-spitzig.

3. *Isidora Minahassae* n. Taf. IX, Fig. 1.

Physa Moluccensis (Less.) v. Martens in Malak. Blätt. 1867, p. 218.

Testa ovato-acuminata, ventricosa, subtiliter striatula et prope aperturam sulcis verticalibus modice distantibus exarata, nitidula; fulvo-fusca, varicibus albidis fuscomarginatis 2 in anfr. ultimo ornata, spira conica, acuminata, apice paulo obscurius fusca; anfr.  $6\frac{1}{2}$ , sutura

profunda discreti, turgidi; ultimus ventrosus, basi celeriter attenuatus; apertura ovato-piriformis, sat obliqua, margine columellari infra subinerassato, rotundate in basalem transeunte.

Long. 16, diam 9, apert. long. 9 diam. 5 Mill.

Nord-Celebes, Minahassa, im See von Tondano ein Exemplar von mir 26 Juli 1862 gefunden.

Lässt sich durch das mehr zugespitzte, tiefer eingeschnittene Gewinde, die stärkere Sculptur des letzten Umgangs und die schwächere Verbreiterung des Columellarrands doch von der folgenden unterscheiden, soweit nach einem Exemplar zu urtheilen möglich ist. Ich würde sie, da noch andere Arten in Celebes vorkommen, gerne I. Tondanensis genannt haben, wenn das nicht zu ähnlich der schon bestehenden Tongana Q. G. (von Tonga-tabu) lautete.

Gegen die Vereinigung dieser Art mit Lesson's *Physa Moluccensis* spricht entschieden, dass er selbst diese „*peu ventru*“ nennt, und zwar im Vergleich mit seiner *Ph. Novae-Hollandiae*, welche wesentlich schlanker als *Is. Minahassae* ist.

#### 4. *Isidora Timorensis* (Sow.?) n. Taf. IX, Fig. 3, 4.

*Physa Moluccensis* (Less.) v. Martens in Malak Blätt. 1867 p. 218. Clessin in der neuen Ausgabe von Chemnitz S. 344. Taf. 48 Fig. 10. Schepman Notes Leyd. Mus. XIV, p. 155.

Testa ovato-oblonga, subtiliter striatula et prope aperturam costulis verticalibus obsoletis sculpta, nitidula, pallide flavescenti-grisea, apice rufescenti-fusca, varicibus 1—2 albis, pallide fuscomarginatis in anfr. ultimo ornata; spira sat elongata, obese conica; anfr. 6, valde convexi, sutura modice impressa discreti, penultimus turgidus, sublaevis, ultimus ovatus, versus basin sensim attenuatus; apertura paululum obliqua, piriformi-ovata, margine columellari valde dilatato et incrassato, superne sensim in callum columellarem conspicuum, inferne subangulatim in marginem basalem transeunte.

Long.  $16\frac{1}{2}$  diam. 8 ; aperturae long. 9, diam.  $4\frac{1}{2}$  Mill.

„ 15 „ 9 ; „ „  $9\frac{1}{2}$  „ 5 „

Timor, bei Delhi (im portugiesischen Theil), zahlreich in einem eingetrockneten Sumpfe, ohne andere Süßwasserschnecken von mir 7. Dec. 1862 gefunden. Süßwasserseen zwischen Susuk und Ainiba in Central-Timor, H. ten Kate.

Auch bei dieser Art zeigt sich, wie bei vielen andere Süßwasser-

schnecken, dass längere Exemplare nicht nur relativ, sondern auch absolut etwas schmaler sind als die kürzeren, indem jede einzelne Windung, wenn sie mehr von der vorhergehenden umfasst, um so breiter werden muss, um gleichen Rauminhalt zu erhalten. Die Farbe ist möglicherweise etwas ausgebleicht.

*Limnaea Timorensis* Sow. catalogue of the shells of Earl Tankerville 1825, appendix p. VIII, ist folgendermassen beschrieben: L. testa sinistrorsa, oblonga, spira acuminata, laevi tenuiter striata, anfractibus quinque rotundatis, ultimo majusculo; apertura oblonga, labio interno minime expanso. Long  $\frac{3}{10}$  unc., lat.  $\frac{9}{20}$  unc. [Etwa 20 und  $11\frac{1}{4}$  Mill.] From Timor. Weder die Maassangaben, noch die Zahl der Windungen und „labio interno minime expanso“ passen nicht auf die von mir gefundene Schnecke; vielleicht kommt noch eine zweite Art auf Timor vor oder sollte es gar wirklich eine linksgewundene *Limnaea* sein? Die Maassangaben würden auf meine *L. javanica* var. *porrecta* von Timor passen und eine mir seiner Zeit von Dr. Mörch aus Kopenhagen zugeschickte Zeichnung der Schnecke, welche Beck als *L. Timorensis* angenommen hat, stellt auch eine rechtsgewundene *Limnaea* dar, im Gegensatz zu Sowerby's Worten.

##### 5. *Isidora Celebensis* Marts. Taf. IX Fig. 2.

*Physa Celebensis* Marts., Clessin in der neuen Ausgabe von Chemnitz, *Physa* S. 350 Taf. 49 Fig. 8.

Testa ovato-elongata, per omnes anfractus aequaliter subcostulato-striata, nitidula, pallide grisea, varicibus parum distinctis, apice nigricante; spira elongata, sat obesa; anfr. 7, convexiusculi, sutura superficiali, alba, leviter appressa et crenulata, penultimus antepenultimo multo longior, ultimus ellipticus, versus basin sensim attenuatus; apertura valde obliqua, piriformis, margine collumellari valde dilatato et incrassato, superne plicula spiratim intrante a callo parietali separato, inferne subangulatim in marginem basalem transeunte.

Long. 23, diam. 11, aperturae long.  $10\frac{1}{2}$  diam. 5 Mill.

Celebes, Beccari.

Durch den noch stärker verdickten, nach oben mit einer bestimmt abgegränzten Spiralfalte versehenen Columellarrand, sowie die gleichmässigeren Sculptur und gestrecktere Gestalt von der eben beschriebenen *J. Timorensis* zu unterscheiden.

Sollte dieses vielleicht Lesson's *Physa Moluccensis* sein, welche er, Voy. Coquille, zool. II 1, 1830 p. 332 folgendermassen beschreibt:

Les Moluques nourrissent une physse très-voisine de celle de la Nouvelle Hollande, très-commune à Amboine. La coquille a 8 lignes de hauteur [18 Mill.] sur 4 de diamètre [9 Mill.]. La forme est ovale-allongée; sa spire très-aigue; son demi-tour [dernier tour ?] peu ventru. La bouche, dirigée à gauche, a son bord externe coupant, en ellipse. La columelle est tordue au milieu. La couleur est fauve noirâtre. Ce sera *physa moluccensis*.

Die in der Mitte gedrehte Columelle bezeichnet vielleicht die angegebene Columellarfalte; die Maassangaben lassen sich mit den obigen vereinigen. Seitdem hat meines Wissens Niemand eine *Physa* auf Amboina oder sonst auf den Molukken gefunden.

6. *Isidora stagnalis* n. Tafel I Fig. 32—34.

Testa obese ovata, subrimata vel imperforata, striatula, vix nitidula, fusca, apice nigricans; spira brevis, acuminata; anfr.  $4\frac{1}{2}$  convexi, sutura profunda, ultimus basi leviter attenuatus; apertura ovata, margine externo valde arcuato, margine columellari subperpendiculari, superne incrassato.

Long  $8\frac{1}{2}$ , diam. 6, aperturae long. 7, lat. 3 Mill.

Sumatra: See von Manindjau.

In Vergleich mit den übrigen Arten aus Niederländisch-Indien characterisirt sich diese Art durch das kurze Gewinde als See-form, in dem eine Verkürzung des Gewindes, d. h. Umhüllung eines grössern Theils jeder vorhergehenden Windung durch die folgende der Schale mehr Festigkeit und Widerstandskraft gegen die mechanische Gewalt des Wellenschlages gibt, wie es ja auch die mitteleuropäischen See-formen in der Gattung *Limnae* zeigen, z. B. *L. stagnalis* var. *lacustris* Stud. und *bodamica* Cless., *L. auricularia* var. *ampla* und *Monardi* Hartm. u. a. Bei manchen Exemplaren ist das Gewinde auch etwas cariös (fig. 33, 34) wie man es so oft bei Melanien und Ampullarien, seltener bei *Limnaeen* findet; bei *Physa* habe ich das früher noch nicht gesehen.

**Planorbis** Geoff.

Schale spiral in Einer Ebene gewunden. Fühler fadenförmig.

Auch diese Gattung ist im malayischen Archipel nur durch wenige,

kleine Arten vertreten, welche nicht wesentlich von den in andern Erdtheilen vorkommenden abweichen. Nur von der Nordostküste Sumatra's, also dem nächsten Anschluss an das asiatische Festland, nämlich Deli, hat das Berliner Museum für Naturkunde auch eine grössere Art erhalten, den für Vorder- und Hinter-Indien charakteristischen *Planorbis exustus* Desh. (Coromandelianus Beck, *Indicus* Bens.) welcher unserem europäischen *Pl. corneus* L. nahe steht.

#### A) *PLANORBIS* s. str.

##### 1. *Planorbis Sumatranus* n. Taf. I. Fig. 8—10 und Taf. XII. Fig. 6 und 9.

Testa depressa, paucispira, utrinque umbilicata, pallide cinerea; anfr. 3, sat celeriter crescentes, supra convexi, ad peripheriam angulati, infra planiusculi, ultimus antice distincte descendens; sutura profunda; umbilicus latiusculus; apertura perobliqua, margine externo bene arcuato, columellari stricto, fauce flavescens.

Sumatra: Danau di bawah.

Diam. maj. 6, min.  $4\frac{1}{2}$ , alt. 2, diam. apert. 3 Mill.

Radula mit 33 Längsreihen. Mittelzahn undeutlich zweispitzig, wenig kleiner als die übrigen. Seitenzähne ziemlich schräg zur Mitte gerichtet, vom ersten bis zum zwölften zweispitzig, die Hauptspitze an der Innenseite.

Beim zwölften Seitenzahn hat die Hauptspitze nach innen einen kleinen Seitenzacken. Vom dreizehnten ab sind die Seitenzähne niedrig und vier- bis fünfspitzig. Kiefer hellhornfarben, dreiteilig. Mittelstück schmal, aus ca 30 ungleich breiten, einander ziemlich parallelen Leisten zusammengesetzt, deren vordere Enden dem Rande des Kiefers eine Zähnelung verleihen. Die Seitenstücke sehr zart, gleichfalls aus feinen Leisten bestehend.

Die Genitalien stimmen im Allgemeinen mit denen der *Gyraulus*-Gruppe überein. Der Penis trägt an seinem vorderen Ende ein chitinoses Stilet, das völlig dem von *Planorbis albus* gleicht; es ist ein dütenartig gerolltes lancettliches Blatt mit verdickter Basis, durch welche er auf dem Penisende befestigt ist. Durch die erwähnte Einrollung gleicht er auf dem ersten flüchtigen Blick einem der Länge nach durchbohrten pfriemenförmigen Gebilde (Fig. 9).

##### 2. *Planorbis proclivis* n. Taf. I, Fig. 11—16.

Testa subdepressa, paucispira, utrinque umbilicata, griseo-flavescens;

anfr. 3, sat celeriter crescentes, convexi, ultimus antice valde descendens; sutura profunda; umbilicus inferus latus; apertura perobliqua, margine externo bene arcuato, columellari stricto.

Diam. maj.  $4\frac{1}{2}$ , min. 4, alt.  $2\frac{1}{2}$ ; diam. apert. 2 Mill.

Sumatra: Pajakombo, Ajer-tabit, Tabeh di Aripa östlich von Singkarak, Danau di atas, hier bis 28 Met. tief.

Durch die abgerundete Peripherie leicht von der vorigen zu unterscheiden. Im Jugendzustand, fig. 14—16, ist die Mündung noch nicht nach vorn übergeneigt, daher das allgemeine Ansehen ein ganz anderes, doch lässt der weite tiefe Nabel schon die Art erkennen.

3. *Planorbis compressus* Hutt. Taf. 1, Fig. 17—22. und Taf. XII, Fig. 7. und 10.

Pl. neglectus Van Hasselt 1823, ohne Beschreibung.

Pl. compressus Hutton in Journ. As. Soc. Bengal III, 1834, p. 93, 94. Benson ebenda V, p. 743. v. Martens in Malak. Blätt 1867 S. 213. Hanley u. Theobald Conchologia Indica p. 40 pl. 99 fig. 1 und 4. Clessin in der neuen Ausgabe von Chemnitz Planorbis S. 107.

Pl. Tondanensis (non Q. G.) Mousson jav. Moll. S. 44, Taf. 5, Fig. 4.

Java: Situ-Bagendit bei Garut, Preanger-Regentschaften, das grösste Stück 6 Millim. im Durchmesser, 2 hoch; Buitenzorg, junge Stücke.

Celebes: bei Makassar, im Fluss bei Tete-adjı und in Luwu namentlich im Fluss bei Palopo; auch von mir bei Makassar in einem Süsswassersumpf an der Wurzeln von Pistia gefunden.

Zuerst von Van Hasselt auf Java gefunden, dann von Zollinger, Teysmann und mir, auf Sumatra bei Palembang und auf Celebes bei Makassar ebenfalls von mir. Exemplare von Singapore und Pulo Pinang in der Sammlung der East India Company, jetzt dem Britischen Museum einverleibt. In Vorderindien selbst verschiedene Fundorte angegeben.

Clessin's Abbildung, Tafel 17 (nicht 16) Fig. 10 stellt die schärfer gekielte Abart dar, welche ich am angeführten Ort als var. Siamensis bezeichnet habe, und zu der ich nun auch Exemplare von den Philippinen kenne; vielleicht ist sie besser als eigene Art zu trennen.

Der Artnamen compressus ist zwar in dieser Gattung schon von Michaud 1830, also vor Hutton, für eine andere Art gebraucht worden, aber da diese ohne Zweifel der ächte Vortex von Linne

ist, braucht deshalb Hutton's Name nicht geändert zu werden.

Nevill's *Pl. javanicus* Mouss. handlist Moll. India Mas. I p. 244 ist entweder auch diese Art oder noch wahrscheinlicher mein *Pl. infraligneatus*, Malak. Blatt 1867 p. 213, Clessin Taf. 23 Fig. 4, da Nevill seine Art von Freiherrn von Richthofen in grösserer Anzahl aus Java erhielt, wie ich die ebengenannte.

Radula nach der Untersuchung von Hrn Protz 0,9 Mill. lang, 0,15 breit; 31 Längsreihen. Mittelzahn niedrig, mit zwei sehr kleinen Spitzen. Seitenzähne dreispitzig mit längerer Mittelspitze, welche allmählig kleiner wird; beim siebenten bis elften sind die drei Spitzen ziemlich gleich. Die weiter nach aussen folgenden Zähne sehr niedrig, vier- und zuletzt fünf-spitzig.

Bei den Genitalien ist der Penis mit einer stumpfen kegelförmigen Papille versehen, an deren Basis die Ausgangsöffnung liegt. Ein Stilet, wie es bei dem im allgemeinen Habitus ähnlichen europäischen *Pl. albus* vorkommt, nicht vorhanden, so dass er hierin dem *Pl. marginatus* näher steht (Fig. 10).

#### 4. *Planorbis Tondanensis* A. G. Taf. I Fig. 23—25.

Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe, Zool. II p. 209 pl. 58 fig. 39. — v. Martens in Malak. Blätt. 1867. p. 215 — Clessin a. a. O. S. 218 (unrichtig *Fondanensis*). Nevill handlist Moll. India Mus. I p. 244 (fälschlich „*tonganensis*“).

Nord Celebes: See von Tondano, Quoy und von Martens.

Nach Nevill handlist p. 244 hat auch Teysmann diese Art in dem genannten See gesammelt, ich habe aber die Exemplare nicht gesehen.

Diese Art, aus dem See von Tondano im nördlichen Celebes, wird nach Mousson's Vorgang von den neueren Autoren für identisch mit dem vorigen gehalten, obwohl Mousson selbst schon hervorhebt, dass die letzte Windung in Quoy's Figur verhältnissmässig grösser sei, als bei seinen javanischen Stücken. An dem einzigen offenbar noch jungen Stücke, das ich selbst bei flüchtigem Aufenthalt an dem genannten See fand, sehe ich hierin einen so auffallenden Unterschied von gleich grossen jungen *Pl. compressus*, dass ich ihn für eine eigene Art halten muss, vgl. die Abbildung dieses jungen *Tondanensis*, Fig. 23—25 mit einem jungen *compressus* von Buitenzorg, Fig. 20—22. Hoffentlich bringen die Herren Sarasin reicheres Material von dort mit.



## B) SEGMENTINA Flem.

Schale stark glänzend, im Innern mit periodisch sich wiederholenden Verdickungen, welche nach aussen als helle Strahlen durchscheinen. Auch diese Untergattung kommt sowohl in Indien als in Australien vor.

5. *Planorbis calathus* Bens.

Benson in Ann. Mag. n. h. (2) V, 1850 p. 349. Hanley u. Theobald Conchol. Indica p. 18 pl. 39 fig. 1—3. Clessin Planorbis in d. Fortsetzung v. Chemnitz, S. 136 Taf. 15 Fig. 13. Tapparone-Canefri fauna malacologica della Nuova Guinea in Ann. Mus. civ. st. nat. di Genova XIX 1883, p. 249.

Java Buitenzorg.

Bis jetzt von Vorderindien, Ceylon und Siam, aber auch von den Aru-inseln bei Neu-Guinea bekannt, so dass seine Auffindung in Java eine merkliche Lücke ausfüllt und weitere Nachweise für die andern Inseln des niederländischen Gebiets in Aussicht stellt. Die vorliegenden Exemplare sind nur klein, das grösste  $2\frac{1}{2}$  Mill. im grossen Durchmesser und etwa 1 hoch, mit 3 Zahnstrahlen auf der letzten Windung, verhältnissmässig noch höher, stumpfkantiger u. die obern Windungen mehr eingesenkt als bei Pl. Clessini Westerl. und in noch höherem Grad als bei unserem europäischen Pl. nitidus. Lebhaft goldgelb glänzend; ein kleineres Exemplar blass weisslich.

*Ancylus* Geoff.

Schale einfach mützenförmig. Fühler kurz, dick.

Das Auffinden dieser Gattung auf Java und Celebes füllt eine bis jetzt bestandene scheinbare Lücke in ihrer Verbreitung aus, da man sie sowohl von Vorderindien nebst Ceylon, als von den Philippinen und Nord-Australien kannte, aber noch nicht von Niederländisch-Indien.

1. *Ancylus Javanus* n. Taf. I, Fig. 35—37.

Testa oblonga, sat depressa, pallide flavescens, nitidiuscula, vertice sinistrorsum flexo, ad  $\frac{2}{7}$  longitudinis sito, obtuso, lateribus strictis, parallelis, extremitate anteriore magis attenuata.

Long  $2\frac{1}{2}$ , lat.  $\frac{1}{3}$ , alt. 1 Mill.

Java: Buitenzorg.

2. *Ancylus Celebensis* n. Taf. I, Fig. 38, 39. und Taf. XII, Fig. 8.

Testa ovato-oblonga, sat convexa, diaphana, alba vel fuscescens, opaca, vertice sinistrorsum spectante, ad  $\frac{1}{4}$  longitudinis sito, acutiusculo, lateribus paulum arcuatis, extremitate antica et postica subaequaliter rotundatis. Long. 3, lat. 2, alt. 1 Mill.

Celebes: Pare-Pare und in einem Flüsschen bei Loka (Bonthain).

Radula nach der Untersuchung von Hrn. Protz 0,5 Mill. lang, 0,1 breit, mit etwa 33 Längsreihen. Im Ganzen ähnlich derjenigen von *A. (Velletia) lacustris*, jedoch die Querreihen geradlinig. Mittelzahn zweispitzig. Die vordere Kante der Seitenzähne ist sehr schräg gestellt; diese selbst vom ersten bis sechsten dreispitzig, vom siebenten an vierspitzig, vom zehnten an fünfspitzig; die äussersten Seitenzähne sehr niedrig und vierspitzig.

## b) PROSOBRANCHIEN.

### AMPULLARIIDEN.

#### *Ampullaria* Lam.

Schale bauchig-eiförmig, mit kurzem Gewinde und länglich-elliptischer, unten meist etwas nach vorn vorgezogener Mündung und etwas ausgebreitetem, oft besonders gefärbten Mündungsrand. Deckel bei den altweltlichen Arten fest, kalkig, concentrisch, der Kern dem Innenrande näher als dem Aussenrande. Thier für Luft- und Wasserathmung eingerichtet, indem neben der Kiemenhöhle mit kammförmiger Kieme noch ein eigener Nebenraum mit gefässreichen Wandungen zum subsidiären Luftathmen vorhanden ist. Ein Paar langer spitziger sehr beweglicher Fühler, an deren Basis auf eigenen kurzen cylindrischen Stielen die Augen sitzen; ein zweites Paar kürzerer Fühler weiter vorn am Mund. Hierüber und über die Anatomie der Arten des indischen Archipels siehe Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe III p. 167 pl. 57 fig. 1—4. (Gray. fig. moll. an I pl. 47 fig. 1 und 4) *Ampullaria Celebensis*, und Semper Entwicklungsgeschichte der *Amp. polita*, Utrecht 1862. Nach Quoy und Gaimard ist *Amp. Celebensis* lebendig gebärend.

Die Ampullarien sind über die Continente und grösseren Inseln der Tropenzone ringsum verbreitet, circumtropisch; in Afrika kommen sie durch der Nil bis Aegypten (*A. ovata*), in Nord-Amerika bis Georgia

(*A. depressa*); nach Süden gehen sie nur in Südamerika etwas über den südlichen Wendekreis hinaus. In Australien scheinen sie völlig zu fehlen, einige frühere Angaben über australische Ampullarien bei Jan und Reeve haben sich bis jetzt nicht bestätigt; auch aus Neu-Guinea und Timor kennen wir bis jetzt noch keine, so dass ihre Verbreitung im malayischen Archipel nur bis Celebes reicht, wo sie aber noch gut vertreten sind, wie auch auf den Philippinen; hierin also ist Celebes, und zwar auch das südliche, philippinisch und nicht australisch. Auf Amboina sagte mir ein praktischer Conchyliensammler, Hr. Hoed, der selbst schon auf Celebes und Buru gewesen war, dass Ampullarien auch noch auf der Insel Amblauw, südöstlich von Buru, vorkommen, sonst aber nirgends auf den Molukken, namentlich nicht auf Amboina oder Ceram; letzterem kann ich aus eigener Erfahrung beistimmen, ersteres möge wenigstens einem künftigen Besucher dieser wenig bekannten Insel zur Berücksichtigung empfohlen sein. Aus der Insel Bangaai zwischen Ost-Celebes und den Sula (nicht Sulu) Inseln ist neulich eine *Ampullaria*, wahrscheinlich *Celebensis*, in deutsche Sammlungen gekommen.

Aus Niederländisch-Indien kenne ich bis jetzt nur drei Hauptformen von Ampullarien: die grosse, unten namentlich in der Jugend stärker verschmälerte *A. ampullacea* mit ziemlich kurzem Gewinde, die kleinere unten mehr bauchig gerundete *A. scutata* und die mehr regelmässig eiförmige spiegelglatte *A. polita* Desh.; ob die beiden ersteren nur sehr variabel sind oder sich innerhalb derselben noch mehrere Arten mit haltbaren Characteren, vielleicht auch nach den einzelnen Inseln, unterscheiden lassen, ist mir noch nicht klar. Ich begnüge mich daher im Folgenden die von Prof. Weber gesammelten aufzuführen.

#### 1. *Ampullaria ampullacea* Lam.

*Cochlea lutaria*, die grosse, Rumph amboin. rarit. p. 92 (deutsche Übersetzung S. 56) Tab. 27 fig. Q, und p. 88 (deutsch 50) wo IX Deckel. *Helix ampullacea* Linne syst. nat. ed. X und Mus-Lud. Ulr. p. 666, zum Theil, soweit auf Rumph bezüglich. *Amp. Celebensis* Quoy et Gaimard Voy. Astrol., Zool. III p. 167 pl. 57 fig. 1–4 Mousson jav. moll. S. 59 Taf. 9 fig. 1. — *A. Sumatrensis* Dunker, Philippi in der neuen Ausgabe v. Chemnitz, Amp. S. 59 Taf. 19 Fig. 12. — *A. ampullacea* (L.) Reeve conch. ic. X fig. 48. — Veth Midden-Sumatra

p. 12 pl. 2 fig. 7. (Radula). — v. Martens in Malak. Blätt 1857 p. 185.

Sumatra: In einem Weiher bei Solok, ein junges Stück.

Celebes: Luwu; jüngere Exemplare in einem Teich bei Makassar und im Fluss bei Palopo.

Philippi hatte diese Art durch Dunker von Danau-luar in Sumatra, Quoy und Gaimard von Manado in Celebes. Ich habe diese Art auch zu Palembang auf Sumatra, zu Singkawang auf Borneo, bei Maros in sumpfigen Reisfeldern und in der Minahassa auf Celebes gesammelt; in Mousson's Sammlung findet sie sich auch von der Insel Banka und von Pardana (?) auf Java, im Berliner Museum ferner von Tana-laut im Südwesten von Borneo durch Semmelink und aus Deli an der Nordostküste Sumatra's durch L. Martin, in Leyden auch von Putus-Sibau in Borneo durch Büttikofer. Rumph kannte sie schon von Celebes (Makassar), Java, Bali und Sumatra, dagegen darf man daraus, dass sie bei ihm vorkommt, nicht schliessen, dass er sie auf Amboina gefunden habe; seine amboinische Raritäten-kammer enthält eben alle Naturalien, die er während seines langen Aufenthaltes auf Amboina zusammengebracht hat, wie man auch heute noch dort durch eingeborne Händler Conchylien aus Celebes, Timor, Neu-Guinea erhalten kann, und gerade die Anführung der besondern Fundorte zeigt, dass Rumph sie nicht von Amboina hatte.

Philippi a. a. O. wollte *A. Sumatrensis* als eng genabelt von *Celebensis*, die undurchbohrt sei, unterscheiden, aber in seiner Beschreibung und Figur hat *Celebensis* eine enge Nabelspalte und Quoy u. Gaimard sagen a. a. O. le bord columellaire cache un ombilic en fente, peu saillant. Der Unterschied ist also nicht gross.

Eine kleine Form von den Saleyer-inseln, das grösste Stück nur 39 Mill. lang, 30 breit, Mündung 29, doch schon mit etwas verdicktem Mundrand, dürfte nach dem kurzen Gewinde auch noch eher zu dieser Art, als zu *scutata* zu rechnen sein; das grösste Stück ist einfarbig braun mit regelmässigen breiten etwas erhabenen Vertikalstreifen; Bänder nur im Innern der Mündung sichtbar. Bei zwei kleineren, entschieden unausgewachsenen Stücken ist diese Skulptur fast gar nicht vorhanden, die Färbung aussen grünbraun mit zahlreichen wenig dunkleren grünlichen Bändern.

## 2. *Ampullaria scutata* Mouss.

*Cochlea lutaria*, die kleine, Rumph a. a. O.

*Amp. scutata* Mouss moll. jav. S. 60 Taf. 8 fig. 2, 1849. — v. Martens in Mal. Blatt. 1857 S. 186.

*Amp. conica* (?? Gray in Wood index testur. suppl. tab. 7 fig. 22, 1828) Hanley miscell. conchol. tab. 3, fig. 13 links, 1854. — Reeve conch. ic. fig. 10. — Nevill catal. Moll. Ind. Mus. 1877 p. 7 und handlist II, p. 5. — Böttger. Bericht d. Senkenberg. Gesellsch. 1890 S. 156.

*Amp. Javanica* Reeve conch. ic. fig. 96.

*Amp. compacta* var. Reeve conch. ic. fig. 71.

Java: Buitenzorg, ein ganz junges Exemplar; ebenda auch von Prof. Semon gefunden.

Celebes: Tete-adji und Tempe, grösstes Exemplar 48 Mill. lang, 41 breit, Mündung 23 lang. Auch von mir bei Makassar am Boden eines Süsswassersumpfes gefunden.

Ich fand diese Art auch bei Palembang und Lahat auf Sumatra, Singkawang, Bengkayang, Mampawa und Mandhor im westlichen Theil von Borneo; in Mousson's Sammlung sah ich Exemplare von Banka und Bali. Auch bei Singapore, Malakka und auf Pulo Pinang ist sie gefunden.

Mehrere englische Autoren betrachten diese Art als identisch mit *A. conica* Gray bei Wood, 1828, welcher Name die Priorität haben soll. Die ursprüngliche stark verkleinerte Abbildung, Wood index testac. suppl. pl. 7 fig. 22, ohne Fundortsangabe passt aber nicht zu *scutata*; Hanley conchol. miscellan. 1854 gibt zwei Abbildungen, wie er sagt, nach dem Typus, d. h. Original-exemplar. Diese zwei sind aber unter sich verschieden, diejenige links, Mündungsansicht, dürfte *scutata* sein, diejenige rechts dagegen, Rückenansicht, kann nicht von demselben Individuum sein und passt nicht zu *scutata*, wohl aber besser zur Originalfigur bei Wood. Blanford in British Burma Gazeteer I p. 712 setzt dagegen *conica* Gray gleich *Amp. paludinoïdes* Phil., was eine gut verschiedene Art ist. Pfeiffer, novitat. conchol. I, p. 51, hat *conica* Wood sogar auf eine Art von Cuba gedeutet, so wenig fest gestellt ist sie durch jene Abbildung; ich ziche daher den sichern Namen *scutata* vor.

## PALUDINIDEN.

### **Vivipara** Lam.

*Vivipara* Lam. 1809. *Viviparus* Montf. 1810. *Paludina* Lamarck

1812 z. Theil. Schale kugelig-konisch oder eiförmig, grünlich oder bräunlich, Mündung eiförmig, oben spitzwinklig, unten einfach abgerundet. Deckel dünn, glänzend braun, mit concentrischen Anwachslineen und dem Kern nahezu in der Mitte, etwas näher dem Columellarrand. Lebendiggebärend, Junge mit schon ausgebildeter Schale von mehreren Windungen, öfters mit Haarreihen, in dem Ovidukt der weiblichen Exemplare zu finden; die Schalen der weiblichen Thiere öfters etwas grösser und bauchiger als die der männlichen; letztere an der Ungleichheit der Fühler zu erkennen.

Diese Gattung ist weit verbreitet, sowohl im alten Continent, als in Nordamerika und Westindien; namentlich kommt sie auch in Vorderindien und in Australien vor; ihr Fehlen auf den Molukken dürfte daher mehr der Seltenheit passender stehender Gewässer als einer geographischen Grenze zuzuschreiben sein. Betreffs der Arten des malayischen Archipels haben Quoy und Gaimard das Lebendiggebären bei *V. costata*, im Monat September am See von Tondano, festgestellt; vgl. auch die Bemerkung bei *V. Javanica*. Meist am Grund sitzend, seltener an Wasserpflanzen.

#### 1. *Vivipara costata* Q. G.

*Paludina costata* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe, zool. III 1832 p. 170, pl. 58 fig. 1—5. — Reeve conch. icon. XIV fig. 6. v. Martens in Malak. Blätt 1865 S. 148, 149. Schepman Not. Leyd. Mus. XV p. 455.

— *Burroughiana* Lea in Transact. Am. philos. soc. V (Najad. I) 1835—1837 p. 225 pl. 19 fig. 80 von Luzon.

— *angularis* (non Müll.) Philippi Abbild. neuer conch. I. Taf. 1 fig. 10. Küster neue Ausgabe von Chemnitz, Pal. S. 26. Taf. 5, Fig. 15, 16 und Taf. 6 Fig. 3—5. Reeve a. a. O. fig. 14.

An den stark abgesetzten Windungen und dem offenem Nabel, der meist deutlich Spiralskulptur zeigt, zu erkennen. Die typische Form, mit stark ausgeprägten zwei Kanten, die eine in Schulterhöhe und daher auf allen Windungen sichtbar, die untere nur an der letzten Windung, und einer oder mehreren starken Spiralleisten dazwischen, ist bis jetzt aus dem nördlichen Celebes, Borneo und den Philippinen bekannt; ich fand sie im See von Tondano, woher sie auch Quoy u. Gaimard hatten, und unterhalb davon bei Sawangan. Vermuthlich gehören zu ihr auch *Pal. carinata* Valenciennes in Hum-

boldt observations zoologiques II 1829 p. 252 pl. 56 fig. 2, fälschlich von Mexico angegeben, wahrscheinlich von den Philippinen, wie einige andere ebenda beschriebene Schnecken, und *Pal. tricostrata* Lesson Voy. de la Coquille, zool. II 1830 p. 349, ohne Abbildung, angeblich von Neu-Guinea.

*Vivipara costata* var. *laevior* n. Taf. II, Fig. 5, 6.

*Paludina Burroughiana* (Lea) Reeve conch. ic. XIV fig. 16.

Die beiden Kanten schwächer, die obere zuweilen fast ganz geschwunden, die Spiralleisten ebenfalls schwach, nur streifenartig. An der breiteren Gestalt, der deutlichen Abflachung der Schale gegen die Naht zu und dem offenen, etwas kantigen Nabel noch von *V. Javanica* zu unterscheiden.

Java: Sinagar, ein junges Exemplar. Schön ausgebildete Exemplare, bis 36 Mill hoch und 28 breit, Mündung 19, aus dem Gebirgs-See Telaga Patengan, 4600' hoch, in den Preanger-Regentschaften durch Herrn von Richthofen im Berliner Museum für Naturkunde.

Celebes: Fluss bei Maros, Seen bei Tete-adjai und bei Sidenreng (Fig. 5). Minralang-Fluss bei Tempe und See ebenda (Fig. 6).

Aus dem nördlichen Theil von Celebes kenne ich bis jetzt diese Form noch nicht, doch zweifle ich kaum, dass sie auch dort vorkomme, da eine noch mehr abgerundete Form, an der beide Kanten verschwunden sind, aber der Nabel noch offen, vielleicht Mousson's *gratiosa*, von Tombuku durch Herrn Ribbe im Berliner Museum vorhanden ist. Immerhin zeigt sich aber auch schon so, das Süd-Celebes mehr mit Java, Nord-Celebes mehr mit den Philippinen gemein hat.

Schon Mousson (moll. jav. S. 62) hat richtig erkannt, dass die im alten Werk von Chemnitz (conch. cab. IX fig. 1222, 1223) abgebildete chinesische Art von Philippi's *angularis* = *costata* Q. G. verschieden ist, aber er hat übersehen, dass eben diese Art von Kanton (*quadrata* Bens.) O. Fr. Müller's *angularis* ist (hist. verm 1774 p. 187).

## 2. *Vivipara Javanica* Busch.

*Paludina Javanica* V. d. Busch bei Philippi abbild. neuer conchyl. I Taf. 1 Fig. 11, 12, 1844. Mousson jav. moll. S. 61 Taf. 8 Fig. 3,

4. Küster in d. neuen Ausgabe v. Chemnitz, Taf. 5 Fig. 7—10. Reeve fig. 52. v. Martens in Malak. Blätt. 1865 S. 150. — Nevill handlist Ind. Mus. Calcutta II p. 23. — Böttger im Bericht d. Senkenberg. nat. Gesellschaft 1890 p. 155.

Die typische Form, mit schwacher dichter Spiralskulptur, kaum oder wenig eingeschnittener Naht, ganz engem, fast verdecktem Nabel und meist blassgrüner, seltener dunkelsaftgrüner Farbe, scheint durch ganz Java häufig zu sein; Zollinger sammelte sie zu Tjiringin in Bantam, ich in der Umgegend von Batavia, ferner bei Sindanglaya, Prof. Semon bei Buitenzorg, F. Jagor zu Malembong (Malangbong) in den Preanger-Regentschaften; im mittlern Java fand ich sie in einem Teich der Wasserburg bei Djokjokarta und am Ufer des Solo-flusses bei Surakarta; im östlichen bei Surabaya und erhielt sie auch von Passuruan. Das mehr oder weniger Hervortreten einer Spur von einer unteren Kante, mehr oder weniger Wölbung der Umgänge, Offenbleiben eines Nabelritzes oder Schluss desselben, helle oder schwärzliche Färbung des Mundsauces kann an einem und demselben Fundorte variiren, so dass Mousson's drei „Hauptformen“ scalaroides, albomarginata und nigromarginata kaum mehr als individuelle Abänderungen sind. Ausserhalb Java ist sie von Zollinger auf Madura und Bali (P. amplior Mouss. in seiner Sammlung, Reeve fig. 55, scheint eine etwas bauchige kleine Form von javanica), auf Sumatra bei Palembang von mir und Teysmann (var. Sumatrensis Mouss. in seiner Sammlung, mit hammerschlagartigen Eindrücken, die aber auch bei javanischen Exemplaren vorkommen) und auf Borneo bei Singkawang von mir (mit schwarzem Mindungsrand) gefunden worden.

Das grösste Exemplar aus Java, das ich gesehen, ist 37 Mill. lang, 25 breit, Mündung  $16\frac{1}{2}$  und 14.

*Vivipara Javanica* var. *Moussoni* n.

*Paludina angularis* (non Müll.) Mousson moll. jav. S. 62 Taf. 8, fig. 5.

Durch schärfere Spiralskulptur ausgezeichnet und sich dadurch der *V. costata* nähernd, aber in der Form noch ganz zu *Javanica* gehörig.

Java: Buitenzorg und Situ bagendit unweit Garut in den Preanger-Regentschaften. Zollinger fand sie bei Tjiringin



in Bantam, ich bei Sumedang, ebenfalls in den Preanger-Regentschaften.

Das grösste der von Prof. Weber im Situ bagendit gefundenen Stücke ist 34 Mill. lang, 25 breit, Mündung 15 lang und 12 breit, es hat 7 Windungen und keine Spur einer untern Kante, während ein nur wenig kleineres, 32 Mill., diese Kante noch deutlich zeigt.

Unter den Exemplaren von Buitenzorg finden sich auch junge, von 4 Windungen, sie zeigen zwar keine Haare, wie die neugeborenen der europäischen *V. contecta* Millet (Listeri Forbes, vera Frnfd.), aber doch 2–3 Spiralreihen kleiner Grübchen, welche auf frühere Anwesenheit von Haaren deuten (Taf. II Fig. 1, 2), so dass also auch hierin die indische Art mit der europäischen übereinkommt.

*Vivipara Javanica* var. *Celebensis* Mouss. Taf. II Fig. 4. und Taf. XII Fig. 11.

*Paludina Celebensis* Mouss. in collect.

— *virescens* Reeve conch. ic. fig. 70. (jung). v. Martens in Mal. Blatt. 1865 p. 149.

Skulptur gleichmässig fein wie bei der typischen *Javanica*, aber die Windungen stärker gewölbt, eine Schulterkante nicht eigentlich vorhanden, aber doch durch stärkere Rundung auf den früheren Windungen angedeutet, auf der letzten aber keine Spur davon. Untere Kante deutlich. Nabel ganz eng. Glänzend, dunkelbraun.

Celebes: Teich bei Makassar, Fluss bei Tete-adj und Palopo-Fluss in Luwu. Junge Exemplare zeigen die Spur einer obern Kante, aber nicht (oder nicht mehr) die drei Kanten der europäischen Arten.

Ähnlich breite und dunkelbraune Stücke mit stark gewölbten obern Windungen auch von Samarang auf Java durch Wiepken in Dunker's Sammlung, 37 Mille hoch, 21 breit, Mündung  $14\frac{1}{2}$  und 12 Mill.

*Vivipara Javanica* var. *Macassarica* n.

Windungen mehr gewölbt mit tieferer Naht; Skulptur gleichmässig fein; keine Spur von unterer Kante. Dunkel grünbraun.

Bei Makassar in Süsswassersümpfen von mir gefunden, meist stark mit Algen bewachsen, auf Schlammgrund. Variirt bei gleicher Länge merklich in der Breite, so habe ich zwei Stücke vor mir, welche beide 28 Mill. lang sind und eine Mündung von 15 Mill. Länge haben, aber das eine ist 22, das andere nur 20 Mill. breit.

*Vivipara Javanica* var. *Saleyerica* Taf. II Fig. 3.

Eine kleine ziemlich breite Form ohne Spur von Schulterkante, die untere Kante aber deutlich wie bei var. *Celebensis*. Mündungsrand innen schwarz. Nabel eng. 5 Windungen. Länge  $18\frac{1}{2}$ , Breite 15, Mündungslänge  $10\frac{1}{2}$  Mill.

Saleyer, vier Stück ziemlich gleicher Grösse, daher vermuthlich erwachsen.

Dass diese Art oder doch eine sehr ähnliche auch auf Ceram, also im Gebiet der Molukken, vorkomme, scheint sich aus Exemplaren zu ergeben, welche ich auf Amboina in den Sammlungen dortiger Liebhaber sah und welche nach mündlicher Angabe von Ceram kommen sollten. Doch ist sichere Bestätigung wünschenswerth.

*Radula von Vivipara javanica* var. *celebensis* (Taf. XII Fig. 11).

Ähnlich der bei Troschel unter dem Namen *angularis* abgebildeten Art. Mittelplatte breit, am freien Rande mit 11 Zähnnchen, von denen der mittlere fast ein Drittel so breit wie die ganze Platte ist. Zwischenplatte mit 9 Zähnnchen, der sehr breite mittlere nach innen in eine starke Spitze ausgezogen, welche die innere Vorderecke der Platte bildet. Innere Seitenplatte mit 11 Zähnnchen; an den die innere Ecke bildenden grösseren Zahn schliessen sich nach innen 4, nach aussen 6 Zähnnchen von fast gleicher Grösse an. Die 11 Zähnnchen der ziemlich breiten äusseren Seitenplatte sind sehr winzig.

3. *Vivipara Sumatrensis* Dkr. Taf. X Fig. 1, 2.

*Paludina Sumatrensis* Dunker in Zeitschr. f. Malak. 1852 S. 128. — Reeve conch. ic. fig. 65. — v. Martens in Malakol. Blätt. 1865. S. 149.

*Paludina lineolata* Mouss. in collect. (v. Frauenfeld in Verhandl. zool. bot. Gesellsch. 1862 p. 1163?) non Reeve.

Sumatra: Solok in einem Weiher und Singkarah.

Dunker hat diese Art zusammen mit *Unio macropterus* und *Corbicula pullata* aus dem Danau-luar erhalten, ich fand sie längs des Enim-flusses bei Muara Enim, Gunung Megang und Lahat, sowie am Musi-fluss bei Tibingtingi und Kepahiang; das Berliner Museum erhielt sie auch von Deli an der Nordostküste Sumatra's durch L. Martin. Morelet, series conchyl. IV p. 301, Nevill (handlist II p. 22) und Andere wollen diese Art mit der siamesisches *P. polygramma* Marts, Proc. Zool. Soc. 1860 p. 13 identificiren, ich finde sie aber durch die

deutliche Spiralskulptur und das Vorhandensein einer untern Kante, zu welcher sich an einigen Exemplaren noch eine obere gesellt, hinreichend verschieden und näher der javanica, als der Bengalensis, mit welcher sie nur die zahlreichen dunkeln Bänder gemein hat. Mousson's *P. lineolata* von Palembang an der Mündung des Musi-flusses, habe ich, als ich 1864 seine Sammlung durchsah, unbedenklich für Sumatrensis gehalten, dagegen beschreibt v. Frauenfeld a. a. O. sie als glatt und Reeve bildet als *lineolata*, fig. 50, eine Schnecke aus Siam ab, welche ich für die glatte, der Bengalensis viel näher stehende *polygramma* aus Siam halte.

4. *Vivipara grossicosta* n. Taf. II Fig. 7, 8.

Testa conoideo-oblonga, imperforata, costis grossis latiusculis, in anfractibus superioribus 2—3 conspicuis, in ultimo 5—8, tribus basalibus approximatis levioribus, interstitiis verticaliter striatulis; periostraco flavescenti-fusco, concolore; anfr. 6, convexi, sutura sat impressa distincti, ultimus basi rotundatus; apertura parva, sat obliqua, subovata, superne obtuse angulata, peristomate recto, crassiusculo, margine columellari leviter arcuato, subduplicato.

Long. 27, diam. 19, aperturae long. 13, lat. 10 Mill.

Sumatra: See von Singkarah.

Sehr eigenthümlich durch die dicken starken Spiralrippen, welche denen der chinesischen *V. angularis* Müll. (quadrata Bens.) ähnlich, aber in grösserer Anzahl vorhanden sind.

**Bithynia** Leach.

Schale ähnlich *Paludina*, aber immer kleiner. Deckel fest, kalkig, concentrisch. Fühler dünn, fadenförmig, bei beiden Geschlechtern gleich.

1. *Bithynia truncata* Eyd. Soul. Taf. IX Fig. 11, 11b.

Eydoux et Souleyet Voyage de la Bonite zool. II, p. 548, pl. 31, fig. 22—24.

B. goniomphalos Mobelet in Revue zoolog. 1866 und series conchyl. IV p. 34, pl. 13 fig. 4; Nevill handlist Moll. Ind. Mus. II p. 38.

Konisch-eiförmig, eng durchbohrt, schwach gestreift, ziemlich fest-schalig, dunkelbraun; Gewinde nur bei jungen Exemplaren spitz und unversehrt, bei älteren immer ausgenagt, so dass oft nur 3, höchstens 5 Windungen übrig bleiben. Nabelritz von einer stumpfen Kante um-

geben. Mündung eiförmig, nur wenig schief, oben winklig, Mündungsrand dick, etwas doppelt, aussen oft schwärzlich. Länge 9, Breite 7, Mündung 5 und 4 Mill. Deckel an der Aussenseite etwas gewölbt, weiss, glatt, an der Innenseite etwas concav, mit deutlich concentrischen Anwachsstreifen.

Celebes: bei Luwu.

Dieselbe Art habe ich auf Java im See von Grati bei Passuruan und bei Malang gefunden, ferner auf Celebes bei Makassar, und in Siam bei Bangkok, Eydoux und Souleyet in Cochinchina; im Calcutta-Museum ist sie aus Birma vertreten. Die Exemplare von Malang weichen durch mehr geradlinig conische Form etwas ab.

### ***Pachydrobia* Cross. Fisch. 1876.**

Schale Paludina-artig, glatt, dick, mit stark verdicktem Mündungsrand. Deckel spiral. Mittelplatte der Radula ähnlich wie bei *Hydrobia*, aber die Mittelspitze breit und stumpf; vier Zähnchen jederseits auf der Fläche der Mittelplatte (Poirier in Journ. de Conchyl. XXIX 1881, pl. 3 fig. 1).

#### **1. *Pachydrobia lacustris* n. Taf. IX, Fig. 12—15.**

Testa ovata, imperforata, laevis, nitidula, pallide flava, apice obtuso, sutura mediocriter impressa; anfr. 4, convexiusculi, regulariter crescentes, ultimus convexus, basi sensim attenuatus; apertura subverticalis, ovata, superne acutangula, peristomate valde incrassato, modice expanso, caerulescente-albido, continuo, margine externo leviter arcuato, basali late rotundato, columellari paulum arcuato, indistincte in callum parietalem crassum turgidum transeunte. Long. 5, diam. 3 aperturae long.  $2\frac{1}{8}$  diam.,  $1\frac{2}{3}$  Mill. (incluso peristomate).

*Var. subglobosa* Fig. 13, Spira brevior, anfr. ultimo magis convexo, margine externo peristomatis superne valde arcuato. Long.  $4\frac{1}{2}$  diam. 3, aperturae long. 3, diam.  $2\frac{1}{2}$  Mill.

Sumatra: See von Singkarak, typische Form und Varietät untereinander.

Kleiner und verhältnissmässig kürzer als *P. parva* Lea, mit schwächerem Parietalwulst.

#### **2. *Pachydrobia parva* Lea.**

*Pachychilus parvum* Lea Proc. Ac. nat. sc. Philadelph. VIII 1856 p. 145 und observ. Unionid. XI p. 76 pl. 22 fig. 14.

*Melania crassilabrum* Reeve conch. icon. XII fig. 221. 1860.

*Paludomus cyanostomus* Morelet Journ. de Conch. XII 1864 p. 288.

*Paludomus parvus* (Lea) Morelet series conchyl. IV p. 315.

*Melania parva* (Lea) Brot Melaniaceen in d. neuen Ausgabe v. Chemnitz S. 55 Taf. 6 Fig. 10.

Grösser und mehr länglich grünlich, Mündung sehr dickwandig, bläulichgrau; 10 Mill. lang,  $5\frac{1}{2}$  breit, Mündung einschliesslich des Randes 5, ohne denselben  $3\frac{1}{2}$  Mill.

Diese sonst von Siam und Cambodja bekannte Art habe ich auch auf Borneo in fliessendem Wasser, dem Kapuas-Strom bei Pontianak, gefunden; Issel gibt sie von Sarawak an.

## MELANIIDEN.

### *Melania* Lam.

Schale länglich, oft gethürmt, nicht selten mit ausgeprägter Skulptur (Höcker, Vertikalrippen oder Spiralleisten); Mündung länglich, oben mehr oder weniger spitzwinklig, unten gerundet und ein wenig eingebuchtet (ausgegossen, wie die Dille einer Kanne oder eines Schöpf-  
löffels), aber in verschiedenem Grade der Ausprägung, zuweilen zugleich etwas lappig vorgezogen. Deckel ziemlich dünn, hornig, spiral gewunden, mit mehr oder weniger Windungen (Taf. IV Fig. 23—27). Kopf mit vorstehender etwas zweilappiger Schnauze und 2 verhältnissmässig kurzen konischen Fühlern. Mantelrand ausgezackt. Abbildungen und Beschreibungen von lebenden Thieren aus dem malayischen Archipel bei Quoy und Gaimard, Voyage de l'Astrolabe, zool. pl. 56 (wo auch die Deckel mancher Arten), Eydoux u. Souleyet Voy. de la Bonite, zool. pl. 31 und Adams genera moll. pl. 31, Copieen davon in Gray's figures of mollusc. an. I pl. 55 und II pl. 127a; die Radula in Troschel's Gebiss der Schnecken, Bd I Seite 117—124, Tafel 9 und 10.

Die Melanien leben vorherrschend in fliessendem Wasser, öfters an Steinen, doch auch in stehendem, und zeigen oft in hohem Grade das Angefressen-sein oder den völligen Verlust der obersten Windungen, wie so manche Süsswasserschnecken; dieses kan veranlasst sein durch wirkliches Anfressen seitens anderer Schnecken, wie es an europäischen Schnecken, namentlich in kalkarmen Gewässern direkt beobachtet ist, oder durch mechanische Verletzung und Abreibung, von welcher die vorstehende Spitze besonders getroffen wird, da sie bei Bewegung



der Schale am meisten von dem Drehpunkt absteht und daher den weitesten Bogen beschreibt, auch der schon am längsten bestehende u. daher am öftesten der Gefahr ausgesetzte, zudem ursprünglich dünnste Theil der Schale ist, oder durch chemische Auflösung des Kalkes mittelst Humussäuren u. dgl, oder auch durch Einnistung mikroskopischer Algen. Diese an sich verschiedenen Ursachen können sich gegenseitig combiniren, namentlich wird die mechanische Verletzung der kalklosen Schalenhaut erst den chemischen Augriff auf die Kalkschale möglich machen. Man nennt es im Allgemeinen „cariös“, angefressen oder „angenagt“, „erosus“, die Gesamtwirkung eine „testa truncata“ oder „decollata“, ohne damit im einzelnen Fall bestimmen zu wollen, welche von den oben genannten Ursachen vorliegt. Ein eigentlicher Artcharacter ist es nicht, gehört daher streng genommen nicht in die Diagnose, aber wohl kann es bei manchen Arten in Folge der Eigenthümlichkeit ihres Aufenthaltes häufiger und in höherem Grade als bei andern vorkommen und dadurch einigermaassen bezeichnend für dieselben sein. Seltener ist Auflagerung von Kalksinter auf die unverletzte Schale, hauptsächlich in den kalkreichen Bächen bei Kupang auf Timor von mir und Prof. Weber bei *Melania laevigata* und *Neritina brevispira* gefunden.

Die Melanien sind in der östlichen Erdhälfte weit verbreitet, von Krain und dem Amurland bis Mossambique, Australien und den Sandwich-inseln; in Amerika finden sich Melaniiden von den grossen Seen zwischen Britisch-Nordamerika und den Vereinigten Staaten an bis ins südliche Brasilien, sie werden aber jetzt meist als besondere Gattungen von *Melania* getrennt; am nächsten stehen diesen noch die mittel-amerikanischen *Pachychilus*. Ein besonderer Reichthum der Inseln gegenüber den grossen Festländern findet bei *Melania* nicht in dem Grade wie bei *Neritina* statt; immerhin spielen aber Melanien und Neritinen bei weitem die Hauptrolle unter den Süsswasserschnecken Niederländisch-Indiens, sowohl nach Arten-, als Individuenzahl. Die Melanien dieses Gebiets lassen sich nach der Schale ziemlich bestimmt in verschiedene Unterabtheilungen gruppiren, welche hier im wesentlichen nach A. Brot's Monographie angenommen sind. Die Mehrzahl derselben ist diesseits und jenseits der Wallace'schen Grenzlinie vertreten, wie auch in den benachbarten Gebieten der ostafrikanischen Inseln, Vorder- und noch mehr Hinter-Indiens, der Philippinen und von Neu-Guinea; ein auffälliger Unterschied in den grössern am

meisten charakteristischen Arten zwischen Borneo und Celebes lässt sich aber nicht verkennen. Borneo schliesst sich hierin, wie in anderem, noch eng am Sumatra und Hinterindien an (Gruppe Brotia). Für Süd-Celebes ist *M. perfecta* und die ihr nächst stehenden Arten besonders charakteristisch. Java hat eine Gruppe, soviel wir bis jetzt wissen, ganz ausschliesslich für sich, diejenige der *M. testudinaria* und *sulcospira*. Von den 10 Untergattungen, welche in Niederländisch-Indien vertreten sind, leben acht sowohl in der östlichen als in der westlichen Hälfte, nämlich *Stenomelania*, *Melanoides*, *Plotia*, *Tiaropsis* und *Tarebia* von Sumatra bis zu den Molukken und Timor, ja bis Neu-Guinea und zum Theil noch in Polynesien; *Sermyla* von Banka (wahrscheinlich auch noch auf Sumatra zu finden) bis Molukken und Timor; *Balanocochlis* von Java bis Flores und Neu-Guinea, endlich *Melania* in engern Sinn zwar auch wieder von Sumatra bis Neu-Guinea, aber doch in der östlichen Hälfte, auf den Molukken, häufiger und reicher entwickelt, dagegen von Timor noch nicht bekannt, übrigens weiter westlich noch auf den ostafrikanischen Inseln und selbst stellenweise auf dem Festland von Ost-Afrika. Die Wallace'sche Grenzlinie wird also nur von zwei unter 10 Untergattungen eingehalten, der einen auf Java beschränkten und von Brotia, welche, durch den Deckel gut unterschieden, für das Festland von Hinterindien sowie Sumatra und Borneo charakteristisch ist und schon auf Java seltener und in abgeschwächter Form vorkommt.

Für die systematische Anordnung, Artbegrenzung und Benennung habe ich mich mit wenigen Ausnahmen an die gründliche und gediegene Monographie dieser Gattung gehalten, welche A. Brot in der neuen Ausgabe des Conchylien-Cabinet's von Martini und Chemnitz 1874 gegeben hat.

Mehrere, wenn nicht alle Arten von *Melania* sind lebendiggebärend, wie *Vivipara*; beobachtet wurde das zuerst bei *M. tuberculata* in Algier von Dr. Raymond (*Journal de Conchyliologie* III 1852 p. 327), ferner an *M. crenifera* Lam. (*granifera* Q. G.) auf Guam von Quoy und Gaimard *Voy. Astrolabe* III p. 150 pl. 56 fig. 19 und ich habe ebenso bei *M. lateritia* von Sawangan im nördlichen Celebes auch ausgebildete junge Schalen von 3–4 Windungen innerhalb der erwachsenen Schalen gefunden, sowie in von Prof. Weber gesammelten Exemplaren von *Mel. perfecta* und *scabra*, also Arten aus den Untergattungen *Melanoides*, *Plotia* und *Tarebia*. Allerdings

findet man auch zuweilen Melanien, an deren Schalen Eikapseln kleben, ganz ähnlich denen der Neritinen, so z. B. *M. funiculus* auf Buru, *plicaria* (*hastula*) auf Halmaheira, *lateritia* auf Samar (Philippinen) aber eben wegen dieser Ähnlichkeit und weil ich sie nur da fand, wo auch Neritinen häufig waren, glaube ich, dass es die Eikapseln von Neritinen sind, welche diese letzteren so gut wie auf die Schalen anderer Neritinen, auch einmal auf die Schalen von Melanien abgelegt haben mögen.

A) *BALANOCOCHLIS* P. FISCH. 1883.

(*Melanella* Brot z. Th., nicht Dufresne 1822 = *Eulima* und nicht Swains. 1840, typ. *M. Holandrei*, = *Amphimelania* P. Fisch.). Eiförmig, glatt. Deckel mit stark ausgebildeter Spirale.

1. *Melania glans* Busch.

*Melania glans* Busch & bei Philippi Abbild. I. S. 3. Taf. 1. Fig. 8. 9. Reeve conch. icon. vol. XII fig. 232. Adams genera moll. pl. 31 fig. 4 a, b (lebendes Thier und Deckel). Brot Melaniaceen in der neuen Ausgabe von Chemnitz S. 14 Taf. I Fig. 3, 3<sup>a</sup>:

*M. inermis* Lesson in Duperey. Voy. de la Coquille, Zoologie II. 1. 1830 p. 359.

*M. siccata* Busch bei Phil. loc. cit. Taf. 9. Fig. 9. Reeve loc. cit. Fig. 230.

Flores: Fluss bei Reo. Ein nicht ganz erwachsenes Exemplar, 18½ Mill. lang, 11 breit, Mündung 13, oberes Ende erhalten, zugespitzt, glatt.

Sonst von Java, wo ich sie selbst bei Palabuan gefunden, den Obi-Inseln bei Halmaheira durch ein von Dr. Bernstein gesammeltes Stück im Leidner Museum, von Amboina durch Prof. Semon, den Philippinen nach Cuming bekannt; ferner auf Waigiu (Waigamma oder Wagen) an der Nordwestspitze Neuguinea's durch Lesson, gefunden, von Neu-Hannover und von Port Carteret auf Neu-Irland (Neu-Mecklenburg) im Berliner Museum vorhanden. Die Exemplare von Neu-Irland stimmen so gut mit Lesson's Beschreibung überein, dass über die Zugehörigkeit von *M. inermis* zu *glans*, welche schon Brot u. a. O. S. 15 vermuthet, mir kein Zweifel bleibt. Demnach sowohl auf den

Sunda-Inseln, als im östlichen Theil des malayischen Archipels verbreitet, diesseits und jenseits der Wallace'sche Grenzlinie.

Lesson's Name inermis ist zwar um mehrere Jahre älter, als derjenigen von Busch, aber da er nicht von einer Abbildung begleitet war und deshalb längere Zeit nicht beachtet und fast vergessen blieb, so dürfte es nicht zur leichteren Kenntniss der Arten beitragen, um seinetwillen den bekannteren, durch eine gute Abbildung gesicherten und in den beiden Monographien von Reeve und Brot angenommenen Namen glans zu verdrängen.

#### B) SULCOSPIRA Troschel.

*Pachychilus* (Lea) z. Theil und *Sulcospira* (Trosch.) bei Brot. Schale gethürmt, glatt mit mehr oder weniger Spiralskulptur, ohne Falten oder Knoten; Aussenrand dünn. Deckel breit oval, mit 3—4 Windungen, deren Anfang annähernd in der Mitte desselben.

Die glatten (*M. testudinaria*) und die spiral gefurchten (*sulcospira*) lassen sich nicht scharf von einander trennen, da auch bei ersterer nicht nur immer an der Basis, sondern oft auch an den untern Windungen, zuweilen selbst an den oberen, Spiralstreifung vorkommt. Die mittel- und südamerikanischen *Pachychilus* (Lea) sind in der allgemeinen Form ähnlich und haben auch einen ebenso gebildeten Deckel, siehe P. Fischer und Crosse *Exploration scientifique d. Mexique*, Moll. pl. 52 fig. 1—3 b und c, aber die meisten haben einen dicken stumpfen Aussenrand, woher der Name.

#### 2. *Melania testudinaria* Busch.

*Melania testudinaria* Busch bei Philippi Abbild. Taf. 1 Fig. 14. Mousson Land- u. Süsw. Moll. v. Java S. 66. Taf. 11 Fig. 3. Reeve Fig. 154. Brot Melan. S. 49. Taf. 6. Fig. 3a.

*M. mutabilis* Hasselt icon. ineditae 10, Fig. 1.

Java: See Situ-Bagendit bei Garut, Preanger Regentschaften.

Die vorliegenden Exemplare entsprechen der Var. *a testudinaria* im engeren Sinn bei Mousson t. u. a. O., sie gleichen sehr der *M. foeda*, sind aber bei gleicher Länge etwas breiter, und die Windungen unterhalb der Naht ein klein wenig eingeschnürt. Dieselbe sind vorherrschend schwärzlich überzogen und nur unmittelbar an der Mündungswand ist die charakteristische gelbbraune Farbe mit dunkelbraunen quadratischen oder striemenförmigen Flecken sichtbar.

Bis jetzt nur aus Java bekannt, aber hier weit verbreitet: Hasselt fand sie in den höher gelegenen Gegenden (hoogstreken) der Preanger-regentschaften, F. Jagor ebenda bei Malembong (Malangbong), ich sammelte sie während einer ziemlich raschen Reise durch die Insel im Westen bei Buitenzorg (ebenda auch Prof. Semon) und Tjandjor, in der Mitte im Fluss von Solo (Surakarta) und bei Djok-jakarta, im Osten bei Surabaya und im „blauen Wasser“ bei Passaruan; in der Dunker'schen Sammlung sind Exemplare von Samarang an der Nordküste und in Mousson's Sammlung solche aus Rogodjampi im äussersten Osten Java's (Res. Banjuwangi), von Stöhr gesammelt, Böttger, im Bericht d. Senkenbergischen Gesellschaft 1891 erwähnt zwar, dass Ad. Strubell diese Art auch auf Amboina erhalten hat, zweifelt aber selbst an der Richtigkeit des Fundortes. Ich kann nur wiederholen, was ich schon früher betont habe, dass ich auf Amboina eingeborene und europäische Sammler gefunden habe, welche Conchylien aus Celebes, Timor und Neuguinea neben richtig amboinesischen ohne bestimmte Fundortsangabe aufbewahrten und mir auch mittheilten und dass Amboina seit Rumph's Zeiten ein Centralpunkt für den Handel mit Conchylien und Korallen ist, der von da bis Singapore getrieben wird; grössere Sammlungen werden dort zusammengebracht und nach Europa verschickt. Man muss daher mit der Vaterlandsangabe Amboina immer sehr vorsichtig sein, wenn nicht ein bestimmter Fundort auf der Insel genannt ist.

Deckel bei Mousson moll. jav. Taf. 11 Fig. 1 rechts unten abgebildet.

### 3. *Melania foeda* Lea. Taf. II. Fig. 9. 10.

Lea in Proc. Zool. Soc. 1850 p. 180. — Brot matériaux hist. Melan. III pl. 33. Fig. 4; Melaniaceen S. 51. Taf. 6. Fig. 4.

Java: Buitenzorg.

Ähnlich der bekannteren *M. testudinaria*, aber schlanker, mit flacheren Windungen, grünlich-braun, an der Basis nur wenige Spiralstreifen, durchschnittlich 5, wovon nur die zwei untersten deutlich erhaben sind. Das grösste Stück ungefähr halb so lang wie Brot's Abbildung, doch oben stärker abgenützt, daher eigentlich nicht soviel kleiner. Kleinere Stücke, bis 16 Millim. lang, zeigen noch eine stumpfe Kante im untern Drittel der zur Zeit letzten Windung und diese Kante fällt auch öfters durch ihre dunkle schwärzlichgrüne

Farbe auf, indem sie von der Inkrustation frei bleibt, welche sich sonst auf der Schale oft zeigt. Ganz junge Exemplare, bis 4 Millim. lang, Mündung  $\frac{1}{2}$  Millim., sind hell grüngelb mit einem breiten braunschwarzen Band an der Kante.

Im Berliner Museum auch von Malangbong, Preanger, durch F. Jagor.

Deckel rundlich, dem von *Litorina litorea* im Umriss ähnlich, mit 3—4 Windungen, ganz ähnlich wie der bei Mousson abgebildete von *M. testudinaria*.

#### 4. *Melania sulcospira* Mouss.

Mousson jav. Moll. S. 68 Taf. 9 Fig. 3. 1849. Brot Melaniaceen S. 56 Taf. 6 Fig. 11.

*Sulcospira typica* Troschel Gebiss d. Schnecken I S. 117 Taf. 9 Fig 6. Radula.

Java: Tjipanas.

Das vorliegende Stück etwas schlanker als Mousson's Abbildung.

Im Berliner Museum auch von Batavia und von Malangbong, durch F. Jagor. *M. spadicea* Reeve, von Junghuhn auf Java gesammelt, im Leidener Museum, dürfte dieselbe Art sein.

Deckel mit vier Windungen wie bei den beiden vorigen.

### C) BROTTIA A. Ad.

(*Melanoides* Brot z. Th.).

Länglich, mit mehr oder weniger ausgeprägten Höckern oder Dornen; Mündung rundlich, ihr unterer Rand eckig vorgezogen. Deckel kreisrund, 4—6 Spiralwindungen bildend. (Taf. IV. Fig. 25—27).

A. Adams hat den Namen *Brotia* für die hinterindische *Melania pagodula* vorgeschlagen wegen der ungewöhnlichen Form ihres Deckels. An den von Prof. Weber gesammelten Exemplaren von *Mel. sumatrensis* und ihren nächsten Verwandten zeigt sich dieselbe Form des Deckels und daraus ergibt sich *Brotia* als eine natürliche Gruppe knotiger Melanien, die vom östlichen Ende des Himalaya bis Borneo reich, aber in Java nur schwach vertreten ist. In Brot's Monographie stehen diese Arten nebst einigen andern in der Untergattung *Melanoides*, welche aber einen andern Namen bekommen müsste, wenn sie beibehalten würde, da der Name *Melanoides* von Olivier auf *M. tuberculata* begründet ist. Eine generische Abtrennung von den übrigen

Melanien, der Form des Deckels wegen, empfiehlt sich desshalb nicht, weil bei *M. glans* und *testudinaria* der Deckel einen Übergang zwischen dem vielgewundenen runden von *Brotia* und den andern Melanien macht. Auch die amerikanische Gruppe der *M. glaphyra* hat einen ähnlichen Deckel wie *Brotia*.

##### 5. *Melania sumatrensis* Brot

Brot Melaniaceen S. 87 Taf. 10 Fig. 2<sup>b</sup> und Taf. 13 Fig. 1, 1<sup>a</sup>, 1<sup>b</sup>.

Sumatra: Fluss Sumani bei Solok, in mehrerlei Variationen;

1) Falten lang und schmal, ähnlich wie in Brot's Figur 13, 1<sup>a</sup>, aber schwächer. 2) Falten senkrecht, in starke Knoten ausgehend, Brot 10, 2<sup>b</sup>. 3) Falten fast verschwunden, aber starke Knoten bildend.

See von Singkarah, bis zu einer Tiefe von 30 Met., nur junge Exemplare mit starken Spitzen, das grösste Stück 18 Millim. lang,  $9\frac{1}{2}$  breit, Mündung  $7\frac{1}{2}$  lang, 5 breit.

Danau di bawah, nur einige noch kleinere Stücke, 8—12 Millim. lang, mit den charakterischen Knoten.

##### Var. *Boeana* Brot

*Melania Boeana* Brot in Journal de Conchyliologie vol. XXIX 1881 p. 154 pl. 6 fig. 1, 1<sup>a</sup>.

Sumatra: Danau di Atas.

Bei dieser Form ist auf den oberen Windungen nur Eine Reihe starker spitziger Knoten vorhanden, auf den späteren zwei, durch Falten unter sich verbunden, auf der letzten sind die Knoten und Falten fast ganz verschwunden und es treten schmale wenig erhabene Spiralleisten an ihre Stelle. Brot unterscheidet a. a. Stelle seine *M. Boeana* von *Sumatrensis* hauptsächlich dadurch, dass erstere nur Eine Reihe Knoten, letztere zwei auf den obern Windungen habe und zwar bei *M. Boeana* diese Reihe in der Mitte des sichtbaren Theils der Windung, gleichweit von der nächst-obern und der nächst-untern Naht entfernt liege, also nicht einer der beiden Reihen bei *Sumatrensis* entspreche; demnach würde auch die von ihm in der Monographie der Melaniaceen Taf. 10 Fig. 2<sup>b</sup> abgebildete Form von *Sumatrensis* zu *Boeana* gehören. An den von Prof. Weber gesammelten Stücken lässt sich aber an demselben Exemplar das Vorhandensein einer Reihe grös-

serer Knoten gleichweit von beiden Nahtlinien und das Auftreten einer Reihe kleinerer oberhalb derselben, näher der obern Naht, verfolgen, ebenso bei dem als *M. Boeana* bezeichneten Exemplar der Paetel'schen Sammlung. Dadurch verliert dieser Unterschied an specifischem Werth.

Var. *mitescens* Marts. Taf. II Fig. 11—13.

*Melania Sumatrensis* var. *mitescens* Martens, Schepman in Veth Midden Sumatra, Mollusca p. 13 tab. 1 fig. 3. 4.

Sumatra: Ajer-tabit bei Pajakombo. See von Manindjau. Auch einzelne Stücke vom Fluss Sumani und vom Danau di Atas gehören hierher.

Hier stehen statt der Knoten auf den meisten Windungen nur fast glatte kantige Spiralleisten. Die zwei obersten Windungen sind glatt, sehr dunkel gefärbt, auf der dritten bis fünften stehen sehr schwache Knoten.

Var. *provisoria* Brot

*Melania provisorio* Brot in Journ. de Conch XXX 1881 p. 186 pl. 6 fig. 2.

Sumatra: See von Manindjau.

Scheint sich durch die schlanker gethürmte Form und das vollständige Verschwinden der Spiralkanten auf der obern Hälfte jeder Windung noch von var. *mitescens* unterscheiden zu lassen, sowie dadurch, dass die Windungen flacher sind. Die von Brot a. a. O. Fig 1b abgebildete Form von *Boeana* scheint eine Mittelform zwischen beiden zu sein. Auch die von Dr. Ludeking in seiner Natur- und ge-neeskundige Topographie von Agam 1867 S. 58 als *M. varicosa* aufgeführte Art aus dem See von Manindjau dürfte wohl diese Varietät von *Sumatrensis* sein; denn *varicosa* Troschel = *variabilis* Bens. ist eine nahe verwandte bis jetzt nur aus Vorderindien bekannte Art.

*M. Sumatrensis* ist übrigens nicht nur auf die Seen der Padang'schen Hochlande beschränkt, denn ich fand dieselbe 1862 weiter südlich auch bei Kepahiang (sowohl mit Knoten, als var. *mitescens*) und Trus-san unweit Tibingtingi am oberen Musi. Auch Prof. Mousson hat sie durch Teysmann aus dem Binnenlande van Palembang erhalten, aber aus Java sah ich 1863 in seiner Sammlung nichts Ähnliches als die von ihm in seinem Werke über javanische Mollusken Taf. 10 Fig. 4 abgebildeten Stücke, welche durch die etwas gebogenen glatten, mehr von einander abstehenden Rippen von *M. Sumatrensis* verschieden



sind und doch wohl zur vorderindischen *M. variabilis* Bens. (*varicosa* Troschel) gehören, wie auch Mousson annahm. Diese ist schon in früherer Zeit, z. B. durch Lamare. Picquot, zahlreich in europäische Sammlungen gekommen; die durch keine nähere Fundortsangabe gesicherte Annahme, dass sie aus Java stamme, dürfte ein Irrthum sein.

Deckel von *Melania Sumatrensis* kreisrund, Kern in der Mitte, 6—7 Windungen, nach typischen Exemplaren aus dem Fluss Sumani und Stücken von *var. mitescens* Taf. IV Fig. 25.

Im Nordosten Sumatra's, bei Deli, findet sich nach von Martin 1891 erhaltenen Exemplaren eine Form, welche zwischen der eigentlichen *M. Sumatrensis* und der für Borneo charakteristischen *M. episcopalis* Lea (*Brookei* Reeve) in der Mitte steht; sie hat zahlreichere Rippen als letztere, dieselben sind aber oben deutlich abgesetzt.

In Borneo habe ich *M. episcopalis* Lea sowohl im nordwestlichen Küstengebiet bei Sewali und Bengkayang als auch im grossen Binnensee Danau Srian im obern Stromgebiet des Kapuas gefunden, immer in Flüssen, sei es an Steinen oder an im Wasser liegenden Baumstämmen, seltener unmittelbar auf dem lehmigen Grunde. Auffallend ist an ihr die lebhaft wachsgelbe Färbung der abgeriebenen obern Windungen. Im Südosten Borneo's findet sich *M. sparsinodosa* Busch, nach Exemplaren, welche Dr. Semmelink auf Tanah-laut und Hr. Grabowsky bei Pramassan-alai gesammelt hat; diese ist der *M. episcopalis* auch noch nahe verwardt.

6. *Melania curvicosta* n. Taf. II. Fig. 14 und Taf. IV Fig. 27.

T. conico-turrita, plicis validis curvatis (13—17) sculpta, interstitiis laevibus, basi spiratim lirata, juvenis olivaceo-fusca, adulta nigricans, apice decollato; anfr. superstitis plerumque 4, valde convexi, sutura profunda, supremam liram spiralem ostendente. Apertura ovata, superne et inferne acuta, fauce nigricante, basi rotundatim producta et effusa.

Long. decollatae 37, diam. 18, apert. long  $14\frac{1}{2}$ , diam. 10 Mill.

Deckel kreisrund, 5 Windungen, Kern in der Mitte. Taf. IV. Fig. 27.

Sumatra: See von Manindjau.

Die etwas schiefen, deutlich bogenförmigen Falten (Rippen) stehen in der Regel um reichlich das Doppelte ihrer Breite von einander entfernt, stellenweise an demselben Exemplar aber auch dichter aneinander; ihre Zahl auf der letzten oder vorletzten Windung wechselt dem entsprechend zwischen 13 und 17, ebensowohl bei den

grösseren, als bei kleineren (jüngeren) Stücken. Diese Bogenfalten beginnen etwas unterhalb der Naht und gehen etwas über die grösste Wölbung jeder Windung herab, hören aber da auf, wo die Naht der folgenden Windung sich ansetzt oder ansetzen würde, so dass sie auch auf den oberen Windungen in ihrer ganzen Länge zu sehen sind. Unterhalb von ihnen, auf der Unterseite jeder Windung, liegen die starken erhöhten Spiralleisten, in der Regel 4, immer um mehr als das Doppelte ihrer Breite von einander entfernt. Zuweilen kommt dazu noch eine fünfte obere, die unteren Ende der Bogenfalten verbindend, in der Regel bedeutend schwächer, und diese, zuweilen auch noch die nächst-folgende sind in dem zur Naht eingebuchteten Theile der obere Windungen in der Regel auch noch zu sehen. Die obersten Windungen sind bei allen vorliegenden Stücken zerstört; soweit an jüngeren Exemplaren die Skulptur sich nach oben verfolgen lässt, bis zu einem grössten Durchmesser von  $2\frac{1}{2}$ —3 Mill. für die einzelne Windung, ist die Skulptur dieselbe, nur zeigen die Bogenfalten daselbst öfters schwache Knoten oder Spitzen, nach dem Typus von Mel. Menkeana und Julieni, Brot Mel. Taf. 11. Fig. 1 und 2. Von Mel. Sumatrensis Brot unterscheidet sich diese Art sogleich durch die bogenförmigen nach oben verschmälerten und allmählig ausgehenden, nicht geradlinigen und nach oben in Knoten endigenden Falten, von Mel. Verbecki Brot durch die schiefe Richtung der Falten und durch die mit Ausnahme der obersten nur schwachen Spiralleisten der Unterseite, von M. subplicata Schepm., der sie wohl am nächsten steht, durch die viel stärkeren und regelmässigen Bogenfalten. M. Zollingeri Brot aus Java ist unsere, Art sehr nahe, aber dadurch verschieden, dass die Falten etwas knotig sind und die obere Naht nicht erreichen.

7. *Melania subplicata* Schepm. Taf. II. Fig. 15. und Taf. IV Fig. 26.

Schepman in Veth, Midden-Sumatra, Mollusca pl. 14. Taf. 1. Fig. 6.

Sumatra: See von Manindjau, zusammen mit M. curvicosta.

Unterscheidet sich von M. curvicosta eigentlich nur dadurch, dass statt der stark ausgeprägten Bogenrippen nur viel schwächere und dafür auch viel zahlreichere Bogenstreifen vorhanden sind. Einzelne Stücke zeigen auf der vorletzten oder drittletzten Windung schwache breitere fallenartige Bogenstreifen, welche an die Bogenrippen von curvicosta erinnern und es in Frage stellen, ob nicht noch weitere

Übergänge zu finden sein dürften. Alle vorliegenden Exemplare sind einfarbig, trüb grauschwarz. Deckel wie bei den vorigen, Taf. IV. Fig. 26.

Hier schliesst sich *M. torquata* Busch aus Java an; wenn Ludeking a. a. O. die letztere am angeführten Orte auch aus Agam in Sumatra nennt, so hatte er vielleicht eben nur *M. subplicata* vor sich.

8. *Melania Verbeeki* Böttg. Taf. II. Fig. 16–18.

Böttger bei Brot in Recueil zoologique Suisse, tome IV 1886 p. 90 pl. 6 fig 9.

Sumatra: See von Singkarah, bis zu einer Tiefe von 30 Met.

Die vorliegenden Exemplare sind meist schlanker als die angeführte Figur, das grösste bei mässiger Erosion der Spitze 23 Mill. lang und 9 breit. Mündung 8 lang und  $5\frac{1}{2}$  breit, die Farbe trüb bräunlich-ashgrau, die Vertikalfalten bei einigen Exemplaren in senkrechte Reihen von 3–4 starken Körnern aufgelöst (Fig. 18), die Spiralrippen der Basis zuweilen sehr schwach und zwar gerade bei solchen Exemplaren, an denen die Vertikalfalten recht stark sind (Fig 16).

Var. *laevis*. Fig. 19. 20.

Skulptur ganz verschwunden, Färbung grüngelb mit drei dunkeln Spiralbändern, wovon das zweite an der peripherischen Kante, das dritte ganz unten an der Basis der Schale und daher an den obern Windungen nicht sichtbar. Bei einigen Stücken nur die Basis grüngelb.

Fundort derselbe, 1 Exemplar auch von Ajer-tabit bei Pajakombo (Fig. 20). So auffällig verschieden diese Stücke auf den ersten Anblick erscheinen, so finden sich doch bei Vergleichung aller in dem See von Singkarah gefundenen Stücke so manche Übergänge, dass man sie nicht als eigene Art trennen kann.

9. *Melania papillosa* n. Taf II. Fig 21.

Testa conico-turrita, pallide flavescens, tuberculis rotundis fuscis in anfractibus superioribus bi-, in sequentibus tri-vel quadriseriatis sculpta; anfr. superstites 4–6, convexi, sutura sat profunda distincti, ultimus basi convexus, liris spiralibus elevatis 3–4 sculptus. Apertura ovata, basi producta, margine externo bene arcuato, marg. columellari sat arcuato, modice incrassato, caerulescenti-albido.

Long. 22, diam. 10; aperturae long. 8 diam.  $5\frac{1}{2}$  Mill.

Deckel kreisrund, mit mindestens 4 Windungen.

Sumatra: See von Singkarah.

Im erwachsenen Zustand sehr charakteristisch durch die scharf geschiedenen Höckereien; nur bei einzelnen Exemplaren treten die vertikal übereinander stehenden 3—4 Höcker so nahe zusammen, dass sie einige Ähnlichkeit mit den knotigen Vertikalfalten einzelner Stücke von *M. stricticosta* zeigen; die oberen Windungen haben Ähnlichkeit mit denen von *M. sumatrensis*, zeigen aber schon sehr bald regelmässig zwei Spiralreihen von Höckern, bei *sumatrensis* dagegen nur eine.

10. *Melania stricticosta* n. Taf. II. Fig. 22—26.

Testa conico-turrita, plicis verticalibus validis rectis, supra suturam abrupte terminatis, interstitia latitudine non aequantibus sculpta, pallide flavescens, rarius fasciis nigricantibus 3 picta; anfractus 6 superstites, superiores saepius magis tumidi, interdum plicis unituberculatis, anfr. ultimus basi liris spiralibus elevatis 4—7 sculptus; apertura ovata, basi producta, margine externo subrecto, margine columellari valde arcuato, modice incrassato, albo.

Long. 26, diam.  $11\frac{1}{2}$ , aperturae long.  $9\frac{1}{2}$ , diam. 6 Millim.

„ 20 „ 9 „ „  $7\frac{1}{2}$  „ 5 „

Sumatra: See von Singkarah.

Durch die geraden starken, oberhalb der Naht plötzlich abbrechenden Rippen ausgezeichnet; die Zwischenräume zwischen denselben  $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  so breit als die Rippen. Im Übrigen mehrfach variabel. Die Mehrzahl der Stücke zeigt oberhalb der Naht gar keine Spiralskulptur, manche Exemplare aber (Fig. 24) mehr oder weniger schwache erhabene Spiralstreifen, welche da wo sie über die Rippen gehen, diese etwas knotig machen. Die Rippen zeigen auf den obersten Windungen, welche noch erhalten sind, oft in der Mitte ihres Verlaufs einen spitzen Knoten, welcher an diejenigen von *M. Sumatrensis* erinnert, aber auf den folgenden Windungen bald verschwindet; nur bei einzelnen Stücken (Fig. 24) erhält sich derselbe, etwas tiefer herabrückend, noch auf einigen weiteren Windungen. Auch die Stärke der Falten ist nach den Exemplaren etwas variabel. Die Farbe ist bei den meisten ein gleichmässiges blasses Grau-Gelb, bei einem einzigen Stück (Fig. 22) treten drei gut ausgeprägte schwärzliche Bänder auf, wie bei manchen Exemplaren von *M. Verbeeki*; einzelne sind dunkler gefärbt, aber auch einfarbig. Bei jungen Stücken (Fig. 25. 26) treten die spitzen Knoten stärker hervor.

Von *M. Verbeeki* unterscheidet sich diese Art durch die schlankere

Gestalt und in der Regel durch weit stärkere Ausbildung der Rippen, namentlich schon auf den oberen Windungen, sowie durch den unten lappig ausgezogenen Mundrand. *Mel. Bocki* hat auch Ähnlichkeit, ist aber kleiner, schlanker, hat stärker gewölbte Windungen, tiefere Nähte und den Mundrand unten abgerundet, nicht vorgezogen.

#### D) STENOMELANIA P. Fisch.

Gruppe von *Mel. aspirans* Mousson moll. jav. 1849 S. 78.

*Melania* s. str. Brot. Melaniaceen S. 113.

*Stenomelania* P. Fischer manuel de conchyliologie p. 701. 1885.

Langgezogen und scharf zugespitzt; Skulptur verschieden, in der Regel auf den untere Windungen sich verlierend. Deckel schmal oval mit wenig Windungen, der Anfang derselben ganz unten. (Taf. IX Fig. 10).

Der Typus der Gattung *Melania* bei Lamarck, système d. an. s. vert. 1801 p. 91 ist *M. amarula*, ohne dass eine andere Art genannt würde, daher hat P. Fischer mit Recht dieser Unterabtheilung einen neuen Namen gegeben.

Die in Niederländisch-Indien lebenden Arten lassen sich nach ihrem allgemeinen Habitus in kleinere Unterabtheilungen gruppieren, deren ich etwa folgende annehmen möchte:

a) Normales: Verhältnissmässig gross und schlank, mit Vertikalfalten an den obersten Windungen:

*M. plicaria* (hastula), acutissima, turris, scipio, constricta.

b) Coarctatae: Letzte Windung verhältnissmässig plump und eckig. Vorzugsweise glatt.

*M. Javanica*, rustica, bisinuata, obesula.

c) Terebriformes: Verhältnissmässig klein und schlank, mit Spiralskulptur, meist mit Flecken oder Bändern.

*M. terebriformis*, acicula, monile, amabilis.

d) Crenulatae: Mittलगross und verhältnissmässig weniger schlank, mit breiten Spiralgürteln, welche selbst wieder Vertikalskulptur zeigen.

*M. crenulata*, semicancellata, uniformis, Mindorensis, litigiosa, artecava, Moluccensis, semiornata.

e) Acamptostylae: Kleiner, konisch-geköpft, Columellarrand wenig oder gar nicht gebogen, Sculptur schwach.

*M. punctata*, *laevigata*, *fulgurans*, *ornata*, *Timorensis*.

- f) *Acuminatae*: Mitteltgross oder klein, unten verhältnissmässig breit, nach oben sehr spitz zulaufend; Sculptur schwach oder fehlend.

*M. clavus*, *tristis*, *distinguenda*, *Papuensis*.

- g) *Humerosae*: Ebenso, aber mit auffälliger Schulterkante.

*M. cochlidium*, *costellaris*, *sobria*, *pireniformis*, *angulosa*, *Tenkatei*.

# 11. *Melania plicaria* Born.

*Strombus fluviatilis* Rumph *amboinsche rariteit-kamer* p. 101 (deutsche Übersetzung S. 70) Taf. 30. Fig. P.

*Helix plicata* Born *index test. Mus. Caes. Vindobon.* 1778 p. 403 nro V. 3, nicht p. 376 nro II. 5.

— *plicaria* Born *testacea Mus. Caes. Vindobon.* 1780. p. 389 tab. 16. fig. 14. — *Mel. pl.* Chenu *manuel fig.* 1985. Brauer S. B. Akad. Wien 1878, p. 68.

*Melania hastula* Lea in *Proc. Zool. Soc.* 1850 p. 189. Adams *gen. moll. pl.* 32 fig. 1, 1a, b, lebendes Thier und Deckel. Hanley *conch. miscell. fig.* 21. Brot *Melaniaceen* S. 130 Taf. 16. Fig. 3. Nevill *Handlist II* p. 228.

— *costata* (non Quoy) Reeve *conch. ic. fig.* 28, 29.

— *sentulata* (Martyn) Tapparone-Canefri *Mus. civ. Genov.* VI 1874 p. 359 und *faun. malac. d. Nuova Guinea* 1883 p. 24.

Celebes: Kaju-malowe an der Bai von Palos, Prof. Wichmann  
(an der Wurzel des langen nördlichen Arms von Celebes).

Flores: Fluss Ba bei Endeh.

Adonara: Bach Waikilaki, Prof. Wichmann.

Diese Art findet sich auch im nördlichen Theil von Celebes, wo ich dieselbe bei Kema und A. B. Meyer auf den Togian-inseln fand; im Leidener Museum Exemplare aus dem See von Tondano. Auf den Molukken sammelte sie Strubell auf Ternate, ich auf Halmahera, ferner bei Wahai auf Ceram und auf Amboina; von letzterem Ort befindet sie sich auch durch Zollinger in Mousson's Sammlung, durch Doria im Museum zu Genua und durch Strubell bei Böttger; es ist daher wohl anzunehmen, dass auch Rumph, s. oben, diese Art vor sich hatte; derselbe sagt, dass sie an schlammigen Flussmündungen vorkomme und von den Eingebornen gegessen werde. Ob aber die von

Martyn universal conchology Theil IV 1784, pl. 123, unter dem Namen *Limax scutulatus* abgebildete Melanie, angeblich aus China, dieselbe Art sei, scheint mir doch noch recht zweifelhaft, es könnte wohl auch *M. fuscata* Born sein; auch ist dieser Name später als der von Born gegebene. Immerhin ergibt sich schon aus Rumph, dass diese Art schon im vorigen Jahrhundert in europäische Sammlungen kam.

Ob diese Art auf Java vorkommt, ist mir noch zweifelhaft; als ich 1863 die Sammlung von Mousson in Zürich und dann diejenige des Museums in Leiden auch wegen der Süsswasserschnecken des niederländisch-indischen Archipels durchsah, glaubte ich in beiden Exemplare dieser Art, von Zollinger und von Hasselt gesammelt, zu erkennen. Nevill rechnet auch Formen von den Nikobaren, Andamanen und Marianen zu dieser Art.

Var. *cincta* Taf. X Fig. 8.

*Melania cincta* Lea in Proc. Zool. Soc. 1850 S. 183. Reeve conch. ic. fig. 35. Brot Melaniaceen S. 162 Taf. 19 Fig. 6, Copie nach Reeve.

Flores: Fluss Ba bei Endeh.

Unter den in diesem Fluss gesammelten Exemplaren von *M. plicaria* findet sich eines, welches in der Gestalt und Sculptur den übrigen typischen gleich, durch die dunkelrothbraune Farbe und eine helle weissliche Binde an der Basis auffällt und darin ganz mit *M. cincta* übereinstimmt, deren Vaterland bis jetzt nicht bekannt war.

## 12. *Melania acutissima* Busch Taf. III Fig. 1, 2.

Brot Mel. p. 129 Taf. 16. Fig. 2, 2a. Nevill handlist II p. 226.

Flores: Fluss bei Mbawa, unterhalb des Wasserfalls, zweiter Fluss bei Mbawa, und Fluss Ba bei Endeh; Fluss bei Bombang.

Durch die an mehreren Exemplaren erhaltene sehr fein ausgezogene Spitze und die sehr starke Biegung des Columellarrandes characterisirt. Einzelne oder mehrere Spiralfurchen unter der Naht und mehrere an der Basis, immer schwach und nicht an allen Exemplaren gleich. Färbung grünlich braun, einfarbig oder jüngere Exemplare mit kurzen dunkelbraunen Striemen. Auf den obern Windungen an einigen Exemplaren Spuren von Vertikalfalten, aber schwach und unregelmässig, dadurch scheint sie von *M. plicaria* verschieden. Bei einzelnen stark ausgenagten Exemplaren zeigt die Ausfüllung der obern Windungen glasartigen Glanz.

Deckel (Taf. IX Fig. 10) länglich oval, im Umriss an denjenigen von *Neritina* erinnernd, mit nur einer Spur von Spirale ganz unten, also sehr verschieden von demjenigen der Untergattung *Brotia*.

Reeve u. Brot kannten noch keinen Fundort für diese Art; Hr. Fruhstorfer hat sie seitdem auch auf Java bei Palabuan gefunden. Nevill bezieht ein in Luzon gefundenes Exemplar auf diese Art.

### 13. *Melania javanica* Busch.

*Melania coarctata* (Lam.) Philippi Abbild. II S. 174 Taf. 4. Fig. 20. Mousson Zeitschr. Malak. 1849 S. 182. Reeve conch. ic. fig. 22.

*Melania Javanica* v. d. Busch bei Philippi a. a. O. — Brot Melaniaceen S. 246 Taf. 26 Fig. 7.

Java, bei Tjipanas.

Hr. Fruhstorfer hat schöne Exemplare dieser Art in verschiedenen Abstufungen der Skulptur und der Nahtrinne bei Sukabumi in den Preanger-Regentschaften gesammelt und unter den Namen *M. artecava* und *semiornata* an das Berliner Museum abgegeben; *M. artecava* Mouss. und *M. semiornata* Brot sind davon ganz verschieden.

### 14. *Melania bisinuata* n. Taf. III Fig. 7.

Testa turrita, crassa, fusca; spira truncata, anfr. superstites 4, convexusculi, sutura sat profunda gradata distincti, leviter arcuatim striatuli et liris spiralibus nonnullis, in superiore parte cujusvis anfractus tenuioribus, obtusis, supra suturam et in basi anfr. ultimi latioribus distincte marginatis sculpti; anfractus ultimus paulo magis inflatus, basi rotundatus; apertura ovata, margine externo supra late emarginato, dein producto, caerulescente, margine basali leviter emarginato, non producto, crasso, flavescente, margine columellari crasso, albido, leviter arcuato, extrorsum fuscolumbato.

Long. speciminis truncati 26 Mill., diam.  $13\frac{1}{2}$ , aperturæ long. 12, diam.  $7\frac{1}{2}$  Mill.

Sumatra: Danau di atas, nur Ein erwachsenes und Ein jüngeres Exemplar.

Scheint zunächst der *M. javanica* Busch verwandt, namentlich in Form und Verhältniss der einzelnen Windungen, (doch ist die letzte verhältnissmässig kürzer und runder), unterscheidet sich aber leicht durch die stärkeren in der Peripherie und an der Basis scharf gürtelartig abgesetzten Spiralleisten und die auffallende Ausrandung des



obern Theils des Aussenrandes. Wegen letzterer hätte man sie pireniformis oder pirenoides nennen können, wenn diese Namen nicht schon vergeben wären. Die Ausrandung tritt aber erst bei Vollendung des Wachstums ein; denn bei dem jüngeren Stück ist dieselbe noch nicht vorhanden und ebensowenig an den Anwachsstreifen der erwachsenen 5 Mill. hinter der Mündung.

15. *Melania rustica* Mouss.

Mouss. in Journ. de Conch. VI 1857 p. 160. Brot. Mel. S. 138 Taf. 17 Fig. 2, 2a, 2b.

Flores: Fluss bei Bari.

Durch die eigenthümliche Form der letzten Windung, im obern Drittel eingeschnürt und dann rundlich vorgewölbt, zu erkennen.

Diese Form tritt aber nur bei erwachsenen deutlich hervor. Einige Exemplare zeigen mehrere vertiefte Spiralfurchen auf den mittleren Windungen, eines auch noch eine solche auf der letzten unterhalb der Naht. Alle sind stark schwarz inkrustirt, doch zeigt ein Stück noch die starken geraden Vertikalrippen an den obersten Windungen.

Das grösste Exemplar, oben nur wenig abgenützt, 78 Mill. lang.

Deckel normal für die Gattung, Taf. IV Fig. 23, 24.

Diese Art ist sonst aus dem östlichsten Theil von Java bekannt: Bezuki, durch Dr. Semmelink, Rogodjampi in Banjuwangi durch Zolinger und Stöhr. Auch sah ich 1864 in Mousson's Sammlung Exemplare von Bali unter dem Namen *M. digitalis*; ihre Verbreitung erstreckt sich demnach, die Wallace'sche Grenzlinie überspringend, vom östlichen Theil Javas wahrscheinlich über die ganze Inselreihe bis Flores einschliesslich.

16. *Melania monile* Mouss.

Mousson im Journal de Conchyliologie VI 1857. p. 162. Brot Melan. S. 173 Taf. 20 Fig. 7.

Timor: Kupang, Prof. Wichmann.

Durch den verhältnissmässig sehr kleinen letzten Umgang, wodurch in der allgemeinen Form eine Ähnlichkeit mit *Terebra hastata* L. entsteht, und die regelmässige feine Spiralstreifung ausgezeichnet; 28 Mill. lang,  $8\frac{1}{2}$  breit, Mündung 8 lang und 4 breit, blass grünlich, auf den obern Windungen zahlreichere kleine rothbraune Flecken, nicht entschieden spiral gereiht, etwas grössere vertikal-längliche immer unter

der Naht; auf der ersten Hälfte der letzten Windung nur noch diese, aber schon verkleinert, auf der zweiten Hälfte gar keine mehr vorhanden. Nur Ein Exemplar.

Moussen gab früher mit Fragzeichen Java und später etwas unbestimmt die Molukken nach Ernbrecht als Vaterland an.

17. *Melania amabilis* Rv. Taf. III Fig. 13.

*Melania pulchra* v. d. Busch in Malak. Blätt. V 1858 p. 35, nicht *M. pulchra* desselben Autors bei Philippi Abbild., III S. 55 Taf. V Fig. 1. 1848.

*Melania amabilis* (Busch) Reeve conch. icon. XII fig. 223, kopirt bei Brot Mel. S. 192 Taf. 22 Fig. 4.

Celebes: Tümpel bei Tempe.

Diese wenig bekannte Art glaube ich in einer kleinen Melanie, 16 Millim. lang, zu erkennen, welche durch ihre allgemeine Gestalt zunächst an *clavus* erinnert. Es sind 10 Windungen vorhanden, die Spitze erhalten, aber der grösste Theil der Schale stark inkrustirt, nur die Spitze, einzelne Stellen der drittletzten und vorletzten Windung und der grösste Theil der letzten frei. Vertikalfalten sind nirgends zu erkennen; 1—2 schwache Spirallinien auf der drittletzten und vorletzten dicht über der Naht, keine auf der letzten. Farbe blass grünlich-gelb mit zwei Reihen rothbrauner Flecken und einem rothbraunen Basalband. Länge 16 Mill., Durchmesser 6; Mündung  $4\frac{1}{2}$  lang. Zusammen mit ihr eine Anzahl ebenso kleiner und gleichfalls stark inkrustirter Stücke, welche grösstentheils zu *M. tuberculata* var. *virgulata* zu gehören scheinen.

18. *Melania crenulata* Chemn.

*Helix turrita crenulata* Chemnitz Conch. Cab. Band IX 1786 S. 165 Taf. 135 Fig. 1230.

*Melania crenulata* (Chemn.) Dcsh. Lam. an. S. vert. ed. 2 VIII p. 434. Brot Melan. S. 114 Taf. 14 Fig. 9.

Var. *porcata* Jonas.

*Melania porcata* Jonas bei Philippi Abbild. neuer Conch. II S. 173 Taf. 4 Fig. 19. Mousson Moll. jav. S. 69 Taf. 11 Fig. 4.

*Melania crenulata* var. Brot Melan. S. 117 Taf. 14 Fig. 9e.

Celebes: Wasserfälle bei Maros, 41—47 Mill. lang.

Flores: Fluss bei Mbawa, unterhalb des Wasserfalls, 33 Mill. lang, 10 breit.

Eine altbekannte Art, die typische Form von den Philippinen, die var. *porcata* von Manila und nach Mousson auch von Java bisher bekannt. Ich fand die Art auch bei Manado im nördlichen Celebes und auf Ternate.

19. *Melania semiornata* Brot. Taf. III. Fig. 8.

Brot in Revue zoologique 1860 pl. 16 fig. 5 und Melaniaceen S. 159 Taf. 19 Fig. 10.

Flores: bei Donah, nur Ein Exemplar. Sonst von Java bekannt.

Das vorliegende Exemplar, 25 Mill. lang und  $9\frac{1}{2}$  im Durchmesser, Mündung 10 lang und einschliesslich des Columellarrandes 6, ohne denselben 5 breit, ist auf den zwei obersten Windungen (eine mindestens ist abgestossen) stark abgerieben, glatt und schwärzlichbraun; auf den nächsten vier ziemlich dicht stehende starke geradlinige aber etwas schief stehende Vertikalfalten, von Naht zu Naht; auf den folgenden drei werden diese Falten breiter und richtig senkrecht, aber kürzer, so dass sie nur eine Zone unter der obern Naht bilden und vor dem Einsetzen der untern Naht schon aufhören. Die Naht ist auf diesen Windungen etwas stufenartig vortretend. Die Spiralskulptur besteht in vertieften ziemlich zahlreichen Linien, welche durch die Falten und durch deren Zwischenräume gleichmässig verlaufen. Die allgemeine Färbung ist grünlichgelb mit zerstreuten rothbraunen kleinen Flecken zwischen den Spirallinien, die Zone unterhalb der Naht aber bläulich-grau, ziemlich scharf abgesetzt.

Von Brot's Beschreibung seiner *semiornata* aus Java unterscheidet sie sich nur dadurch, dass auf den obern Windungen keine Flammenzeichnung vorhanden ist und die letzte Windung nicht glatt ist, sondern Spiralfurchen zeigt, doch sind diese schon ziemlich schwach und könnten, wenn die Schale noch weiter wachsen würde, sich ganz verlieren. Vom Jugendzustand der *M. uniformis* var. *aequisulcata* unterscheidet sie sich dadurch, dass die ganze Schale von der Spitze an rascher an Breite zunimmt, und durch die abgekürzten Falten der mittlern Windungen; von jungen *M. semicancellata* Busch und *crenulata* Chemn. durch die zahlreicheren Spiralfurchen mit schmäleren unter sich gleichmässigen Zwischenräumen, 11 zwischen der Naht und dem grössten Umfang der letzten Windung.

20. *Melania uniformis* Q. G.

Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe III p. 154 pl. 56 fig. 30—33,

von Manado, lebendes Thier. Brot. Mel. S. 124 Taf. 15 Fig. 3, 3a.

Var. *crispulata* n. Taf. III Fig. 3.

Testa turrita, solidula, nitida, lineolis verticalibus teneris numerosis et sulcis spiralibus teneris numero variantibus, plerumque una sub-suturali profundiore sculpta, virescenti-grisea, interdum fuscomaculata. Spira superne gracilis, breviter erosa; anfr. circa 14?, plani, ultimus infra modice rotundatus, parte tota basali sulcis spiralibus distinctis, 8—10, infimis latiusculis sculptus. Apertura lanceolata, superne peracuta, inferne latiuscule rotundata, margine columellari crasso, valde arcuato, sat brevi, margine basali externo subcrenulato, fauce plumbeocaerulea.

Long. 50, diam.  $15\frac{1}{2}$ , aperturae long 17, lat. 9 Mill.

„ 49 „ 14, „ „ 16 „  $7\frac{1}{2}$  „

Flores: Bari und Fluss bei Reo. Von mir 1863 auch auf Adonara gesammelt.

Timor: Fluss Koinino bei Kupang, von Prof. Wichmann gesammelt.

Rotti: Fluss bei Baä, Prof. Wichmann.

Diese Form stimmt in den meisten Characteren mit Brot's Beschreibung von *Melania uniformis* überein; der hauptsächlichste Unterschied ist, dass die Spiralfurchen bei allen vorliegenden Exemplaren stark ausgeprägt sind, nicht „obsolete paucistriato“, oder in der deutschen Beschreibung „fein gestreift“ oder wie nach Quoy und Gaimard nur auf der ersten Windungen vorhanden. Die feinen Vertikallinien, deren Vorhandensein Brot mit „interstitiis crispulis“ bezeichnet, sind auf der ganzen Schalenoberfläche vorhanden. Die Spiralfurchen auf dem sichtbaren Theil der früheren Windungen und auf der obern Hälfte der letzten variiren sehr, bei einigen Exemplaren sind ausser einer oder auch zwei unter der Naht keine vorhanden, bei andern sind sie zahlreicher, aber immer schwach und ungleich. Vertikal-falten, wie sie Brot's Figur 1 auf Taf. 16 zeigt, sind an keinem der vorliegenden Exemplare zu sehen. Wie die Skulptur der obersten Windungen sei, kann nicht angegeben werden, da dieselbe wie bei so vielen Süswasserschnecken aus der Umgebung von Kupang durch Kalksinter überzogen ist.

Nach Brot findet sich diese Art auf den mittleren Philippinen (Guimaras, Siquijor) und auf Nord-Celebes. In Mousson's Sammlung sah ich seiner Zeit dieselbe (*M. fulgida* Reeve) auch von Bima auf Sumbawa und in Cuming's Sammlung von Lombok; ich selbst sammelte sie auf Adonara.

Das Exemplar von Flores zeigt auf den oberen Windungen die unterbrochenen schmalen rothen Spiralstreifen von *M. punctata* Lam., von der es sich eigentlich nur noch durch mehr zugespitztes Gewinde und seine Grösse, 57 Millim. lang, 17 breit, Mündung 19, unterscheidet.

Var. *aequisulcata*. n. Taf. III, Fig. 4, 5.

Testa turrita, solidula, nitidula, sulcis spiralibus regularibus plerisque et lineolis verticalibus teneris numerosis per omnes anfractus sculpta, virescenti-fusca, unicolor vel maculis rufo-fuscis irregularibus picta. Spira superne gracilis, anfr. c. 11? superiores plicis verticalibus sat validis et confertis sculpti, ultimus basi modice rotundatus, sulcis basalibus non fortioribus. Apertura lanceolata, superne peracuta, inferne rotundata, margine columellari crasso, levius arcuato, margine basali externo subintegro, fauce caerulescenti-cinerea.

Long. 46, diam. 13. apert. long. 15½ lat. 7 Mill.

Flores: Fluss Mbawa unterhalb des Wasserfalls und Fluss Ba bei Endeh; auch ein Stück aus dem Fluss bei Reo scheint hieher zugehören.

Wegen der gleichmässigen Spiralfurchen auf allen Windungen und der regelmässigen Vertikal-strichelung ihrer breiteren Zwischenräume möchte man diese Form zunächst auf *M. crenulata* nach Brot's Auffassung beziehen. Aber der ganze Habitus gleicht zu sehr demjenigen unserer *uniformis*, der Columellarrand der Mündung ist sogar noch weniger gekrümmt als bei dieser und auch die braunfleckige Färbung passt nicht zu *crenulata*. — *M. figurata* var. *striata* Mousson jav. S. 118 Taf. 22 Fig. 4 links, von Bima auf Sumbawa könnte dieselbe Form sein und dann gehören vielleicht überhaupt die von ihm als *M. figurata* und *aspirans* beschriebenen Formen, S. 116—118 zu *uniformis*.

Var. *plicatula*. Taf. III, Fig. 6.

Minor, pliculis verticalibus subplanis in anfractibus omnibus excepto ultimo, lineis spiralibus impressis raris, anfractu ultimo sublaevi, basi spiratim sulcato: Long. 21, diam 7, apert 7½ Mill.

Grünlichbraun mit zahlreichen schmalen unterbrochenen dunkeln Spiralbändern.

Saley: Fluss Bankal.

## 21. *Melania litigiosa* Brot

*Melania Mindorensis* var. Reeve conch. ic. fig. 34b.

*Melania litigiosa* Brot in Revue Zool. 1860 pl. 16 fig. 4; *Melaniaceen* S. 17 Taf. 20 Fig. 5.

Flores: Fluss bei Bari; junge Exemplare (fig. 9, 10) im Fluss Donah.

Ein Exemplar zeigt auf allen Windungen, ausgenommen die drei letzten, regelmässige Vertikalfalten, was Brot a. a. O. wohl bei *M. mindorensis* im engeren Sinn, aber nicht bei *litigiosa* erwähnt; zugleich zeigt dieses Exemplar die schlanker ausgezogene Spitze, wie sie bei *litigiosa* vorkommen soll. Ein anderes, ebendaher, ist verhältnissmässig plumper mit mehr konischem Gewinde. Die Massangaben für beide sind:

a. Länge 53 Mill., Durchmesser 15, Mündung 18 lang, 9 breit.

b. „ 47 „ „ 15, „ 16½ „ 9 „

Bei beiden ist die Spitze nur unbedeutend verletzt.

Dieser Befund lässt mir zweifelhaft erscheinen, ob *litigiosa* als eigene Art von *mindorensis* zu trennen ist.

Nach Brot kommt *M. Mindorensis* auf den Philippinen, *litigiosa* sowohl auf den Philippinen, als auf Sumbawa (der westlichen Nachbarinsel von Flores) und auf Amboina vor, dagegen habe ich auf Amboina eine Schnecke gesammelt, welche ich nach den von ihm angegebenen Unterscheidungsmerkmalen für *M. Mindorensis* halten muss.

## 22. *Melania laevigata* Lam. Taf. III, Fig. 14, 15.

Lamarck an. s. vert. VI 2 1882 nro 7; ed. 2 VIII p. 431. Delessert recueil pl. 30 fig. 12. Brot matériaux Mel. III, p. 14, pl. 1 fig. 8, 9.; *Melaniaceen* S. 171 Taf. 20 Fig. 9. — v. Martens in Sitz. Bericht. d. Berlin. Akad. d. Wiss. 1877 S. 281. Taf. I Fig. 17, 19.

Timor: bei Kupang, Prof. Wichmann.

Insel Rotti bei Timor: Fluss von Baa, von Prof. Wichmann gesammelt.

In Grösse und Färbung mit Brot's Beschreibung übereinstimmend, aber die Mündung voller, nicht so nach unten verschmälert, wie in beiden Figuren, 9 und 9<sup>a</sup>, bei Brot, und dadurch noch näher der *punctata* Lam. (*albescens* Lea), mit welcher auch schon Brot sie in nächste Beziehung bringt. Wenn beide in eine Art zu vereinigen sind, so ist dieselbe wiederum den mittleren Philippinen, Molukken (Böttger 1891) und Timor gemeinsam, aber nach Exemplaren im Leidner Museum auch auf Java von Dr. Junghuhn gefunden. Wenn nicht, ist sie Timor und der nächst anliegenden Insel Rotti eigenthümlich.

Von der obigen *M. uniformis* var. *crispulata* unterscheidet sie sich

unter anderm auch durch dichtere Aufwindung: die Breite (Durchmesser) des sichtbaren Theils der vorletzten Windung, von der Rückenseite aus gesehen verhält sich zu deren Länge (Achsenrichtung) bei *laevigata* wie 3:2, *crispulata* wie 5:3, was für das an Schneckenformen geübte Auge schon einen merklichen Unterschied macht.

Die Zeichnung: unterbrochene schmale braune Spiralbänder und grössere braune Flecken unter der Naht, ist bei jüngeren Exemplaren meist deutlicher, bei ältern mehr verwischt.

Ich möchte vermuthen dass die von Schepman Not. Leyd. Mus. XIV p. 155 von Kupang angeführte inkrustirte *M. punctata* eben diese *laevigata* ist, welche auch ich und Th. Studer in den Bächen um Kupang stark mit Kalk inkrustirt gefunden haben.

23. *Melania clavus* Lam. Taf. III Fig. 11.

Lamarck an. s. vert. VI z. 1822 nro 8; ed. 2 VIII p. 431. Delessert recueil pl. 30 fig. 13. Brot matr. Mel. III p. 15 pl. 1 fig. 17, *Melaniaceen* S. 175 Taf. 21 Fig. 17. Nevill handlist II p. 223.

*Melania acuminata* Dunker in Philippi Abbild. I S. 160 Taf. 3 Fig. 5. 1844.

*Melania acus* Lea Proc. Zool. Soc. 1850 p. 181. Reeve conch. ic. fig. 92.

Celebes: Tempe in einem Teich.

Flores: Fluss Donah bei Ende, etwas schlanker, Fig. 11.

Exemplare mit braunem Schlammüberzug, die Vertikalfalten der oberen Windungen verhältnissmässig schwach und ziemlich schief. Ich sammelte diese Art im Fluss bei Wahai auf Ceram in sumpfigen aber fliessenden Wasser nahe am Strande, das grösste Exemplar 46 Mill. lang, 13 breit, Mündung 15 und  $8\frac{1}{2}$ , die meisten Stück 30—35 Mill. lang, und zu Batu-gantong auf Amboina; A. B. Meyer auf den Togian-Inzeln im Golf von Gorontalo. Brot kannte sie nur von den Philippinen und Neu-Irland; das Vorkommen auf Celebes und auf den Molukken bildet eine Brücke zwischen diesen Fundorten.

Nevill vereinigt mit dieser Art sogar einige Formen, welche durch ihre Schulterkante zur nächsten Unterabtheilung gehören dürften.

E) *MELANOIDES* Oliv.

*Melanoides* Olivier, voyage à l'empire Ottoman 1807 vol. II p. 40.

*Striatella* Brot *Melaniaceen* S. 193.

Gethürmt, mässig schlank, mit Gitterskulptur. Naht öfters vertieft. Mündung unten gerundet Deckel mit wenig Windungen, oval.

Die Art, auf welche Olivier seine Gattung *Melanoides* gegründet hat, ist *M. tuberculata* Müll. (*fasciolata* Oliv.) und daher muss dieser Untergattung jener Name bleiben und ist der Name *Striatella* überflüssig.

Auch hier lassen sich wieder einige Unterabtheilungen zum leichteren Überblick für die Arten von Niederländisch-Indien aufstellen.

a) *Instrictae*: durchschnittlich grösser, mit gröberer, etwas höckeriger Gitterskulptur und merklich eingezogener Naht.

*M. perfecta*, *robusta*, *Wallacei*, *Buginensis*, *subsuturalis*, *disjuncta*, *vineta*, *Wichmanni*.

b) *Inciso-striatae*: Mit scharf eingeschnittenen Spirallinien, im Übrigen der *M. tuberculata* ähnlich.

*M. crepidinata*, *inhonesta*, *Adonarae*.

c) *Elevato-striatae*: Spirallinien erhaben, Vertikalfalten mässig oder schwindend, keine Höcker.

*M. tuberculata*, *unifasciata*, *pulchella*, *cylindracea*, *fontinalis*.

24. *Melania perfecta* Mouss. Taf. III. Fig. 16. 17. Taf. IX. Fig. 5, 6.

Mousson Moll. Jav. S. 116 Taf. 22. Fig. 5. Reeve fig. 84. Brot Melan. S. 79. Taf. 9 Fig. 4.

Celebes: Wasserfälle bei Maros. Fluss bei Maros unter Bantimurong, bis 39 Mill. lang und 14 breit. Fluss Minralang bei Tempe. Mousson's Original-exemplare sind auch von Maros, und ich habe sie 1861 auch bei den Wasserfällen daselbst gefunden.

Diese Art und ihre nächsten Verwandten scheint mir nach der Form der Basis der Mündung mehr hieher als zu *M. Sumatrensis* zu gehören.

Auch diese Art ist lebendiggebärend; die Schalen in Mutterleib mit schon 5 Windungen, noch ganz ohne Spiralskulptur, glänzend dunkelbraun, zweite und dritte Windung mit starken aber nicht zahlreichen Vertikalfalten (Taf. IX Fig. 6).

Deckel annähernd kreisförmig, aber mit vortretender Ecke, ähnlich dem von *Litorina litorea* und mit mindestens fünf ziemlich engen Windungen (Taf. IX Fig. 5).



25. *Melania robusta* n. Taf. III. Fig. 18—20.

Testa obese conico-turrita, liris elevatis spiralibus parce nodulosis exarata, interstitiis grossiuscule verticaliter striatis, junior obscure fusca, adulta nigra, apice breviter eroso; anfr. superstites 7—8, vix convexiusculi, sutura superficiali juncti, supremi indistincte verticaliter costulati, ultimus medio obtuse angulato-rotundatus. Apertura ovata, fauce caerulescente, basi late, at breviter effusa.

Long. 42 diam. 17; apert. long. 14 diam. 10 Mill.

Celebes: Fluss bei Pare-Pare und Fluss bei Palopo in Luwu.

Die Skulptur der unteren Windungen ähnlich derjenigen der normalen *Mel. perfecta*, aber auf den obersten der erhaltenen Windungen mit zahlreicheren, enger aneinander stehenden, kaum knotigen Spiralleisten; starke, etwas entfernt von einander stehende geradlinige Vertikalfalten, welche aber auf den nächstfolgenden Windungen rasch schwächer und zahlreicher werden und mehr oder weniger in die Knötchen der Spiralleisten und die Vertikalstreifen der Zwischenräume sich auflösen; ebenso scheint es bei der normalen *perfecta* zu sein. Aber durch die verhältnissmässig breiten und vollen, gegen die Naht kaum eingedrückten Umgänge, sowie durch die absolute Grösse unterscheidet sich diese Form von Mousson's und Brot's *perfecta*.

Auch von mir 1 Exemplar am Wasserfall bei Maros 1861 gefunden.

26. *Melania wallacei* Reeve. Taf. III. Taf. 22 (jung).

Reeve conch. ic. fig. 66. Brot. Melan. S. 80 Taf. 9. Fig. 5.

*M. constricta* Mouss. collect.

Testa turrita, suturis valde instrictis, nigricanti-fusca; anfr. circa 12, medii subplani, plicis verticalibus obtusis, nonnullis subarcuatis, supra suturam terminatis, inferiores duo rotundati, superne seriebus 2—3 nodulorum, dein liris compluribus subnodulosis sculpti. Apertura parva, subcircularis, basi rotundata, margine externo et columellari bene arcuatis, fauce plumbeo-coerulea.

Long. (35), lat.  $12\frac{1}{2}$ , apert. long. 9, lat. 7 Millim.

Celebes: Fluss bei Maros.

Gleicht im Habitus der *M. perfecta*, unterscheidet sich aber sofort bei direkter Vergleichung durch die verhältnissmässig viel kleinere letzte Windung, daher mehr cylindrische als konische Gesamtform, die flachen nur vertikal-gefalteten mittleren Windungen und die Reihen gesonderter Knötchen auf den 2 letzten Windungen.

Die Vertikalfalten werden zwar weder bei Reeve noch bei Brot im Text deutlich hervorgehoben, doch passt die übrige Beschreibung so gut, dass ich an der Bestimmung nicht zweifle. Durch Kombination eines jungen und eines alten oben abgenützten Exemplars ergibt sich, dass deutliche Vertikalfalten auf der 6. oder 7. Windung beginnen und bis zur 9<sup>ten</sup> bleiben; der Übergang zur Skulptur der beiden letzten (10. und 11.) ist rasch und geschieht dadurch, dass die Falten sich in ihrem obern Theile in Knötchen auflösen, während die stumpfe Spiralkante, welche ihr unteres Ende noch etwas oberhalb der Naht aufnimmt, sich zu einer wirklichen Spiralleiste ausbildet und unter ihr sofort eine zweite entsteht. Die Skulptur der mittleren Windungen erinnert so sehr an einige Potamides (Cerithidea), dass ein Blick auf die runde, nicht ausgeschnittene Basis der Mündung nöthig ist, um die Schale nicht zu diesen zu stellen.

Wallace's Exemplare sind von Makassar, Mousson's ebenfalls vom südlichen Theil von Celebes.

27. *Melania buginensis* n. Taf. III. Fig. 21.

Testa turrita, gracilis, liris spiralibus latiusculis obtuse nodosis, in anfr. mediis circa 7 conspicuis sculpta, nigrescenti-fusca; anfr. superstites 9, convexiusculi, infra angustati, sutura instricta distincti, ultimus basi sensim attenuatus, liris confertioribus, sublaevibus. Apertura elliptico-oblonga, margine externo tenui, crenulato, leviter arcuato, basali rotundato, columellari paulum incrassato, valde arcuato, caerulescenti-albido, fauce plumbeo-coerulea.

Long 47, diam. 13, apert. long. 13½ lat. 8 Millim.

Celebes: Fluss bei Balang-nipa, im Gebiet von Boni an der Ostküste der süd-westlichen Halbinsel, an Stellen, wo das Wasser bei Ebbe ganz süß ist. Fluss bei Palopo in Luwu.

Gehört auch in die Nähe von *M. perfecta*, unterscheidet sich aber durch schlankere, minder konische Gestalt, verhältnissmässig grössere Höhe des sichtbaren Theils der früheren Windungen und viel stärker gebogenen Columellarrand, welcher die Mündungsform ähnlich derjenigen von *M. hastula* und *acutissima* macht. Die Skulptur ist nur von der drittletzten Windung an gut erhalten; von den sieben Spiralgürteln der dritt- und vorletzten sind die zwei untersten dicht über der Naht schmaler und ohne Knoten, auch der oberste dicht unter der

Naht schmal und schwachknotig, die vier übrigen reichlich doppelt so breit als die Zwischenräume und breite, nicht scharf vorstehende Knoten bildend.

Ein jüngeres Exemplar von Luwu zeigt, dass die obersten Windungen schmalere glatte etwas schiefe Vertikalfalten und zwei stärkere Spirallinien unmittelbar unter der Naht haben; hierauf folgen zwei Windungen, welche nur einzelne scharfe Spiralstreifen zeigen und dann erst beginnen die kurzen Falten der späteren Windungen.

Diese Art schliesst sich noch gut an *M. perfecta* und *robusta* an.

28. *Melania vineta* n. Taf. III. Fig. 23—25.

Testa turrita, sublaevis, leviter verticaliter striatula, pallide cornea, parce rufo-variegata; apice integra. Anfractus 11, regulariter crescentes, lira filiformi tenui spirali paulo supra suturam et zona inter hanc et suturam impressa cincti, ultimus obtuse angulatus, basi convexa liris nonnullis spiralibus elevatis plus minusve obsoletis cinctus. Apertura piriformis, margine externo superne sinuato, dein producto, basi late sinuato-rotundata, margine columellari vix arcuato, incrassato, caerulescenti-albido.

Long. 17, diam 6, apert. long 5, diam 3 Millim.

Celebes: Fluss bei Banti-murong.

Von *M. wallacei*, an welche sie durch die Vertiefung über der Naht erinnert, neben der schlankeren Gestalt und schwächeren Skulptur wesentlich dadurch unterschieden, dass die vertiefte Zone über der Naht nicht schief, einen Winkel mit der übrigen Oberfläche bildend einspringt, sondern im Ganzen parallel mit derselben und etwas tiefer liegt. Der ganze Habitus, namentlich auch die Form der Mündung, gleicht mehr demjenigen von *M. clavus* Lam.

Schliesst sich im Bau der Naht an *M. subsuturalis* Metc. von Borneo, *disjuncta* Brot von Borneo?, *Tapparonii* Brot unsichern Fundorts und *wallacei* Reeve von Celebes an, unterscheidet sich aber von all diesen in Skulptur, Gestalt und Färbung.

29. *Melania Wichmanni* n. Taf. III, Fig. 26, 27.

Testa conico-turrita, plicis verticalibus rectis sat validis (17 in anfr. penult.) et lineis incisis spiralibus paucis prope peripheriam cujusve anfractus sculpta, pallide flavescenti-grisea, unicolor, apice saepius integro; anfr. 13, subplani, sutura paululum instricta, ultimus basi

modice convexus, striis spiralibus] incisio compluribus, saepius obsolescentibus sculptus; apertura ovata, basi rotundata, non distincte producta, margine externo vix, columellari modice arcuato, illo tenui, hoc incrassato, albido.

Long. 30, diam. 9, apert. long. 9, diam.  $4\frac{1}{2}$  Mill.

Timor: bei Kupang, Prof. Wichmann. Auch bei Delli im nördlichen Theil der Insel ein verbleichtes Stück von mir 1862 gefunden.

Die Vertikalfalten hören an jeder der früheren Windungen etwas oberhalb der Naht auf; sie schwinden fast ganz auf der letzten Windung und bei einigen Stücke schon mehr oder weniger auf der vorletzten. Die scharf eingeschnittenen Spirallinien treten auf den früheren Windungen immer nur unmittelbar oberhalb der Naht auf, zwei bis drei zwischen dem untere Ende der Falten und der Naht selbst, bei einigen Stücken auch noch 1—2 den untersten Theil der Falten und deren Zwischenräume durchschneidend; auf der letzten Windung erscheinen sie demgemäss in dem mittleren peripherischen Theil in der Zahl von 2—4, und unterhalb derselben, durch eine glatte Zone getrennt, an der Basis zahlreichere aber meist sehr schwach ausgeprägte, bei den grössten Stücke kaum oder gar nicht mehr erkennbare Spirallinien; an jüngern Exemplaren sind sie stärker und an solchen tritt auch zuweilen an der Basis ein verwaschenes braunes Band auf, entsprechend demjenigen von *M. unifasciata*.

Diese Art verbindet einigermaßen die Gruppen *Stenomelania* und *Melanoides*, die allgemeine Gestalt, lang ausgezogen und scharf zugespitzt, mit flachen Windungen, starker Vertikal- und schwacher Spiralskulptur, erinnert an *Stenomelania*, die Mündung ist mehr diejenige von *Melanoides*. Man kann an *M. malayana* Issel denken, aber nach der Abbildung bei Brot, Mel. Taf. 26 Fig. 9 und dem damit übereinstimmenden Exemplar der Paetel'schen Sammlung ist diese weniger konisch und sie hat auch eine stärkere Spiralskulptur. Von unserer obigen *M. Wallacei*, mit welcher sie in den geradlinigen Vertikalfalten übereinstimmt, unterscheidet sie sich dadurch, dass die Spiralskulptur an den früheren Windungen etwas über der Naht deutlich hervortritt und hier dadurch eine Art Einschnürung veranlasst, wie es oft auch bei *M. tuberculata* der Fall ist. Die Mündung ist breiter, mehr nach dem Typus der *M. tuberculata*, ein breites dunkleres Band an der Unterseite der letzten Windung, wie so oft

bei *M. tuberculata*, ist bei *M. wichmanni* schwach angedeutet und die charakteristischen spiral gereihten Flecken fehlen gänzlich.

30. *Melania crepidinata* Rv.

Reeve conch. icon. XII fig. 120. Brot Melaniaceen S. 238 Taf. 25 Fig. 13, 13a.

Sumatra: Flösschen bei Singkarak.

Von *M. tuberculata* und *unifasciata* dadurch unterschieden, dass die Spirallinien sich als eingeschnitten, nicht als erhöht darstellen, 1–2 unter der Naht und eine grössere Anzahl im mittlern Theil jeder Windung und im unteren der letzten. Vertikalfalten sind auch nicht vorhanden, sondern nur feine Streifen an ihrer Stelle. Gelbbraun, unter der Naht eine Reihe grösserer dunkelbrauner Flecken und immer an der Basis, oft auch in der Mitte ein breites dunkles Band.

Länge 20, Breite 8, Mill.; Mündung 7 lang,  $4\frac{1}{2}$  breit.

Nach Cuming und Brot auf Java und Borneo; das Berliner Museum besitzt ein Exemplar von der Insel Palawan im Nordosten von Borneo.

31. *Melania tuberculata* Müll.

Mousson Moll. Jav. p. 73. Brot Melaniaceen S. 247. Nevill handlist II p. 239–246.

Var. a *plicifera* Mouss.

Plicis verticalibus distinctis per omnes anfractus, in ultimo abbreviatis.

*Nerita tuberculata* O.-Fr. Müll. hist. verm. II 1774 p. 191 (von Koromandel.) — Schröter Geschichte d. Flussconchylien 1779 S. 373 nro. 171 Taf. 8 fig. 14. *Helix acicula* Gmelin Linn. syst. nat. ed. XIII p. 3668. Chemnitz Conch. Cab. IX Taf. 136 Fig. 1262.

*Melanoides fasciolata* Olivier voy. emp. Ottom. II p. 40 pl. 31 fig. 7. — *Melania* f. Lam. an. s. vert. 7 VI 2 1822 nro 16.

*Melania tuberculata* Deshayes in Lamarck an s. v. ed. 2. VIII p. 434. — Philippi Abbild. I S. 4 Taf. 1 Fig. 19. Reeve conch. ic. fig. 87 und 110.

*Melania tuberculata* var. b. *plicifera* Mouss. Moll. Jav. S. 73 Taf. 11 Fig. 7.

*M. tuberculata* Brot Mel. Taf. 26 Fig. 11, 11a. Hanley u. Theobald conch. Ind. pl. 74 fig. 4.

*Melania* Layardi Dohrn Proc. Zool. Soc. 1858 p. 135. Reeve conch. icon. fig. 104. Hanley u. Theobald conch. Ind. pl. 73 fig. 8.

Sumatra: Flösschen bei Kaju-tanam und im See Danau-di-bawah, an ersterem Ort mit der folgenden zusammen.

Java: Buitenzorg, mit der folgenden Varietät und in dieselbe übergehend.

Celebes: Fluss bei Maros, See von Sidenreng bei Tete-adj (nicht über 12 Mill.) und See von Tempe.

Flores: Fluss bei Reo und Fluss bei Bombang, mit der folgenden; Mbawa unterhalb des Wasserfalls; Sumpf bei Maumeri, 39 Mill. lang, in die folgende übergehend.

Adonara: bei Tana merah.

Diese Form, welche in Aegypten die vorherrschende ist, habe ich auch bei Bengkajang, Sewali und Lumar im nordwestlichen Theil von Borneo gesammelt, Dr. S. Martin bei Deli an der Nordostküste von Sumatra.

var. b) *virgulata* Q. G.

Plicis verticalibus nullis, striis spiralibus aequaliter dispositis.

*Melania virgulata* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe, Zool. III, p. 141, pl. 56, fig. 1—4 mit lebendem Thiere u. Deckel. Desh. in Lam. an. s. vert. ed. 2, VIII, p. 437. Reeve conch. ic. Fig. 109a.

*Melania tuberculata* var. a. *virgulata* Mousson Moll. Java, S. 73, Taf. 11, Fig. 6. — Hanley u. Theobald conchol. Ind. pl. 74, fig. 1.

*M. tuberculata* Brot. Mel. Taf. 26, Fig. 11c, 11d.

*Melania punctulata* Grateloup Reeve conch. ic., fig. 100.

*Melania Layardi* Dohrn Proc. Zool. Soc. 1858, p. 135 z. Theil. Hanley u. Theobald conchol. Ind. pl. 73, fig. 9.

*Melania affinis* van Hasselt tabulae inedit. im Leidner Museum, tab. 10, fig. 2.

Sumatra: Ajer teganang zwischen Fort de Kock und Padang-Pandjang. Flösschen bei Kaju-tanam, in var. *seminuda* übergehend, See von Singkarah (klein) und Sawah bei Singkarah. Tabeh di Aripa. Weiher bei Solok. Danau di bawah und Danau di atas, in letzterem bis 25 Mill. lang und 10 breit, meist stark angenagt. Padang-fluss (klein).

Java: Buitenzorg, nur bis 24 Mill. lang, mit Übergängen zu var. *seminuda*. Tji-panas.

Celebes: Maros. See bei Tete-adj. Pare-Pare. Fluss Minralang bei Tempe, bis 20 Mill. lang, mit Übergängen zu *seminuda*. Palima in Brackwasser, sehr klein, nicht über 10 Mill. Luwu, in *seminuda* übergehend.

Saleyser: im Fluss Bonea und bei Bangkalan.

Flores: Fluss bei Bombang, zusammen mit var. plicifera.  
Mbawa unterhalb des Wasserfalls, in var. plicifera und  
seminuda übergehend. Maumeri.

Adonara: Tana-merah und im Bach Waikelaki, (letzte Windung auffällig flach).

Timor: Kupang, Prof. Wichmann.

Diese Varietät habe ich auch bei Lahat, Trussan und Kepahiang im Gebiet des Musi-stroms auf Sumatra, bei Surabaya auf Java, bei Bengkajang und Lumar auf Borneo gesammelt, A. B. Meyer im nördlichen Theil von Celebes.

var. c) *seminuda*. Tab. IV, Fig. 1.

Pallide fusca, nitidula, anfractibus magis inflatis, penultimo et ultimo superne sublaevibus, medio distincte spiratim liratis, plicis verticalibus nullis.

?*Melania suturalis* Philippi Abbild. II, p. 173, Taf. 4, Fig. 17.

*Melania tuberculata* var. Hanley u. Theobald conch. Ind. pl. 74, fig. 2, 3.

Sumatra: See von Manindjau, Ajer-tegenang, Kaju-tanam,  
Tabeh di aripan, Danau di bawah und Danau di atas.

Celebes: Kaju-malowe an der Bai von Palos. See von Tempe. Boni.

Saleyser: Bangkalan, in var. virgulata übergehend.

Flores: Fluss bei Reo und Kotting.

Adonara: Bach Waikelaki.

Rotti: Fluss Oitelao bei Bilba und Fluss bei Talaë, Prof.  
Wichmann.

Diese Varietät, welche man gerne für eine eigene Art halten möchte, wenn sie nicht so vielfach durch Zwischenformen mit var. virgulata verbunden wäre, habe ich auch auf Sumatra bei Palembang, Lahat und Benkulen, auf Java bei Anjer und Sindanglaya (Preanger), auf Borneo bei Singkawang und Bengkajang, auf Celebes bei Makassar und Tondano, auf Batjan, Ceram bei Wahai und auf Amboina, auf Adonara und auf Timor bei Kupang gesammelt und das Berliner Museum für Naturkunde besitzt sie ferner von der Insel Salang an der Küste von Malakka durch Capt. Joh. Weber, von Deli an der Nordostküste Sumatra's durch Dr. S. Martin, vom Singalang auf Sumatra durch Beccari, vom Kali Manudjajo, Res. Rembang auf Java durch F. Jagor, von den Togian-inseln bei Celebes durch A. B. Meyer.

var. d *angularis* Tab. IV, Fig. 2, 3.

Praecedenti similis, at angulo spirali elevato infra suturam.

Sumatra: Kaju-tanam, Solok und Danau di atas, mit Übergängen zu seminuda.

var. e *truncatula* Lam. Tab. IV, Fig. 4.

*Melania truncatula* Lam. an. s. v. VI, 2. 1822 nro 15; ed. 2 VIII p. 433. Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe, Zool. III p. 143 pl. 56 fig. 5—7 mit lebenden Thier u. Deckel. — Delessert recueil pl. 30 fig. 17. Brot materiaux Mel. III, p. 22; pl. 1, fig. 13.

*Melania tuberculata* var. Brot Melaniac. S. 250. Taf. 26, Fig. 11e, 11 ff.

Java: Blauw-water bei Passuruan.

Cylindrisch mit verhältnissmässig kleiner Mündung, nur 4 Umgänge erhalten, die beiden obern mit starken etwas bogenförmigen Vertikalfalten und gut ausgeprägten Spiralrippen, die beiden untern fast glatt, doch unter dem schwarzen Überzug bei näherer Betrachtung doch noch Spuren von beiderlei Skulptur zeigend; Naht deutlich angedrückt, etwas breit rinnenförmig. Erinnert auf den ersten Anblick sehr an *M. disjuncta* Brot Mel. S. 195. Taf. 22, Fig. 11 von Borneo(?), bei welcher aber die Spiralskulptur fast ganz fehlt. Lamarck's Exemplare stammen aus Timor, wahrscheinlich von Peron's Reise, diejenigen von Quoy u. Gaimard aus Mauritius.

*Melania tuberculata* ist bekanntlich sehr weit verbreitet, einerseits nach Nordwesten über Indien, Vorderasien und Nordafrika bis zur Südseite des Kaukasus, Cypern und Malta, andererseits nach Australien (Queensland). Man kann mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass ihre ursprüngliche Heimat die des Reises, also doch wohl Vorderindien sei, und dass sie durch dessen Kultur, welche ja theilweise im Wasser vor sich geht, mittelbar durch den Menschen ohne sein Wissen so weit verbreitet wurde, was durch den engen internationalen Verkehr der mahomedanischen Kulturvölker begünstigt wurde. Bei Kupang auf Timor z. B. habe ich sie gerade in den Bewässerungsgräben der Reisfelder gefunden. Sie kommt sowohl in stehendem als in ruhig fliessendem Wasser, hier gerne auf Schlammgrund, vor.

32. *Melania adonarae* n. Tab. IV, Fig. 5.

Testa turrito-conica, leviter striatula et lineis incisus spiralibus



exarata, olivaceo-fusca, margine suturali tumido flavescente, anfr. 10, regulariter crescentes, superiores plicis verticalibus subarcuatis obsoletis decussati, ultimus basi tumidus, lineis incisis et striis verticalibus frequentioribus, zona basali fusca et regione centrali pallide flava. Apertura ovata, subverticalis, basi latiuscula, non distincte producta, margine externo superne paulum recedente, margine columellari valde arcuato, crasso, albo.

Long. 27, diam. 10, aperturæ long. 9, diam.  $7\frac{1}{2}$  Mill.

Insel Adonara bei Flores: im Bach Waikelaki.

Gehört auch noch in die Reihe der *M. tuberculata* und schliesst sich zunächst an var. *seminuda* an, aber die oberen Windungen zeigen eine schwächere und andere Skulptur; die späteren Windungen zeigen scharf eingeritzte Spirallinien ziemlich gleichmässig über die ganze Oberfläche, nur an der Basis der letzten dichter aneinander und tiefer. Auch ist die wulstige heller gefärbte Nahtgegend charakterisch. Das auffallend breite und dunkle Basalband erinnert an *M. unifasciata* Mouss., aber diese ist nach der Originalbeschreibung des Autors jav. Moll. S. 71 auf den späteren Windungen ganz glatt, während Brot in seiner Monographie S. 262 ihr auf denselben auch noch vertiefte Streifen besonders über den Nähten und an der Basis zuerkennt. Hat im Habitus auch Ähnlichkeit mit *M. canalis* Reeve fig. 63 von den Philippinen, bei welcher die Naht auch hellgefärbt aber nicht aufgewulstet ist, und *M. bullioides* Rv. fig. 65 ebenfalls von den Philippinen, bei welcher die Naht zwar auch aufgewulstet, aber die obern Windungen starke Vertikalfalten zeigen.

### 33. *Melania cylindracea* Mouss.

Mousson moll. Jav. S. 72 Taf. 11 Fig. 9.

Java: Buitenzorg.

Etwas grösser als die Abbildung bei Mousson, übrigens in den wesentlichen Merkmalen, schlanke cylindrische Form und schwache Skulptur, mit derselben übereinstimmend. Stark inkrustirt, nur die letzte Windung theilweise frei, mit abgeflachten sehr undeutlichen Vertikalfalten und spärlichen abgeriebenen Spirallinien. Länge 18 Mill., Breite  $6\frac{1}{2}$ , Mündung  $5\frac{1}{2}$ . In Mousson's Text ist die Längenangabe 7,5 Mill. vielleicht ein Druckfehler für 17,5, denn  $7\frac{1}{2}$  Mill. Länge bei 5,2 Breite würde eine viel breitere eiförmige Gestalt ergeben, nicht eine schlank cylindrische wie die Abbildung zeigt; diese hat 13 Mill.

Länge bei 5 Breite. Auch bei andern Figuren dieses Buchs, z. B. der nebenstehenden *M. unifasciata*, ist die Figur kleiner als die Maassangaben im Text, wahrscheinlich weil eben nicht das grösste, sondern das best erhaltene Exemplar abgebildet wurde.

Diese Art ist bis jetzt nur aus dem westlichen Theil von Java bekannt; Mousson's Exemplare sind aus Pardana, Resid. Bantam.

Ich habe Brot's Monographie bei dieser Art nicht angeführt, da dessen Abbildung Taf. 26 Fig. 10 durch die bauchige und relativ grössere letzte Windung und die eingeschnürte Naht wesentlich von Mousson's Abbildung abweicht und sich mehr der *M. fontinalis* nähert.

#### 34. *Melania fontinalis* Phil.

Philippi Abbild. III, S. 57, Taf. 5, Fig 7. Brot Melan. S. 253, Taf. 26, Fig. 9.

Celebes: See Sidenreng bei Tete-adj und Fluss Minralang bei Tempe.

Der vorigen in Skulptur und Färbung ähnlich, aber in der Gesamtgestalt verschieden, indem zwar die drei obern der noch erhaltenen Windungen ziemlich gleich breit sind, die letzte aber bauchig vorsteht. Vertikalstreifen flach. Was Nevill handlist II, p. 246 als *M. fontinalis* von Penang beschreibt, passt nicht zu den vorliegenden Exemplaren, obwohl Philippi seine Art auch von Penang hatte.

#### 35. *Melania pulchella* n. Tab. IV, Fig. 21, 22.

Testa parva, cylindraceo-turrita, pallide flavescens, rufo-maculata, nitidula, apice integro; anfr. 6, regulariter crescentes, convexiusculi, plicis verticalibus sat validis et lineis spiralibus sculpti, ultimus et pars penultimi sublaevis, lineis spiralibus plus minusve distinctis, nitidus; apertura lanceolato-ovata, margine columellari sat arcuato, crassiusculo, externo tenui, supra sinuato, infra producto, basali paulum sinuato.

Long.  $6\frac{1}{2}$ , diam.  $2\frac{1}{2}$ , aperturae long.  $2\frac{1}{2}$ , diam.  $1\frac{1}{2}$  Mill.

Sumatra: See von Singkarah.

Diese Art hat das Ansehen einer jungen *M. tuberculata* mit sehr schwacher Skulptur und ungewöhnlich blasser Färbung; das dunkle Band an der Basis, das öfters bei *M. tuberculata* und ihren nächsten Verwandten auftritt und der *M. unifasciata* Mouss. den Namen gegeben hat, ist bei einigen Exemplaren vorhanden. Aber verglichen mit zweifellosen Stücken junger *tuberculata* stimmt sie doch nicht

hinreichend überein, erscheint namentlich mehr cylindrisch und durch das baldige Verschwinden der Skulptur unterschieden.

F) *Plotia* Ad.

Eine Stachelreihe wenigstens auf den obern Windungen, ausgeprägte Spiralskulptur. Meist klein und blassgefärbt. Deckel länglich, schmal, mit ganz kleiner Spirale.

36. *Melania scabra* Müll. Taf. IV, Fig. 6—12, Taf. IX, Fig. 8, 9.

Brot Melaniaceen S. 266.

var. a) *spinulosa* Lam. Tab. IV, Fig. 6.

Anfr. omnibus prope suturam muricato-denticulatis.

Buccinum scabrum O. Fr: Müller hist. verm. II, 1774, p. 136 (von Koromandel). Schröter Geschichte der Flussconchylien 1779, p. 299, Taf. 6, Fig. 13. Chemnitz Conch. Cab. IX, S. 188, Taf. 136, Fig. 1259, 1260. *Helix aspera* und *lugubris* Gmelin Linn. syst. nat. ed. XIII, p. 3656 und 3665.

*Melania scabra* Ferussac essai d'une methode conchyliologique 1807, p. 73. Theobald u. Hanley conchol. Ind. pl. 73, fig. 1—4. Brot Melan. Taf. 27, Fig. 147. Nevill handlist II, p. 281.

*Melania spinulosa* Lam. an. s. vert. VI 2, 1822, nro 12; ed. 2. VIII, p. 433. Delessert recueil pl. 30, fig. 15. Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrol. Zool. III, p. 147, pl. 56, fig. 12—14 mit lebenden Thier u. Deckel copirt bei Gray fig. Moll. an I pl. 55, fig. 7. Philippi Abbild. I, S. 6, Taf. 1, fig. 20. Mousson Moll. Java, Taf. 11, Fig. 12. Morelet series conchyl. IV, p. 319.

Sumatra: See von Singkarah, bis 30 Met. tief.

Celebes: Fluss bei Maros und Bantimurong. Pare-Pare. Palopo in Luwu, Palima.

Flores: Fluss bei Bari und Fluss bei Reo; zweiter Fluss bei Mbawa, dicht am Meer, 27 Mill. lang, 12 breit, Mündung  $11\frac{1}{2}$  lang.

Ausserdem ist diese Form im Berliner Museum vertreten von Mauritius, Madras, Calcutta, der Insel Salang an der Halbinsel Malakka, Siam und Pegu, Java, Ceram, Adonara, Timor, sowie den Philippinen und Palaos-inseln.

var. b) *acanthica* Lea.

Spinis paucioribus, 3—6 in anfr. ultimo, longioribus.

*Melania acanthica* Lea Proc. Zool. Soc. 1850 p. 194. Hanley conchol. miscell. fig. 8. Adams gen. Moll. pl. 31, fig. 3a b, Deckel. Brot Melaniaceen S. 278, Taf. 28, Fig. 10, 10a, 10b. Nevill handlist II, p. 281.

*Melania spinulosa* Lam. Reeve Conch. in fig. 156a b.

Celebes: Pare-Pare und Balangnipa, an Stellen, die bei Ebbe Süsswasser haben.

Saley: Fluss Bangkalan.

Flores: Fluss bei Bari.

Im Allgemeinen nimmt die Zahl der Dornen auf den untern Windungen ab, so zeigt z. B. ein Stück von Balangnipa auf der viertletzten und der drittletzten 8, auf der vorletzten 5, auf der letzten 4; ein anderes beziehungsweise 8, 4 und 3.

Ein Exemplar von der Insel Saleyer, bei welchem schon die vorletzte Windung nur 5 stark nach auswärts gerichtete Dornen zeigt, die letzte dagegen zahlreiche schwächere, bildet einen deutlichen Übergang zur typischen Form und zeigt, dass *M. acanthica* nicht als Art getrennt werden sollte, denn hier ist dasselbe Individuum im Verlauf seines Lebens wieder von *acanthica* zu *spinulosa* zurückgekehrt.

Diese Form ist im Berliner Museum noch vorhanden von den Seychellen, Andamanen, Nord-Celebes (Kema), Ceram, Adonara, den Philippinen und Palaos-inseln.

var. c) *nodosocostata* Mouss. Tab. IV, Fig. 7.

Anfr. ultimo infra saturam serie nodulorum coronato.

*Melania spinulosa* var. *nodoso-costata* Mousson. Moll. Jav. S. 76, Taf. 11, Fig. 1.

*Melania scabra* var. Hanley u. Theobal conch. Ind. pl. 73, fig. 4 und 5. Brot Melaniaceen Taf. 27, Fig. 14, 14a, 14b.

Sumatra: See von Manindjau, Ajer-tabit bei Pajacombo, See von Singkarah, Danau di atas, Padang.

Java: Situ bagendit und Sinagar.

Celebes: Bantimurong bei Maros, Fluss bei Pare-Pare, See Sidenreng bei Tete-adj, Minralang-Fluss bei Tempe, Palima, Fluss bei Palopo in Luwu.

eyer: Fluss Bangkalan, vorherrschend lang und schlank, bis 23 Mill. lang, 10 breit, Mündung 9 lang.

Flores: Fluss bei Bari und bei Reo; Fluss bei Mbawa unterhalb des Wasserfalls; Kotting, hier ein Stück mit einem breiten braunen Spiralband unterhalb der Knoten.

Adonara: Tana-merah, Prof. Wichmann, 25 Mill. lang,  $9\frac{1}{2}$  breit,  
Mündung  $9\frac{1}{2}$  lang.

Diese Form ist im Berliner Museum ferner vertreten von Mauritius, Madras und Bettighery in Vorderindien, Banka, Ceram, Amboina, Timor, den Philippinen und Palaos-inseln.

var. d) *angulifera*. Taf. IV, Fig. 8.

Anfr. ultimo (et penultimo) infra suturam linea angulari integra notato.

Brot Melaniaceen Taf. 27, Fig. 15a.

Sumatra: Flösschen bei Kaju-tanam, 24 Mill. lang, 13 breit,  
Mündung  $12\frac{1}{2}$  lang.

Celebes: Fluss bei Maros, 21 Mill. lang, 9 breit, Mündung 8.

Rotti: Fluss Oitelao bei Bilba und Fluss bei Talaë, Prof. Wichmann, 25 Mill. lang,  $10\frac{1}{3}$  breit, Mündung 10 Mill.

Diese Form habe ich auch zu Muaradua auf Sumatra und auf Ternate gefunden und ausserdem von Java und Siam erhalten.

var. e) *mutica*. Taf. IV, Fig. 9—12.

Anfr. ultimo infra suturam convexo, spinis, nodis lineave angulari nullis.

Hanley u. Theobald conch. Ind. pl. 73, fig. 6. Brot Melaniaceen Taf. 27, Fig. 14c, 14d.

Sumatra: See von Manindjau und Ajer-tabit bei Pajacombo.

Java: Buitenzorg, schlank und klein; Tjipanas, 17 Mill. lang, 10 breit, Mündung  $8\frac{1}{2}$ ; Sinagar.

Celebes: Bantimurong bei Maros. See Sidenreng bei Tete-adj; Fluss von Kaju-malowe bei Palos; Luwu.

Saley: Fluss Bangkalan.

Flores: Fluss bei Bombang; Fluss bei Mbawa, oberhalb des Wasserfalls, zweiter Fluss dicht am Meer; Kotting.

Timor: Kupang, Prof. Wichmann.

Bei einem Exemplar von Bantimurong, 26 Mill. lang, ist schon die drittletzte Windung ohne Knoten, bei solchen von Flores, Rotti und Timor die beiden letzten.

Diese Form ist im Berliner Museum noch vertreten von Mauritius, Ceylon, Banka, Ceram und den Philippinen.

Die angegebenen Varietäten gehen vielfach in einander über, so

dass man manche Exemplare ebenso gut zu der einen als zu der andern stellen kann; an vielen Fundstellen kommen zwei oder drei dieser Formen mit Übergängen untereinander vor, alle fünf aber erinnere ich mich nicht an Einer Stelle beisammen gefunden zu haben.

Das grösste Exemplar, von Flores, zeigt eine Länge von  $27\frac{1}{2}$ , eine Breite von  $12\frac{1}{2}$  Mill., die Mündung 11 Mill. (Taf. IV, Fig. 6.)

*Melania scabra* ist in Niederländisch-Indien in ähnlicher Weise allgemein verbreitet, wie *M. tuberculata*, und kommt ebenfalls auch in Vorderindien vor; die damals dänische Besitzung Trankebar oder Tarangawari an der Koromandelküste ist der Ort, von welchem beide Arten zuerst in die Conchyliensammlungen von Kopenhagen und damit in die europäische Litteratur gekommen sind. Beide finden sich auch sonst oft zusammen in demselben Gewässer. Aber *M. scabra* geht im Westen nur bis zu den osafrikanischen Inseln, im Osten nicht über Neu-Guinea, findet sich dafür auch in Siam und Cochinchina. Ich habe die Art in Niederländisch-Indien an 21 verschiedenen Orten gefunden, von Sumatra bis Ternate, Amboina und Timor, zu Lumar in Borneo in den Wassergräben der Reisfelder, zwischen Charen (*Nitella pseudoflabellata* A. Br.), aber an andern Orten auch auf Steinen in Bächen, so bei Wahai auf Ceram und bei Kupang auf Timor, hier auch öfters mit Kalk incrustirt.

Auch diese Art ist lebendig gebärend; die im Mutterleib gefundenen Schalen zeigen schon bis 5 Windungen, alle rasch an Umfang zunehmend, daher die ganze Schale fast kreiselförmig, die vierte Windung mit zahlreichen verhältnissmässig schwachen Vertikalfalten, die fünfte schon mit knotiger Schulterkante. (Taf. IX, Fig. 8.)

Deckel (Tab. IX, Fig. 9), schmal, länglich, mit einem fast geradlinigen und einem stärker gebogenen Seitenrande, ähnlich wie bei dem Deckel von *Neritina*; Spirale ganz klein, unten; ziemlich starke, etwas unregelmässig wellenförmige Anwachslineen.

### 37. *Melania granum* Busch.

Philippi Abbild. I, S. 4, Taf. 6, Fig. 7. Brot Mel. S. 270, Taf. 27, a—d.

*Melania scabra* var. *granum* Nevill handlist II p. 285.

Sumatra: See von Manindjau.

Bis 15 Mill. hoch und 8 breit, trüb röthlich grau mit den rothbraunen Zikzakstriemen und Flecken. Breiter als *scabra*, fast kubisch,

mit weniger zahlreichen und dafür breiteren Spiralleisten, oberhalb der Dornenreihe fast horizontal abgeflacht, die Dornen selbst nach aussen gerichtet mit kurzer runder Basis, sehr selten etwas faltenförmig herablaufend.

Ich habe seiner Zeit, 1861—62, diese Art auch bei Kepahiang und Trussan auf Sumatra (oberes Gebiet des Musi), sowie bei Sumedang auf Java gefunden.

G) MELANIA s. str.

Typus von *Melania* Lamarck syst. d. an. s. vert. 1801.

Tiara (Bolten) Brot, non Swainson 1831, *Melacantha* Swains. 1840, *Amarula* Sow. 1842. Ziemlich gross, mit Dornenreihe an der Schulterkante, Aussenrand der Mündung nicht ausgebuchtet. Schalenhaut dick, dunkel gefärbt; Deckel schmal.

38. *Melania setosa* Swains.

*Buccinum aculeatum* Lister hist. conch. mantissa 1692, pl. 1055, fig. 8. *Voluta fluviatilis* Rumph amb. rar. p. 106 (deutsch S. 79) zum Theil. *Buccinum fluviatile* Gualtieri index test. tab. 6, fig. B. — Favanne conchyliologie pl. 61, fig. G, 5.

*Melania setosa* Swainson in Brand's Quarterly Journal of science 1824, nr. 33, pag. 13 und Zool. illustr. (2) I, 429, fig. 1. Lesson Voy. de la Coquille Zool. II, 1, p. 351, pl. 41, fig. 2 mit Deckel. Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe Zool. III, p. 145, pl. 56, fig. 8—11 lebendes Thier, copirt bei Gray fig. moll. an. I, pl. 55, fig. 2, 11. Philippi Abbild. I, Taf. 3, Fig. 40. Reeve conch. ic. XII, fig. 186. Brot Melan. S. 297, Taf. 30, Fig. 5.

*Melacantha setosa* Troschel Gebiss d. Schnecken I, S. 122, Taf. 9, Fig. 11. Radula.

Flores: Fluss bei Bari und Sungei-Nargi bei Konga.

Schlanker als Brot's typische Figur, mit erhaltener Spitze, 39 Mill. lang, 23 breit, Mündung 24 lang, 13 breit.

Deckel schmal, Kern am untern Ende gegen aussen, die Spirale nicht sehr deutlich; Innenseite mit langgezogener matter Anheftungsfläche, im Umkreise derselben glänzend.

Ich habe diese Art 1862 auf Amboina von dem damaligen Hafenmeister Paulus zusammen mit *M. diadema* Lea (Brot Taf. 29, Fig. 2)

erhalten, mit der Angabe, dass dieselben beim alten Fort Laha an der Westseite der Bai von Amboina gefunden seien. Dieses Vorkommen macht es um so wahrscheinlicher, dass Rumph diese Art schon gekannt habe, und in der That hat er unter dem Namen *Voluta fluviatilis*, Fluss-Papstkrone, beide, *M. setosa* und *diadema*, zusammengefasst, denn er sagt a. a. O. 106 ausdrücklich: mit feinen Furchen längs der Windungen und an deren Kanten weiche Dornen, welche zuweilen aber auch stumpf und steif sind. Weiche, d. h. biegsame Dornen sind für *M. setosa* charakteristisch; seine Abbildung, Taf. 33, Fig. FF. stellt aber eine Art ohne deutliche Spiralskulptur und mit starken Zacken vor, also *M. diadema*. Die Benennung „amarula“, d. h. die kleine bittere, stammt auch von Rumph her und ist Uebersetzung des malayischen „papeytje“, weil die Schnecke einen etwas bittern Geschmack habe, bezieht sich daher ursprünglich auf diese zwei Arten.

Ferner lebt *M. setosa* auf der Insel Buru, wo ich sie bei Oki an der Südküste auch in Gesellschaft von *M. diadema* gefunden habe; durch Ida Pfeiffer erhielt das Berliner Museum ein Exemplar aus Makassar, durch F. Jagor von der Insel Samar (Philippinen) und in Mousson's Sammlung befindet sich eines von Bali; Lesson sammelte sie auf der Insel Waigiu (Waigamme) bei Neu-Guinea. Sie ist demnach im östlichen Theil des malayischen Archipels ziemlich verbreitet. Bedenklicher steht es mit ihrem Vorkommen im Westen, auf den grossen Sunda-inseln. Allerdings hat Frustorfer die kaum davon zu trennende *M. setifera* angeblich aus Java dem Berliner Museum mitgetheilt, und nach Reeve soll Cuming sie vom Cap Palmas in Sumatra gehabt haben, sonst ist mir aber kein Fundort derselben in Java, Sumatra, Malakka oder Borneo bekannt geworden.

Schon Mörch hat im Journal de Conchyliologie Band XX, 1872, p. 319–321 die früher unter *M. amarula* zusammengefassten Formen als eigene Arten unterschieden und benannt, er hat aber die unterscheidenden Merkmale selbst nicht angegeben, sondern lässt nur die Formen, welche er meint, durch Angabe des Fundorts und einiger Citate mehr errathen als erkennen.



## MÖRCH.

	NAMEN	CITATE.	VORKOMMEN.
1	amara Mörch 1872.	mitra bei Reeve fig. 175.	Sumatra, Nikobar.
2	amarula L.	Müll. Chemnitz. Schröter.	Amboina.
3	crenularis Desh.	Mag. Zool. 1843, 83.	?
4	melanus Montf. 1811.	Encycl. meth. 458, 6.	Ile de France, Bourbon.
5	coacta Meuschen 1787.	Argenville. Born. 16, 21.	?
6	mitra Meuschen 1778.	Schröter Flussc. 9, 12.	?

BROT vertheilt diese sechs Formen folgendermaassen (Melan. S. 289—295).

MÖRCH nro.	BROT nro.	NAMEN.	VORKOMMEN.
1	301	Cybele A. Gould 1847.	Sumatra, Fidji, Philippinen.
2	300	diadema Lea 1850.	Philippinen, Amboina.
3	301	Zu Cybele 3.	
4	297	amarula (L.) Lam.	Madagascar, Mauritius.
5	299	thiarella Lam.	?
6	293	Plotia sp.	

Melania diadema Lea oder amarula (L.) Mörch habe ich wie schon erwähnt, auch auf Amboina erhalten und auf Buru selbst gefunden, und sie ist wohl unzweifelhaft die von Rumph, dem Urheber des Namens amarula, gemeinte Form, sowie wahrscheinlich auch die von Linne. Von M. Cybele liegt auch ein Exemplar mit dem Fundort Sumatra in der Berliner Sammlung, es ist aber sonderbar, dass dieselbe auch auf den Philippinen und auf den Viti- (Fidji-) inseln vorkommen soll, ohne bis jetzt auf Java, Celebes, Flores oder den Molukken gefunden zu sein. Entweder ist unsere Kenntniss von der Verbreitung dieser Arten noch sehr lückenhaft oder sind diese beiden doch nicht so scharf als Arten zu trennen.

## H) TIAROPSIS Brot.

Brot Melan. S. 299.

Gethürmt, dickschalig, mit einer Knotenreihe und bogenförmig zurücktretendem Aussenrand der Mündung. Schalenhaut dünn, blass.

39. *Melania Bocki* Brot, Taf. IV, Fig. 13—16.

Brot in Journ. de Conch. XXIX, 1881, p. 157, pl. 6, fig. 3.

Sumatra: Seen von Manindjau, Singkarah, Danau di bawah und Danau di atas, bis 25 Met. Tiefe. Auch Sawah bei Singkarah.

Scheint für die Padangischen Oberlande (Bovenlanden) eigenthümlich zu sein. Im Danau di atas einzelne Stücke bis 25 Mill. lang und 10 breit, aber diese sehr stark abgerieben. *M. Snellemanni* Schepman in Veth, Midden Sumatra p. 15, Taf. 6, Fig. 5 ist dieser Art ziemlich ähnlich, hat aber schon auf den obern Windungen zahlreichere Rippen.

I) TAREBIA Ad.

Länglich eiförmig, mit mehreren Spiralreihen von runden Höckern (Körnern). Aussenrand der Mündung bogenförmig zurücktretend. Deckel ziemlich schmal eiförmig, mit kleiner Spirale unten.

40. *Melania spectabilis* Brot.

*Melania lateritia* var. Reeve fig. 165 a b.

*Melania spectabilis* Brot. Melaniaceen S. 321, Taf. 33, Fig. 15.

Sumatra: Flüsschen bei Kaju-tanam und bei Tabeh di aripan.

Zwischen *M. celebensis* und *lateritia*. Körner verhältnissmässig gross, aber flach, in Spiral- und Vertikalreihen, meist nur in den zwei oberen Reihen deutlich ausgeprägt, darunter nur glatte mehr oder weniger deutlich begränzte Spiralgürtel. Naht stark abgesetzt. Kolumellarrand stark gebogen, dick.

Auch auf Neu-Irland, nach von Dr. Finsch gesammelten Exemplaren im Berliner Museum.

41. *Melania celebensis* Q. G.

Quoy et Gaimard voy. Astrolabe, zool. III, p. 152, pl. 56, fig. 26—29 mit Weichtheilen und Deckel. Brot Mel. S. 317, Taf. 32, Fig. 15, 15a, 15c.

Celebes: Fluss bei Maros und Bantimurong. See von Tempe.

Fluss bei Tete-adj. See Sidenreng bei Tete-adj, klein und schlank. Fluss bei Pare-Pare. Fluss bei Palopo in Luwu. — Fluss von Kaju-malowe an der Palos-bai, Prof. Wichmann.

Saley: Fluss Bonea, schön ausgebildete Exemplare, das grösste 30 Mill. lang,  $11\frac{1}{2}$  breit, Mündung 13 lang.

Flores: Fluss bei Bari. Fluss bei Reo, bis 37 lang,  $15\frac{1}{2}$  breit, Mündung  $15\frac{1}{2}$ . Zweiter Fluss bei Mbawa, dicht am Meer und Fluss bei Mbawa, unterhalb des Wasserfalles; Fluss bei Baa, Endeh.

Durch schlankere Gestalt und zahlreichere Spiralreihen von Körnern, auf der letzten Mündung meist noch 4, von *M. spectabilis* zu unterscheiden. Ein auffallend bauchiges Exemplar von Pare-Pare,  $34\frac{1}{2}$  Mill. lang, 15 breit, Mündung 18, zeigt sogar 8—9 gekörnte Spiralreihen auf der letzten Mündung, die zweite, vierte und siebente auffallend schmaler, aus Verdopplung hervorgegangen, wie sich beim Zurückverfolgen nach der vorletzten Windung erkennen lässt. Die unter einander stehenden Körnchen reihen sich öfters zu schiefen Linien, was an *M. semicostata* erinnert, aber der Unterschied zwischen der Skulptur des oberen und unteren Theils der letzten Windung ist nie so scharf und gross wie bei dieser. Fast immer schwarz überzogen.

var. *obsoleta*, Tab. IV, Fig. 29.

Körnelung sehr schwach. Nur 18 lang und  $6\frac{1}{2}$  breit, Mündung 7. Form sehr schlank.

Celebes: Fluss Minralang bei Tempe.

var. *minor*, Taf. IV, Fig. 30.

Nur bis 15 Mill. l.; kaum 6 breit, Mündung 7, Aussenseite und Inneres der Mündung schwärzlich.

Celebes: Palima in Boni, in Brackwasser zusammen mit *M. semicostata*, öfters stark incrustirt.

Körner mehr oder weniger deutlich in schiefer oder etwas bogenförmiger Reihe, an *semicostata* erinnernd, aber in der allgemeinen Form verschieden.

var. *annectens* n. Tab. IV, Fig. 31.

Testa conico-ovata, seriebus 3—4 granorum quadratorum, subtus liris latiusculis sculpta, nigricans, unicolor, paululum decollata, anfr. superstites 6—7, subgradati; superiores planati, ultimus convexiusculus. Apertura lanceolato-ovata, margine externo superne recedente, marg. columellari incrassato, sat curvato, pallide coeruleo. Long. 32, diam. 13, apert. alt.  $4\frac{1}{2}$  diam. 8 Mill.

Celebes: Fluss bei Palopo, Luwu. — Fluss bei Pare-Pare. Fluss Minralang bei Tempe (jung).

Würde ich für die von Brot näher beschriebene *Mel. granifera* Lam.

halten, wenn derselbe nicht ausdrücklich auf die gerade Columella besonderen Werth legen würde. Wohl nur etwas bauchigere Varietät von Celebensis. Q. G.

42. *Melania granifera*. Lam.

Lamarck an. s. vert. ed. 1. VI 2. nro. 13. 1822; ed. 2. VIII. p. 433.

Brot Mel. S. 321, Taf. 33, Fig. 13, 13a (nicht *M. granifera* von Quoy et Gaimard).

Celebes: Wasserfälle und Fluss bei Maros, schlanker als die typische Form, 24 Mill. lang, 8 breit, Mündung 11, hell bräunlichgelb, mit einzelnen rothbraunen Flecken (Ebenda habe ich sie auch 1861 gefunden).

Flores: Fluss bei Reo. Fluss bei Mbawa unterhalb des Wasserfalls. Fluss bei Bombang. Fluss Donah bei Endeh. Fluss bei Maumeri. Kotting. Sikka.

Rotti: Fluss Oitelao bei Bilba und Fluss bei Talae, Prof. Wichmann.

Im Allgemeinen durch mehr bauchige eiförmige Gestalt, schwächere und ungleichmässige Ausbildung der Körner, mehr geraden Columellarand und Verengung des untern Theils der Mündung von *M. celebensis* unterschieden, auch hell braungelb gefärbt; doch finden sich oft Exemplare, bei welchen man im Zweifel bleibt, zu welcher von beiden sie zu stellen seien. Nur von Einem Ort, dem Fluss bei Mbawa unterhalb des Wasserfalls, liegen charakteristische Stücke von beiden Arten, ohne Übergangsformen, vor, dagegen vom Fluss bei Reo eine Anzahl Stücke, die nur mit Mühe und so zu sagen bösem Gewissen zwischen beiden Arten vertheilt werden können. Die Exemplare von Rotti nähern sich durch stärkere Ausbildung der Körner der *M. celebensis*, haben aber doch die eiförmigen Gestalt von *granifera*.

Ich fand diese Art auch auf Timor bei Kupang, in Bächen an Steinen sitzend, in Gesellschaft von *Neritina brevispina* und öfters wie diese mit Kalksinter bedeckt; ferner bei Atapupu.

Ähnliche Formen, die ich auf den Molukken, namentlich zu Batugantong auf Amboina gesammelt habe, scheinen eher zu *M. verrucosa* Hinds zu gehören.

43. *Melania lineata* Gray.

*Helix lineata* Gray in Wood ind. testaceol., Suppl. 1828, fig. 68.

*M. lirata* Benson in Journ. Asiat. Soc. of Bengal V, 1836, S. 782.

Reeve fig. 170. Brot. Melan. S. 328, Taf. 33, Fig. 6.

*M. lineata* Troschel Archiv f. Naturgeschichte 1837, S. 176. — Philippi Abbild. I, S. 161, Taf. 3, Fig. 7. — Mousson Moll. Jav. S. 75. — Nevill handlist II, p. 276.

Sumatra: See von Singkarah, bis zu 30 Met. Tiefe.

Durch Herrn Grabowsky erhielt das Berliner Museum diese Art auch aus dem südöstlichen Theil von Borneo, nämlich dem Fluss Batangalai in Pagat. Sonst aus Bengalen, Tenasserim und Java bekannt.

var. *semigranosa* Busch.

*Melania semigranosa* von dem Busch bei Philippi Abbild. I, S. 2, Taf. 1, Fig. 13. ?Troschel Gebiss d. Schnecken I, p. 123, pl. 10, fig. 1. Radula.

— *lineata* var. *subgranosa* Mousson Moll. Jav. S. 75, Taf. 10, Fig. 6.

— *lirata* var.  $\gamma$  Brot Melan. S. 329, Taf. 33, Fig. 6b.

— *lineata* var. *semigranosa* (Busch) Nevill handlist II, p. 7.

— *granulata* van Hasselt tab. inedit. im Leidner Museum tab. X, fig. 3.

Sumatra: Fluss von Padang, See von Singkarah, spärlich unter der typischen Form.

Java: Situ bagendit in den Preanger-Regentschaften, Ein Exemplar mit wohl erhaltener Spitze, 26 Mill. lang,  $10\frac{1}{2}$  breit, Mündung  $11\frac{1}{2}$ , drei Körnerreihen auf der früheren Windungen, vier, wovon aber die zweite viel kleinere Körner hat, auf der letzten. Ich fand dieselbe auch bei Palabuan.

#### 44. *Melania flavida* Dunk.

Philippi Abbild. Ed. I, S. 164, Taf. 3, Fig. 15.

Testa subturrita, liris spiralibus obtusis sat depressis viridifuscis nitidulis, in anfr. superioribus ternis conspicuis, in ultimo 6—7 sculpta, ceterum leviter striatula, griseobrannea. Anfr. 6 vix convexiusculi, infra suturam impressam subangulati, ultimus basi sensim attenuatus. Apertura circa  $\frac{2}{5}$  testae longitudinis occupans, lanceolata, margine externo tenui, superne recedenti-sinuato, inferne convexo producto, margine columellari incrassato, valde arcuato, pallide caeruleo, fauce plumbeo-coerulea.

Long. 25, diam. 11, apert. long. 11, lat. 6 Mill.

Sumatra: Danau di atas und Danau di bawah. Ajer-tabiet bei Paja-kombo. Fluss bei Padang.

Die meisten der vorliegenden Exemplare oben stark ausgefressen, daher das Verhältniss der Mündung zur ganzen Schale nur vermu-

thungsweise und die Skulptur der oberen Windungen gar nicht angegeben werden kann.

Bei den Exemplaren von Ajer-tabiet tritt die dunkelgrüne Farbe der mittleren und unteren Spiralleisten auf hell bräunlichgelbem Grunde besonders auffällig hervor, fehlt aber der obersten.

Brot Mel. S. 329 vereinigt *M. flavida* mit *lirata* Bens. und *semigranosa* Busch in eine Art und alle drei sind einander auch sehr nahe, aber *M. lineata* hat nur kleine Knötchen, um mehr als ihren Durchmesser von einander abstehend und durch eine dunkle Linie verbunden, in einer oder zwei Spiralleisten; *M. semigranosa* stärkere Knoten, grösser als ihre Zwischenräume, mit oder ohne dunkle Linie, in zwei bis drei Spiralleisten; *M. flavida* nur eine Reihe dicht aneinander liegender blasser flacher Knötchen nach dem Original Exemplar in Dunker's Sammlung und Philippi's Abbildung; bei den Exemplaren aus Sumatra sind auch diese meist ganz verschwunden.

45. *Melania dissimulans* n. Tab. IV, Fig. 32.

Testa ovato-turrita, solida, nigricans; spira truncata, anfr. superstites 5—6, superiores subplani, gradati, granis series 3 spirales formantibus, plus minusve in plicis subverticales grossas confluentibus sculpti; anfr. ultimus convexiusculus, granis 4 seriatis, magis sejunctis, intermediis minoribus, denique versus aperturam compressis et linea nigra spirali concatenatis, basi liris spiralibus crassiusculis 3—4 sculptus. Apertura superne acuta, basi late sinuata, margine columellari crasso, albido.

Long. 17, diam. 8, apert. long. 8 Mill.

N. O. Sumatra: Deli, legit Martin. Museum Berolin. nro. 43446.

K) SERMYLA Ad.

Obere Hälfte der letzten Windung mit schiefen Radialfalten.

46. *Melania semicostata* Phil.

Philippi Abbild. II, S. 171, Taf. 4, Fig. 2. — Brot. Melan. S. 308, Taf. 32, Fig. 3. — *M. Riqueti* (non Grateloup) Mousson Moll. Jav. S. 76, Taf. 11, Fig. 10.

Celebes: Palima in Boni, Brackwasser, das grösste Stück, noch etwas abgestutzt, 15 Mill. lang, Mündung  $6\frac{1}{2}$ , die Mehrzahl der Stücke nicht über 10 Mill., Mündung  $4\frac{1}{2}$ . — Boni, ohne nähere Fundortsangabe, mit andern Süsswasser-Melanien, durchschnittlich grösser, bis 18 Mill.

Diese Art steht in der Mitte zwischen den Untergattungen *Tarebia* und *Sermyla*: von der letzteren hat sie die schiefen Falten, diese sind aber nicht glatt wie bei den typischen Arten von *Sermyla*, *M. tornatella* Lea von den Philippinen und *M. Riqueti* Grat. aus Vorderindien, sondern von Spiralfurchen durchschnitten und dadurch mehr oder weniger in Körner aufgelöst.

Ich habe diese Art auch bei Surabaya auf Java gesammelt.

Die nahe verwandte ächte *M. Riqueti* habe ich bei Makassar in sumpfigem Brackwasser gesammelt, an einer Stelle, wo die Eingebornen Salz gewinnen, mit *Stenothyra Moussoni* die einzige lebende Schnecke, die ich daselbst fand. Ferner bei Muntok auf Banka und bei Singkawang auf Borneo. Diese letztern Fundorte führen zu den vorderindischen hinüber, welche Brot anführt; Brackwasserschnecken haben oft eine weitere Verbreitung als ächte Süsswasserbewohner.

47. *Melania pinguicula* n. Taf. IV, Fig. 17–20.

Testa turrito-ovata, pallide olivaceo-flavescens, sebaceo-nitida, subtiliter striatula, plicas verticales tenues regulares et sulcos spirales distinctas, plicas nodulatim secantes, in anfr. superioribus exhibens, in inferioribus plicis nullis, sulcis obsolescentibus; anfractus convexusculi, sutura mediocri, albida, ultimus basi convexus, lineis elevatis spiralibus et fascia basali fusca. Apertura ovata, basi late rotundata, margine externo tenui, supra modice sinuato, margine columellari incrassato, valde arcuato, albo.

Long. 14 diam. 6–7, aperturae long. 6, diam. 3 Mill.

„ 19 „ 10, „ „ 9, „ 4 „

Sumatra: Danau di bahwa, Ajer-tabit bei Pajacombo und See von Singkarah.

In letzterem nur ein ganz kleines, wahrscheinlich junges Exemplar, 5 Mill. lang und 2 breit, Mündung 2, mit  $5\frac{1}{2}$  Windungen, die erste einen glatten vorstehenden Knopf bildend, während die übrigen die oben beschriebene Skulptur deutlich zeigen; das dunkelbraune Basalband ist schon vorhanden.

Die Exemplare aus dem Danau di bahwa haben die oben angegebene Grösse, die oberen Windungen stark abgenützt, an den drei untern noch gut erhaltenen nur noch Spuren der charakteristischen Sculptur.

Dem allgemeinen Ansehen nach kann diese Art noch in die Gruppe *Sermyla* gestellt werden, obwohl die Sculptur viel schwächer ist.

## NASSIDEN.

**Canidia** Ad. 1891.

Schale ähnlich der von *Melania*, länglich, mit Vertikalfalten, Mündung unten deutlich ausgeschnitten und darüber eine schwache Einbiegung des Aussenrandes, ähnlich wie bei *Strombus*, nur schwächer. Columellarrand unten eine enge Nabelritze bildend. Deckel hornig, länglich-rhomboidal mit endständigem Kern, nicht wie bei *Nassa* gezähnt. Radula ähnlich derjenigen von *Nassa*, Mittelplatte bogenförmig mit 6 Spitzen, Seitenplatte mit 3 Stärkern, die äussere mehr abstehend. (Brot in Journ. de Conch. XXIV 1876, pl. 12, fig. 1 und 3).

1. *Canidia Helena* Phil.

*Melania Helena*, Meder bei Philippi abbild. neuer Conchyl. II, S. 170, Taf. 4, Fig. 4.

*Melanopsis Helena* Mousson Moll. jav. S. 64, Taf. 10, Fig. 2.

Bräunlich-grün mit drei dunkelbraunen Bändern, Windungen ziemlich gewölbt, mit geraden glatten Vertikalfalten, auf der vorletzten gegen 20, auf der letzten schwächer und flacher. Spitze gut erhalten, glatt, kugelig; 20 Mill. lang,  $7\frac{1}{2}$ —10 breit, Mündung 8—10 Mill.

Java: See Situ-bagendit bei Garut, Preanger-Regentschaften, zusammen mit *Melania tuberculata* var. *plicifera*.

Bei der beträchtlichen Entfernung dieses Fundortes von und Erhebung über dem Meere ist diese Gattung als entschiedene Süßwasserbewohnerin anzuerkennen und nicht etwa als submarin, wie man daraus hätte vermuthen können, dass sie und die nahverwandte *Clea* in Borneo die einzigen Rhachiglossen unter den Süßwasserschnecken sind. Philippi und Mousson geben keinen näheren Fundort als Java überhaupt an, ich fand sie bei Surabaya in süßem Wasser in einiger Entfernung vom Meere und auch auf Timor bei Kupang, doch hier nicht lebend. Strubell fand sie im „Tji-lewung in der Umgebung von Buitenzorg“ und wenngleich Böttger sie unter die Brackwasserarten setzt (Bericht Senkenb. Gesellsch. 1890, S. 165), so scheint mir doch diese Angabe auf einen Fundort hinreichend weit von und über dem Meere zu deuten, um sie dem reinen Süßwasser zuzurechnen; es ist wohl der Tji-liwong gemeint, welcher am Berg Gedeh in der Assistenz-Residentschaft Buitenzorg entspringt und bei Batavia mündet, und



Buitenzorg selbst liegt 270 niederl. Ellen über dem Meer. F. Jagor fand sie auf Java bei Malembong (Malangbong) in den Preanger-Regentschaften, 8 deutsche Meilen vom Meere entfernt und etwa 3000 rhein. Fuss hoch, de Filippi und Giglioli bei Batavia ohne nähere Angabe über die Fundstelle. Nach französischen Autoren kommt dieselbe Art in Cambodja in rasch fliessenden Bächen (torrents) und in einem Binnensee Udong (über 20 deutsche Meilen vom Meer entfernt) vor, P. Fischer, catalogue d. distrib. geogr. de moll. terr. et fluv. de l'Indochine 1891, p. 60. Die grössten Stücke, welche ich gesehen habe, 29 Mill. lang, 15 breit, Mündung 13 Mill. hoch, sind aus Neu-Hannover, von der Expedition der Gazelle mitgebracht, mittlere Grösse 20—21 Mill. lang,  $7\frac{1}{2}$  breit, Mündung 8 Mill.

In Niederländisch-Indien findet sich noch eine zweite Art, C. Temmincki, welche Dr. Semmelink bei Tana-laut im südöstlichen Borneo gefunden hat.

Auch die nahe verwandte Gattung *Clea* dürfte dem eigentlichen Süsswasser, nicht dem Brackwasser angehören, da das Berliner Museum für Naturkunde *Clea nigricans*, sowohl var. *maxima* Brot als var. *fasciata* E. Smith aus Südost-Borneo von Hrn. Grabowsky mit der Angabe erhalten hat, dass sie daselbst im Pramassan-gebirge gefunden sei, zusammen mit *Melania sparsinodosa*; Doria und Beccari haben *Clea nigricans* im nordöstlichen Theil von Borneo bei Sadong im Wasser klarer Bäche (nelle acque di limpidi ruscelli) gefunden, Issel moll. Born. p. 102, Büttiköfer im Fluss Sibau (Schepman 1896). Über die Arten und Varietäten von *Clea* s. E. Smith in Proc. malac. Soc. London I, 1895, p. 251—252.

#### NERITIDEN.

Rhipidoglossen (Fächerzüngler) mit halbkreisförmiger Mündung und plattenartiger Mündungswand.

##### **Neritina** Lam.

Spiralgewunden. Deckel die Mündung schliessend, aussen glatt.

##### 4) *AURICULATAE* (Neripteron Recluz).

##### 1. *Neritina auriculata* Lam.

Lamarck Tabl. Encycl. meth. pl. 455, fig. 6; an. s. vert. ed. 1. VI 2 nro. 11; 2 VIII, p. 572. — Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe,

Moll. p. 198, pl. 65, fig. 6—8. — Martens *Neritina* in d. neuen Ausgabe von Chemnitz S. 30, Taf. 6, Fig. 24—27.

Celebes: Boni.

Von Ceylon bis Neu-Irland verbreitet.

B) HEMISPHERICAE (Clypeolum Recluz).

2. *Neritina pulligera* L.

Rumph amb. var. p. 76 (Deutsche Übersetzung S. 31, Tab. 22, Fig. H. — (Nerita) Linne syst. nat. ed. XII, p. 1253. — Sowerby thes. conch. II, pl. 111, fig. 65, 66. — Reeve conch. ic. IX, fig. 9. — Martens a. a. O. S. 49, Taf. 1, Fig. 4, 5.

Celebes: Fluss von Maros, Fluss bei Pare-Pare, See bei Tete-adju und Fluss bei Balang-nipa.

Flores: Fluss bei Bari und Fluss bei Reo.

Von letztgenanntem Ort das grösste Exemplar, 35 Mill. im grossen Durchmesser, 26 hoch, Wölbung 18. Auch diese Art ist weit verbreitet; ausser den a. a. O. genannten Fundorten habe ich sie auch in letzter Zeit von der Insel Ponape (Karolinen), durch Herrn O. Zernsch in Süsswasser gefunden, erhalten.

3. *Neritina iris* Mouss.

Mousson moll. jav. S. 81, Taf. 12, Fig. 8—10. Martens a. a. O. S. 52, Taf. 9, Fig. 5, 6.

Celebes: Fluss bei Palopo in Luwu.

Timor: Fluss Koinino bei Kupang. Prof. Wichmann.

Die erwachsenen Stücke dieser Art unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre längliche, weniger verbreiterte und abgeflachte Gestalt von *N. pulligera*; junge Exemplare, bis 12 Mill. im grössten Durchmesser, sind aber noch verhältnissmässig breiter und flacher. Die Zähnelung des Columellarrandes ist meist recht schwach, doch bei einem erwachsenen Exemplar von Palopo so stark wie bei *pulligera*, die rothe Färbung des hintern Randes der Columellarfläche ist bei erwachsenen bald mehr bald weniger markirt. Die ohr-artige Erhebung am Ende der Naht kann bei jungen Stücken so deutlich sein, wie bei *pulligera*, bei erwachsenen fehlt sie ganz oder ist kaum angedeutet. Nach all diesem steht *N. iris* der *pulligera* sehr nahe und ist im Jugendzustand nicht sicher von ihr zu unterscheiden. An jungen Exemplaren fehlt öfters alles Roth in der Mündung; dasselbe kommt auch bei ganz jungen Stücken von *N. pulligera* vor.

var. *wichmanni* Taf. X, Fig. 10.

Major, paulo magis rugosa, area columellari grossius rugulosa, sulco arcuato in parte posteriori insigni, margine columellari distincte denticulato.

Diam. maj. 27, min. 12, alt. 19, marg. columell. 12, lat. areae columellaris 10 Mill.

Timor: Fluss Koinino, Prof. Wichmann, mit Kalksinter inkrustirt.

Von Timor war *N. iris* bis jetzt nicht bekannt; die von Prof. Wichmann gesammelten Exemplare zeichnen sich durch ihre Grösse, stärkere Wölbung und gröbere Skulptur, sowohl an der Aussenseite, als in der Mündung, aus. Bei erwachsenen zeigt sich eine bogenförmige Furche im hintern Theil der Columellarfläche, der hintern Umgränzung derselben ungefähr parallel, bei einem Exemplar sehr deutlich ausgeprägt, bei einem andern sehr schwach; spurweise Andeutung derselben sehe ich auch bei einzelnen Exemplaren aus Celebes. Das Roth im Innern der Mündung bei einem Stück sehr lebhaft, bei einem andern nur blass orange; das Roth am hintern Rand der Columellarfläche fehlt bei diesem letztern gänzlich. Bunte Netzzeichnung öfters vorhanden. Naht herabgebogen wie bei *N. iris*. Ein junges Stück auch breiter, mit kleinen schwarzen Flecken, ohne Roth in der Mündung.

C) *NERITAEA* Roth. (*PICTAE* Menke, *SERRATAE* Recluz).

4. *Neritina variegata* Less. Tab. X, Fig. 14.

Lesson Voy. de la Coquille, Zool. II, p. 378. — Martens a. a. O.

S. 98, Taf. 10, Fig. 11–17. — *N. Sumatrensis* Sow. conch. illustr. fig. 54.

Celebes: Fluss bei Maros.

Adonara: Tanah-mera.

Timor: Fluss Koinino, Prof. Wichmann.

Einzelne der vorliegenden Stücke aussen ganz schwarz, eines fast ganz gelb, die meisten schwarz mit mehr oder weniger grossen gelben Flecken; der rothe Fleck an der Columellarfläche zuweilen sehr deutlich, zuweilen kaum oder gar nicht angedeutet (an in Spiritus aufbewahrten Stücken). Ein Exemplar zum Theil von einer Kalk-Inkrustation bedeckt, wie es auf Timor so oft bei *N. brevispina* vorkommt. Das Exemplar von Maros Tab. X, Fig. 14 ist jung, nur 7 Mill. im grossen Durchmesser, und sehr lebhaft gefärbt, rothgelb mit drei breiten schwarzen Bändern und zahlreichen nicht ganz kleinen gelben Flecken

auf beiden Farben. Charakteristisch ist die tiefschwarze Farbe der Aussenseite des Deckels mit weisslichem Fleck am Anfang der Spirale.

5. *Neritina ziczac* Lam.

Lamarck an. s. vert. ed. 1. VI 2. 1822; ed. 2 VIII, p. 570, Philippi Abbild. Conch. I, Taf. 1, Fig. 10. — Sowerby thesaur. conch. II, fig. 105, 106. — Martens a. a. O. S. 101, Taf. 10, Fig. 20, 22. Celebes: Palima.

Timor: bei Kupang, Prof. Wichmann, ebenda auch von mir und von Th. Studer gefunden.

Die Stücke von Celebes und Timor typisch, schwarz mit zahlreichen schmalen blassgelben, etwas zackigen Linien. Dass diese Art wirklich die von Lamarck gemeinte ist, woran ich früher a. a. O. gezweifelt, davon habe ich mich später, 1883, durch Vergleichung des Lamarck'schen Original-Exemplars im Museum zu Genf überzeugt.

6. *Neritina communis* Q. G.

Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe, Zool. III, p. 195, pl. 65, fig. 12—14. — Sowerby thes. II, fig. 17, 18, 22—25. — Reeve conch. ic. IX, fig. 88. — Martens a. a. O. S. 113, Taf. 11, Fig. 6, 7, 9. Celebes: Boni.

Bunt gefleckt, eine fast einfarbig gelb, keine mit Roth.

D) CLITHON RECLUZ.

7. *Neritina brevispina* Lam.

Rumph amb. rar. p. 76 (deutsche Übersetzung S. 35) Tab. 22 Fig. O. — Lamarck an. s. vert. ed. 1. VI 2 nro. 9. 1822; ed. 2 VIII, p. 572; Delessert recueil des coquilles de Lamarck pl. 32, fig. 5. — Sowerby conchol. illustr. fig. 8; thes. conch. II, fig. 45, 51, 52. Reeve conch. ic. IX, fig. 28. — Martens a. a. O. S. 156, Taf. 17, Fig. 1—4 und 9. N. corona Linne Syst. nat. ed. X, p. 777, zum Theil, Hanley ipsa Linn. conch. p. 397, pl. 5, fig. 10.

N. corona-australis (Chemnitz) Mouss. jav. moll. S. 83 und 118, Taf. 12, Fig. 12, Taf. 20, Fig. 11 und Taf. 22, Fig. 6, 7.

Flores: im Fluss bei Bari und demjenigen bei Reo.

Adonara: bei Tanah-merah.

Rotti: im Fluss von Baä, Prof. Wichmann.

Die Exemplare von Bari, Reo und von Rotti ohne Stacheln (var. mutica), diejenigen von Adonara theils mit, theils ohne.

8. *Neritina angulosa* Recl.

Recluz in Proc. Zool. Soc. 1842 p. 173. — Reeve conch. ic. IX, fig. 51. — Martens a. a. O. S. 158, Taf. 17, Fig. 5, 6 und 10. — N. corona var. Sowerby thes. conch. II, fig. 1, 2.

Flores: im westlichen Theil im Fluss bei Reo, im mittlern (Endeh) im Fluss bei Mbawa unterhalb des Wasserfalls und wiederum ganz nahe am Meer, im Fluss bei Braai und im Fluss Donah, endlich im östlichen Theil im Sungei-Nargi bei Konga.

Unterscheidet sich hauptsächlich durch kürzeres Gewinde, deutliche Schulterkante und gröbere Runzeln ohne helle Flecken von *N. brevispina*; bei einzelnen Exemplaren kann man aber zweifelhaft sein, zu welcher sie zu stellen. Exemplare mit und solche ohne Stacheln kommen an demselben Fundorte zusammen vor, unter denen im Fluss Donah gesammelten überwiegen die stachellosen bei weitem bei erwachsenen und jungen, im Sungei-Nargi dagegen bei beiden die gestachelten. Meist schwärzlich oder dunkelbraun, im Fluss bei Braai auch bräunlich-gelbe mit schwarzen oder schwärzlichen Bändern. War bis jetzt nur von den Philippinen und Süd-Celebes bekannt.

9. *Neritina squarrosa* Recl.

Recluz in Proc. Zool. Soc. 1842, p. 173. — Martens a. a. O. S. 162, Taf. 16, Fig. 13–18. — *N. squamosa* Sowerby thes. conch. II, fig. 26, 27. — Reeve conch. ic. IX, fig. 56.

*N. ruida* Mousson in Journ. de Conchyliologie VI, 1857, p. 162.

Timor: Fluss Koinino bei Kupang, Prof. Wichmann.

Verhältnissmässig gross, bis 26 Mill. im grossen Durchmesser und 15 in der Wölbung.

War bis jetzt von Java bis Flores, Amboina und den Philippinen bekannt, aber noch nicht von Timor. Den von Recluz gegebenen Namen „*squarrosa*“ glaubten Sowerby und Reeve in *squamosa* corrigiren zu sollen, was allerdings eine verständlichere Benennung sein würde, aber auch *squarrosa*, schorfig, grindig bezeichnet das Aussehen der Oberfläche dieser Art recht gut, sie sieht aus wie mit vertrocknenden Eiterpusteln bedeckt.

10. *Neritina faba* Sow. Taf. X, Fig. 11.

Sowerby conchol. illustr. fig. 10; thes. conch. II, fig. 220, 221. — Martens a. a. O. S. 176, Taf. 18, Fig. 14–17.

Celebes: im Fluss bei Maros.

Flores: Fluss bei Bari.

Mehrere Exemplare, die grössten 11 Mill. im grossen Durchmesser, 6 im kleinen, 10 hoch, glänzend gelbbraun mit zahlreichen weissen Tropfen, welche nach vorn zugespitzt, oder auch abgerundet, selten quer abgeschnitten, immer dunkelroth oder schwarz gesäumt sind, und 2—4 mehr oder weniger dunkleren Bändern, welche weniger solche Flecken enthalten.

11. *Neritina flavovirens* Busch. Taf. X, Fig. 12, 15, 16.

v. d. Busch bei Philippi Abbild. Conch. I, S. 26, Taf. 1, Fig. 23. — Martens a. a. O. S. 184, Taf. 19, Fig. 1, 2.

Celebes: Fluss bei Balang-nipa, an Stellen, welche bei Ebbe ganz süsses Wasser zeigen, und im Fluss bei Palopo.

Die vorliegenden Stücke, meist ohne Zweifel noch nicht ausgewachsen, sind vorherrschend glänzend olivengrün, einzelne ganz einfarbig, andere mit ziemlich breiter schwarzer Nahtbinde, andere mit weissen, öfters schwarz-gespitzten Pfeiflecken, welche aber gegen die Mündung zu ganz verschwinden. Einzelne Exemplare mit mehreren Stacheln auf der letzten Windung, (fig. 12), eines mit nur einer. Ein Exemplar (ohne Stacheln) ganz ockergelb, aber auch mit der schwarzen Nahtbinde (fig. 15).

Deckel schmal, Aussenseite weisslichgrau mit schwarzem Anfangsfleck und schwarzem Aussenrand und deutlicher Bogenfurche; Innenseite ähnlich gefärbt, Zapfen stark, mit stumpfem blassgelben Knopfe, Rippe schlank, blassgrau, Zwischenwand sehr schief.

12. *Neritina confluens* n. Taf. X, Fig. 9.

Testa oblongo-semiglobosa, leviter striatula, subopaca, obscure olivacea strigis nigris subverticalibus undulatis multifariam inter se confluentibus et maculis interstitialibus nonnullis caerulescenti-albidis picta; spira prominula, conica, brevi, sutura appressa, lacera, antice valde descendente; apertura diagonalis, ampla, intus plumbea, margine externo subsemicirculari, sursum sigmoideo, columellari paulum sinuato, obtuse et inaequaliter denticulato, area columellari coriaceo-rugulosa, plumbea, retrorsum flavesciente, in parte dimidia inferiore arcuato-angulatim terminata.

Diam. maj. 22, min. 14, alt. 23; margo colum. 13, lat. areae colum.  $6\frac{1}{2}$  Mill.

Deckel aussen weisslichgrau mit breitem dunkelrothem Randsaum, deutlich ausgeprägter Bogenfurche, innerhalb welcher das Grau etwas dunkler ist; ganz unten weisslich mit orangegelbem Randfleck; Innenseite weisslich mit mehr oder weniger gelbröthlichen Stellen und zunächst dem dunkelrothen Randsaum bläulich-grün; Zapfen kräftig, ziemlich schief nach aussen, orangegelb, Rippe abgeflacht, längs- und quer-gestreift, mit breit abgestutztem unten ausgehöhltem Ende, Zwischenwand ziemlich aufrecht.

Flores: im Fluss bei Bombang, Fluss bei Wukur unweit Sikka und im Fluss bei Donah.

Adonara: von Hrn. Nägele erhalten.

Zunächst verwandt mit *N. chlorostoma* Brod. von Polynesien und *N. retropicta* Marts. von Japan, aber in Gestalt und Zeichnung doch verschieden. Schon ganz junge Exemplare von kaum 5 Mill. im grossen Durchmesser zeigen die charakteristischen schwarzen unter sich anastomosirenden Striemen (fig. 9f).

### 13. *Neritina Ualanensis* Less.

*Neritina Oualaniensis* Lesson, Voy. de la Coquille, Zool. II, p. 379, 1830. — Reeve conch. ic. X, fig. 68. — Martens a. a. O. S. 193, Taf. 20, Fig. 1—24.

*Neritina Mertoniana* Recluz in Proc. Zool. Soc. 1843, p. 71. — Sow. thes. conch. II, fig. 242—246. — Reeve fig. 141.

*Neritina pulchella* Mörch in Videnskab. Meddelelser naturhist. Förening Kjöbenhavn 1872, p. 27.

Celebes: bei Makassar.

Eine im Brackwasser des indischen und pacifischen Oceans weit verbreitete Art, von Madras, Ceylon, Siam und Hongkong (von Hrn. Schmacker erhalten) bis Nord-Australien, den Viti-Inseln, Ualan bei den Karolinen und Süd-Japan bekannt. Die vorliegenden Exemplare, obwohl nicht zahlreich, zeigen doch die hauptsächlichsten Zeichnungsvarietäten:

- a) *conferta*: grünlich mit zahlreichen schwarzen Wellenlinien.
- b) *polydelta*: ebenso aber noch mit kleinen weissen Dreiecken.
- c) *diremta*: schwarze Wellenlinien weit von einander abstehend, einzelne weissgesäumt, auf gelblichem Grund.
- d) *frondicineta*: drei gelbliche mehr oder weniger ausgezackte Spiralbänder auf dunkelm Grund.

- e) nigrobifasciata: wie b, aber noch zwei breite schwarze Spiralbänder, das obere dicht an der Naht.

#### E) NERITILIA Marts.

##### 14. *Neritina* (*Neritilia*) *consimilis* Marts. Tab. X, Fig. 17.

Von Martens a. a. O. S. 243. Taf. 23, Fig. 25, 26 und Taf. A, Fig. 17.

Celebes: Luwu, zwei Exemplare.

Obgleich es auffallend ist, eine Art, welche bis jetzt nur aus einem Bach der Insel Mauritius bekannt war, in Celebes wiederzufinden, kann ich doch weder an der Schale noch am Deckel Unterschiede finden, welche zur Aufstellung einer neuen Art berechtigen würden. Die Schale ist von einem schwarzen Überzug ganz bedeckt, nur die Columellarfläche davon frei und bläulich grau, während das ebenfalls einzige Exemplar von *consimilis* im Berliner Museum gelb ist, mit schwärzlich grauer Columellarfläche. Grosser Durchmesser  $3\frac{1}{4}$  Mill., kleiner 3, Höhe 2, Columellarrand 2, Breite der Columellarfläche  $1\frac{1}{2}$  Mill. Von der etwas grösseren polynesischen *N. rubida* A. Gould, welcher sie in dieser Färbung mehr gleicht, und deren nächster Fundort, die Viti-inseln, ungefähr ebensoweit in entgegengesetzter Richtung von Celebes entfernt ist als Mauritius, unterscheidet sie sich wesentlich durch die Bildung des Deckels, bei *consimilis* flach ohne einen bestimmten aus der Fläche heraustretenden Fortsatz, bei *N. rubida* mit einem solchen (a. a. O. Taf. A, Fig. 16).

Der Umstand, dass Prof. Weber weder von den Padang'schen Oberlanden und deren Landseen in Sumatra, noch von den Preanger-Regentschaften in Java Arten dieser Gattung mitgebracht hat, wohl aber aus den Küstengegenden von Celebes, Flores und Timor, bestätigt auffallend was ich in der Monographie dieser Gattung 1879 hervorgehoben habe, dass *Neritina* mehr den Inseln und der Nähe des Meeres angehöre als andere Süsswasserschnecken und höher gelegenen Continentalgegenden fremd sei.

**Septaria** Fer. 1807.

(*Navicella* Lam. 1809).

Ohne Spiralwindungen, Spitze gerade nach hinten. Deckel in den Fuss eingesenkt.



1. *Septaria suborbicularis* Sow.

Noote-Doppen Rumph amb. rar. p. 123 (Deutsche Übersetzung S. 104) Taf. 40, Fig. O.

*Patella porcellana* L. syst. nat. ed. X, 781; Mus. Lud. Ulr. p. 689; Gmelin ed. XIII, p. 3692 z. Theil.

*Navicella suborbicularis* Sowerby cat. shells Earl of Tankerville p. X. — Recluz in Revue Zool. 1841, p. 377. — Sowerby thes. conch. II, fig. 30, 31. — v. Martens in der Fortsetzung v. Martini—Chemnitz, *Navicella* S. 91, Taf. 6, Fig. 5–14.

*Navicella orbicularis* Reeve conch. ic. IX, fig. 5.

Flores: im Fluss bei Bombang und in demjenigen bei Mbawa unterhalb des Wasserfalls, sowie im Fluss Donah nahe Endeh.

Timor: bei Kupang, mit Kalksinter überzogen, Prof. Wichmann.

Ausserdem in Niederländisch-Indien von Sumatra, Java, dem nördlichen Celebes, Ternate, Ceram, Amboina und Adonara bekannt, siehe Martens a. a. O.

subvar. *furcato-radiata*.

v. Martens a. a. O. S. 31, Fig. 9, 10.

Flores: im Flusse Braai bei Endeh.

Auch von Java und den Philippinen bekannt.

var. *compressa*.

*Navicella Urvillei* var. Quoyi Recluz in Revue Zool. 1841, p. 378.

Flores: im Fluss bei Bombang und demjenigen bei Mbawa zusammen mit der typischen Form.

Recluz hatte sie von Amboina.

Diese Art ist im Allgemeinen an den breiteren, dem kreisförmigen sich nähernden Umriss und namentlich dem verhältnissmässig breiten und kurzen, mehr quer bandförmigem als dreiseitigen Septum zu erkennen, doch finden sich, wie bei manchen andern der Gattung, so auch bei dieser öfters auffällig schmälere und seitlich wie zusammengedrückte Formen, bei denen dann das Septum verhältnissmässig länger ist; zum Vergleich mögen die folgenden Ausmessungen dienen, welche auch zeigen, dass die jüngeren durchschnittlich flacher sind.

## a) Typische Form.

Länge	Breite der Schale.	Höhe	Breite des Septums.	Länge	
31	24	13?	12 $\frac{1}{2}$	4	Mill. (Timor).
28 $\frac{1}{2}$	24	11 $\frac{1}{2}$	12	2	„ (Donah).
24	20 $\frac{1}{2}$	8	10	3	„ „
17	15	5	8	2 $\frac{1}{2}$	„ „
12	10	4	6	1 $\frac{1}{2}$	„ „
5 $\frac{1}{2}$	4	1 $\frac{1}{2}$			„ „

## b) compressa.

30	21	11	13 $\frac{1}{2}$	5	„ (Mbawa).
----	----	----	------------------	---	------------

Die Zeichnung ist in der Regel netzförmig, aber an Exemplaren mit wohl erhaltener Schalenhaut wenig hervortretend, mehr bei abgebleichten oder etwas abgeriebenen; zuweilen zerfällt das Netzwerk in drei Felder, zwischen denen zwei breite vom Wirbel zum Vorder- rand ziehende Strahlen ohne Zeichnung sich befinden. Dieses macht den Übergang zur Subvar. *furcato-radiata*, bei der die Zeichnung in stärkeren schwarzen vom Wirbel ausstrahlenden Linien besteht, mehr oder weniger breit, nicht oder nur sehr wenig anastomosierend, öfters auch ähnlich in drei Felder getheilt. Die Innenseite ist bei allen vorliegenden Stücken graublau, das Septum weisslich, der Hinterrand oft gelblich, auffallend röthlichgelb bei manchen Stücken aus dem Fluss Donah. Schwarze Flecken an der Innenseite nahe dem Wirbel sind eine Ausnahme.

Var. *compressa* zeigt ganz dieselbe Färbung wie die typische Form und unterscheidet sich dadurch von der in der Form ähnlichen *S. luzonica*.

2. *Septaria Janellei* Recl. Tab. X, Fig. 13.

*Navicella Janellei* Recluz in *Revue Zool.* 1841, p. 376. — Sowerby *thes. conch.* II, fig. 11—13. — Reeve *conch. ic.* IX, fig. 1a—c. — v. Martens a. a. O. S. 25, Taf. 4, Fig. 16—19.

Flores: im Fluss bei Reo, nur 1 Exemplar.

Sonst von den Marianen und Philippinen, sowie unbestimmt von den Molukken (angeblich Amboina in Tapparone's Bearbeitung der von Doria gesammelten Mollusken) angegeben. Nahe mit der vorigen verwandt, aber stärker gewölbt, mehr glänzend und lebhafter gezeichnet. Das vorliegende Exemplar 36 Mill. lang, 26 breit, 13 $\frac{1}{2}$  hoch,

also etwas höher als die halbe Länge, Septum 15 breit und  $9\frac{1}{2}$  lang, dreiseitig, röthlichgelb.

3. *Septaria tessellata* Lam.

var. *clypeolum* Recluz.

*Navicella clypeolum* Recluz in Proc. Zool. Soc. 1842, p. 157. — Sow. thes. II, fig. 32—35. — Reeve conch. ic. IX, fig. 24, 24a.

*Navicella tessellata* var. *clypeolum*, v. Martens a. a. O. S. 37, Taf. 7, Fig. 8—15.

*Navicella radiata* Reeve conch. syst. pl. 199, fig. 7.

Celebes: bei Balang-nipa, an einer Stelle, wo das Wasser bei Ebbe vollständig süß ist.

Flores: im Fluss Braai bei Endeh.

Sonst noch von Sumatra, Java, Timor, Batjan und Buru bekannt.

An der flachen Gestalt, dem nicht überragenden Wirbel und dem längeren dreiseitigen, am Innenrand stärker ausgebuchteten Septum leicht zu kennen. Das Exemplar von Flores ist 17 Mill. lang, 14 breit, vorn verengt, 5 hoch, Septum  $8\frac{1}{2}$  lang und 3 breit, Zeichnung dreistrahlig, Innenseite blau, nach hinten gelb.

Das Exemplar von Balang-nipa 13 Mill. lang, 10 breit, 4 hoch, Septum  $5\frac{1}{2}$  lang und 2 breit.

## SÜSSWASSER-BIVALVEN.

### MYTILIDAE.

#### *Modiola* Lam.

Wirbel nahe am vordern Ende der Schale, im Innern ohne Scheidewand.

Mantelränder längs der ganzen Unterseite nicht verwachsen.

1. *Modiola leucosticta* n. Tab. X, Fig. 18—21.

Testa oblonga, utrinque leviter radiatim striatula, tenuis, olivaceo-fusca, punctis albis adspersa, prope apices et intus zonis arcuatis roseo-purpureis picta; pars antica perbrevis, rotundata, leviter radiatim costulata, pars media laevis compressa, angulo obtuso tumido a parte superiore et posteriore separata; margo dorsalis usque ad medium longitudinis stricte in alam obtusam ascendens, dein arcuatim in marginem posteriorem rotundatum transiens, margo ventralis medio paulum sinuatus.

Long. 10, alt. apicis  $3\frac{1}{2}$ , alae 6, diam. 4 Mill. Vertices in  $\frac{3}{20}$  long.  $\frac{11}{20}$ , angulus alae in  $\frac{2}{3}$  long. situs.

Celebes: Fluss bei Maros.

Süsswasser-arten aus dieser sonst marinen Gattung kennt man noch aus Hinterindien und China folgende:

*M. lacustris* Marts. im See Tungting, Prov. Hunan in China, an Steinen, Anodonta und Corbicula festsitzend, Sitzgsber. Malak. Blätt. 1875, S. 186 und in Pfeiffer's novitat. concholog. IV, Taf. 135, Fig. 2, 3 abgebildet.

*M. Siamensis* Morelet im See Tonlisap in Cambodja und bei Vinluong in Cochinchina (übrigens hier an den Wurzeln der Rhizophoren, also wohl in Brackwasser) Morelet, series conchyl. IV, 1875, p. 365, pl. 17, fig. 3.

*M. Lemeslei* Rochebrune im Mekong-strom, Bull. Soc. philomath. de Paris 1881.

Rochebrune hat dafür die Gattung *Limnoperna* aufgestellt, welche aber vorerst nur auf das Vorkommen im süßen Wasser, nicht auf einen Formunterschied gestützt ist.

*Modiola subramosa* Hanl. soll nach Strubell im Bach von Batu-gadja bei dem Städtchen Amboina leben, Böttger im Bericht d. Senkenb. Gesellsch. 1891, S. 310; auch mir wurde während meines Aufenthaltes in Amboina von einer solchen Muschel im süßen Wasser daselbst gesprochen (Mal. Blätt. 1863, S. 131), ich vermochte sie aber dort nicht aufzufinden, wohl aber sehr zahlreich auf Steinen in der Bai von Amboina selbst. Siehe unten unter den Brackwasser-Mollusken.

*Modiola glaberrima* Dunker (unter dem Namen *Perna*) Reeve fig. 48, lebt nach Angas Proc. Zool. Soc. 1867, p. 929 im Paramattafluss bei Sydney auf schwarzem Schlammgrund; da aber hinzugefügt wird, in 6 Faden Tiefe dürfte es doch an der Mündung und vielleicht schon im Meere sein; dieselbe soll sich eine Art Nest zusammenspinnen, wie *M. vestita* Phil. und *Lima ventricosa* Sow. im Mittelmeer, beides Meermuscheln.

Ausserdem spukt in den Sammlungen noch der Name *Modiola fluviatilis* Parreyss mit der Fundortsangabe: Sumatra, auf eine Süsswasserart dieser Insel hinweisend. In Dunker's Sammlung ist aber unter dieser Bezeichnung *M. Metcalfei* Hanley vorhanden, eine grössere marine Art des malayischen Archipels, in Pätel's Sammlung die kleine *M. perfragilis* Dunker, und eine junge *tulipa* Lam.

Aus Siam und Cambodja sind auch einige *Dreissena* (Morelet in

Revue Zool. 1866, p. 167, Morelet Journ. de Conch. XXXII, 1884, p. 603 u. Rochebrune Bull. Soc. philomath. 1881) beschrieben. Es ist daher nicht ganz unwahrscheinlich, dass auch noch in Borneo diese Gattung gefunden würde.

Diese Gattung unterscheidet sich von *Mytilus* und *Modiola* durch eine Scheidewand im Innern der Wirbelgegend und durch Verwachsung der beiderseitigen Mantelränder längs der hintern Hälfte der Bauchseite.

### UNIONIDEN.

Die Unioniden spielen in Niederländisch-Indien durchschnittlich eine geringere Rolle als im Festlande von Indien und Afrika, und stehen an Häufigkeit der Arten und Individuen entschieden gegen die Cyreniden zurück, was wohl durch insulare Natur und der dadurch bedingten Beschaffenheit der Flüsse bedingt sein mag. Denn auch sonst treten auf Inseln die Unioniden wenig hervor, sind z. B. sehr schwach vertreten auf Cuba, gegenüber der grossen Zahl und manchfaltigen Ausbildung derselben in Nord-, Central- und Süd-Amerika. Am reichsten an Unioniden dürfte Borneo sein, das ja an sich am meisten festlandartig ist und sich in seiner Fauna näher an Siam und Cochinchina anschliesst. Auch Sumatra hat noch einige auffallende Formen, wie *U. superbus* Lea (*macropterus* Dunk.), der sich an den siamesischen *U. capax* anschliesst, *cucumoides* Lea und den hier zu beschreibenden *U. Verbecki*. Die Philippinen sind noch ärmer an Unioniden, als die Sunda-inseln; denn sie besitzen nur den einen zwischen *Unio* und *Anodonta* schwankenden Typus der *Anodonta purpurea* Val. in mehreren kaum als Arten von einander zu trennenden Formen. Celebes scheint gar keine Unioniden zu besitzen; nicht nur Prof. Weber, auch P. und Fr. Sarasin scheinen keine daselbst getroffen zu haben, letztere nennen in ihrem Reisebericht (Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde XXX, 1895, S. 334), aus dem Binnensee Poso im Mittelstück der Insel zwischen den Golfen von Boni und Tomini wohl Melanien und *Paludina* als zahlreich vorhanden, aber kein Wort von Unioniden.

Auch den Molukken, der Inselreihe östlich von Java und der Insel Timor fehlt diese Familie; dieselbe hält demnach innerhalb Niederländisch-Indien die Wallace'sche Grenzlinie ein (abgesehen von Bali, dessen Fauna noch zu wenig bekannt ist), aber der Mangel der Unioniden ist mehr ein insularer als ein australischer Character, denn auf

dem Hauptland von Australien und schon in südlichen Theil von Neu-Guinea finden sich wieder eine Anzahl Unionen.

Die von mir in Niederländisch-Indien gefundenen Unioniden habe ich schon in den Malak. Blätt. 1867, S. 10—17 zusammengestellt, ich behandle daher hier nur die von Prof. Weber gefundene Art und verweise für Borneo auf die in der Literatur angegebenen Arbeiten von Drouet.

#### Unio Retz.

##### 1. *Unio Verbecki* Böttg. mscr. Taf. Fig. 1, 2, 4, und 5.

Testa ovato-elliptica, crassiuscula, rugis elevatis fulminato-undulatis per majorem superficiei partem sculpta, antice breviter rotundata, postice producta, subrostrata, margine superiore postico paullo ultra ligamenti finem horizontali, dein angulo obtuso descendente, lineis angularibus duabus a regione verticis in rostrum descendentibus, inferiore validiore; margo ventralis antice leviter arcuatus et paululum hians, medio convexus, postice leviter sinuatus. Dentes cardinales parvi, valvae sinistrae 2, obliqui, valvae dextrae unicus nodiformis, laterales antici sat breves, asperi, laterales postici elongati, leviter arcuati, laeves. Vertices detriti, in pullis bifariam tuberculosi.

Long. 47, alt. 26, diam. 18. Vertices in  $\frac{1}{4}$  longitudinis siti.

„ 41, „ 25, „  $15\frac{1}{2}$  „ „ „ „ „

Sumatra: See von Singkarah.

Neben *U. radulosus* aus Borneo die einzige *Unio*-art mit starker Skulptur aus Niederländisch-Indien; sie erinnert am meisten an solche aus Siam und Cochinchina wie *U. rusticus* und *scobinatus* Lea, *pellis-lacerti* Morelet.

#### CYRENIDAE.

Zur Bestimmung der Cyreniden des malayischen Archipels liegen zwei grössere, mit Abbildungen versehene Bearbeitungen der Familie oder Gattung vor, Clessin's Cycladeen in der Fortsetzung des Conchylien-Cabinets von Martini und Chemnitz, 1874—79, und Sowerby's Gatt. Cyrena in der Fortsetzung von Reeve's Conchologia iconica Bd. XX, 1876. Beide sind unabhängig von einander, indem Sowerby Clessin's Arbeit nirgends citirt und offenbar nicht kannte, sie ergänzen dadurch einander gegenseitig, widersprechen sich aber auch öfters in den Bestimmungen. Clessin behandelt die ihm bekannten Arten gründlicher, gibt namentlich auch Beschreibung und Abbildung des Schlosses,

aber das ihm zu Gebot stehende Material an ausländischen Arten war spärlicher, hauptsächlich aus den Sammlungen von Maltzan, Pätel, Gruner, welche eben einzelne Exemplare ohne nähere Fundortsangabe, durch Händler bezogen, besaßen, wobei falsche Bestimmungen nicht ausgeschlossen, und eine Controle durch Vergleichung der Original-Literatur konnte Clessin nicht überall ausüben, da ihm manche Werke nicht zugänglich waren. Sowerby gibt nur sehr unvollständige Literatur-Angaben und stellt mit wenig Ausnahmen nur die Aussenseiten der Muschel dar, aber seine Bestimmungen sind in sofern zuverlässiger, als sein Material, das des Britischen Museums und der Cuming'schen Sammlung, die Originale der zahlreichen neuen Arten von Deshayes enthält.

Da im Museum für Naturkunde in Berlin von manchen Arten zahlreiche Exemplare mit specieller Fundortsangabe, direkt aus den Händen des Sammlers, mir vorliegen, welche in der bisherigen Literatur noch nicht berücksichtigt sind, so gehe ich hier etwas weiter auf die im niederländisch-indischen Archipel vorkommenden Arten ein, als ausschliesslich durch die Bestimmung der von Prof. M. Weber gesammelten bedingt wird.

**Cyrena (Lam.) Gray, Desh.**

Vorderer und hinterer Seitenzahn nicht gekerbt, vorderer kurz. Schalenhaut an frischen Exemplaren meist längs den concentrischen Streifen oder Rippen franzenartig vorstehend. Innenseite in der Regel weiss, ohne Violett. Von Vorder-Indien und Ceylon bis Nord-Australien und Neu-Caledonien in unter sich oft recht ähnlichen Arten verbreitet, hauptsächlich im Küstenland, zunächst dem Meere, oft im Brackwasser, doch nicht immer. Die Artunterscheidung wird dadurch schwierig, dass Schloss und Skulptur wenig scharfe Unterschiede geben und die allgemeinen Umrisse bei Individuen desselben Fundortes einigermassen im Verhältniss der Längenausdehnung zur Höhe variiren. Dennoch scheint es vorerst noch das Beste, die Arten nach dem allgemeinen Umriss zu gruppiren und, ähnlich wie es schon Deshayes 1854 gethan hat, nach den einzelnen Inseln auseinander zu halten.

A) PROCLIVES.

Vorderrand vom Wirbel an steil abfallend bis zur Mitte der Höhe der ganzen Schale oder noch tiefer,

B) SUBORBICULARES.

Vorderrand und Hinterrand bogenförmig, Unterrand auch gebogen, Länge der Schale die Höhe wenig

*(Proclives).*

Unterrand wenig gebogen, Gesamtmumriss der Schale daher je nach der Ausbildung des hintern Theils mehr oder weniger gleichschenkelig-dreieckig oder beilförmig:  
*bengalensis* Desh. Bengalen.  
*siamica* Prime, Siam.  
*sumatrensis* Sow. Sumatra.  
*ponderosa* Prime, Philippinen.

—

*buschi* Phil. Borneo.  
*triangularis* Metc. Borneo.

—

*impressa* Desh. Java.  
*Moussoni* n. Java.

—

*jukesi* Desh. (*fallax* Cless.) Nord-Australien.

C) *EXPANSAE.*

Nach hinten schnabelartig verlängert und etwas zusammenge-drückt, meist hellfarbig:

*ceylonica* Chemn. Ceylon.  
*expansa* Mouss. Java.  
*moluccensis* n. Batjan.  
*papua* Less. Neu-Guinea.  
 ? *ventricosa* Desh., Sow. Nord-Australien.  
*rugulosa* Mouss. Nord-Australien.

*(Suborbiculares)*

übertreffend. Wölbung der Schale schwach:

*proxima* Prime, Hinter-Indien.  
*suborbicularis* Busch, Philippinen, Celebes.  
*laevis* Prime, Borneo.  
*nitida* Desh. Borneo (Cless.) Neu-Guinea (Tapp. Can.)  
*bernardiana* Prime, Neu-Caledonien.  
*essingtonensis* Prime, Nord-Australien.

D) *CYPRINOIDEAE.*

Stark gewölbt, etwas länger als hoch, vorn und hinten abgerundet, hinten oft durch eine vom Wirbel herabsteigende Furche eingebuchtet. Schalenhaut meist dunkel.

*galathea* Mörch, Nikobaren.  
*eximia* Dunk. Java.  
*coaxans* Gm. Molukken.  
*cyprinoides* Q. G. Neu-Guinea.  
*divaricata* Rv.       "       "  
*sinuosa*, Desh. Java?, Ceylon?, Philippinen.  
*caledonica* Sow. <sup>1)</sup> Neu-Caledonien.  
*cyprinaeformis* Prime, Nord-Australien.

1) Anmerkung. Bei der Tafel X der Sowerby-Reeve'schen Bearbeitung von *Cyrena* stimmen die Nummern der Figuren nicht mit denen des Textes überein, was bei flüchtiger Benützung dieses Werkes irre führen kann. Vergleichung lehrt dass:



Es ergibt sich daraus, dass die Hauptformen sich durch den grössten Theil des Gebietes wiederholen.

Bei manchen Arten von *Cyrena* findet sich namentlich an alten dickschaligen Exemplaren an der Innenseite der Schalen eine eigenthümliche Verdickung, von den Wirbeln herabsteigend, nach vorn steil abfallend, nach hinten allmählig abschwellend, oder auch an derselben Stelle nur eine schwache Vertiefung, von zwei schmalen leicht erhabenen Rändern begränzt. Die Lage entspricht an den Weichtheilen der Stelle, wo die innere Kieme nicht mehr von der äussern bedeckt wird, sondern unmittelbar unter dem Mantel sichtbar wird, aber diese Gränze verläuft an den Weichtheilen schiefer, als die Anschwellung oder Furche an der Innenfläche der Schale, so dass sie nicht die alleinige Ursache sein kann. So finde ich es bei Exemplaren von *C. eximia*, *coaxans*, *Sumatrensis*, *sinuosa*, auch bei einem Stück von *C. triangulata*. Ebenso bei *Batissa*.

#### A) PROCLIVES.

##### 1. *Cyrena sumatrensis* Sow.

Sowerby genera of shells Nro. 5, pl. 27, circa 1820, kopirt bei Reeve conchol. systematica I, pl. 63. Hanley bivalv. p. 94, pl. 15, fig. 1. Philippi Abbild. III, Taf. 3, Fig. 4, kopirt bei Clessin Cyclad. Taf. 18 Fig. 2. Desh. catal. Veneridae Brit. Mus. II, p. 242. Sow.-Reeve conch. icon. XX, fig. 62.

Sumatra: nach der Angabe von Sowerby in einem Bächlein gefunden; ein etwas verbleichtes Exemplar habe ich 1862 von Benkulen mitgebracht, kann mich aber des näheren Fundorts nicht erinnern.

Die unter dem Namen *Sumatrensis* in der Dunker'schen und Pätel'schen Sammlung enthaltenen Stücke, sowie ein unter demselben Namen vom Madras-Museum passen alle nicht zu diesen Abbildungen und schliessen sich näher an *suborbicularis* an. Nach französischen Autoren kommt *C. Sumatrensis* auch in Siam, Cambodja und bei Saigon vor.

---

Fig. 39a—b ist *carolinensis*, N. 31a—b des Textes.

„ 40	„ sublobata,	N. 39	„	„
„ 41	„ caledonica,	N. 40	„	„
„ 42	„ fallax,	N. 41	„	„

Nur für 38, *nitidula*, stimmen die Nummer der Figur und des Textes überein.

## 2. *Cyrena impressa* Desh.

*Cyrena impressa* Desh. cat. Ven. II, p. 249.

— *ceylonica* (Chemn.) Clessin Cyclad. S. 103, Taf. 17, Fig. 1, 2.

Java: nach Jukes bei Desh.

Gross, vorn durch  $\frac{2}{3}$  der Höhe steil abfallend, unten und hinten gerundet mit schwacher Andeutung einer hintern Furche; vorderer Seitenzahn sehr stark. Das mir vorliegende Exemplar der Pätel'schen Sammlung, 86 Mill. hoch, 87 lang, 51 dick, gleicht so sehr der erwähnten etwas zu schief nach vorn geneigten Abbildung eines Maltzahn'schen Exemplars bei Clessin, dass man es für das Original halten könnte. Wirbel in  $\frac{1}{3}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne annähernd ein rechter.

Deshayes gibt die Art zugleich auch von den Philippinen und Australien an.

## 3. *Cyrena triangularis* Metc.

Metcalf Proc. Zool. Soc. 1851, p. 74 und Ann. Mag. N. H. (2) XI, 1853, p. 21. Sow.-Reeve fig. 25.

Borneo: Gegend von Sarawak, Hamilton bei Metcalfe.

Auffallend beilförmig, indem der Vorderrand weit über die Mitte der Höhe herab steil und etwas concav abfällt, der Hinterrand nicht viel weniger steil aber leicht convex und der Unterrand in der Mitte wenig gebogen ist mit schwacher Hinterfurche. Ein mir vorliegendes Exemplar 57 Mill. hoch, 61 lang, 30 dick, Wirbel in  $\frac{3}{7}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne ungefähr ein rechter.

Ein Exemplar in der Dunker'schen, dem Berliner Museum einverleibten Sammlung, von H. Dohrn gegeben, ganz zur erwähnten Abbildung passend, hat die Fundortsangabe Siam. Manche Arten von Süßwasserthieren sind allerdings Borneo und Siam gemeinsam.

*C. triangula* Philippi abbild. neuer conchyl. Taf. 2, Fig. 3, 1849 unbekannter Herkunft, ist ähnlich, aber doch schärfer dreiseitig, der Unterrand wenig aufgebogen; Prime erklärt dieselbe für eine amerikanische Art, von Mazatlan.

## 4. *Cyrena buschi* Phil.

Philippi Abbild. III, S. 77, Taf. 2, Fig. 2, 1849, Sow.-Reeve fig. 113. Issel moll. borneensi p. 109.

*Cyrena triangularis* (Metcalf) Prime in Annals of the Lyceum of

nat. hist. of New York, VIII, p. 235, fig. 65, kopirt bei Clessin Cyclad. S. 121, Taf. 19, Fig. 1.

Borneo: Bellida im Gebiet von Sarawak, malayisch teccajon udgion nach Doria und Beccari.

Der Vorderrand nicht so steil und tief abfallend, wie bei der vorigen, so dass die Art einen Übergang zur folgenden Gruppe bildet; keine Furche am hintern Theil. Zwei Exemplare von Doria und Beccari im Berliner Museum. Clessin's C. Buschi, S. 104, Taf. 13, Fig. 6 angeblich aus China, kann ich nicht für dieselbe Art halten. Philippi und Sow.-Reeve geben keine Vaterlandsangabe, in Mousson's Sammlung ist auch ein Exemplar aus Java als C. Buschi bezeichnet.

##### 5. *Cyrena Moussoni* n.

*Cyrena Ceylonica* var. *major* Mousson moll. jav. S. 89, Taf. 13.

Ziemlich stark gewölbt, seidenglänzend, blättrig gerieft, dunkelbraun; vor und hinter den Wirbeln beinahe gleich gross und in gleichem Winkel annähernd geradlinig abfallend, aber vorn ist das Maximum schon in der Hälfte der Höhe und abgerundet, hinten etwas tiefer und eckig; Unterrand stark gebogen.

Mousson's Exemplar: Länge 87, Höhe 81, Durchmesser 49 Mill.

Fruhstorfer's       "       "       90,       "       86,       "       49       "

                      "       "       79,       "       74,       "       49       "

Wirbel in  $\frac{3}{7}$ — $\frac{2}{5}$  der Länge. Winkel der Seitenzähne etwa 110—115°.

Java: Fluss Panimbang bei Pardana (Bantam), Zollinger. Tjandjor und Tji-Kalong, Preanger Regentschaften, Fruhstorfer.

Nähert sich im Umriss schon mehr der zweiten Gruppe, Suborbiculares, ist aber zu stark gewölbt für dieselbe.

#### B) SUBORBICULARES.

##### 6. *Cyrena suborbicularis* Phil.

Philippi Abbild. III, S. 77, Taf. 2, Fig. 1. Desh. cat. Ven. II, p. 243. Clessin Cyclad. S. 104, Taf. 13, Fig. 5.

Celebes: Palima, in den Reisfeldern (Sawah) und ein junges Exemplar bei Pare-Pare am Strand, M. Weber. Bei Makassar, v. Martens. Auf den Togian-inseln im Golf von Gorontalo, ein junges Exemplar, A. B. Meyer. Demnach in Celebes weit verbreitet.

Die Dimensionen der beiden erwachsenen Stücke sind:

Palima: Länge 64, Höhe 61, Durchm. 31.

Makassar: „ 67, „ 63, „ 35.

Die Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge, Winkel zwischen den Seitenzähnen etwa  $115^\circ$ . Hintere Furche schwach angedeutet.

Die Färbung ist bei dem in Spiritus aufbewahrten Exemplar von Palima bräunlichgelb, bei dem trockenen von Makassar hell grünlichgelb; jenes zeigt an den concentrischen Rippen kurze häutige Zacken, wie solche bei vielen Arten dieser Gattung in frischem Zustand vorkommen. Das Vortreten der Lunular-Gegend in der Profil-Ansicht, ist bei beiden Exemplaren ungefähr ebenso deutlich, wie in der Original-Abbildung bei Philippi, schwächer als in der Figur bei Clessin.

Diese Art kommt auch auf den Philippinen vor, wie schon Philippi angibt und mehrere von F. Jagor in Brackwasser bei Patrocinio und Paracali (Prov. Camarines Norte) und Mariveles (Prov. Bataan) auf Luzon, gesammelte Stücke im Berliner Museum bestätigen. Dagegen scheint die Vaterlands-angabe China bei Deshayes wenig glaubwürdig. Übrigens bin ich geneigt eine jüngere Schale, welche ich bei Benkulen auf Sumatra gefunden, dieser Art zuzurechnen.

Von Borneo stammen ferner noch *Cyrena laevis* Prime Ann. Lyc. nat. hist. N. York VIII, p. 233, fig. 64, nicht sehr genau kopirt bei Clessin, Taf. 21, Fig. 4, und vielleicht auch *C. nitida* Desh. Clessin S. 120, Taf. 22, Fig. 5, 6, bei Deshayes selbst Proc. Zool. Soc. 1854, p. 23 und cat. Ven. II, p. 250 ohne Vaterlandsangabe.

Aus Timor ist mir bis jetzt nur eine halbe jüngere Schale bekannt geworden, von Th. Studer auf der Expedition der Gazelle bei Pariti gesammelt und früher von mir (Monatsberichte der Berlin. Akad. 1877, S. 286) als *suborbicularis* aufgeführt, aber sie zeigt einen grössern Winkel zwischen den Seitenzähnen, etwa  $120^\circ$  und ist verhältnissmässig niedriger, ( $43\frac{1}{2}$  Mill. lang, 39 hoch) so dass ich bis auf weiteres Material lieber auf die Benennung verzichte.

#### C) EXPANSAE.

##### 7. *Cyrena expansa* Mouss.

Mousson land- und süssw. Moll. Jav. S. 89, Taf. 14, Desh. cat. Ven. II, p. 243. Clessin S. 105, Taf. 15, Fig. 1, 2.

Java: Im östlichen Theil der Insel, Zollinger bei Mousson.

Hintertheil schief nach unten verlängert und dann rechtwinklig abgestutzt, ohne Furche, aber mit einer Andeutung von Radialkante.

Mousson's Exemplar ist 81 Mill. lang, 68 hoch und 50 im Durchmesser, das Exemplar der Dunker'schen Sammlung, von Oberst Winter aus Java erhalten, 97 lang, 76 hoch und 58 im Durchmesser. Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne  $130^\circ$ . Ein noch grösseres, unbekannten Fundortes im Berliner Museum, ist 105 Mill. lang, 86 hoch und 57 dick, Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne  $122^\circ$ .

Ganz ähnliche Formen hat das Berliner Museum auch aus Hinterindien, nämlich eine kleine, 63 Mill. lang, 51 hoch, 30 dick, von F. Jagor zu Pongoor bei Malakka gefunden und eine mittelgrosse, in Siam von Hrn. de Castelnau erhalten 94 Mill. lang, 79 hoch und 46 dick.

Auf Sumatra soll nach Philippi Abbild. III, S. 108 *Cyrena ceylonica* Chemn. vorkommen; leider stehen mir keine sicher ceylonische Exemplare zu Gebot und es scheint zweifelhaft, ob die Abbildungen bei Philippi Taf. 3, Fig. 3, bei Sow.-Reeve fig. 111 und bei Clessin Taf. 18, Fig. 1 unter sich und mit der Original-Figur im alten Conchylien-Cabinet von Chemnitz, Band VI, Fig. 336, als Art übereinstimmen; leider ist sie in Hanley und Theobald's *Conchologia Indica* als Brackwasser Art ausgelassen.

In Mousson's Sammlung sah ich 1863 zwei *Cyrena*-arten aus Palembang auf Sumatra, als *C. Buschi* Phil. (*gravis* Mouss. mscr.) und *C. excavata* bezeichnet, über welche ich gegenwärtig nichts näheres angeben kann.

8. *Cyrena moluccensis* n. Tab. VI. Fig. 4.

*Cyrena cyprinoides* (Q. G.) Clessin Cyclad. S. 124 Taf. 20, Fig. 3, 4.

*Cyrena papua* Less.? Shepman in Notes from the Leyden Museum XV, p. 159.

Testa subtriangularis, striis concentricis confertis fimbriolatis, nitidula, pallide virens, intus alba; margines superi anterior et posterior subaequaliter et mediocriter declives, posterior longior; pars antica rotundata, postica obtuse rostrata; non distincte truncata; margo ventralis valde arcuatus, posterius ante rostrum saepius leviter emarginatus. Dentes cardinales parvi, lateralis anticus sat validus, lateralis posticus mediocris.

a) Long. 106, alt.  $90\frac{1}{2}$ , diam. 55.

b) „ 96, „ 90, „ 47.

c) „ 94, „ 71, „ 42.

d)	Long.	91,	alt.	77,	diam.	47.
e)	"	87,	"	60,	"	36 (Ternate).
f)	"	62 $\frac{1}{2}$ ,	"	54,	"	28.
g)	"	42,	"	40,	"	19.

a) das grösste, b) ein charakteristisches normales Exemplar, c) das am meisten langgezogene, d) das verhältnissmässig kürzeste und höchste, e) und f) jüngere Stücke. Wirbel in ungefähr  $\frac{2}{5}$  der Länge, hierin etwas variirend. Winkel der Seitenzähne ungefähr  $130^\circ$ , bei alten und jungen gleich.

Molukken: Batjan, in einem Morast, der nur durch einen schmalen Landstreifen vom Meer getrennt, in Gesellschaft mit *C. coaxans*, v. Martens Sept. 1862. Ternate, eine jüngere Schale, v. Martens. Ceram bei Pasahari, Martin 1892. Molukken, ohne nähern Fundort, Semper bei Clessin, möglicher Weise von mir stammend.

Clessin's Abbildung entspricht gut einem der von mir gesammelten Stücke, dessen Dimensionen unter d. angegeben sind; die Mehrzahl der meinigen sind aber länger im Verhältniss zur Höhe, daher ich oben die Dimensionen der hierin am meisten verschiedenen Stücke desselben Fundortes angegeben habe. Jüngere Exemplare zeigen dagegen die Hinterseite weniger entwickelt und sind auch verhältnissmässig flacher.

Von der javanischen *C. expansa* unterscheidet sich diese Art durch verhältnissmässig kürzere oder höhere Form, stärker gebogenen Unterrand und geringere Ausbildung des Schnabels am hintern Theile. Bei der Mehrzahl der Exemplare ist gar keine Kante daselbst zu erkennen, bei einzelnen aber eine breitere und etwas mehr der senkrechten Linie sich nähernde radiale Anschwellung, welche eine sehr seichte Einbuchtung am hintern Theil des Unterrands veranlasst, wie auf Clessin's Figur. — *C. oblonga* bei Sow. Reeve fig. 37 ist unserer Art sehr ähnlich, aber ganz verschieden von *C. oblonga* Quoy et Gaimard, Voy. Astrol. 82, 6–8 und Desh. cat. Ven. p. 257.

Die nahe verwandte *C. Papua* Less. lebt im süssen Wasser kleiner Bäche nach Lesson's ausdrücklicher Angabe, Voy. de la Coquille, Zool. II, 1, p. 428.

## D) CYPRINOIDEAE.

9. *Cyrena eximia* Dkr.

Dunker in Zeitschr. f. Malak. 1852, S. 51 und in Pfeiffer's Novitates conchologicae Band I, S. 88, Taf. 24.

Batissa eximia (Dkr.) Deshayes catal. Venerid. II, p. 235.

Java: Fluss Progo bei Magelang (Resid. Kediri, östl. Java), von Scheepmaker an Dunker gegeben. Im Mangle-dickicht bei Menudjaja auf der Insel Nusa Kambangan an der Südküste, F. Jagor.

Stark gewölbt und ringsum gerundet, mit schwacher Andeutung einer hintern Radialfurche. Dickschalig, Aussenseite schwärzlich.

Dunker's Exemplar: Länge 102, Höhe 85, Durchmesser 58.

Jagor's Exemplar: „ 122, „ 101, „ 73.

Wirbel in  $\frac{1}{3}$  der Länge. Winkel der Seitenzähne etwa  $140^\circ$ . Die breiten Falten am hintern Theil scheinen hauptsächlich in der Schalenhaut zu liegen; sie sind an dem Jagor'schen Exemplar schwächer als auf Dunker's Abbildung und bei einem zweiten ganz abgeriebenen im Berliner Museum gar nicht zu erkennen.

C. galathea Mörch in Katalog der Kierulf'schen Sammlung, 1850, S. 32, Taf. 2, von den Nikobaren, ist dieser Art sehr ähnlich, nur sind die Zähne bei Mörch's Art verhältnissmässig viel grösser.

C. divaricata Desh. cat. Brit. Mus. Veneridae II, p. 247, Sow.-Reeve fig. 28 von Neu-Guinea, von O. Finsch in Neu-Irland gesammelt, mit ebensolchen Falten, wird von O. Reinhardt, Sitzungsberichte d. Gesellsch. nat. Fr. 1886, p. 60 mit der javanischen eximia vereinigt, scheint mir aber durch den stärker abfallenden Vorderrand und den viel mehr verkürzten Hintertheil hinreichend verschieden und meiner C. coaxans näher zu stehen.

10. *Cyrena coaxans* Gm. Tab. VI. Fig. 1—3.

Chama lutaria s. coaxans, holländisch: quakkers, malayisch: bia Kodok (Frosch-muschel) Rumph. amb. rar. p. 138, Taf. 42, Fig. H, deutsche Übersetzung S. 126, die Figur etwas verändert.

Venus coaxans Gm. Linne syst. nat. ed. XIII, p. 3278 zum Theil.

Grosse Cyrena, Martens in Malak. Blätt. X, 1862, S. 130.

Cyrena coaxans (Gm.) Martens bei Shepman, Notes from the Leyden Museum, XV, p. 158.

Testa subglobosa, striis concentricis confertis fimbriolatis, nitida

olivaceo-fusca, intus alba, medio et ad dentes cardinales luride flavescens; margo anterior usque ad mediam fere altitudinem sat declivis, dein rotundatus, margo posterior ad eandem altitudinem minus declivis, leviter convexus, dein subverticaliter truncatus, sulco radiali leviter impresso, margo ventralis modice arcuatus. Dentes cardinales et lateralis anticus validi, lateralis posticus parvus, remotus.

a)	Long. 118	alt. 97	diam. 77	(Batjan).
b)	" 102	" 88	" 52	(Amboina).
c)	" 86	" 75	" 45	(Batj.).
d)	" 80	" 76	" 49	(Batj.).
e)	" 73	" 68	" 38 $\frac{1}{2}$	(Batj.).
f)	" 50 $\frac{1}{2}$	" 47	" 27 $\frac{1}{2}$	(Amb.).
g)	" 21	" 18	" 9 $\frac{1}{2}$	(Wahai).

Wirbel in etwa  $\frac{3}{7}$  der Länge, etwas variirend. Winkel der Seitenzähne bei dem grössten Stück (Maas-angabe *a*) 145°, bei mittelgrossen (*b*, *c*) 135°, bei jüngern (*e*, *f*) 130—125°. Jüngere Stücke sind auch durchschnittlich flacher.

Molukken: Batjan in einem Morast ganz nahe am Meer, zusammen mit *C. moluccensis*, v. Martens Sept. 1862.

Ceram: bei Wahai eine junge Schale (*g*) im Brackwasser, v. Martens 1862; bei Pasahari, Martin 1892.

Amboina: Rumph. An der Mündung des Flüsschens Weynitua, v. Martens 1862.

?Buru: Rumph.

Auch bei Kema, am nordöstlichen den Molukken zugewandten Ende von Celebes, fand ich eine halbe Schale am Strand, welche hieher zu gehören scheint.

Rumph sagt von dieser Art: „man findet sie an schlammigen Stellen, meist an der Mündung grosser Flüsse, wo sie zur Zeit der Ebbe bemerkt werden und durch Öffnen und Schliessen der Schale wie die Frösche quacken, so dass man sie von weitem hören kann. Sie sind gut zu essen, wenn man sie vorher einen halben Tag in süßes Wasser legt, damit sie den meisten Sand ausspeien. Die grössten findet man auf der Insel Buru.“ Auch ich habe auf Batjan diesen quackenden Ton gehört, er gleicht demjenigen, welchen *Limnaea stagnalis* von sich gibt, wenn sie an der Oberfläche des Wassers ihr Athemloch öffnet, nur dass er bedeutend lauter ist; ich vermuthe daher, dass er beim Öffnen der Schale entsteht und dass die Muschel so ober-



flächlich liegt, dass dabei etwas Luft eindringt. Dass Rumph diese Art meint, ergibt sich aus dem Umriss der Figur und den Worten stahlgrün und bauchig in seiner Beschreibung. Was er weiter von dem Steinchen „Mestica“, das man öfters bei ihr, wie bei *Tridacna*, finde, sagt bezieht sich wohl auf eine Verhärtung des Schlossbandes und man möchte desshalb auch an eine *Batissa* denken, da bei dieser Gattung das dicke Ligament eher solche perlenartige Bildungen zeigen könnte; vielleicht hat Rumph auch *B. violacea* von Celebes gehabt und mit dieser *Cyrena* zusammengeworfen, aber von den Molukken ist mir keine *Batissa* bekannt. Chemnitz, Schröter (Einleitung in die Conchylienkenntniss III, S. 160) und Gmelin haben Rumph's Muschel mit einer andern von Ceylon zusammengeworfen und hauptsächlich nach letzterer beschrieben; da für diese der Artname *ceylonensis* besteht, kann der Name *coaxans*, der gerade aus Rumph genommen ist, für die unsrige bleiben.

An einzelnen wohl erhaltenen Stücken zeigt sich eine ganz schwache Kante, die nur von der Oberhaut gebildet wird und mit deren Abreibung verloren geht; die Radialfurche ist auch schwach und läuft mehr nach unten aus, ohne eine merkliche Lappenbildung am Hinterrande zu veranlassen.

#### 11. *Cyrena cyprinoides* Q. G.

Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe, Zool. III, p. 513, pl. 82, fig. 1—3, non Clessin, nec. Sow.-Reeve.

Ceram: bei Pasahari, Martin 1892.

Neu-Guinea: Port Dorey, Q. G.

Scheint sich durch etwas länger gezogene, mehr viereckige Form und mehr schnabelförmig nach hinten und unten verlängertes Hintertheil mit herablaufender stumpfer Kante ohne Furche von *C. coaxans* zu unterscheiden. Die Abbildung bei Quoy und Gaimard zeigt 108 Mill. Länge, 93 Breite, 68 Durchmesser, die Wirbel stehen in  $\frac{3}{8}$  der Länge und der Winkel zwischen den Seitenzähnen beträgt etwa  $120^\circ$ ; das Stück aus Ceram, welches ich von Hrn. Schepman erhielt, beziehungsweise 81, 65, 49,  $\frac{3}{8}$ .

#### 12. *Cyrena sinuosa* Desh.

Deshayes in Proc. Zool. Soc. 1854, p. 18, und cat. Ven. Brit. Mus. p. 249. Clessin S. 228, Taf. 45, Fig. 1. Sow.-Reeve fig. 26.

*Cyrena cyprinoides* (Q. G.) Sow.-Reeve fig. 24.

Diese Art, durch die deutliche Furche des hintern Theils, welche vom Wirbel herabsteigend den Hinterrand zweilappig erscheinen lässt, gekennzeichnet, ist entweder ungewöhnlich weit über verschiedene Inseln verbreitet oder überhaupt keine geographisch abgeschlossene Art, sondern ein Formzustand, der bei verschiedenen Arten vorkommt. Die Inseln, welche für dieselbe in Betracht kommen, sind:

- 1) Ceylon, nach Sowerby-Reeve fig. 26.
- 2) Java, im Fluss Paningbang, Originalfundort nach Deshayes; das ist ohne Zweifel derselbe Fluss, welchen Mousson als Panimbang für seine *ceylanica* major, unsere *Moussoni*, angibt, aber während Deshayes der seinigen eine tiefe herablaufende Furche am Hintertheil zuschreibt, ist in Mousson's Beschreibung nichts davon zu finden und auf seiner Abbildung nur eine leise Einbiegung am Hinterrand, aber keine entsprechende Furche zu sehen. Auch Tapparone-Canefri Zool. Viagg. Magenta Malac. (Atti Accad. Torin. 2, XVIII, 1874 p. 134), erwähnt eine *C. sinuosa* Desh. gleich *Ceylanica* Mouss. von „Takerang, Fiume Murera“ in Java.
- 3) Palaos-inseln, Aibukit. Einige von Prof. Semper daher erhaltene Stücke passen ebenfalls recht gut zu dieser *sinuosa*; das grösste, 106 Mill. lang, 97 hoch, 59 dick, zeigt am grössten Theil der Schale schwache aber deutliche erhabene Radialstreifen auf der wohlerhaltenen Schalenhaut, andere kleinere nur spurweise.

Unterscheidet sich von *C. coaxans* durch stärkere Ausbildung der hinteren Furche und des dadurch abgetrennten Lappens am Rande; ferner ist sie verhältnissmässig mehr zusammengedrückt, im Umriss mehr quadratisch.

All diese Formen: *Galathea*, *eximia*, *coaxans*, *cyprinoides* und *sinuosa* sind jedenfalls nahe unter einander verwandt und ergeben sich vielleicht künftig als Variationen einer Art, vorerst möchte ich sie aber, auf eine Anzahl von 15 Exemplaren von Batjan gestützt, als geographisch getrennt auseinander halten.

#### **Batissa Gray.**

Vordere und hintere Seitenzähne fein gekerbt, vorderer dick und verhältnissmässig kurz. Schlossband sehr gross und dick. Schalenhaut glänzend, am Rand leicht abblättrnd. Die concentrischen Streifen meist

am vordern Theil stärker vortretend. Innenseite mehr oder weniger violett.

Weichtheile: Lage der Kiemen und der Siphonen wie bei *Corbicula*, aber die Mantellappen hinten weiter unter sich verwachsen, die Verwachsung nimmt das hintere Drittel des Bauchrandes ein (nach einem von Prof. Weber mitgebrachten Exemplar von *B. violacea* var. *Celebensis*). Die leistenartige Verdickung, welche sich bei manchen Arten, z. B. bei *B. violacea*, *tenebricosa*, *gigantea*, mehr oder weniger konstant und deutlich an der Innenseite der Schale unterhalb des Wirbels findet, liegt in der Gegend, wo die innere Kieme nach vorn über die äussere hervorragt, stellt aber nicht den Abdruck der Kiemenränder dar, wie man vermuthen könnte, indem diese viel stärker schief nach hinten, die genannte Verdickung mehr senkrecht nach unten verläuft und daher mehr den Verdickungen entspricht, welche bei manchen Soleniden vorkommen.

Angeblich von Indien, sicher von den Nikobaren über Niederländisch-Indien und Neu-Guinea bis nach Neu-Caledonien und den Viti-inseln verbreitet, also noch mehr insular als *Cyrena* und *Corbicula*. Scheint hauptsächlich in Flüssen vorzukommen. Th. Studer bemerkt betreffs *B. tenebrosu* Hinds, dass sie im Flusse Rewa auf Ovalau (Viti-gruppe) bis 50 Seemeilen landeinwärts vorkomme und zwar im untern Flusslauf klein, weiter aufwärts bis 10 Cm. gross (Forschungsreise der Gazelle III, 1889, S. 275) was zeigt, dass es eine ächte Süsswasser-Muschel ist.

Die einzelnen Arten sind schwer zu unterscheiden und zu charakterisiren, da an demselben Fundorte die Form der Exemplare öfters ziemlich variirt, doch dürften sich auch hier nach der allgemeinen Form zwei Artengruppen unterscheiden lassen:

A) ROTUNDATAE, annähernd kreisrund, mit stark gebogenem Unterrand, oft mit etwas Radialskulptur an einzelnen Stellen; *B. rotundata* Lea, *jayensis* Lea und *producta* Sow.

B) ELLIPTICAE, länglich in der Richtung von vorn nach hinten, Unterrand wenig gebogen; keine Radialskulptur.

Typus *B. violacea* Lam. Hieher die Mehrzahl der beschriebenen Arten.

#### A) ROTUNDATAE.

##### 1. *Batissa jayensis* Lea.

*Cyrena jayensis* Lea observ. Unionid I, p. 220, pl. 17, fig. 52. 1834. — Sowerby—Reeve XX, fig. 19.

*Batissa Jayensis* Deshayes catal. Veneridae Brit. Mus. II, p. 237.  
Clessin Cyclad. S. 207, Taf. 33, Fig. 3, 4.

Testa triangulari-cordata, sat tumida, concentrice rugosa, rugis partis anticae irregulariter conjunctis, sculptura radiali sparsim distincta; margine supero antico valde declivi usque ad dimidium altitudinis, leviter arcuato, margine supero postico multo minus declivi, postico medio truncato, subverticali, margine ventrali sat arcuato; extus nitida, obscure olivaceo-fusca, periostraco setulas in series radiantes dispositas exhibente, intus violascenti-albida, zona marginali violacea. Dentes laterales antici et postici subaequaliter longi.

Long. 71, alt. 61, diam.  $34\frac{1}{2}$  (Benkulen).

„ 67, „ 62, „ 36 „

„ 81, „ 77, „ 44 (Java, Winter).

Wirbel in  $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{7}$  der ganzen Länge. Winkel der Seitenzähne  $115$ — $125^\circ$ .

Sumatra: in Flüssen, Deshayes loc. cit. — Benkulen, von Martens 1862, hiernach die obige Beschreibung.

Java: „Batavia?“ Jay bei Lea. Ein Exemplar, aus Java durch Oberst Winter erhalten in der Dunker'schen Sammlung.

Unterscheidet sich von *B. rotundata* zunächst dadurch, dass der obere Theil des Vorderrandes und der mittlere Theil des Hinterrandes viel steiler abfallen und daher der ganze Umriss weniger kreisförmig ist; ferner ist die Radialsculptur viel spärlicher, oft nur spurweise vorhanden.

*B. lenticularis* Desh., Sow.-Reeve fig. 3, ist unserer Art ähnlich aber eckiger.

Die Namensform „jayensis“ ist unpassend, da die Endung „ensis“ nur an Ortsnamen, nicht Personennamen gefügt wird, und dürfte daher passend zu jayana umgeändert werden, wenn das nicht dem folgenden „javanica“ zu ähnlich wäre.

## 2. *Batissa javanica* Mouss.

*Cyrena rotundata* (Lea) Philippi Abbild. III, S. 107, Taf. 3, Fig. 1.

*Cyrena violacea* var. *javanica* Mousson moll. jav. S. 88, Taf. 15, Fig. 1, 1849.

*Batissa violacea* var. *suborbicularis* Deshayes cat. Veneridae Brit. Mus. 1854.

*Batissa sphaericula* Prime in Proc. Zool. Soc. 1862, p. 2.

Java: Fluss Panimbang bei Pardana, (Bantam), in grosser Menge, von den Eingebornen als schmackhafte Speise gesucht und To-e genannt, Zollinger bei Mousson; Palabuan, Fruhstorfer.

Die Fruhstorfer'schen Exemplare weichen durch geringere Höhe nicht unerheblich von Mousson's Angaben ab, sind aber selbst wieder unter sich ziemlich verschieden:

a)	Länge	68,	Höhe	60,	Durchm.	33,	nach	Mousson's	Abbildung.
b)	"	71	"	57	"	33	} an drei Fruhstorfer'schen Exemplaren.		
c)	"	66	"	48	"	28			
d)	"	61	"	49	"	32			

Die Wirbel bei *a*, *c* und *d* in  $\frac{3}{8}$ , bei *b* in  $\frac{1}{3}$  der ganzen Länge.

In der Form zwischen *B. rotundata* und *jayensis* einerseits, *violacea* und *sundana* andererseits die Mitte haltend, doch noch mehr zu den *Rotundatae* gehörig und doch vielleicht noch mit *jayensis* zu verbinden.

*Batissa rotundata* Lea observ. I, 17, 51, Sow. Reeve fig. 4 und Clessin 33, 1. 2. — Deshayes gibt für diese Art Java und die Philippinen als Vaterland an, ersteres vielleicht nur nach Philippi vgl. *B. javanica*; Lea selbst kannte den Fundort seines Exemplars nicht, Sow. Reeve gibt Indien, aber nicht die Philippinen an, obwohl ihm die Cuming'sche Sammlung zu Gebote stand; das Vaterland dieser Art, wovon mir schöne Exemplare im Berliner Museum, auch ohne sichere Fundortsangabe, vorliegen, scheint daher noch unsicher.

*Batissa compressa* Prime von Borneo, Proc. Zool. Soc. 1860, p. 320, testa ovato-orbiculari, tumida, compressa, subaequilaterali, intus violacea, epidermide polita atrovirescente vestita; umbonibus erosis; dentibus cardinalibus subaequalibus, lateralibus elongatis serrulatis.

$2\frac{2}{3}$  (engl.) Zoll lang,  $2\frac{1}{2}$  hoch,  $1\frac{1}{10}$  im Durchmesser, bis jetzt nicht abgebildet, ist mir nicht näher bekannt, die Worte *tumida* und *compressa* widersprechen sich gewissermassen.

#### B) ELLIPTICAE.

##### 3. *Batissa violacea* Lam.

var. *Celebensis*. Tab. V Fig. 3.

(Cyclas.... Braguière Tabl. Encycl. méthod. pl. 301, fig. 1a, b.

Testa trigono-elliptica, sat compressa, concentrice rugosa, rugis in

parte antica fasciculatim in taenias complanatas conjunctis, sculptura radiali nulla; pars antica compressa, rotundata, pars postica longior arcuatim rotundata; margines superni anterior et posterior ad dimidium fere altitudinis subaequaliter declives, margo ventralis medio parum, anterieus et posterius magis arcuatus; extus olivaceo-fusca, intus pallide violascens, radiis duobus violaceis obsoletis; dentes laterales posteriores valvae dextrae inter se appropinquati.

Long. 84, alt.  $66\frac{1}{2}$ , diam. 34 Mill.

„ 73 „ 58 „ 30 „

Wirbel in  $\frac{1}{3}$  der ganzen Länge. Winkel der Seitenzähne  $122-130^\circ$ .

Celebes: Tjenrana. — Fluss bei Pampanua im Gebiet von Boni.

Auch einzelne im Fluss bei Maros (unweit Makassar) gefundene Stücke sind hieher zu zählen.

Zunächst verwandt mit *B. insignis* Desh. von den Philippinen, Sow.-Reeve fig. 7, aber mehr dreiseitig, der Oberrand vorn und hinten mehr schief und geradlinig abfallend bis nahe zur Hälfte der Schalenhöhe; im Umriss gleicht sie auch ziemlich der *B. humerosa* Desh., Sow.-Reeve fig. 18. Bei einzelnen Exemplaren zwei oder gar drei sehr stumpfe Anschwellungen, vom Wirbel nach hinten herabziehend — man kann sie noch nicht Kanten nennen, auch prägen sie sich nicht im Umriss als Ecken aus. Der hintere Seitenzahn der linken Schale ist verhältnissmässig schlanker und die beiden der rechten Schale demgemäss näher aneinander. Die Querfurchen der vordern und der hintern Seitenzähne sind mit der Lupe sehr deutlich zu sehen.

Als Jugendzustand dieser Art dürfte eine ganz kleine Muschel aus dem Fluss bei Maros zu betrachten sein, Taf. V, Fig. 6, 7 Mill. lang,  $5\frac{1}{2}$  hoch und 2 dick, Wirbel in  $\frac{3}{7}$  der Länge, die schon im Allgemeinen die Umrisse von *Batissa* und die etwas ungleichmässige concentrische Sculptur dieser Gattung zeigt, hell grünlichgelb, Wirbel vorstehend, glatt, röthlich, Lunulargegend violett und zwei undeutliche violette Strahlen. Das Ligament ist schon verhältnissmässig gross.

Var. *Macassarica*. Tab. V, Fig. 8.

Testa cordato-elliptica, sat tumida, rugis concentricis levibus, in parte antica irregulariter confluentibus et complanatis, sculptura radiali nulla; margine antico modice declivi usque  $\frac{1}{3}$  altitudinis, dein arcuatim producto, margine postico supero minus declivi, medio obliquo subtruncato, margine ventrali levi arcuato; extus olivaceo-fusca,

nitidiuscula, intus pallide violacea, versus marginem posteriorem radiis 2 violaceis obsoletis. Dentes laterales antici posticis parte tertia breviores, at crassiores.

Long. 48, alt. 38, diam. 22 Mill.

Wirbel in  $\frac{5}{16}$  der Länge. Winkel der Seitenzähne  $127^\circ$ .

Celebes: Makassar, v. Martens 1862.

Schliesst sich in der allgemeinen Form und dem Mangel aller Radialsulptur an *B. violacea* an, ist aber verhältnissmässig stärker gewölbt und der Vorderrand fällt mehr ab. Von den drei bei Makassar gefundenen Stücken sind zwei noch merklich kleiner, als oben angegeben, aber ihre Wirbel doch schon stark abgerieben, eines zeigt an der Innenseite das Violett strahlig vertheilt, ähnlich wie *B. minor* bei Sowerby-Reeve fig. 8b; diese Art unterscheidt sich aber nach der genannten Abbildung und einem etwas grösseren Exemplar der Dunker'schen Sammlung, 45 Mill. lang, 38 hoch und  $18\frac{1}{2}$  im Durchmesser, von den Viti-inseln, dadurch, dass der Oberrand sowohl vorn als hinten weniger abfällt und dadurch die ganze Schale mehr längs-oval erscheint, und dass sie viel weniger gewölbt ist.

Var. *discoidea*. Tab. V, Fig. 9.

Testa suborbicularis, compressa, strüs concentricis superficialibus, antice in costas tenues elevatas confluentibus; pars antica rotundata, magis compressa, margine supero sat declivi; pars postica paulo longior, rotundata, magis tumida, margine supero usque ad finem ligamenti minus declivi, dein convexa arcuato; margo ventralis medio leviter arcuatus.

Long. 67, alt. 59, diam. 26 Mill.

Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge. Winkel der Seitenzähne  $118^\circ$ .

Celebes: Fluss bei Maros, Ein Exemplar, mit var. *Celebensis* zusammen gefunden. Unterscheidet sich von *B. rotundata* und *jayensis* neben dem völligen Mangel der Skulptur auch durch die viel geringere Wölbung der Schalenhälften. *B. ponderosa* Prime Ann. Lyc. N. York VIII p. 231 zeigt einen ähnlichen Umriss.

Var. *extensa*. Tab. V, Fig. 7.

Testa longitudinaliter ovata, tumida, striis concentricis superficialibus, antice in costas tenues elevatas confluentibus; pars antica brevis, rotundata, margine supero sat declivi; pars postica producta,

ad extremitatem rotundata, margine supero convexo, minus declivi; margo ventralis levissime arcuatus.

Long. 75, alt. 57, diam. 30 Mill.

Wirbel in  $\frac{1}{3}$  der Länge. Winkel der Seitenzähne  $130^\circ$ .

Celebes: Fluss bei Maros, Ein Exemplar, mit der vorigen und mit var. Celebensis zusammen gefunden.

Unter dem Artnamen violacea, dem ältesten in der Gattung Battissa, werden in den systematischen Werken ziemlich verschiedene Formen beschrieben. Die älteste dazu citirte Abbildung, von Bruguière in den Abbildungen zur Encyclopédie méthodique, pl. 301 fig. 1, als Cyclas bezeichnet, stimmt fast genau in Umriss und Grösse, Stellung der Zähne und Muskeleindrücke mit dem grössten Exemplar aus dem Tjenrana, nur ist der Unterrand ein klein wenig mehr gerade. Die Abbildung nach einem Exemplar der Lamarckschen Sammlung in Delessert's recueil de coquilles décrites par Lamarck, pl. 7 fig. 5, stellt eine kleinere und mehr längliche, übrigens sehr verbleichte Muschel dar, Länge 62, Höhe  $46\frac{1}{2}$ , Durchmesser  $16\frac{1}{2}$  Mill., Wirbel in  $\frac{3}{8}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne  $120^\circ$ , stimmt aber auch nicht recht mit der obigen var. oblonga. Die spätern Abbildungen von violacea bei Philippi Abbild. III Taf. 3 Fig. 2, Clessin Taf. 33 Fig. 5 und Sow. Reeve fig. 15 zeigen alle eine niedrige längs-ovale Form mit längerem Vordertheil und mehr geradem Unterrand, aber stimmen auch nicht befriedigend unter sich überein; bei Philippi ist der hintere Seitenzahn am Ende kräftig eingebogen, während an den mir vorliegenden Stücken kaum eine schwache Andeutung einer derartigen Verlängerung zu sehen ist, vielleicht nur vom Zeichner zu stark markirt; bei Sowerby-Reeve zeigt sich eine bestimmte stumpfe Kante am Hintertheil und vor derselben eine leichte Einbiegung des Unterrandes.

Lamarck kannte die Herkunft seiner violacea nicht, Deshayes gibt Neu-Guinea mit Berufung auf Lesson an, den er aber unter den Citaten nicht aufführt, Philippi China, Hanley und Sowerby-Reeve den indischen Ocean, Clessin die Inseln des pacifischen Oceans, keiner also einen speciellen zuverlässigen Fundort. Nach Quoy und Gaimard kommt violacea mit cyprinoides zusammen bei Port Dorey auf Neu-Guinea vor und darauf bezieht sich wohl die Angabe bei Deshayes.

Die als var. discoidea und extensa aufgeführten Stücke würde ich



unbedenklich für verschiedene Arten halten, wenn mehrere unter sich gleiche Stücke vorlägen; aber da nur je Ein Exemplar mit 2—3 von mehr normaler Form zusammen im Fluss bei Maros gefunden wurden, so sind es vielleicht doch nur extreme Individuen; freilich ist unter dieser Voraussetzung die Art schwer zu definiren.

*B. Keraudreni* wurde von ihrem Autor Lesson auf der Insel Waigiou (Wageu, Waigame) an der Nordwestseite von Neu-Guinea gesammelt (Voy. de la Coquille, Moll. p. 429) und dürfte daher zunächst unter den Formen von Neu-Guinea zu suchen sein; sie ist nach der Abbildung, ebenda pl. 11 fig. 3, 69 Mill. lang, 59 hoch, mit einer deutlichen Kante am Hintertheil, Wirbel in  $\frac{1}{2}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne  $120^\circ$ , ziemlich ähnlich der *violacea* bei Sowerby-Reeve fig. 15. — Deshayes catal. Veneird. p. 236 vereinigt diese mit der merklich kürzeren und mehr abgerundeten *Philippinarum* Hanley, recent bivalv. p. 351 pl. 14, fig. 60 von den Philippinen; zu dieser letzteren passt recht gut eine Anzahl Exemplare, welche F. Jagor bei Mariveles in der Provinz Bataan auf Luzon gesammelt hat, 55—57 Mill. lang, 45—46 hoch, 23—25 dick, Wirbel in  $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{8}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne  $120^\circ$  und ich halte daher diese für eine gute, von *Keraudreni* verschiedene Art. Clessin bildet eine ganz andere Form als *Keraudreni* ab, und ebenso ist dessen *B. philippinarum*, Taf. 44 Fig. 1, ganz von derjenigen von Hanley verschieden, dagegen mit *gigantea* Sowerby-Reeve im ganzen übereinstimmend.

#### **Corbicula Meg.**

Vorderer und hinterer Seitenzahn lang, deutlich quer gekerbt. Schale mit meist starken concentrischen Rippen, Schalenhaut glänzend, glatt, Innenseite mehr oder weniger violett. Von den Küstenländern des Mittelmeers und Vorderasien durch das tropische Afrika und Indien bis Japan und Nord-Australien verbreitet, und auch in Südamerika vom Orinoko bis zum La Platu wieder auftretend, tertiär auch in Europa weiter verbreitet, durchschnittlich kleiner als *Cyrena* s. str. und *Batissa*; in vollständig süßem Wasser.

Über die Weichtheile siehe P. Fischer in Journ. de Conchyliologie XI 1863 p. 1—10 pl. 4 fig. 1—3, nach Untersuchung der chinesischen *C. Largillierii* Phil., dasselbe auch von Prime in Ann. Lyc. n. h. New-York VIII p. 422—427 fig. 7—9 wiedergegeben.

Auch in dieser Gattung lassen sich hauptsächlich nach dem äussern Umriss mehrere Artengruppen unterscheiden, welche sich in verschiedenen geographischen Gebieten wiederholen:

#### A) TRANSVERSAE.

Schale von vorn nach hinten verlängert, weniger hoch, ungleichseitig, meist dick, weniger glänzend.

*C. transversa* Marts. Japan.

— *Debrixiana* und *Fenouilliana* Heude, China.

— *jagori* n. Ins. Samar, Philippinen.

— *lamarckiana* Prime Hinterindien.

— *moltkeana* Prime Singapore, Sumatra.

— *javanica* Mouss. Java.

— *trapezoidea* n. Sumatra.

— *subplanata* n. Celebes.

— *ovalina* Desh. Nord-Australien.

#### B) TUMIDAE.

Auch etwas verlängert, annähernd gleichseitig, dreieckig, stark gewölbt, glänzend.

*C. tumida* Desh. Sumatra, Borneo.

— *celebensis* n. Celebes.

#### C) TRIANGULARES.

Ungleichseitig-dreieckig, mehr oder weniger herzförmig, Vordertheil entschieden kürzer, meist glänzend.

*C. Martensi* Cless. (*fuscata* var. *atrata* Reinh.) Japan.

— *japonica* Prime (*biformis* Reinh.) Japan.

— *Largillierti* Phil. China.

— *Bocourti* Morelet Saigon.

— *Baudoni* Morelet Tonkin.

— *Sayana* Prime Philippinen.

— *venustula* Prime Philippinen.

— *ducalis* Prime, Java.

— *trapezoidea* n. Sumatra.

— *angulifera* n. Sumatra.

- regularis Prime Vorderindien.
- fuscata Lam. China.
- Cumingi Prime Philippinen, Borneo.
- sulcata Cless. Java.
- gracilis Prime Java.

#### D) SUBAEQUILATERAE.

Fast gleichschenkelig-dreieckig, nahezu oder ganz so hoch als lang, dickschalig, mit starken Rippen, in der Regel nicht glänzend.

*C. crassula* Mouss. Vorderasien.

- cashmirensis Desh. Hanley a. Theobald Conch. Ind. 138, 2. 3 (non Cless., Reeve) Vorderindien.
- Sandri Reinh. Japan.
- fluminea Müll. Kanton, China.
- Seleciana Heude, China.
- gravis Heude, China.
- Moreletiana Prime, Morelet (erosa Sow.-Reeve, vix Prime) Cambodja.
- Tonkiniana Morelet Tonkin.
- pullata Phil. Sumatra, Borneo, Java.
- lacustris n. Sumatra.

#### E) DEBILES.

Dünnschalig, abgerundet, mit schwächerer Ausbildung der Skulptur.

*C. borealis* und *Soriniana* Heude, China.

- castanea Morelet, Cochinchina.
- rivalis Busch. Java.
- tenuis m. Tungting-see, China.
- gibba m. Sumatra.
- ? pulchella Mouss. Java.

Eine weitere besondere Gruppe, die im niederländisch-indischen Archipel nicht vertreten ist, bildet die verhältnissmässig sehr grosse, glatte, nach hinten zugespitzte, Cytherea-ähnliche *C. Woodiana* Lea von China.

Die amerikanischen *Corbicula*-arten sind hierbei nicht berücksichtigt, da sie durch einen gemeinschaftlichen Charakter, die zwar sehr kurze aber doch erkennbare Mantelbucht, als besondere Abtheilung sich

abgrenzen, die auch schon zwei eigene Namen erhalten hat, Polymesoda Raf. 1820 und Leptosiphon P. Fisch. 1872.

#### A) TRANSVERSAE.

##### 1. *Corbicula javanica* Mouss.

*Cyrena orientalis* (Lam.) var. *javanica* Mouss. moll. jav. S. 86 Taf. 15 Fig. 2 1849. Clessin Cyclad. S. 181 Taf. 31 Fig. 20.

*Corbicula Moussoni* Deshayes catal. Venerid. Brit. Mus. II p. 227. 1854.

Java: bei Tjikoya, wird vom Volke „Remis“ genannt und gegessen, Zollinger bei Mousson. Tjipanas, v. Martens; Sukabumi, Fruhstorfer. Alles im westlichen Theil der Insel.

Die grösste Art dieser Gattung in Niederländisch-Indien, ein Exemplar von Fruhstorfer ist 45 Mill. lang, 38 hoch, 14 dick. Der vordere Seitenzahn kürzer als der hintere, Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne nach Mousson 113—115°, an kleineren von ihm selbst erhaltenen Exemplaren aus Tjikoya, 28 Mill. lang, 22 hoch, 18 $\frac{1}{2}$  dick, bis 125°.

Unter dem Namen *Cyrena orientalis* hat Lamarck eine Art aus China und eine aus Vorderasien („Orient“, vermuthlich von Olivier's und Bruguière's Reise) vereinigt. Die Abbildung in Delessert's recueil de coquilles de Lamarck pl. 7 fig. 8. scheint *C. fluminalis* Müll. darzustellen wie sie z. B. bei *Ismailia* vorkommt.

Wahrscheinlich gehört auch hierher die javanische *C. ovalina* in Frauenfeld's Liste der Novara. Mollusken, Verhandl. Zool. bot. Gesellsch. Wien 1869 S. 863; die ächte *ovalina* Dess. ist nordaustralisch.

##### 2. *Corbicula Moltkeana* Prime. Tab. VII Fig. 1—6.

Prime in Bull. Mus. compar. Zool. V p. 43, 1878 pl. 2 fig. 2.

Sumatra: im See von Manindjau, M. Weber. Alahang — Pandjang und Bedar — Alam, Schepman.

Singapore nach Prime, auch von F. Jagor und von mir daselbst gefunden.

Schale sehr variabel in der Form des Unterrandes, welcher bald in der Mitte fast gerade, bald stärker gebogen ist; auch das Verhältniss der Länge zur Höhe sehr wechselnd, wie folgende Maassangaben zeigen:

a)	Länge	$31\frac{1}{2}$ ,	Höhe	23,	Durchmesser	15,	Wirbel	in	$\frac{3}{7}$	der Länge.
b)	"	29,	"	24,	"	$13\frac{1}{2}$ ,	"	"	$\frac{3}{7}$	" "
c)	"	28,	"	$21\frac{1}{2}$ ,	"	14,	"	"	$\frac{5}{11}$	" "
d)	"	27,	"	$22\frac{1}{2}$ ,	"	14,	"	"	$\frac{4}{9}$	" "
e)	"	$28\frac{1}{2}$ ,	"	25,	"	16,	"	"	$\frac{2}{5}$	" "

Winkel der Seitenzähne  $108-110^\circ$ .

Die Schale ist vorn stets mehr zusammengedrückt und abgerundet, hinten schief abgestutzt, doch in verschiedenem Grade; auch das hinterste Ende ist stärker zusammengedrückt. Ältere Exemplare sind aussen schwarz, innen tief violett, jüngere aussen öfters dunkel gelbbraun, innen bräunlich-violett.

Die kurzen hohen Formen, wie die deren Maasse unter e) angegeben, könnte man als var. *abbreviata* bezeichnen; sie kommen aber mit den andern zusammen vor.

### 3. *Corbicula subplanata* n. Tab. VII Fig. 7—10.

Testa longitudinaliter triangulo-ovata, subcompressa, costis concentricis plus minusve complanatis, interstitia subaequantibus vel paulo angustioribus, antice rotundata, postice rotundato-rostrata, margine supero antico et postico subaequaliter declivibus, margine ventrali leviter arcuato; extus nigricans, intus cinereo-livida, postice fuscescens, dentibus lateralibus anticis et posticis subaequalibus, pallide violaceis, plus minusve arcuatis.

Long. 25, alt. 20, diam. 13 Mill.; vertices in  $\frac{2}{5}$  longitudinis siti.

Angulus inter dentes laterales  $113^\circ$ .

Celebes: Fluss Minralang bei Tempe.

Ähnlich *C. moltkeana* Prime und noch mehr *C. ovalina* Desh. Reeve fig. 77 von Nord-Australien, von beiden durch den kürzeren, steiler abfallenden Vordertheil zu unterscheiden, die Seitenfläche ist im allgemeinen weniger gewölbt, als bei den andern Arten des Archipels, die Rippen weniger vorstehend und breiter, doch an verschiedenen Exemplaren in verschiedenem Masse; öfters verbinden sich auch einzelne Rippen schon in der Mitte der Schale, nicht erst nahe dem Rande. Die Seitenzähne sind bald mehr, bald weniger gebogen, der vordere etwas stärker und mehr im ganzen gebogen, der hintere mehr gerade, aber an manchen Stücken am Ende deutlich eingebogen.

## B) TUMIDAE.

4. *Corbicula tumida* Desh.

Deshayes in Proc. Zool. Soc. 1854 p. 343 und catal. Venerid. Brit. Mus. II p. 229. Prime. in Ann. Lyc. N. York VIII p. 219 fig. 50. Clessin S. 135 Taf. 24 Fig. 11 (ungenau Copie nach Prime) und Taf. 25 Fig. 5, 6.

Sumatra: Lahat, Benkulen und Pulo-bai bei Benkulen, v. Martens.

Borneo: in Cuming's Sammlung. Sarawak, Beccari und Doria. Bengkayang und Sepang, Residentie Sambas, v. Martens, März und April 1863. Fluss Limbang, von Staudinger erhalten.

Ähnlich einer jungen ducalis, aber stärker gewölbt bis zu den Rändern und etwas mehr gleichseitig. Wie überhaupt bei dieser Gattung sind jüngere Exemplare meist verhältnissmässig niedriger und länger, als alte: unter den von mir bei Benkayang gesammelten finde ich folgende Abänderungen in den Formverhältnissen bei gleicher Sculptur und sonstigen Charakteren:

a) Länge	12 $\frac{1}{2}$ ,	Höhe	12,	Dicke	9.
"	14,	"	13,	"	10.
"	16,	"	14 $\frac{1}{2}$ ,	"	11.
"	17,	"	15,	"	11.
"	19,	"	18,	"	13.

Wirbel in  $\frac{3}{7}$  bis  $\frac{5}{6}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne zwischen 112 und 130°.

5. *Corbicula celebensis* n. Tab. VII Fig. 11–13.

Testa longitudinaliter ovata, tumida, costis concentricis validis, duplo angustioribus quam interstitia, prope marginem anticum acutangule convergentibus, versus marginem posticum alternis, obsolescentibus; antice latius rotundata, postice subproducta, margine supero antico et postico primum subaequaliter levissime declivibus, postico dein magis declivi usque ad dimidium altitudinis, margine ventrali modice arcuato; extus fusca vel flavescens, nitida, ad vertex detrita, rubescens, intus pallide violacea vel livido-albida, versus umbones rubescens, dentibus lateralibus violaceis, anticis et posticis subaequalibus, anticis primum subrectis, dein bene arcuatis, posticis aequaliter levissime arcuatis.

Long  $17\frac{1}{2}$ , alt. 14, diam. 9 ; vertices in  $\frac{3}{7}$  longitudinis siti. (Makassar).

„ 15, „ 12, „  $9\frac{1}{2}$ ; „ „ „ „ „ (Maros).

„ 20, „ 17, „ 12; „ „ „ „ „ (Tete-adj).  
 Wirbel in  $\frac{3}{7}$  der Länge, Winkel zwischen den Seitenzähnen  $120-125^\circ$ .

Celebes: bei Makassar von mir, im Fluss bei Maros, im See bei Tete-adj, in dem von Tempe und im Fluss Minralang bei Tempe von Prof. Weber gefunden.

Das Exemplar von Makassar, glänzend braun, mit auffällig rothen Wirbeln, steht ungefähr in der Mitte zwischen den kleineren mehr kugeligen glänzend gelben von Maros und den grösseren mehr grünlich-braunen von Tete-adj, deren Mehrzahl, todt gesammelt, aussen glanzlos und innen weiss ist, während einzelne Stücke noch aussen etwas Glanz und innen die charakteristische Färbung zeigen. Das Verhalten der Rippen an ihren beiden Enden ist einigermaßen variabel, am vordern Ende verbinden sich oft zwei unter einem spitzen Winkel mit einander oder die eine hört doch erst ganz nahe an der andern auf, während diese noch weiterläuft; am hintern Ende fällt oft mehr oder weniger regelmässig je eine Rippe aus, während ihre zwei Nachbarn weiterlaufen, zuweilen verflachen sie sich aber auch in unregelmässiger Reihenfolge oder fast alle zugleich zu vielen feinen Streifen.

### C) TRIANGULARES.

#### 6. *Corbicula ducalis* Prime.

Cyrena fluminea (Müll.) Philippi Abbild. II S. 76 Taf. 1 Fig. 3.  
 — Mousson moll. jav. S. 87 Taf. 15 Fig. 3. — *Corbicula flum.* Desh. cat. Venerid. p. 226 zum Theil. Böttger Bericht d. Senkenberg. Gesellsch. 1890 S. 163.

*Corbicula ducalis* Prime in Proc. Boston Soc. nat. hist. VIII p. 274 1862; Ann. Lyc. N.-York VIII p. 225 fig. 58. und Bull. Mus. comp.

Zool. V p. 43 mit Figur. — Clessin S. 184 Taf. 32 Fig. 5, 6. — Schepman in Veth Midden-Sumatra p. 17.

— *colonialis* Prime in Ann. Lyc. nat. hist. New York VIII 1867 p. 416. — Clessin S. 199.

— *fluminea* var. *Moussoni* Clessin S. 154 Taf. 27 Fig. 16—18, aber nicht *C. Moussoni* Desh. 1854.

Sumatra: Ajer tegenang bei Fort de Kock; in einem Weiher bei Solok oberhalb Singkarah; im Fluss bei Kajutanam, M. Weber. Alahan-Pandjang, Schepman.

Java: Buitenzorg, Tji-panas und Situ-bagendit, M. Weber. Aus Buitenzorg auch in Dunker's und Strubell's Sammlung. Zahlreiche charakteristische und lebhaft gefarbte Exemplare, Originale zu Clessin's Abbildung von mir Aug. 1861 bei Sindang-laya (zwischen Bandong und Buitenzorg) gesammelt. Sukabumi, Fruhstorfer. Also überhaupt im westlichen Java verbreitet. Java, in allen Gebirgsbächen, Zollinger bei Mousson.

Celebes: im See von Tempe, M. Weber.

Ungleichseitig dreieckig, Hinterrand in der Mitte senkrecht abgeschnitten, aussen grüngelb bis schwarz, innen bläulich weiss, in der Mitte oft röthlich, Schloss meist violett. Vorderer Seitenzahn ziemlich so lang wie der hintere.

a) Länge 33, Höhe 28, Dicke 20 (Ex. v. Fruhstorfer).

b) „ 26½, „ 24, „ 16 (Tji-panas, Weber).

c) „ 25, „ 21, „ 16 (Mousson's Figur).

Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge. Winkel der Seitenzähne ungefähr 100°.

Junge Exemplare sind länger im Verhältniss zur Höhe und oft einfarbig gelb, doch an den starken weit von einander abstehenden Rippen kenntlich; ein Exemplar von 8 Mill. Höhe und 10 Länge zeigt 22 Rippen, wenn man die ganz kleinen und feinen am Wirbel nicht mitzählt; die untersten sind etwa 1 Mill. von einander entfernt. Dass solche Exemplare zur Art gehören, kann man durch Vergleichung mit erwachsenen Stücken erkennen, welche oben noch nicht zu sehr abgerieben sind.

Die ächte fluminea Müllers stammt nach dessen Historia vermium II 1774 p. 206 aus China und ist daher unter den chinesischen Arten zu suchen. Prime selbst erklärt seine ducalis für identisch mit Mousson's fluminea, seine Abbildung stellt sie etwas klein und hinten kürzer dar, aber auch seine Beschreibung von colonialis passt ganz gut auf die vorliegende Art.

#### 7. *Corbicula trapezoidea* n. Tab. VII Fig. 14—19.

Testa trapezoidea, sat tenuis, versus margines valde compressa, costis validis, prominentibus, subinaequalibus, sesqui-vel duplo angustioribus quam interstitia; antice breviter rotundata, areola lanceolato-elongata, linea pertenui elevata circumscripta, postice producta, costis debilioribus, margine postico superne leviter declivi usque ad



dimidium fere altitudinis, dein plerumque subverticaliter truncato, rotundatum in marginem ventralem subrectum transeunte; extus griseofusca, (juvenis nitida, virescens), intus violascens, zona marginali et impressionibus muscularibus laete violaceis; dentes laterales breviusculi, antici arcuati, postici recti.

Long 20, alt. 17, diam. 12, Mill. Vertices in  $\frac{1}{3}$  longitudinis siti.

„ 17, „  $16\frac{1}{2}$ , „  $10\frac{1}{2}$ , „ „ „  $\frac{2}{5}$  „ „

Angulus inter dentes laterales  $120^\circ$ .

Sumatra: im See Danau di atas.

Einigermassen variabel im Umriss, bald etwas höher, bald etwas mehr nach hinten verlängert, die vorliegenden Exemplare meist durch schlammige Auflagerung mehr oder weniger entstellt, namentlich im hintern Theil.

Steht gewissermassen zwischen den Gruppen der Transversae und der Debiles in der Mitte.

#### 8. *Corbicula angulifera* n. Tab. VII Fig. 28—31.

Testa triangulari-rotundata, tumida, costis concentricis elevatis tectiformibus, antice et postice aequaliter validis, postice angulatim ascendentibus, interstitiis angustis; nigricans, intus intense violacea; pars antica rotundata, margine superiore ultra dimidiam altitudinem valde declivi; pars postica subrostrata, margine superiore paulo minus declivi, inferiore subtruncato; margo ventralis vix convexus, angulatim in posteriorem transiens.

Long.  $25\frac{1}{2}$ , alt. 22, diam. 15 } Vertices in  $\frac{2}{5}$ — $\frac{4}{8}$  longitudinis.

„ 22, „ 19, „ 13 } Angulus dent. lat.  $100^\circ$ .

Sumatra: Danau di atas und Danau di bawah.

Jüngere Exemplare,  $12\frac{1}{2}$  Mill. lang, 11 hoch,  $7\frac{1}{2}$  in Durchmesser, zeigen den Wirbel etwas mehr nach der Mitte zu, in  $\frac{7}{9}$  der Länge, und einen grösseren Winkel zwischen den Seitenzähnen, etwa  $108^\circ$  und ähneln dadurch etwas der *C. tumida*, zeigen aber schon die charakteristische Ecke im Verlauf der Rippen am hintern Theil; auch von *C. trapezoidea* sind sie nicht immer leicht zu unterscheiden.

#### 9. *Corbicula sulcata* Cless.

Clessin Cyclad. S. 188 Taf. 32, Fig. 17, 18. 1878.

Java: Buitenzorg, Batavia und Surabaya, v. Martens 1861, 62. Samarang, in der Dunker'schen Sammlung. Also durch die ganze Länge von Java verbreitet.

Ziemlich gleichseitig, dicht gerippt, dunkelbraun, innen violett; Unterrand stark gebogen.

Länge  $16\frac{1}{2}$ , Höhe  $14\frac{1}{2}$ , Durchmesser  $10\frac{1}{2}$  (Clessin)

„	25,	„	21,	„	14	(von Surabaya)
„	22,	„	20,	„	13.	

Wirbel in  $\frac{3}{7}$  der Länge, nach Clessin's Figur beinahe in der Mitte. Winkel der Seitenzähne  $108-110^\circ$ .

*C. gracilis* Prime in Journal de Conchyliologie X 1862 p. 389 pl. 14 fig. 7, kopirt bei Clessin S. 191 Taf. 38 Fig. 2, Sow.-Reeve Cyrena fig. 67, auch von Java, ist dieser Art sehr ähnlich, nur merklich kürzer im Verhältniss zur Höhe.

*C. Cumingi* Desh., von Borneo nach Prime Ann. Lyc. N. York VIII p. 217, dagegen von den Philippinen nach der Originalangabe bei Deshayes catal. Brit. Mus. Ven. p. 228 und Proc. Zool. Soc. 1854 p. 228, ist nach der Originaldiagnose von Deshayes und der Abbildungen bei Sowerby-Reeve 53 und Prime fig. 16, 17 dieser *sulcata* sehr ähnlich, während Clessin Taf. 29 Fig. 9, 10 eine etwas andere Form als solche abbildet. Namentlich finde ich auch die innere Fläche der Ligamentträger (Nymphen) bei *C. sulcata* etwas gekörnt, wie es Deshayes angibt, übrigens ebenso auch bei *C. tumida* von Borneo. Nach von Prime erhaltenen Exemplaren aus Borneo ist *C. Cumingi* etwas mehr dreieckig durch stärkeres Abfallen des Vorder- und Hinterrandes, etwas weniger gewölbt, aussen lebhaft grünlich gelb, innen nur blass violett.

#### D) SUBAEQUILATERAE.

##### 10. *Corbicula pullata* Phil.

Philippi Abbild. neuer Conchyl. III p. 110. — Deshayes catal. Venerid. II p. 232.

*Corbicula dayakorum* Issel moll. borneensi (Ann. Mus. civ. di stor. nat. Genov. VI) 1874 p. 410 (473) tav. 7 fig. 25—27.

Sumatra: Danau-luar, in der Dunker'schen Sammlung. Bei Palembang und Gunung Megong, v. Martens Apr. 1862.

Borneo: Marop bei Sarawak, Beccari und Doria. Singkawang (Resid. Sambas) und Pontianak, v. Martens 1863, hier im Fluss Kapuas an Stellen, wo der Einfluss

von Fluth und Ebbe schon sichtbar, aber noch kein Salzgeschmack im Wasser merklich ist; wird daselbst gegessen.

Ein Exemplar von *C. pullata* in der Dunker'schen Sammlung, vermuthlich von Philippi selbst seinem Freunde Dunker gegeben, macht es mir möglich diese wenig gekannte, von Philippi ohne Abbildung beschriebene Art zu identificiren, und meine Exemplare von Borneo erlauben mir nicht, Issel's *dayakorum* als Art davon zu trennen.

Ziemlich gleichschenkelig-dreieckig, doch vorn etwas mehr gerundet, ungefähr so hoch als lang, mit ziemlich flachen Rippen, die Zwischenräume breiter, mit den Rippen parallelen Streifen. Aussen graugrün bis schwarz, innen violett, Randzone dunkler violett.

Länge  $27\frac{1}{2}$ , Höhe 27, Durchm.  $17\frac{1}{2}$  (Danau-luar)

„ 31, „ 29, „ 19 (Palembang)

„  $26\frac{1}{2}$ , „ 25, „  $15\frac{1}{2}$  (Pontianak)

„ 27, „  $24\frac{1}{2}$ , „ ? (Issel's *dayakorum*)

„ 22, „ 21, „ 14 } (Pontianak).

„ 21, „ 20, „ 14 } Sumbawa)

„ 33, „ 35, „ 26 (abweichendes Stück von

Wirbel in  $\frac{4}{9}$  bis  $\frac{1}{2}$  der Länge. Winkel der Seitenzähne  $95-98^\circ$ .

Die in letzter Reihe angegebenen Dimensionen sind von einem ungewöhnlich grossen und hohen Exemplar, höher als lang, bei welchem der Winkel zwischen den Seitenzähnen auffällig klein, nur  $75^\circ$ , ist. Issel's Angabe dass bei seinem grössern, 27 Mill. langen Exemplar der Durchmesser 26, also nur 1 Mill. weniger betrage, scheint mir im Vergleich mit seinen andern Angaben und meinen ziemlich gleich grossen Stücken von Pontianak ein Versehen für 16.

*C. javana* Clessin Cyclad. S. 180 Taf. 31 Fig. 16. 17, ist ähnlich, hat aber stärkere, weitläufiger gestellte Rippen und hellere braune Färbung. Ich fand einige verbleichte Stücke bei Surabaya.

# 11. *Corbicula lacustris* n. Tab. VII Fig. 20—24.

Testa alte cordato-trigona, solida, tumida, postice obtuse angulata, post angulum gibba et liris radiantibus 2 obsoletes exarata; costis concentricis validis, duplo angustioribus quam interstitia; latere antico ultra dimidium altitudinis valde declivi, rotundatim in marginem ventralem leviter arcuatum transeunte, margine postico usque ad dimidium altitudinis declivi, dein subverticaliter truncato, angulatim

in marginem ventralem transeunte; extus fulvo-fusca, parte antica magis fulva, intus pallide carnea, ad marginem fulva, dentibus lateralibus anticis et posticis elongatis, parte externa paulum arcuatis, posticis paulo longioribus, saepius violaceis.

Long. 14, alt.  $14\frac{1}{2}$ , diam. 11 Mill.; vertex in  $\frac{4}{9}$  longitudinis siti.

„ 11, „ 13, „  $9\frac{1}{2}$  „ „  $\frac{1}{2}$  „ „

Angulus dent. lat.  $64-80^\circ$ .

Sumatra: See von Singkarah, bis zu einer Tiefe von 50 Metern.

Diese Art erinnert im allgemeinen Umriss an *C. crassula* Mouss. (coq. de Bellardi fig. 12, Martens vorderasiat. Conch. Taf. 5 Fig. 56) aus Syrien, unterscheidet sich aber leicht von derselben durch die stärker vortretenden Rippen und die, wenn auch stumpfe doch deutliche Kante, welche den hinteren Theil der Muschel von der mittleren gewölbten Seitenfläche scheidet; bisweilen, doch nicht bei allen Exemplaren erscheinen auf diesem hintern Theil noch zwei erhabene vom Wirbel ausstrahlende Leisten, in ihrem Verlauf bald mehr oben, bald mehr unten deutlicher sichtbar. Junge Exemplare sind verhältnissmässig nicht so hoch und erscheinen durch den stärker vorgezogenen hintern Theil im Umriss mehr quadratisch; die hintere Kante ist schon sichtbar.

So auffallend diese Art von den übrigen des indischen Archipels sich unterscheidet, so finden sich doch auch in demselben See Stücke, welche grösser und breiter (eigentlich länger von vorn nach hinten) sind, die Kante abschwächen, aussen schwärzlich und innen stark violett werden und so bedenklich zu *C. pullata* hinneigen, ähnlich wie *C. crassula* in *fluminalis* übergeht; ein derartiges Exemplar, an welchem aber noch die zwei hinteren ausstrahlenden Linien zu erkennen sind, ist in Fig. 20 und 24 abgebildet, während die Mehrzahl der Exemplare den Fig. 22, 23 entspricht.

Bock, Proc. Zool. Soc. 1881 p. 633 gibt *C. gracilis* als häufig in den Seen von Sumatra, namentlich dem von Singkarah an; vielleicht hat er diese Art vor sich gehabt.

*C. erosa* Desh. bei Reeve fig. 46, unbekannten Fundortes, ist nach einem gut mit dieser Abbildung übereinstimmenden Exemplar in Pätel's Sammlung unserer Art recht ähnlich; hat namentlich dieselbe hohe gleichschenklige Gestalt und am ältern Theil der Schale ebenso starke und weit aus einander stehende Rippen, ferner ebenfalls das hintere Feld durch eine erhabene Linie begrenzt, aber sie ist nicht

nur viel grösser, 28 Mill. lang und 31 hoch, sondern die hintere Fläche auch deutlich ausgehöhlt, namentlich gegen die Wirbel hin, also auch an jüngern Exemplaren, wodurch die sie begrenzende Linie als Kante erscheint und es ist auf diesem Feld keine Spur von den erhabenen Radialfalten der *C. lacustris* vorhanden. Diese *C. erosa* von Reeve 1877, ist übrigens nicht, wie Reeve angibt, von Deshayes in den Proc. Zool. Soc. 1854 beschrieben, auch sonst meines Wissens nicht, und ist ziemlich verschieden von *C. erosa* Prime 1861, Ann. Lyc. nat. hist. VIII p. 213 fig. 40 von Cambodja, kopirt bei Clessin Taf. 26 Fig. 12, 13.

#### E) DEBILES.

12. *Corbicula rivalis* Busch Tab. VII Fig. 32, 33.

V. d. Busch bei Philippi Abbild. III S. 110 Taf. 3 Fig. 5, 1850, kopirt bei Clessin S. 159 Taf. 27 Fig. 15. Desh. cat. Venerid. II p. 228.

Java: v. d. Busch und Zollinger.

Ein Exemplar, welches ich direkt von Mousson erhalten, erlaubt mir eine deutlichere Abbildung von dieser eigenthümlichen Art zu geben. Sehr dünnchalig.

*C. compressa* (Mousson) Desh. cat. Venerid. p. 227, Sow.-Reeve Cyrena fig. 58 und Clessin S. 165 Taf. 29 Fig. 11, 12, von Java, ist vielleicht dieselbe Art; wenigstens habe ich mir 1864 in Cuming's Sammlung notirt, dass dieselbe nur durch ihre Grösse von dem von Mousson erhaltenen Exemplar von *rivalis* sich unterscheide.

13. *Corbicula pulchella* Mouss.

Mousson moll. Jav. S. 88 Taf. 15 Fig. 4, Desh. catal. Venerid. II p. 228. Clessin S. 181 Taf. 30, Fig. 7, 8.

Java: Tjikoya, Zollinger.

Nach Mousson's Beschreibung und Abbildung bin ich geneigt sie für eine eigene, durch die feinen Rippen („tenuiter sulcata“, „fein gerieft“) und die gelblichweisse, nicht violette Innenfärbung kenntliche Art zu halten, aber es liegt mir kein Exemplar vor, das diese Kennzeichen hat. Länge 11, Höhe 10, Durchmesser 6, Wirbel in  $\frac{1}{2}$  der Länge, Winkel der Seitenzähne  $120^\circ$  nach Mousson. Dagegen erhielt ich 1862 von Mousson selbst 3 Exemplare seiner *pulchella*, von Zollinger gesammelt, welche zwar in Grösse, Umriss und Färbung mit seiner Abbildung übereinstimmen, aber doch so starke Rippen

haben, dass sie nicht recht in diese Abtheilung und auch nicht befriedigend zu Mousson's Beschreibung passen.

14. *Corbicula gibba* n. Tab. VII Fig. 25—27.

Testa triangulari-trapezoidea, tenuis, medio tumida, postice subrostrata, compressa, costis concentricis inaequalibus, plerisque parum prominentibus, postice obsolescentibus, antice subrotundata, margine antico superne ultra dimidium altitudinis modice declivi, dein celeriter in partem anticam marginis ventralis valde arcuatam transeunte, margine postico superne modice declivi ultra dimidium longitudinis, dein breviter subverticali, denique rotundatim in partem posticam marginis ventralis subrectam transeunte; extus virenti- vel nigricanti-fusca, intus albida; dentes omnes debiles, laterales antici breviusculi, parum declives, prope finem leviter arcuati, postici sesqui-longiores, sat declives, subrecti.

Long.  $18\frac{2}{3}$ , alt.  $14\frac{1}{2}$  diam.  $11\frac{1}{2}$  Mill. Vertices in  $\frac{1}{2}$  longitudinis siti.

Sumatra: im See Danau di atas.

Diese eigenthümliche Art erinnert im Umriss einigermaßen an die Gattung *Petricola*, namentlich die europäischen *P. lithopaga* durch den verlängerten und kurz abgestutzten hintern Theil und die starke Biegung des vordern Theils des Unterrandes. Prof. Weber sammelte sie gleichzeitig mit *C. trapezoidea* in dem genannten See, sie ist ebenfalls stark mit vertrocknetem Schlamm überzogen, dieser Überzug ist aber theils rostroth, theils schwarz und haftet mehr an der Mitte der Schale, bei *trapezoidea* blass graugelb und am hinteren Ende. Beide Arten sind daher wohl nicht an derselben Stelle des Sees untereinander gefunden. *C. gibba* ist bedeutend dünnschaliger und ich sehe keine deutlichen Zwischenformen zwischen beiden. Da die vorliegenden Exemplare todt gesammelt sind, beruht die weissliche Färbung der Innenseite vielleicht auf Verbleichung.

Gatt. **Pisidium.**

1. *Pisidium sumatranum* n. Tab. IX Fig. 16—18.

Testa rotundata, sat convexa, tenuiter concentrice striata, nitidula, alba, verticibus obtusis prominulis, antice breviter rotundata, postice producta, margine dorsali leviter declivi, postico subtruncato, margine ventrali valde arcuato; dens cardinalis valvae dextrae bicuspidatus.

Long  $2-2\frac{1}{2}$  Mill., alt.  $1\frac{4}{5}-2$ , diam.  $1\frac{2}{5}-1\frac{4}{5}$  Mill. Vertices in  $\frac{1}{2}$  longitudinis.

Sumatra: Ajer-Tegenang bei Fort de Kock, in einer Höhe von 1150 Met. in Gesellschaft von Melania, 23 Mai 1888.

Muschel klein, breit eiförmig, wenig länger als breit, mässig aufgeblasen, festschalig, sehr fein aber unregelmässig gestreift, etwas glänzend, weisslich, durchscheinend; Wirbel stumpf, wenig hervortretend. Oberrand schneidend, gebogen, gegen den Vorderrand mehr abwärts gekrümmt, Hinterrand abgestutzt, Unterrand stark gebogen, allmählich in den Vorderrand übergehend. Ligament kurz, freiliegend, Schlossleiste unter dem Wirbel verbreitet. Links (Fig. 18a) 2 Cardinalzähne, der äussere fast gerade, gegen den Oberrand wenig geneigt, sehr dünn, niedrig, den Schalenrand nur wenig überragend, den inneren Zahn nach hinten überragend; dieser bedeutend höher und kräftiger, mehr gebogen, nach hinten schräg abfallend, seine obere Kante nach aussen umgebogen, Rinne zwischen beiden Zähnen schmal, nach hinten sich erweiternd. Seitenzähne einfach, ziemlich hoch, mit stumpfer Spitze. Rechts 1 Cardinalzahn (Fig. 18c), vorn und hinten hakenförmig nach innen gebogen, obere Kante in der Mitte stark ausgeschnitten, sodass die Ecken als spitze Zähne hervortreten. Seitenzähne (Fig. 18b) doppelt, die äusseren feiner und niedriger als die kräftigen inneren, Rinne lang und weit.

Diese Beschreibung ist möglichst in denselben Ausdrücken gehalten, wie die Artbeschreibungen in Clessins's Monographie der Cycladeen.

Bis jetzt die einzige Art dieser Gattung aus Niederländisch Indiën. Was von den Weichtheilen in Spiritus sich erhalten hat, zeigt in der Kürze und Vereinigung der Siphonen deutlich den Character von Pisidium im Gegensatz zu Sphaerium. Das Vorkommen einzelner kleiner Schalen in den grössern deutet auch auf Lebendig-gebären und zwar in geringer Zahl von Jungen hin, wie es bei Pisidium von Nilsson und Baudon beobachtet ist.

#### **Psammotellina.**

Eine Psammobiide, welche in rein süssem Wasser vorzukommen scheint, siehe weiter unten bei den Brackwasser-Mollusken.

### B) BRACKWASSER-MOLLUSKEN.

Neben den bisher aufgeführten Mollusken gibt es noch eine Anzahl von solchen, welche hauptsächlich da leben, wo sich Süss- und Meerwasser mischt, an den Flussmündungen und in Strandseen, welche noch durch schmale Sandstreifen vom Meere getrennt sind; für Niederländisch-Indien kommen dabei hauptsächlich die Mangle-dickichte in Betracht, von *Rhizophora* (Rhizophoreen), *Avicennia* (Verbenaceen), *Sonneratia* (Myrtaceen) und *Aegiceras* (Myrsineen) gebildet, welche theils die Flussmündungen selbst, theils überhaupt schlammige Küstenstrecken umsäumen. Das Wasser kann hier je nach der Zeit von Fluth und Ebbe in wenigen Stunden, nach dem höhern oder niedrigeren Wasserstand der Flüsse, Regenzeit oder Trockenheit, in grössern Zeiträumen an Salzgehalt zu- oder abnehmen. Das Wesentliche ist, dass wir hier ein Gebiet haben, das weder völlig zum Süsswasser, noch völlig zum Meer gehört und eine Anzahl eigenthümlicher Molluskenformen in ihm leben, welche weiter aufwärts im Land, in beträchtlicherer Entfernung vom Meer, nicht vorkommen, wenn sie auch innerhalb des Gebietes an einzelnen Stellen leben, an denen augenblicklich kein Salzgehalt nachzuweisen ist. Schwieriger ist es sie von den Meer-Mollusken scharf abzutrennen, sie bilden gewissermaassen die Facies des Schlammbodens in der Litoralzone und erst wo der Grund überwiegend sandig oder steinig, felsig wird, treten andere ächte Meeresformen auf. Über dieses Vorkommen habe ich für Niederländisch-Indien schon von meiner Reise 1860—63 aus in den Malakol. Blättern 1863 S. 79—81, 125—131, 175, 176 meine Erfahrungen mitgetheilt, sodann im Allgemeinen auch in dem amtlichen Werk über die Preussische Expedition nach Ost-Asien: Zoologie I 1876 S. 317—320, doch möchte ich mir erlauben, hier im Anschluss an die Bearbeitung des von Prof. Weber mitgebrachten neuen Materials auch das Specielle aus meinen früheren Beobachtungen zu erwähnen. Eine Liste der an der Küste von Birma, namentlich dem Delta des Irawaddy, beobachteten Brackwasser-Mollusken hat Blanford im British Birma Gazetteer Band I, S. 714—716 gegeben. Die Thierwelt der Manglesümpfe an der Nordost-küste Australiens schildert anziehend Tenison-Woods in Proc. Linn. Soc. of New South Wales V 1880 p. 107—131 (Auszug in Malak. Blätt. 1882 S. 93).



Es möge erlaubt sein hier wiederzugeben, was ich am Ende meines 16-monatlichen Aufenthaltes in Niederländisch-Indien 1861–1863 als Gesamteindruck über derartiges Vorkommen niedergeschrieben habe.

„Der reine Systematiker mag die Auriculiden als Landschnecken betrachten, welche an sehr feuchten Orten und hauptsächlich in der Nähe des Meeres leben, die Neritinen und Cyrenen als Süsswasser-Mollusken, welche da und dort noch in das Salzwasser hineinreichen, die Potamides und Baum-Austern als Salzwasserthiere des seichten Schlammgrundes. Wenn aber die Thiere nach dem Medium, in welchem sie leben, gruppiert werden sollen, so muss man der Thatsache ihr Recht wiederfahren lassen, dass Pythia, Neritina und Potamides dicht bei einander an derselben Stelle leben und öfters als nächste Nachbarn Austern und Littorinen haben, und wer selbst diese Thiere an ihrem Standorte sammelt, wird bald durch Erfahrung lernen, dass da, wo eine dieser Brackwasserschnecken lebt, er weder Heliceen oder Cyclostomiden, noch Paludinen und Unionen zu erwarten hat, aber ebensowenig Cypraeen oder Trochus.

„Die Auriculiden und Assimineen finden sich meistens, manche Neritinen (Neritodryas) nicht selten, Potamides und Faunus zuweilen, Littorina fast immer über Wasser. Neritodryas und die Littorinengruppe Littorinopsis ersteigen Gebüsche und selbst niedrige Bäume, die Auriculiden, Neritina crepidularia, Potamides und die Baum-Austern finden sich hauptsächlich an feuchtem Holz, die letzteren zwei hauptsächlich an lebendigem, wie Wurzeln und Schösslinge der Rhizophoren u. dgl., die andern auch an abgestorbenen grösseren oder kleinen losen Holzstücken. Faunus und Assiminea leben auf, Cyrena in weichem Schlammgrund. Die Auriculiden und die genannten Neritinen findet man auch an Orten, wo mindestens zeitweise das Wasser ganz süss und fliessend ist, doch immer nur im Küstenstrich, Potamides und Faunus an Flussmündungen nicht leicht höher als das Salzwasser geht, Littorina, Assiminea und die Austern wohl nie im Gebiet des süssen Wassers und ebenso am Rand des offenen Meeres als in halbsalzhaltigen Sümpfen, wenn überhaupt noch Manglegebüsch daselbst vorhanden ist. Diese bilden dadurch den Übergang zu einer zweiten Reihe von „submarinen“ Mollusken, nämlich zu denjenigen, welche nichts mit Süsswasser zu thun haben, sondern an Steinen und Felsen unmittelbar am offenen Meer, von reinem Seewasser benetzt, aber doch den grössern Theil

„ihres Lebens an der Luft über Wasser zubringen, so die nicht zu „Littorinopsis gehörigen Littorinen, einige Melampus-arten, Plecotrema „und die (nicht in Niederländisch-Indien vorkommende) Auriculiden- „gattung Pedipes; ähnlich auf Schlammgrund mit einzelnen Steinen „einige Arten von Nerita, Modiola und Perna, auf reinem Schlamm- „grund die Oncidiiden.“

Wenn übrigens im Folgenden sämtliche mir aus Niederländisch-Indien bekannt gewordenen Arten aus den Familien der Psammobiiden und Soleniden behandelt sind, so will ich damit nicht alle für submarin oder Brackwasserbewohner erklären, sondern es geschieht hauptsächlich, um deren verwickelte Synonymie aufzuhellen.

#### a) PULMONATEN.

##### ONCIDIIDAE.

Die Oncidien oder Peronien, schalenlose Schnecken mit derbhäutigem gewölbten längsovalen Mantel, welcher Kopf und Fuss völlig überdeckt, sind im Gebiet des malayischen Archipels, soweit meine Erfahrungen reichen, entschiedene Meerbewohner <sup>1)</sup>, welche auf weichem oder mit losen kleineren Steinchen bedecktem Schlammgrunde leben, an so seichten Stellen, dass sie bei der Ebbe vom Wasser verlassen werden, öfters nahe den Mangle-dickichten an der Flussmündungen, doch nicht eigentlich in denselben. Soweit ich mich erinnere und meinen Notizen entnehmen kann, habe ich während meiner ostasiatischen Reise 1860—63 Oncidien nur an den Meeresküsten gefunden, auf Schlammboden, aber meist an festen Gegenständen, an und unter einzelnen Steinen fest sitzend, zwischen Fluth- und Ebbe-grenze, bei Petshabari (Siam) in Brackwasserkanälen, bei Singapore an der Mündung eines kleinen Baches ins Meer, an Steinen zusammen mit der Strand-Assel Ligia, bei Dodinga (Halmaheira) an Steinen nahe der untern Ebbegrenze, zusammen mit ächten Meerschnecken, wie Purpura und Columbella. Mehrmals habe ich bemerkt, dass sie über Wasser die Fühler ausstreckten und umherkrochen. Springfische,

---

1) Allerdings soll eine Art, *Oncis montana* Plate a. a. O. S. 194 nach von Möllendorff auf der Philippinen-insel Sibuyan „noch oben auf einem Berg an Felsen und alten Baumstämmen“ gefunden sein: „Sie wurde von dem Orchideensammler C. Roebelin gesammelt.“

(Periophthalmus) an denselben Stellen mit Oncidien habe ich bei Singapore, Makao, Zamboanga und Larentuka gesehen.

Die besten neueren Arbeiten betreffs der Systematik dieser Familie sind von C. Semper, Reisen im Archipel der Philippinen, Landmollusken Heft V 1880 und von Plate im Zoologischen Jahrbuch VII, Abtheilung Anatomie, 1. Heft 1894; dieser letzteren Arbeit ist wesentlich das Folgende entnommen, die von Prof. Weber gesammelten Exemplare sind durch Dr. *Max Meissner* untersucht und bestimmt.

**Oncidium** Buchanan, s. str. Plate.

Hyponota (Unterseite des Mantels) schmaler als die Fusssohle. Rand des Mantels nicht gekerbt, ohne grosse Drüsen. Rücken Augen, wenn vorhanden, in Gruppen angeordnet.

4) Augen gruppenweise auf retractilen Papillen.

1. *Oncidium verruculatum* Cuv.

Cuvier Mem. anat. Moll. 1817 nro XIII. Keferstein Zeitschr. f. wiss. Zool. XV 1865.

Semper a. a. O. S. 255: Plate a. a. O. S. 168.

Amboina: von Martens.

Timor: Kupang von Martens und Expedition der Gazelle.

Vom Rothen Meer bis Philippinen und Tahite verbreitet.

2. *Oncidium Peroni* Cuv.

Cuvier Annales du Mus. d'hist. nat. V 1804 p. 37 Taf. 6. = Mem. Moll. no. 13. — Plate a. a. O. S. 172.

Peronia Mauritiana Blainville malacologie 1825 Taf. 46 Fig. 7.

Onchidium Tonganum Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe, Zool. II p. 210 pl. 15 fig. 17, 18. Semper a. a. O. S. 258 Taf. 19 Fig. 29.

Ohne Zweifel auch noch in Niederländisch-Indien zu finden, da einerseits von den Nikobaren, andererseits von den Philippinen und Neu-Guinea bekannt und ebenfalls weit verbreitet, von Mombas an der Ostküste Afrika's bis zu den Tonga- oder Gesellschafts-inseln.

3. *Oncidium tumidum* Semp.

Semper S. 262 Taf. 20 Fig. 3, 4. — Plate S. 173.

Singapore: v. Martens und Semper.

4. *Oncidium Amboinae* Plate.

Plate a. a. O. S. 177 Fig. 8.

Amboina: von Martens.

5. *Oncidium Palaense* Semp.

Plate S. 180.

Amboina: nach Dr. Plate.

Palaos: nach Semper.

B) Augen einzeln auf contractilen Höckern.

6. *Oncidium luteum* Semp.

Semper S. 274, Taf. 20, Fig. 10, 12. Plate S. 181.

Singapore: Semper.

Celebes: Fluss Djenemaedja bei Luwu, M. Weber.

7. *Oncidium aberrans* Semp.

Semper S. 267. Plate S. 187.

Wahrscheinlich von Singapore, Semper.

8. *Oncidium nigrum* Plate.

Plate a. a. O. S. 188.

Borneo: Gerard.

C) Augen auf der glatten Haut unregelmässig vertheilt.

9. *Oncidium ambiguum* Semp.

Semper a. a. O. S. 264 Taf. 19 Fig. 4, 5, 10, Taf. 20 Fig. 5.

Singapore: Semper.

Palaos: Semper.

Philippinen: Samar, F. Jagor.

**Oncis** Plate.

Hyponota so breit oder breiter als die Sohle. Mantelrand nicht gekerbt. Rückenaugen, wenn vorhanden, einzeln stehend.

## a) Augen einzeln.

1. *Oncis coriacea* Semp.

*Onchidium coriaceum* Semper a. a. O. S. 271 Taf. 19 Fig. 1. Plate S. 190 Fig. 34.

Singapore: v. Martens und Semper.  
 Celebes: bei Luwu, M. Weber.  
 Halmaheira: Dodinga, v. Martens.  
 Java: ein Exemplar im Berliner Museum.  
 Auch Nikobaren, Pulo Pinang und Philippinen.

b) Augen fehlen.

2. *Oncis lata* Plate.

Plate a. a. O. S. 191 Taf. 7 Fig. 2.

Celebes: Mündung des Flusses Djenemaedja in Luwu, M. Weber.

Die vorliegenden 10 exemplare, stimmen mit der Beschreibung Plate's genau überein bis auf die Färbung des Randsaums der Hyponota. Diese ist nicht gelb, sondern schmutzig gelb-grau. Die gleiche Farbe zeigt die Umrandung des Athemloches. Die Maasse der vorliegende Stücke sind folgende: Das grösste ist 33 mm. lang, 27 mm. breit, die Sohle misst in der Mitte 8, das Hyponotum 9,5 mm. Das kleinste Exemplar ergab: Länge: 16 mm., Breite: 14 mm., Sohle: 4 mm. Hyponotum: 5 mm. (Dr. Meissner.)

Plate's Original-Exemplare sind aus Neu-Britannien.

3. *Oncis coeca* Plate.

Plate S. 199 Fig. 9.

Amboina: Expedition der Gazelle.

Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, dass *Oncis Martensi* Plate S 196 Fig. 7 von mir nicht bei Singapore, sondern bei Petshaburi im Golf von Siam gefunden wurde.

***Oncidella* Gray.**

Mantelrand fein gekerbt oder gelappt. Auf der Spitze der grösseren Kerblappen münden grosse Drüsen aus. Ohne Rückenaugen.

1. *Oncidella griseofusca* Tapp.

Tapparone-Canefri Moll. del viaggio della Magenta Taf. 2 Fig. 1.

Singapore: Expedition der Magenta.

Die Abtheilungen *Oncidina* und *Peronina* sind bis jetzt in unserem Gebiet noch nicht beobachtet.

## AURICULIDAE.

Luftathmende Schnecken, ohne Deckel, mit zwei Fühlern, die Augen an deren Basis, meist hinter denselben. Radula musiogloss, die Queerreihen meist wellenförmig. Schale verhältnissmässig dick, öfters gefärbt oder mit Skulptur, spiral, länglich; Mündung länglich, mit mindestens einer Spiralfalte am Columellarrand; Aussenrand oft verdickt. Im Innern der Schale die Scheidewände zwischen den einzelnen Windungen oft aufgelöst, und die Windungen der Weichtheile dann durch eine neugebildete Zwischenhaut verbunden.

Fast alle sind ächte Brackwasserschnecken; nur die Gattung *Carychium* lebt im Binnenland und einige Arten von *Melampus*, *Pedipes* und *Plecotrema* kann man ebenso gut wie die Littorinen als Meeresschnecken betrachten, indem sie an Felsen und Steinen an der offenen Meeresküste leben, bei der Fluth oft unter Wasser. Schon Ferussac, prodrome 1821 p. 91 ff. bezeichnete sie als *Pulmonés gehydrophiles*, Land-Wasserschnecken, und sagt von ihnen, sie seien „destinés à „peupler avec certains Pectinibranches les parties basses des côtes, „les étangs saumâtres, qui ne conviennent ni aux *Pulmonés fluviales* [den *Limnaeiden*], ni aux véritables Pectinibranches marins, et „où l'alteration des marées les expose souvent aux mêmes circonstances que les *Pulmonés fluviales* qui sont souvent exposés à un „dessèchement complet que causerait leur mort, s'ils ne pouvaient „respirer l'air en nature, et attendre dans la vase encore humide le „retour des pluies.“ Und Souleyet, welcher mehrere Arten im indischen Archipel lebend beobachtet hat, sagt, Voy. de la Bonite, zoolog. II p. 523 „les Auricules sont des Mollusques *Pulmonés*, mais „qui vivent constamment sur les bords de la mer ou auprès des „marais salins et pour lesquels la proximité de l'eau salée parût être „aussi nécessaire que le séjour dans l'eau douce pour les *Pulmonés fluviales*; les Auricules vivent même une partie du temps sous „l'eau, ce qui a sans doute porté quelques zoologistes à les regarder „comme des animaux marins, respirant par des branchies.“ An der Westküste von Borneo genügte mir bei Mampawa eine halbe Stunde, um 4 Arten von Auriculiden aus drei Gattungen zu finden, während in dem weit landeinwärts gelegenen Binnensee Danau Srian, während eines Aufenthaltes von 10 Tagen, keine einzige Auriculide mir zu Gesicht kam.

Ich habe sowohl bei Alexia auf den Schlammhängen der Lagunen von Venedig, (Malak. Blätt. 1857 p. 131) als bei Pythia, Auricula und Cassidula in Niederländisch-Indien mich überzeugt, dass sie an Stellen leben, welche bei Fluth von Wasser bedeckt sind, aber doch bei Ebbe an der Luft herumkriechen und dabei die Fühler frei ausstrecken, also in voller Lebensthätigkeit sind, während Limnaea und Planorbis wohl auch hie und da etwas aus dem Wasser herauskriechen, aber dann ihre Fühler unthätig am Kopf angelegt halten. Sie sind also entschieden mehr Luftthiere als die Limnaeiden; doch fehlt noch die Beobachtung, wie sie sich unter Wasser verhalten, ob sie hier unthätig bleiben oder zwar sich bewegen, aber doch die Fühler weniger gebrauchen, als an der Luft, sowie es die ächten Landschnecken machen; so schien es mir bei Alexia zu sein. Ihr Verhalten zwischen Wasser und Luft gleicht demnach, abgesehen vom Salzgehalt, dem von Succinea.

Dass die Auriculiden wirklich durch eine ähnliche Lungenhöhle wie Helix Luft athmen, haben Quoy und Gaimard an Auricula Midae, Trinchese an A. Malchi (Issel moll. borneensi p. 38), Moquin-Tandon an Alexia myosotis und Souleyet an Melampus castaneus anatomisch nachgewiesen. Quoy und Gaimard haben übrigens beobachtet, dass Auricula Midae mehrere Tage unter Wasser gehalten am Leben bleibt, was wir ja auch von den luftathmenden Limnaeen wissen.

#### **Pythia** Link.

Pythia (Bolten 1798) Link 1807. Polydonta Fisch. Waldh. 1807. Scarabus Montf. 1810. Strigula Perry 1811.

Schale seitlich zusammengedrückt mit gegenüber liegenden meist hellen, braungesäumten Varicen, wie Ranella, schwach längsstreifig, die meisten Arten ohne Spiralsculptur. Mündung mit zwei Zähnen, der untere oft doppelt, über der Columellarfalte und 3–6 abwechselnd grösseren auf einer Leiste der Aussenrandes; Aussen- und Unterrand ausgebreitet.

a) Statt des Nabels eine geschlossene Queerspalte.

1. *Pythia trigona* Troschel Tab. VIII Fig. 1.

Polydonta carinata Beck ind. moll. 1837 p. 101 ohne Beschreibung.

*Scarabus trigonus* Troschel in Archiv f. Naturgeschichte 1838 I p. 207, Taf. 4 Fig. 5. Reeve in Ann. Mag. n. h. IX p. 219; conch. syst. II pl. 188 fig. 2; conch. icon. XII fig. 22. Küster Auricul. S. 10 Taf. 1 Fig. 6. Adams a. Reeve Zool. Samarang p. 56 pl. 14. fig. 12, lebendes Thier. Issael moll. borneensi p. 61.

*Pythia trigona* (Troschel) Pfr. mon. Auric. p. 75. Nevill handlist I p. 222.

Stark zusammengedrückt, an den Längsseiten scharfkantig, auf hellerem Grund dunkelbraun gefleckt; Nabelspalte lang, völlig geschlossen. Länge 17—19½ Mill., grösste Breite 16—20, kleinerer Durchmesser 8½—12, Mündung 10—12½ Mill. lang.

Singapore: über Wasser dicht am Rande von Brackwassergräben in den Cocospflanzungen am westlichen Ende der Rheede, zusammen mit *Auricula Judae*, von mir gefunden.

Pululez bei Bintang, wohl Pulu Loos an der Ostseite der Einfahrt nach Bintang, Röttger s. Troschel a. a. O. — Mampawa an der Westküste von Borneo, an sumpfigen Stellen nahe am Meeresstrand, in Mehrzahl von mir gefunden; ebenso in Borneo, Nordwest- oder Nordostküste, unter verwitterndem Laube (decaying leaves) A Adams. — Insel Labuan, Lowe und Beccari. — Luzon, Cuming. — Irawaddy-delta Blanford. — Trincomale auf Ceylon Nevill.

Dass Beck's *Polydonta carinata* hierher gehört, scheint mir aus dem Namen selbst, der Stellung vor *P. plicata* und dem Fundort Singapore mehr als wahrscheinlich.

## 2. *Pythia plicata* Fer.

*Cochlea compressa fusca* etc. Lister hist. conch. 1688 pl. 577 fig. 32, copirt bei Klein meth. ostracol. Taf. 1 Fig. 24 und Favanne conchyl. pl. 65 fig. D 4.

*Helix scarabaeus* merkwürdige Abänderung, Chemnitz Conch. Cab. IX 1786 Fig. 1251, 1252.

*Strigula purpurea* Perry conchology 1811 Tab. 15 Fig. 4.

*Scarabus plicatus* Ferussac prodr. p. 101 no. 2. Lesson Voy. Coquille, zool. II p. 335. Troschel in Wiegmann's Archiv 1838 I S. 106. Taf. 4 Fig. 2. Küster Auriculaceen S. 9 Taf. 1 Fig. 34. Reeve conch. syst. pl. 188 fig. 3; conch. ic. fig. 28. Metcalfe Proc. Zool. Soc. 1851 p. 76.

*Scarabus triangularis* Benson in Asiat. Journ. V 1836 p. 354.

*Auricula plicata* Desh. bei Lam. an. s. vest. ed. 2. VIII p. 339.



*Pythia plicata* (Fer.) Pfr. mon. auricul. p. 76. Nevill handlist I p. 222.

*Pythia inflata* Pfr. novitat. conch. I 57. Taf. 3 Fig. 34.

Mässig zusammengedrückt, an den Seiten gerundet, violett-braun, öfters etwas gebändert; Nabelspalte kürzer, aber auch ganz geschlossen.

Ceylon bei Jaffna (Gardener). Trankebar und Pondichery auf der Koromandelküste (Chemnitz und Deshayes). Bengalen (Ferus-sac, Lamare-Picquot, Benson, Stoliczka). Irawaddy-Delta und Salween (Blanford); Rangan und Mulmein in der Ecke von Pegu und Tenasserim (Stoliczka), Pulo Pinang (Sammlung der Ostindischen Compagnie in London und Stoliczka). In Siam sammelte ich sie im Kanalsystem zwischen Bangkok und dem westlich davon gelegenen Thachin, noch in der Küstenzone, am Rand eines künstlichen Teiches, den Fuss der Bäume, welche im Wasser standen, bis zu einer Höhe von zwei Fuss über Wasser besetzend. Nordwestküste von Borneo (Metcalf). Surabaya im östl. Java, nur ein todes und abgeriebenes, aber zweifellos zu dieser Art gehörigen Stück von mir gefunden.

Eine grössere Anzahl von Exemplaren, welche ich in Siam sammelte, zeigt, dass die Kennzeichen, nach welchen Pfeiffer seine *P. inflata* von *plicata* unterscheidet, sich auf das Mannichfachste bei den an derselben Stelle lebend gesammelten combiniren: kürzere mehr quadratische oder gestrecktere mehr eiförmige Gestalt mit dem Vorhandensein oder Fehlen eines dritten Zähnnchens an der Mündungswand gleich unter der grössern Falte und mit stärkerer oder schwächerer Ausprägung einer Queerkante an der Basis; von den Zähnen des Aussenrandes sind fast immer nur drei deutlich ausgeprägt und von diesen der oberste der kleinste, zwischen dem mittlern und untern oft noch zwei, unterhalb des untern zuweilen noch einer spurweise als kleines Knötchen auf dem Verbindungswulst; zuweilen wird einer von diesen eingeschalteten so gross wie der oberste. Windungen zähle ich an allen meinen erwachsenen Stücken bei verschiedener Grösse, 18–24 Mill., neun oder doch acht und eine halbe; aber die obersten sind schwer zu zählen, da die Naht gar nicht vertieft ist. Auch die Färbung ist bei *inflata* und *plicata* ungefähr dieselbe, eines der Exemplare aus Bengalen, durch Lamare-Picquot erhalten, im Berliner Museum, stimmt in der Färbung ganz mit Pfeiffer's Abbildung von *P. inflata* überein und zeigt auch den ersten Ansatz zur Verdopplung der untern

Parietalfalte. Die violette Farbe ist nur durch Verbleichen aus der dunkelbraunen entstanden.

b) Nabel auch ganz geschlossen, aber nicht in Form einer Queerlinie.

### 3. *Pythia imperforata* A. Ad.

*Scarabus imperforatus* A. Ad. Proc. Zool. Soc. 1851 p. 151. Reeve conch. ic. fig. 10.

*Pythia imperforata* (A. Ad.) Pfr. mon. auricul. p. 80.

Celebes: Flussmündung Djenemaedja südlich von Palopo in Luwu, M. Weber.

Borneo: A. Adams.

Die von Prof. Weber mitgebrachte Schnecke weicht von der Beschreibung bei A. Adams und Pfeiffer darin ab, dass die letzte Windung nicht verschmälert genannt werden kann, die Columellarfalte genau quer verläuft, nicht schief aufsteigt und der Aussenrand an allen vorliegenden Stücken nur 3 Zähnen zeigt. Da im Übrigen alles stimmt, möchte ich keine besondere Art daraus machen.

c) Nabel rundlich, eng.

### 4. *Pythia scarabaeus* L.

*Cochlea compressa variegata* etc. Lister hist. conch. IV 1688 pl. 577 fig. 31, copirt bei Klein meth. ostrac. Taf. 1 Fig. 23, und Born test. mus. Caes. p. 364 fig. a.

— *imbrium* Rumph amb. rar. p. 91 (deutsche Ausg. S. 55) Taf. 27 Fig. I. Gualtieri ind. test. tab. 4 Fig. 8. Argenville conchyl. ed. 1 pl. 12 fig. T; ed 2 pl. 9 fig. T (nicht ganz ausgewachsen).

*Helix scarabaeus* Linne syst. nat. ed. X, p. 768; ed. XII p. 1241 Hanley ipsa linn. conch. p. 355. — Chemnitz Conch. Cab. IX S. 179. Fig. 1249, 1250, auch noch nicht ganz ausgewachsen, copirt bei Küster Auricul. Taf. 1 Fig. 1, 2.

*Helix Pythia* Müller hist. verm. II p. 88.

*Scarabus imbrium* Montfort conch. syst. II 1810 p. 307. Leach zool. miscell I p. 96 pl. 42. Ferussac prodr. p. 101. Lesson Voy. de la Coquille, zool. II. p. 333, pl. 10 fig. 5, lebendes Thier. copirt bei Oken allg. Naturgesch. Taf. 23 Fig. 8 und Gray fig. moll. an. III pl. 306 fig. 3. Troschel in Archiv. Naturgesch. 1833 I S. 204 Taf.

4 Fig. 1. Reeve conch. syst. pl. 88 fig. 11. A. Adams und Reeve zool. Samarang, Moll. p. 56 pl. 14 fig. 13 lebendes Thier copirt bei H. A. Ad. genera moll. pl. 82 fig. 3.

*Scarabus scarabaeus* Reeve conch. ic. XII fig. 5.

*Auricula scarabaeus* Lam. an. s. vert. VI 2 p. 132 ed. 2 VIII p. 327. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. II p. 162 pl. 13 fig. 24, lebendes Thier.

*Pythia rictans* Schumacher essai syst. test. p. 229.

*Pythia scarabaeus* (L.) Pfr. mon. Auricul. p. 82. v. Martens Monatsber. Berlin. Akad. 1877 p. 286.

Eiförmig, an den Seiten stumpfwinklig, gelblich-bräunlich mit zahlreichen dunkelbraunen, verschieden gestalteten Flecken und mit runzelartigen flachen, unter sich parallelen Längsstreifen unterhalb der Naht; Nabel meist offen, halbkreisförmig, nur selten ganz geschlossen. Untere Falte der Mündungswand durch eine Furche gleichmässig zweigetheilt 32—41 Mill. lang, 18—23 breit, Mündung 20—23 <sup>1)</sup>).

Unausgewachsene Exemplare, denen noch eine oder eine halbe Windung fehlt, haben zwar auch schon eine gezahnte und verdickte Mündung, lassen sich aber doch daran erkennen, dass der Aussenrand nur schmal ist, namentlich nach unten sich nicht so lappenartig ausbreitet, wie bei den erwachsenen, wodurch auch die Breite der ganzen Schale im Verhältniss zur Länge grösser erscheint, und dass die Columellarfalte direkt in den Mündungsrand übergeht. Schon junge Stücke von erst 11 Mill. Länge und 7 Breite zeigen Zähne in der Mündung.

Rumph sagt a. a. O. von seiner *cochlea imbrium*: es werden diese Schnecken an der Seeküste, unter verfaulten Blättern und Holz, sowohl am Strand als mehr landwärts, ja öfter auch auf den Bergen gefunden, und es ist nicht wahrscheinlich, dass sie vom Strande dahin kriechen könnten; man glaubt daher, dass sie durch den Wind bei starkem Platzregen von unten aufgehoben und daselbst niedergeworfen werden; mir aber kommt es wahrscheinlicher vor, dass sie auf den Bergen selbst durch den Regen erzeugt werden, weil man sie daselbst sowohl klein als gross findet. Soweit Rumph, und manche haben desshalb diese Gattung als ächte Landschnecken angesehen; es fragt sich aber was Rumph unter seinen „Bergen“ versteht. Th. Studer, welcher

1) In Pätel's Sammlung, jetzt im Berliner Museum, ein noch etwas grösseres Stück, 43½ Mill. lang, 26½ breit, Mündung 23½, angeblich von den Molukken; die obigen Angaben nach den Exemplaren, die ich selbst auf den Molukken gesammelt.

sie ebenfalls auf Amboina gesammelt hat, sagt ausdrücklich „im Brackwasser und nahe dem Ebbestrand ungemein häufig“ (Forschungsreise der Gazelle III. Zoologie 1889 S. 220). Es ist mir aber nicht bekannt, dass sie irgendwo einigermaßen entfernt vom Meere gefunden wurde. Ich fand sie auf Ternate, Tidore, Moti, Kajoa, Batjan und bei Dodinga auf Halmahera nur im Gebiet des salzhaltigen Wassers, am Boden oder seltener an Blättern von Gesträuch; zu Oka bei Larentuka auf Flores allerdings am Rand eines Bächleins mit süßem Wasser, aber doch noch innerhalb der Strandzone; bei Wahai auf Ceram in der Nähe des Meeres, aber doch in Gesellschaft echter Landschnecken: *Cyclotus Amboinensis* und *Helicina suturalis*. Lesson sagt von Sc. Lessoni Blainv. auf Neu-Irland: in geringer Entfernung vom Meer, unter Moos und namentlich in den immer feuchten Blattachsen einer Amaryllidee, *Pancratium*; abgeriebene Schalen auch in einer Entfernung von mehr als 1 Lieue in Wäldern und auf Bergen. Quoy und Gaimard berichten, dass *P. scarabaeus* auf den Lande (à terre) nicht weit vom Strande leben, sie dieselbe aber nie unter Wasser gesehen haben; sie sei apathisch und lichtscheu, verberge sich unter abgestorbenem Laube und komme nach starkem Regen aus der Schale hervor. A. Adams fand diese Art auf Celebes und Borneo unter totem Laub und vermodernden Pflanzentheilen in Wäldern nahe der Meeresküste.

Die geographische Verbreitung der Art zu umgränzen ist desshalb unsicher, weil die Unterscheidung der Arten in dieser Gattung schwierig ist und die verschiedenen Autoren darüber nicht immer einig sind. Halten wir uns zunächst an Pfeiffer's Monographie der Auriculaceen 1856 und nehmen an, dass alle Autoren, welche er zu dieser Art citirt oder welche nach ihm den Artnamen *scarabaeus* L. gebrauchen, auch dieselbe Art gemeint haben, so ergibt sich folgende Verbreitung:

Amboina-gruppe der Molukken: Amboina, einzelne Stücke ich selbst, andere von Th. Studer bei der Expedition der Gazelle. Haruku, K. Martin (Schepman Not. Leyd. Mus. XV p. 153). Saparua, Strubell (Böttger Bericht d. Senkenberg. Gesellsch. 1891 S. 276). Buru, Lesson.

Banda-gruppe, Strubell bei Böttger a. a. O., etwas abweichend.

Eigentliche Molukken: auf den oben angeführten Inseln von mir gefunden; Batjan von Strubell.

Nördliches Celebes: A. Adams und A. B. Meyer im Berliner Museum. Borneo, wahrscheinlich das nordöstliche, A. Adams. Die Adams'schen Stücke von Celebes und Borneo werden von Pfeiffer als eigene Art, *P. Reeveana*, betrachtet, mon. auricul p. 81.

Timor, s. unten var. *tripartita*.

Neu-Guinea und Umgebung: Port Dorey, Raffray. Aru-inseln, Becari. Neu-Irland, Lesson, von Blainville als *Sc. Lessoni* getrennt, aber von Pfeiffer mit *scarabaeus* vereinigt. Neu-Irland und Neu-Hannover, Expedition der Gazelle. Neue Hebriden, Quoy und Gaimard. Salomons-inseln, Cox. Auch der von Hombron und Jacquinot voy. pole sud pl. 10 fig. 15—17 abgebildete *Scar. insularis* von der Salomons-inseln gleicht meinen Exemplaren von Halmahera so genau, dass ich ihn für dieselbe Art halten muss.

Dagegen stehen mir die beiden Angaben: Java bei Frauenfeld, Verhandl. zool. bot. Gesellsch. 1869 p. 877 und Nikobaren bei Nevill handlist I p. 221 noch zu isolirt, um sie unbedingt anzunehmen.

*Pythia scarabaeus* var. *tripartita*.

29 Mill. lang, 19 breit, Mündung 20 lang. Die eigentliche Columellarfalte stark, aber nicht in der Mitte durch eine Furche zweigetheilt, sondern an der Ober- und an der Unterseite mit einem kleinen Anhang, der untere deutlicher abgesetzt. Farbe des einzigen, anscheinend etwas abgeriebenen Exemplars hellkastanienbraun, ohne Flecken. Im Übrigen mit *P. scarabaeus* von den Molukken übereinstimmend.

Timor bei Kupang, Prof. Wichmann, Ein Exemplar.

Es ist mir sonst noch keine Art dieser Gattung aus Timor vorgekommen und bleibt es daher noch zweifelhaft, ob es nur eine individuelle Variation oder eine geographisch abgegränzte Abart oder gar Art sei.

##### 5. *Pythia pantherina* A. Ad.

*Helix scarabaeus* var. Favanne conchyliologie 1780 pl. 65 fig. D 1.

*Scarabus pyramidatus* (non Reeve) Küster Auricul. S. 62 Taf. 9

Fig. 3. 4. Mousson moll. jav. S. 49 Taf. 5 Fig. 10. Smit in

Natuurkund. Tijdschr. Nederl.-Indië XX 1860 p. 324.

*Scarabus pantherinus* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1850 p. 152. Issel

moll. borneensi p. 61.

*Pythia pantherina* (A. Ad.) Pfeiffer mon. Auricul. p. 94. Böttger

Ber. Senkenberg. Gesellsch. 1891 S. 275.

Merklich kleiner, schlanker, mit stärker verlängertem spitzem Gewinde, aber in der Skulptur und den Zähnen nicht wesentlich von *P. scarabaeus* verschieden. Nabel eng.

Länge 21—34 Mill., Breite 14—20, Mündung 13—20.

Obwohl diese Art im allgemeinen Umriss sich auffällig genug von normalen *P. scarabaeus* unterscheidet, so habe ich doch einige Bedenken, ob sie sich bei reicherem Material scharf getrennt halten lassen wird. Auf Tawalli unweit Batjan fand ich nämlich neben andern normalen *P. scarabaeus* ein Exemplar, das noch etwas kleiner und schlanker als diese *pantherina* ist, 20 Mill. lang, 12 breit, Mündung 11 Mill. lang, das in allen übrigen Beziehungen, Färbung, Sculptur u. s. w. ganz genau mit den zugleich gefundenen normalen *P. scarabaeus* zusammenstimmt und daher kaum anders als eine verkümmerte Form desselben zu betrachten ist; dann würde aber *pantherina* ganz innerhalb der Variationsbreite von *scarabaeus* liegen. Pfeiffer, der nur die Dimensionen eines Exemplars bei beiden angibt, findet desshalb auch mehr Unterschied in der Grösse, während ich, von jeder Art die grössten und kleinsten (erwachsenen), die mir vorgekommen, ausmessend, eine weitere Variationsbreite für beide finde; das Stück von 34 Mill. Länge ist aus Java, von Zollinger an Mousson gegeben. Dagegen erhält die Art eine gewisse weitere Berechtigung dadurch, dass sie auch in der westlichen Hälfte von Niederländisch-Indien verbreitet ist, wo der Vorkommen der ächten *scarabaeus* noch sehr zweifelhaft ist.

Sumatra: bei Benkulen von mir gefunden, bei Tiku in der Assistenz-Residentschaft Agam von Dr. Ludeking, angeblich an Kalkfelsen (Smitt a. a. O.)

Java: Anjer an der Sundastrasse, von mir gefunden. Südwestküste Java's, Resid. Bantam, nahe dem Strand in den von Buschholz bedeckten Sümpfen, an Stämmen, wenig über Wasser, van Hasselt. Insel Nusa-Baron an der Südküste, Zollinger bei Mousson.

Borneo: A. Adams nach Pfeiffer. Tandjong-datu bei Sarawak, Doria und Beccari.

Celebes: Cuming'sche Sammlung nach Pfeiffer.

Philippinen: Cagayan auf Mindanao und Siquijor, Cuming.

Molukken: Tawalli (vgl. oben) und Wahai auf Ceram, v. Martens. Haruku und Saparua, Strubell (Böttger a. a. O.).

Nach Jousseume Mem. Soc. geol. de France VII 1894 auch auf Ceylon, nach Nevill handlist p. 222 auch auf den Nikobaren, nach Tapparone-Canefri auf Neu-Guinea bei Mansinam von Albertis gefunden.

Ausser den hier gekennzeichneten Arten sind noch die folgenden von verschiedenen Autoren als in Niederländisch-Indien vorkommend angegeben; ich muss es dahin gestellt sein lassen, wie weit dieselben sich bei näherer Kenntniss und reicherm Material bewähren werden.

*Pythia Reeveana* Pfr. monogr. Auricul p. 81 auf die von A.

Adams selbst als *scarabaeus* bezeichnete Art begründet, Reeve fig. 6 von Borneo, Celebes und den Philippinen.

— *albovaricosa* Pfr. novitat. I S. 6 Taf. 3 Fig. 1. 2 und monogr. p. 87 von Celebes, 44 Mill. lang, fast glatt, einfarbig bräunlich (abgerieben?), wenig von *scarabaeus* verschieden.

— *Celebensis* Pfr. monogr. p. 89, Reeve fig. 1 von Celebes, einfarbig gelblich, mit gelben Varicen, obere Parietalfalte einfach, Columellarfalte schwach, Mündungsrand violett-röthlich.

— *striata* Reeve, Pfr. monogr. p. 94, Reeve conch. ic. fig. 26. von den Philippinen, ist Quoy und Gaimard's *Aur. scarabaeus* ohne nähere Fundortsangabe, von Süd-Amboina und Haruku nach Böttger Ber. Senkenb. Ges. 1891 S. 277 und Shepman Not. Leyd. Mus. XV p. 154

— *crassidens* Hombron et Jacquinot (*Scarabus*) Voy. pole sud, Zool. V p. 40 pl. 10 fig. 12–14 von Amboina, möchte ich nach der Abbildung entschieden für ein unausgewachsenes Stück und zwar wahrscheinlich von *P. undata* halten, welche demnach auch auf Amboina vorkäme. Da bei dieser die eigenthümliche Skulptur erst auf der letzten Windung deutlich wird, ist es nicht zu verwundern, wenn sie auf der Abbildung noch nicht ersichtlich ist und in der Beschreibung, welche Rousseau nur nach der Abbildung gemacht hat, ohne die Exemplare vor sich zu haben, die Schale glatt genannt wird. Böttger dagegen, S. 275 a. a. O., erklärt sie für eine gute Art, welche Strubell auf Nord-Amboina, Haruku und Saporua gesammelt habe, und für identisch mit *P. Wallacei* Pfr. Proc. Zool. Soc. 1861 pl. 2 fig. 2 von Batjan, welche nach dem dünnen Mündungsrand zu urtheilen, wohl auch ein Jugendzustand ist. Shepman Not. Leyd. Mus. XV p. 154 hat sie auch von Saporua, zweifelt aber daran, dass sie von *P. striata* constant verschieden sei.

- pollex Hends Voy. Sulph., Zool. Moll. p. 60 pl. 16 fig. 9. 10, Pfr. mon. p. 87, Reeve fig. 7, von der Viti-inseln, soll nach Böttger Ber. Senkenberg. Gesellsch. 1891 S. 276 auch auf Haruku und Saparua vorkommen.
- semisulcata A. Ad., Pfr. mon. p. 93, unbekannten Fundortes, nach Böttger's Bestimmung bei Shepman Not. Leyd. Mus. XV p. 153 auf Saparua gefunden. „Species distinctissima“ Pfr.

#### 6. *Pythia undata* Less.

Scarabus undatus Lesson Voy. de la Coquille, Zool. II 1830 p. 336 pl. 10 fig. 6. Reeve in Ann. Mag. n. h. IX p. 219 pl. 4 fig. 4; conchol. system. II pl. 188 fig. 4; conch. icon. XII fig. 17. Küster Auriculac. S. 65 pl. 9 fig. 8, 9.

Polydonta abbreviata Beck ind. moll. 1837 p. 101.

Scarabus variabilis var. Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 10 fig. 7. 9.

Pythia undata (Less.) Pfeiffer mon. auricul. p. 90.

Scarabus avellana Reeve conch. icon. XII fig. 67t.

Etwas breit oval, mit unregelmässig wellenförmigen, unter sich anastomosirenden Längsrünzeln, einfarbig grünlichbraun. Nabel ziemlich weit. Obere Parietalfalte zweischenklig; Columellarfalte quer-gestellt, dick, in den innern Theil des Columellarrandes auslaufend. Aussenrand mit 4—5 grössern und öfters einigen kleinern Zähnen. 22—29 Mill. lang, 14—18 breit, Mündung  $15\frac{1}{2}$ —20.

Sumatra: Palembang, Teysmann in Mousson's Sammlung.

Madura bei Java, Reeve.

Bali bei Djembrana, Zollinger in Mousson's Sammlung.

Flores bei Oka unweit Larentuka, am Rand eines Baches ganz nahe am Meeresstrand, v. Martens.

Buru bei Kajeli in einem schwach-salzigen Strandsumpf, in Gesellschaft von Neritina dubia, v. Martens.

Ceram: Wahrscheinlich von Rosenberg, in Dunker's Sammlung. Insel Waigiou oder Waigame bei Neu-Guinea, Lesson.

Neu-Guinea, Hombron und Jacquinot.

Die eigenthümliche Sculptur tritt erst auf der letzten Windung und auch da in der zweiten Hälfte derselben stärker hervor; auf den früheren Windungen sind die Längsstreifen schwächer und mehr gerade, unter sich parallel; bei den Exemplaren von Buru sehe ich auch



1—2 vertiefte feine Spirallinien in der Nähe der Naht; dadurch nähert sie sich etwas der folgenden.

Da die angegebenen Fundorte eine weite Verbreitung über Niederländisch-Indien andeuten, so ist es auffallend, dass diese Art nicht auch neuerdings von Anderen wiedergefunden oder vielleicht auch nur nicht erkannt worden ist. *P. Cumingiana* Petit von den Philippinen und *P. leopardus* Reeve von Neu-Caledonien stehen unserer Art sehr nahe.

#### 7. *Pythia Borneensis* A. Ad.

*Scarabus Borneensis* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1850 p. 152; Metcalfe Proc. Zool. Soc. 1851 p. 72.

*Pythia Borneensis* Pfeiffer monogr. Auricul. p. 96.

Konisch eiförmig, durch vertiefte Spirallinien, welche unterhalb der Naht etwas stärker werden, und Längsstreifen fein gegittert, braun, etwas gebändert. Nabel (nach Schwaner's Exemplaren im Leydner Museum) zuweilen ganz geschlossen, zuweilen halbrund oder selbst in der Richtung des kleinen (nicht des grossen) Durchmessers linienförmig. Der Columellarrand ist tief zweigetheilt, sein innerer Schenkel setzt sich aber nicht wie bei *P. undata* in die Columellarfalte fort, sondern diese läuft an ihm vorbei bis zum äussern Rande. Obere Parietalfalte zweischenklig, untere durch ein hinzutretendes Zähnchen verdoppelt, 23 $\frac{1}{2}$ —25 Mill. lang, 11—12 breit, Mündung 16—17 Mill.

Borneo, Taylor bei A. Adams und Schwaner im Leydner Museum; speciell Gegend von Sarawak, Metcalfe.

#### **Cassidula** Fer., Gray.

Ferussac prodr. 1821 p. 105 als Untergattung von *Auricula*. — Gray Proc. Zool. Soc. 1847 p. 175. Pfeiffer mon. Auricul. p. 108.

Schale verkehrt eiförmig (d. h. das breitere Ende nach oben), spiral gefurcht, braun, einfarbig oder gebändert; bei den meisten Arten ein Spiralkiel in der Nabelgegend. Mündungsrand breit umgeschlagen, namentlich auch der Culumellarrand, rosenroth oder weisslich; zwei Parietal- und eine Columellarfalte; Aussenrand in Mitte und unterm Drittel breit nach innen ausgedehnt, dann nach oben plötzlich schmaler, wodurch eine vorspringende Ecke entsteht.

Weichtheile ähnlich wie bei *Pythia*: Fühler konisch, zugespitzt, Augen nach innen und hinten in einem hellen Hof der sonst stark

pigmentirten Nackenhaut. H. und A. Adams gen. moll. p. 238 pl. 82 fig. 2 lassen den Fuss am hintern Ende zweispitzig sein, ich habe das nie bemerkt und finde auch an den Zeichnungen des lebenden Thiers bei Hombron und Jacquinot und bei Souleyet den Fuss einspitzig. *Auricula monile* Q. G. aber, welche einen zweispitzigen Fuss hat und von Gray fig. moll. an. IV p. 118 als *Cassidula* aufgeführt wird, gehört der Schale nach entschieden zu *Melampus*. In den Beschreibungen ist öfters angegeben, dass die untere Paritalfalte sich in den Kiel um den Nabel fortsetze; in der That sieht man oft zwischen Columellarrand und der unteren Parietalfalte eine Verlängerung des Spiralkiels nach innen mehr oder weniger deutlich verlaufen, am schärfsten ausgeprägt bei Exemplaren welche noch jünger sind, indem hier noch keine neue Schichte auf den untern Theil der Mündungswand aufgelagert ist, also diese Fortsetzung des Spiralkiels trifft immer in einem spitzen Winkel auf die untere Parietalfalte, zuweilen in die Mitte derselben; nur wo letztere noch nicht ganz ausgebildet ist, trifft der Spiralkiel in einzelnen Exemplaren auch auf das äussere Ende der Falte, so dass der Schein einer unmittelbaren Fortsetzung, doch immer mit veränderter Richtung, entsteht. Als Art-unterschied sind diese Verhältnisse nicht zu verwenden, eben weil sie von der zeitlichen Ausbildung des Individuums abhängen.

*Cassidula* ist durch das ganze Gebiet des indischen Oceans im weitesten Sinn, von der Ostküste Afrikas bis Australien (Sydney) und Polynesien verbreitet, kommt aber ausserhalb desselben nicht vor.

1. *Cassidula auris-felis* Brug. Taf. VIII Fig. 12—14.

*Voluta coffea* Chemnitz Conch. Cab. IX 2 S. 45 Fig. 1043, 1044, gut, aber sehr gross, copirt bei Küster *Auricul.* Taf. 3 Fig. 3 Nicht Linne's *Vol. coffea*. Faÿanne conchyliologie pl. 65 fig. H 7, verkleinert.

*Bulimus auris-felis* Bruguière Encycl. method. Vers I, p. 343 (etwas unsicher, vielleicht eher *C. nucleus*), pl. 460, fig. 5.

*Auricula felis* Lamarck an. s. vert. ed. 1 VI, 2; ed. 2 VIII p. 226.

— Ferussac prodr. p. 115. — Souleyet Voy. Bonite, Zool. II p. 516 pl. 29 fig. 21—23, lebendes Thier, copirt bei Gray fig. moll. an. III pl. 304 fig. 3. — Metcalfe Proc. Zool. Soc. 1851 p. 72.

Sowerby bei Reeve conch. ic. XX fig. 25.

*Cassidulus Chemnitzii* Beck ind. moll. p. 105.

*Auricula fusca* Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 9 fig. 7, 9, fig. 8 lebendes Thier.

*Cassidula auris-felis* (Brug.) Proc. Zool. Soc. 1847 p. 179. Pfeiffer mon. Auricul. p. 117.

— *inflammata* (Bolten) Mörch catal. Yoldi p. 38.

— *coffea* Adams gen. moll. II p. 238 pl. 82 fig. 2, 2a (zu kurz).

Tapparone-Canefri Zool. Viagg. Magenta, Malac. (Mem. Accad. Torino 2 XXV 14 1874) p. 106.

Schale verhältnissmässig gross, mit nur schwacher Skulptur, etwas glänzend, kastanienbraun oder gelblich-braun, meist ein helleres mehr oder weniger bestimmtes Band etwas unterhalb der Naht. Mündung ziemlich eng, etwa  $\frac{3}{4}$  der ganzen Schalenlänge einnehmend; zwei Parietalfalten, die obere dünn und fast senkrecht, die untere etwas stärker und schief. Columellarfalte durch eine Furche mehr oder weniger bestimmt zweigetheilt, das untere Stück kleiner, Aussenrand frisch rosenroth, verbleicht weisslich; der verbreitete Mitteltheil desselben gekerbt. 24—31 Mill. lang, 16—19 breit, Mündung 20—25.

Benkulen auf Sumatra, v. Martens. Jibus auf Banka, Teysmann in Mousson's Sammlung. Java, Heusinger bei Pfeiffer; Novara Exped. und Magenta; Tandjong Priok bei Batavia, Strubell; bei Surabaya von mir gefunden. Borneo, Hombr. et Jacq.; Gegend von Sarawak, Metcalfe und Beccari. Arakan, Blanford. Mergui und benachbarte Inseln, auf Schlammflächen und in Mangle-sümpfen, Th. Philippi und J. Anderson. Bangkok im Kanalsystem zwischen dieser Stadt und Thachin, auf feuchtem Schlamm Boden, zur Zeit meiner Anwesenheit über Wasser; v. Martens. Daria in Cochinchina, Morelet. Manila, Cuming.

In Neu-Guinea und Polynesien scheint sie nicht vorzukommen.

## 2. *Cassidula multiplicata* Marts. Tab. VIII Fig. 2.

*Cassidula multiplicata* v. Martens Monatsberichte d. Berlin. Akad. d. Wiss. 1865 p. 54; Pfeiffer mon. Pneum. suppl. III p. 354.

— Bensoni (Pfr.) Martens Linn. Soc. Journ. XXI 1886 p. 166.

Ähnlich der vorigen, aber die Columellarfalte an ihrem äussern Ende durch Furchen in drei oder vier Stränge getheilt. Gewinde stumpf, mehr gewölbt als zugespitzt. Schultergegend mit kaum merklicher Kante, ohne helles Band oder nur mit schwacher Andeutung eines solchen nahe der Mündung; die Spiralfurchen unterhalb derselben oft, aber nicht immer, schwächer, als oberhalb. Aussenrand blass roth-

braun oder gelb-braun, sein verbreiteter mittlerer Theil mit einer oder zwei stärkeren Einkerbungen. 17—21 Mill. lang,  $11\frac{1}{2}$ —14 breit, Mündung 13—15 $\frac{1}{2}$ .

Bangka, Teysmann in Mousson's Sammlung. Singapore, häufig in Gesellschaft mit *C. mustelina* von mir gefunden. Elphinstone Bay bei Mergui, J. Anderson.

Diese Art habe ich in verschiedenen Sammlungen unter dem Namen *C. nucleus* gesehen, aber der ursprüngliche Typus von *C. nucleus*, Martyn universal conchology II pl. 67 (ed. Chenu pl. 24, fig. 2) von Otaheite, ist eine ganz andere Art, viel ähnlicher der *C. mustelina* Mouss., wenn nicht identisch mit derselben. Küster's Abbildung und Pfeiffer's Beschreibung von *nucleus* passen dagegen ziemlich gut zu dieser Art, doch ist bei beiden die Columellarfalte nur als doppelt angegeben; *C. nucleus* bei Gassies faun. conchyl. de la Nouv. Caledonie pl. 3, fig. 9 hat die Columellarfalte einfach und scheint kaum von *mustelina* verschieden. Unausgewachsene Exemplare zeigen die Columellarfalte noch ganz einfach und die Oberfläche von einer Cuticula bedeckt, welche vertikale Reihen von Häarchen zeigt, die aber sehr leicht abfallen und daher bei trockener Aufbewahrung meist verloren gehen; solche Exemplare habe ich a. a. O. irrig für *C. Bensoni* Pfr. gehalten. Eine ähnliche Behaarung kommt bekanntlich auch bei jungen Exemplaren von *Marinula Firmini* Payr. vor.

Die philippinische *C. Quadrasi* Hidalgo von Zebu zeigt dieselbe Zertheilung der Columellarfalte und ist auch in der ganzen Gestalt sehr ähnlich, zeigt aber nach dem mir vorliegenden Stücken tiefere Spiralfurchen auf dem ganzen letzten Umgang und bleibt etwas kleiner.

### 3. *Cassidula turgida* Pfr.

Pfeiffer in Malak. Blätt. 1854 S. 134; novitat conch. I S. 48 Taf. 12 Fig. 19, 20; monogr. Auricul. p. 115.

Gewissermassen eine *C. multiplicata* im Kleinen, nur 11—14 Mill. lang,  $8\frac{1}{2}$ —9 breit und die Mündung ebensolang, bauchig-eiförmig mit kurzem Gewinde und gitterförmiger Skulptur, im frischen Zustand an den Knotenpunkten mit Häarchen bedeckt, einfarbig dunkelbraun, zuweilen mit einem helleren Wachstumsabsatz; 2 Parietalfalten; Columellarfalte durch Furchen mehrfach getheilt, Aussenrand gelblich, der verbreiterte mittlere Theil öfters mit einem stumpfen Zähnen

gegenüber der untern Parietalfalte; auch in der obern Bucht über dem verbreiterten Theil meist ein stumpfes Zähnnchen.

Amboina, bei Weynita auf weichem Schlammgrund zwischen den Wurzeln von Rhizophoren, mit *C. sulculosa* zusammen, von Martens. Philippinen-insel Negros, Cuming.

Pfeiffer's grössere Varietät von Singapore,  $15\frac{1}{2}$  Mill. lang,  $9\frac{1}{2}$  breit, Mündung 11 Mill. lang, muss der *C. multiplicata* sehr nahe kommen.

*Cassidula Bensoni* Pfr. ebenda, Fig. 17, 18, monogr. 111 von Singapore ist dieser Art ähnlich, aber mit einfacher Columellarfalte.

4. *Cassidula mustelina* Desh. Tab. VIII, Fig. 15.

Knorr Vergnüg. d. Augen VI 1773, Taf. 17, Fig. 9.

*Auricula mustelina* Deshayes in Encycl. meth., Vers II p. 92 und Lamarck an. d. vert. ed. 2 VIII p. 336. Küster Auricul. S. Taf. 4. Fig. 3, 4. Metcalfe Proc. Zool. Soc. 1851 p. 72.

*Cassidulus mustelae* Beck ind. moll. p. 105.

*Cassidula mustelina* Pfeiffer mon. Auricul. p. 116. Gassies faune malac. de la Nouv. Calédonie p. 71, pl. 3, fig. 10. Tapparone-Canefri faun. mal. Nov. Guin. p. 223.

*Auricula rhodostoma* Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 9, fig. 1—3.

— *coffea*. (L.) Sowerby-Reeve conchol. icon. XII fig. 27.

Breit eiförmig, nach oben angeschwollen, mit kurzem Gewinde und zahlreichen schwachen Spirallinien, kastanienbraun und weisslich gebändert. Mündungsrand rosenroth, verbleicht weisslich.

Der verbreiterte mittlere Theil des Aussenrandes mehrfach eingekerbt, oberhalb desselben eine tiefe kurze Einbucht und darüber wieder ein stumpfes Zähnnchen. Obere Parietalfalte sehr schwach, mittlere nicht vorhanden, die untere und die Columellarfalte einfach, aber stark ausgeprägt. 22—27 Mill. lang,  $15—17\frac{1}{2}$  breit, Mündung 17—22 Mill.

Diese altbekannte und leicht kennbare Art ist von F. Jagor auf der kleinen Insel Nusa-Kembangan an der Südküste von Java gefunden und in einem ungewohnten grossen Exemplar, dessen Maasse oben als Maximum angeführt, dem Berliner Museum gegeben. Ferner wird sie aus Borneo von Metcalfe a. a. O., auch aus Java und aus Sumatra von P. Fischer catalogue d. distribut. géographique d. moll. terr. de l'Indochine 1891 p. 40 angeführt. Deshayes hat sie zuerst aus Neu-

seeland angegeben; Beccari hat sie auf den Aru-inseln, Hombron und Jacquinet auf Neu-Guinea gefunden, Montrouzier auf Neu-Caledonien, Cuming auf den Philippinen; in Castelneau's Sammlung sah ich sie von Chantabun in Siam. Pfeiffer nennt noch Singapore und Pulo-Pinang nach Bacon und Cantor, P. Fischer a. a. O. auch noch Cambodja, Formosa und Mauritius; von letztgenannter Insel habe ich zwar verschiedene Auriculiden, aber nie diese Art erhalten; ebenso wird das Vorkommen auf Neuseeland sehr zweifelhaft, Hutton führt sie in seiner zweiten Zusammenstellung der neuseeländischen Mollusken, manual 1880, gar nicht mehr an.

Die Bänder wechseln an Zahl und Breite; am konstantesten ist ein blass weissliches in der Schultergegend, dasselbe, welches auch bei *C. felis* angedeutet ist, und zwei andere in der untern Hälfte der Schale; ausserdem sind Naht und Nabelkiel weiss. An Einem Exemplar ist nur ein breiteres weisses Band in der Mitte, abgesehen von demjenigen an der Schulterhöhe. Wenn die weissen Bänder breit und die braunen Zwischenräume eng werden, so erscheint die Schale weiss mit 4 braunen Bändern. Bei einem Exemplar treten die Bänder erst nahe der Mündung auf, das Übrige ist ganz braun.

5. *Cassidula triparietalis* n. Tab. VIII. Fig. 16.

*Auricula nucleus* (Martyn) Gassies faune conchyliolog. de la Nouv. Caledonie 1863 p. 71, pl. 3, fig. 9.

*Cassidula distans* Mousson mscr. in seiner Sammlung.

Breit eiförmig mit ziemlich kurzem stumpfem Gewinde, mit zahlreichen sehr seichten Spiralfurchen; Aussenseite einfarbig schwarzbraun. Obere Parietalfalte sehr schwach, untere gut ausgebildet; eine weitere, etwas tiefer nach innen liegende, vertikal aufsteigende weissliche Falte zwischen beiden, doch der unteren näher. Columellarfalte stark, einfach, nicht bis an den Rand reichend; von ihrem äussern Ende erhebt sich eine vertikale Falte, welche bis zur innern Fortsetzung des Nabelkiels emporsteigt. Aussenrand und Columellarrand braungelb, mittlerer Theil des Aussenrands verbreitet, unterhalb der vorspringenden Ecke nicht eingekerbt; oberhalb jener Ecke ist der Aussenrand nur mässig eingebuchtet, die Bucht ist länger als tief, verliert sich allmählig nach oben und zeigt nur zuweilen einen ganz kleinen Vorsprung in ihrer Mitte. Im frischen Zustand ist die Aussenfläche der Schale mit kurzen Härchen besetzt, welche aber leicht abfallen, die Ober-

fläche bleibt aber dann matt und nur die Mündungswand ist glänzend. 15—21 Mill. lang, 9—13 breit, Mündung 11—17 Mill.

Ich fand diese Art zahlreich auf Batjan, im Mangle-dickicht auf von brackischem Wasser durchtränkten Grund, theils am Boden selbst, theils an den Wurzeln oder dem untersten Theil der Stämme von *Sonneratia*, theils auf am Boden liegenden Blättern und Zweigen; ebenfalls bei Wahai auf Ceram, auch im Mangle-dickicht. Kleinere Exemplare (15—16 Mill. lang) bei Oka unweit Larentuka auf Flores, am schlammigen Rand eines Bächleins ganz nahe am Meeresstrand. In Mousson's Sammlung sah ich 1864 übereinstimmende Exemplare von *Djembrana* auf Bali, durch Zollinger gesammelt.

Diese Art kann ich in keiner der vorhandenen Beschreibungen und Abbildungen wieder erkennen; in der allgemeinen, etwas verkehrt konischen oder Cassis-förmigen Gestalt gleicht sie der *C. mustelina* Desh., welche aber schon durch ihre Färbung auf den ersten Anblick sich unterscheidet, bei näherem Anblick auch durch den Mangel der dritten Parietalfalte und die tiefere aber kürzere Einbucht oberhalb des verbreiterten Theils des Aussenrandes. Von *C. nucleus* Küst. Auricul. Taf. 4. Fig. 5, 6 und Pfeiffer, mon. auricul. p. 115 (nicht Martyn), unterscheidet sie sich durch die einfache, nicht verdoppelte Columellarfalte; *C. nucleus* von Gassies faun. malac. de la Nouv. Calédonie 1863 p. 71 pl. 3 fig. 9 zeigt zwar die einfache Columellarfalte, ist aber schlanker, auch gebändert, ebenfalls ohne die dritte Parietalfalte und mit anderer Einbucht des Aussenrandes.

6. *Cassidula sulculosa* Mouss. Tab. VIII. Fig. 17.

*Auricula sulculosa* Mousson jav. moll. S. 45. Taf. 5. Fig. 8.

*Cassidula sulculosa* (Mousson) Pfeiffer mon. auricul. p. 114.

Von tiefen, nicht sehr gedrängt stehenden Spiralfurchen durchzogen, blass grünlich-gelb mit mehreren breiten dunkelbraunen Bändern; Gewinde verhältnissmässig länger als bei den vorigen und spitziger. Columellarfalte nach aussen tief herabsteigend und so gewissermassen einen innern Schenkel des zweigetheilten Columellarrands bildend; keine Verbindung zwischen den beiden Parietalfalten. 12—17 Mill. lang, 6—8½ breit, Mündung 8½—12.

Java: Bucht von Pampang, Residentschaft Banjuwangi, an den Wurzeln von Rhizophoren, Zollinger.

Celebes: Mündung des Djenemaedja in Luwu, Prof. Weber.

Molukken: Ternate, in Cuming's Sammlung und bei Landauer; Amboina an der Mündung des Flüsschens von Weynita und auf Ceram bei Wahai auf weichem von Salzwasser durchdrungenem Schlammgrund zwischen den Wurzeln der Rhizophoren, v. Martens.

Flores: am Rand eines Süßwasserbächleins, doch nicht weit vom Meere und ebenfalls auf weichem Grund, v. Martens.

Cuming hat sie auch auf der Insel Burias, Philippinen, gefunden, F. Jagor bei Legaspi an der Südostküste von Samar, ich auch bei Singapore.

Auch diese Art zeigt im frischen Zustand öfters Häärchen in Vertikalreihen.

7. *Cassidula Sowerbyana* Pfr. Tab. VIII. Fig. 3.

Pfeiffer in Zeitschr. f. Malak. 1853 S. 125; monogr. Auricul. p. 111. Tapparone-Canefri faun. malac. della Nuov. Guinea p. 227, fig. 7.

*C. decussata* A. Adams Proc. Zool. 1854, p. 111.

Länglichlich oval mit verhältnissmässig langem aber stumpfen gewölbtem Gewinde, fein gitterförmig gestreift, gelbbraun (nach Pfeiffer dunkel kastanienbraun, einfarbig). Obere Parietalfalte höckerförmig, untere stark, horizontal, an allen meinen Exemplaren sich fast direkt in den Nabelkiel fortsetzend, Columellarfalte stark, einfach. Mündungsrand blassgelb, Aussenrand in der Mitte zahnförmig verspringend, aber nur wenig verbreitert. 11—13½ lang, 7½—8 breit, Mündung 7—9 Mill.

Singapore, Pfeiffer, ebenda von mir gefunden. Wokan, Aruinseln, Beccari. Moretan-bai an der Ostküste Australiens, Pfeiffer.

Diese Fundorte machen es mehr als wahrscheinlich, dass die Art auch in Niederländisch-Indien vorkomme.

*Cassidula faba* Menke, Zeitschr. f. Mal. 1853 S. 124, Pfr. novitat. Taf. 2. Fig. 7, 9 und monogr. p. 110, von Java, durch Heusinger erhalten, ist dieser Art offenbar sehr nahe und scheint sich nur durch die breit-eiförmige Gestalt zu unterscheiden; wenn beide vereinigt werden sollten, so müsste der Name *faba* vorangestellt werden.

8. *Cassidula lutescens* Pfr. Tab. VIII. Fig. 18.

Pfeiffer mon. auricul. p. 113.

Mit lang vorstehendem spitzigen Gewinde und nur 1—2 Spiralfurchen unter der Naht, gelbbraun oder auch (nach dem Boden?) grün-



lich schwarz, meist einfarbig, selten mit Spuren von drei dunkelbraunen Bändern; Gewinde lang und spitz. Mündungsraum blass gelb oder bei den dunkeln Exemplaren trüb rosenroth. Columellarfalte stark, einfach, bis ganz nahe an den Rand fortgesetzt; die beiden Parietalfalten ziemlich gleich schwach, die obere viel mehr schief aufsteigend als die untere. Aussenrand deutlich doppelt, der äussere ausgebreitet, der innere gerade, nach innen in der Mitte verbreitert und hier unterhalb des grossen Zahns noch mit einem zweiten kleineren versehen, 10–15 Mill. lang, 6–8 breit, Mündung  $6\frac{1}{2}$ –8.

Pfeiffer kannte das Vaterland dieser Art nicht, ich glaube sie in einer Art wieder zu finden, welche ich auf den Molukken und zwar an der Ostküste von Halmahera, unweit Dodinga sammelte, auf Steinen dicht am Meere, aber noch über der gewöhnlichen Fluthhöhe; auch auf Gross-Tawalli nördlich von Batjan fand ich ein Exemplar, das einzige mit Spuren von Bändern, das ich gesehen. Die Färbung und ihr Spielraum erinnert an diejenige einer Schnecke aus einer ganz andren Ordnung, *Nassa corniculum* (Olivi) aus dem Mittelmeer, welche auch meist gelbbraun, seltener ganz dunkel und zuweilen mit Bändern verkommt; doch lebt diese mehr auf Tangen.

Jickeli, Land- u. Süssw. Moll. Nordost. Afrikas 1874 S. 186 vereinigt diese Art mit *C. labrella* Desh. von Mauritius und *C. Kraussi* Küst. von Südafrika; mir scheint sie jedoch durch die geringe Anzahl von nur 1 oder 2 Spiralfurchen zwischen Naht und Schultengegend, wo die afrikanischen eine grössere Anzahl zeigen, und durch das längere spitzigere Gewinde gut verschieden.

9. *Cassidula flaveola* Marts. Tab. VIII. Fig. 19.

Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. Berlin 1865 S. 24. Pfeiffer mon. pneum. IV, p, 351.

Klein, mit ziemlich langem konischem Gewinde und dichten Spiralfurchen, braungelb. Kiel der Nabelgegend kräftig ausgebildet. Die beiden Parietalfalten ziemlich schwach, die Columellarfalte einfach in den Columellarrand einbiegend. Aussenrand in der Mitte mit einer kurzen, mehr zahnförmigen Verbreiterung.  $9\frac{1}{2}$ – $10\frac{1}{2}$  Mill. lang,  $5\frac{1}{2}$  breit, Mündung 6 Mill.

Auf Ceram bei Wahai nur todt von mir gefunden.

*Ophicardelus paludosus* Garrett in Am. Journ. of Conchol. VII, p. 220, pl. 9, fig. 3. *Plecotrema paludosus* im Catalog von Godeffroy,

*Melampus paludosus* bei Pfeiffer pneum. IV p. 327 scheint dieser Art nahe zu stehen und jedenfalls zu *Cassidula* zu gehören.

10. *Cassidula Gruneri* Pfr.

Pfeiffer Malak. Blätt. 1854 p. 111; mon. Auricul. p. 109.

Noch kleiner, mehr bauchig, mit kürzerem Gewinde, spiralgefurcht, Kiel der Nabelgegend ganz undeutlich. Nur eine Parietalfalte (die untere). Columellarfalte einfach, den Rand nicht erreichend. Aussenrand nur mit einem kleinen Zahn in der Mitte, 7 Mill. lang,  $4\frac{1}{2}$  breit, Mündung 5.

Borneo, Gruner.

**Plecotrema** Ad.

Klein (5—8 Mill.) konisch, eiförmig, spiral gefurcht, gelblichbraun, ohne Basalkiel, 2 Parietalfalten, die untere verzweigt, eine Columellarfalte; Aussenrand verdickt mit 2—3 Zähnen.

Ich habe keine Art dieser Gattung selbst lebend gefunden und führe daher nur kurz die bis jetzt im Gebiet von Niederländisch-Indien vorgekommenen Arten an; nach der Habitus-ähnlichkeit mit *Pedipes* leben dieselben vermuthlich mehr auf Steingrund an der eigentlichen Meeresküste als im Brackwasser; doch führt Blanford Pl. Cumingianum ausdrücklich vom Irawaddy-delta an.

*Pl. exaratum* Ad. Proc. Zool. Soc. 1853 p. 122 Pfr. mon. Auric. p. 104. Borneo, A. Adams.

— *punctigerum* Ad. Proc. Zool. Soc. 1853 p. 120. Pfr. mon. Auric. p. 105. Borneo, Taylor. Singapore, Bacon.

— *punctatostriatum* Ad. Proc. Zool. Soc. 1853 p. 121. Pfr. mon. Auric. p. 106. Borneo und Singapore, Taylor.

— *imporforatum* Ad. Proc. Zool. Soc. 1853 p. 120. Pfr. mon. Auric. p. 106. Ein wahrscheinlich hieher gehöriges Exemplar aus Madura in Mousson's Sammlung. Sonst von den Philippinen bekannt.

**Auricula** Lam. s. str.

*Auricula* Lam. 1799. *Auriculus* Montf. 1810. *Marsyas* Oken 1815.

*Ellobium* (Bolten 1798) Adams gen. 1854.

Schale verhältnismässig gross, cylindrisch-eiförmig oder etwas seit-

lich flachgedrückt, etwas gekörnt, unter einer einfarbig gelbbraunen ziemlich leicht verloren gehenden Schalenhaut weiss.

Mündung mit Einer starken Columellarfalte, darüber zuweilen noch 1—2 kleinere; Aussenrand verdickt, aber nicht ausgebreitet. Fühler lang, in eine schief aufgesetzte längliche Anschwellung endigend; Augenpunkte unter der Haut versteckt, innerhalb der Basis der Fühler.

Schon Lesson, Voyage de la Coquille 1822—25, veröffentlicht 1830, hat die Augen bei *A. Midae* an der gewöhnlichen Stelle vermisst und die Anschwellung an der Spitze der Fühler gesehen, aber einen schwarzen Punkt in diese hineinzeichnen lassen; er wurde deshalb von Deshayes leise, von Küster (*Auriculaceen* S. 68) unverdient hart getadelt; selbst Gray nahm Lesson's sonst richtige Zeichnung nicht in seine Sammlung der figures of molluscos animals auf, wahrscheinlich weil Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe in ihrer Zeichnung des Thiers derselben Art die Fühler einfach zugespitzt enden lassen, übrigens richtig die rudimentäre Beschaffenheit und subcutane Lage der Augen bemerkten. Später hat Souleyet, Vog. de la Bonite, dasselbe bei der kleineren Art, *A. Judae*, wieder gefunden und richtig abgebildet. Von den früheren Lehrbüchern hat nur Rang, manuel des mollusques 1829, diese Ausnahme von den übrigen *Auriculiden* erwähnt, p. 173 „tentacules en forme de gland an sommet“. Ich habe sowohl *A. Midae* als *Judae* lebend gesehen und bei beiden die eigenthümliche Anschwellung gefunden, bei *A. Judae* auch den schwarzen Punkt im Innern der Fühler zuweilen vom äussern, zuweilen vom innern Rand der Fühler aus durchscheinen sehen, zuweilen auch gar nicht, je nach der Streckung des Fühlers; bei *A. Midae* aber, bei welcher die Haut stärker und mehr grobkörnig ist, konnte ich den Augenpunkt gar nicht von aussen erkennen. (*Malak. Blätt.* 1863 S. 126).

Diese Verkümmernng der Augen hängt wohl damit zusammen, dass die Thiere öfters in den Grund oder in vermoderndes Holz eingebohrt leben, wie es Lesson bei *Auricula Midae* und ich bei *A. Judae* gesehen.

#### 1. *Auricula Midae* L.

Lister hist. conch. suppl. 1692 pl. 1058 fig. 6.

Midas-Ohr und Cylinder lutarius Rumph amb. rar. p. 107 und 120  
(deutsche Ausg. S. 80 und 100) Taf. 33 Fig. H H, fälschlich links,

copirt von Klein meth. ostrac. Taf. 7 Fig. 122, verbessert in der deutschen Ausgabe.

*Strombus integer* etc. Gualtieri ind. test. tab. 55 fig. 9.

Oreille de Midas Argenville conchyliologie ed. 1 1742 p. 270 pl. 15 fig. G; ed. 2. pl. 10 fig. G.

*Bulla auris-Midae* Linne syst. nat. ed. X p. 728.

*Voluta* „ „ „ „ „ ed. XII p. 1286. Gmelin ed. XIII p. 3435.

*Auris-Midae* etc. Martini Conchyl. Cabinet II p. 121 fig. 436, 438, copirt in der neuen Ausgabe von Küster, Auriculaceen Taf. 2 Fig. 1—3. Favanne conchyliologie pl. 65 fig. H 2, recht gut.

*Helix auris-Midae* O. Fr. Müller hist. verm. p. 110.

*Bulimus auris-Midae* Bruguière Encycl. method. pl. 460 fig. 6.

*Auricula Midae* Lam. an. s. vert. VI p. 137; ed. 2 VIII p. 323.

Leach zool. miscell. I p. 74 pl. 32. Ferussac prodrome p. 102.

Lesson Voyage de la Coquille, Zool. II p. 337, atlas Moll. pl. 9 fig. 1 A—C, lebendes Thier, vgl. oben. — Quoy et Gaimard, Voy.

Astrolabe Zool. II p. 156 pl. 14 die ganze Tafel, lebendes Thier, und Anatomie, vgl. oben, ersteres copirt in Oken's Isis 1834, p. 285 Taf. 2, in Oken's allg. Naturgeschichte Taf. 23 Fig. 9, in Küster's Auriculaceen Taf. A fig. 1 und in Gray's fig. moll. an. III pl. 306 fig. 12. — Pfeiffer mon. Auriculac. p. 125. — Martens Mal.

Blätt. X 1863 p. 126. Sowerby bei Reeve conch. ic. XX fig. 1.

Die grösste Art, 65—106 Mill. lang und 34—53 breit, meist etwas seitlich zusammengedrückt, indem eine halbe Windung vor der Mündung ein früherer Mündungsrand (Varix) vorhanden ist; nur Eine Falte an der innern Mündungswand oberhalb der starken Columellarfalte. Frisch lebhaft kastanienbraun, äusserer Mündungsrand blass röthlich.

Lebt nach Rumph in den morastigen Sagu-wäldern [*Metroxylon Rumphii*, vgl. *Potamides palustris*] oder auch in morastigen Flüssen, „daher man sie nicht zu den Seeschnecken rechnen kann“, aber doch nach p. 107 (80) in salzigem Schlamm (braak slyk). Lesson fand sie lebend eingegraben in den weichen Grund (*enfoncee dans la terre meuble*) am Fuss von Bäumen, 12 bis 15 Schritte vom Rand des Meers.

Ich fand sie bei Wahai auf Ceram auf Sumpfboden nahe am Meer im Mangledickicht, wo keine ächten Landschnecken zu sehen waren.

Quoy und Gaimard haben sie mehrere Tage unter Wasser lebend erhalten.

Diese Art ist im malayischen Archipel von Malakka bis Neu-Guinea verbreitet; von Malakka erhielt das Berliner Museum Exemplare durch Feod. Jagor, von Singapore ist sie im Calcutta-Museum vertreten, von Siam in den Sammlungen von Rob. Schomburgk und Vic. Castelneau, von Kampot in Cambodja durch P. Fischer, von Tonkin durch Mabilie angegeben, von Palembang auf Sumatra und Jebus (Djeboes) auf Banka ist sie durch Teysmann in Mousson's Sammlung, von Java im Leydner Museum und speciell von Batavia durch Gruner in Dunker's Sammlung, von der Nordwestküste Borneo's sah ich sie bei Stevens in London, an der Nordostküste bei Ligiton fand sie A. Adams, Zool. of the Samarang, Moll. p. VI; vom südlichen Celebes bei Boni im Leydner Museum, von Ceram auch im Mousson's Sammlung, Lesson sowie Quoy und Gaimard fanden sie bei Port Dorey in Neu-Guinea, Beccari auf den Jobie- und Aru-inseln.

Man kann zwei Formen unterscheiden,

1) eine breitere, seitlich mehr zusammengedrückte, gewissermaassen Ranella-artige, indem ein früherer Mündungswulst gerade einen halben Umgang von der bleibenden Mündung nach rückwärts entfernt ist, die Breite  $\frac{6}{10}$  oder  $\frac{7}{10}$  der Länge. Hieher alle von Jagor bei Malakka gesammelte Stücke, das Steven'sche von Nordwest-Borneo und die Abbildungen bei Rumph, in der Encyclopédie, bei Leach und Reeve fig. 1.

2) eine schmalere, mehr cylindrische, bei welcher der frühere Mündungswulst nicht um eine halbe Windung, sondern nur um  $\frac{1}{4}$  oder weniger von der Mündung absteht, die Breite ungefähr die Hälfte der Länge oder noch etwas weniger; hieher meine Exemplare von Wahai auf Ceram, ein Stück von Halmaheira (Landauer), das Stück aus Java im Leydner Museum, die Abbildungen bei Gualtieri, bei Martini, bei Quoy u. Gaimard und bei Reeve, fig. 1b.

## 2. *Auricula subnodosa* Metc.

*Auricula subnodosa* Metcalfe Proc. Zool. Soc. 1851 p. 72. Pfeiffer novitat. conch. I p. 4 Taf. 2 Fig. 10, 11; monogr. Auricul. p. 127.  
— Malchi (Müll.) Reeve conch. ic. XX fig. 2. Issel moll. borneensi (Ann. Mus. civ. stor. nat. Genova VI 1874) p. 57 (420).

Die einzelnen Windungen nach oben stärker gewölbt, die letzte und zuweilen auch die vorletzte mit einigen faltenartigen Knoten versehen. Mündungsfalten wie bei *A. Midae*. Grösse etwas geringer, das grösste

Exemplar, das ich sah, 80 Mill. lang, 40 breit, Mündung 33, durch Resident Schwaner im Leydner Museum (Aur. Schwaneri Herklots in coll.), das von Pfeiffer beschriebene, etwas grösser 81, 41 und 42, das grösste in Pätel's Sammlung 75, 40 und 43, das kleinste, das ich kenne nur 64, 35 und  $46\frac{1}{2}$ .

Hauptsächlich von Borneo bekannt, von wo Metcalfe sie aus Sarawak erhielt, ich sie bei Singkawang im holländischen Gebiet fand, Doria und Beccari wieder bei Sarawak. Im Leydner Museum ist ein Exemplar, das vielleicht aus Java stammt, durch Groen erhalten. Ich möchte auch ein kleines Exemplar, das ich zu Singapore mit A. Judae zusammen gefunden, noch zu dieser Art rechnen.

Müller's *Helix auris Malchi*, hist. verm. II p. 112, Chemnitz Conch. Cab. IX 2 p. 41 Taf. 121 Fig. 1037, 1038 war ich früher auch geneigt für identisch mit A. subnodosa zu halten, namentlich wegen der Worte: „anfractus costati, costae sive tubera elevata in extimo et in quibusdam quoque in penextimo margine“. Aber die Betrachtung der Abbildung bei Chemnitz, welche doch wohl eines der Original-exemplare darstellt, scheint mir doch besser auf A. Midae zu passen und jene Worte demnach sich nur auf die Varicen zu beziehen; auch ist es nicht wahrscheinlich, dass Müller schon eine Art aus Borneo kannte. Das Kennzeichen, auf welches Müller das Hauptgewicht legt, ist „axi exciso patentissimo“ was in der Beschreibung näher ausgeführt wird: „Paries anfractus majoris aperturae oppositus segmentum „circuli quasi arte adeo excisus, ut omnium anfractuum interiora „pateant, totaque cochleae structura ad summum verticem usque oculis sistatur“.

Es ist das entweder ein ungewöhnlich weit nach vorn fortgesetztes Vorschreiten der Resorbirung der innern Wände, welche an sich für die meisten Auriculiden charakteristisch ist, oder vielleicht noch wahrscheinlicher mechanische Abreibung durch Einsiedlerkrebse, welche in den betreffenden Exemplaren geherbergt haben, wie schon Chemnitz und Bruguière vermutheten; an den verschiedensten Arten von Meer-schnecken habe ich solche Defekte der innern Fortsetzung der Mündungswand bei von Einsiedlerkrebsen bewohnten Stücken gesehen, oft ganz scharf abgeschnitten, und eine Auswahl von solchen in der Schausammlung des Museums für Naturkunde in Berlin aufgestellt.

Auricula Mörcchi Menke Zeitschr. f. Malak. 1853 p. 124, Pfr. novitat. conch. I S. 3. Taf. 2 Fig. 1. 2; monogr. Auricul. p. 128, vielleicht

von Java, ist mir als eigene Art verdächtig, indem im Berliner Museum ein Exemplar, leider unbestimmter Herkunft sich befindet, welches zwischen dieser *A. Mörchi* und der normalen *A. subnodosa* in der Mitte steht und bereits Spuren der charakteristischen Knoten auf der letzten Windung zeigt, welche der von Menke beschriebenen noch fehlen. Eine Vergleichung der Dimensionen ergibt:

	Länge	Breite	Mündung	
<i>A. Mörchi</i>	40	22	28	Mil.
Mittelform	53	30	34	"
<i>A. subnodosa</i> , klein	67	36	42 $\frac{1}{2}$	"
" gross	80	40	48	"

Es ergibt sich daraus, dass auch schon bei kleineren ausgebildeten Formen von *A. subnodosa* die Breite mehr als die Hälfte der Höhe ausmacht. Die schwächere Wulstauflagerung auf der Mündungswand, die nach unten schmalere und etwas eckige Form der Mündung und die geringere Verdickung des Aussenrandes, welche als Unterschiede von *A. Mörchi* gegen *subnodosa* bei Vergleichung der Pfeifferschen Diagnose sich ergeben, passen ganz gut zu der Annahme, dass erstere ein Jugendzustand der letzteren sei, der schon einen vorläufigen Mündungsrand (künftigen Varix) gebildet, dem aber noch etwa eine Windung zur Vollendung fehlt.

Auch *Auricula Scheepmakeri* [Petit Journ. d. Conchyl. I 1850 p. 405, leider ohne Abbildung, und darnach Pfeiffer monogr. Auricul. p. 128, angeblich von Sumatra, scheint noch eine zweifelhafte Art; sie ist meines Wissens nicht wiedergefunden; sie schliesst sich in der Grösse (80 Mill.) und dem Vorhandensein von nur 2 Falten an *A. Midae* und *subnodosa* an, die Mündung soll aber nur die Hälfte der ganzen Länge ausmachen, was nicht einmal bei den gestrecktesten Formen von *A. Judae* erreicht wird.

### 3. *Auricula Judae* L. Tab. VIII Fig. 6–11.

Lister hist. conch. I 1685 pl. 32 fig. 30. — Bonanni observ. circa viv. 1691 p. 322 fig. 37 und im Mus. Kircherianum III fig. 412. Die kleinere Art des *Cylinder lutarius*, Rumph. amb. rar. S. 120 (deutsche Ausg. S. 100).

*Bulla auris* — *Judae* Linne syst. nat. ed. X p. 728.

*Voluta* " " " " " " XII p. 1287; Gmelin ed. XIII p. 3437.

*Auris Midae tridentata* Martini Conch. Cabinet II p. 128 fig. 449—451; Schröter Geschichte d. Flussconchylien S. 315 Taf. 9 Fig. 10 (nicht ausgewachsen).

*Helix auris* — Judae O. Fr. Müller hist. verm. II p. 109.

*Auricula Judae* Lam. hist. d. an. s. vert. ed. 1. VI 2 p. 137; ed. 2. VIII p. 324. Ferussac prodr. p. 102. Lesson Voy. Coquille, zool. II p. 338. Souleyet Voy. Bonite, Zool. II p. 515 pl. 29 fig. 19, 20, lebendes Thier, copirt bei Gray fig. moll. an. III pl. 304. fig. 4. Beck ind. moll. 1837 p. 103. Küster Auriculaceen S. 15 Taf. 3 Fig. 1. 2. (jung). Pfr. mon. Auricul. p. 130. Woodward manual pl. 12 fig. 35. Nevill handlist I p. 225. Tapparone-Canefri faun. malac. della Nuova Guinea 1883 p. 217. Reeve conch. ic. XX fig. 16 jung, 16b erwachsen.

— *reticulata* Schumacher essai syst. test. p. 229. Anton verz. conch. p. 48.

— *tridentata* Mörch catal. Yoldi p. 37.

Ziemlich cylindrisch, runzlig und nur schwach granulirt; zwei Falten auf der Mündungswand oberhalb der Columellarfalte, welche verhältnissmässig schwach und fast senkrecht ist.

Sehr variabel in der Gesamtgestalt: die absolute Länge wechselt an den von mir gemessenen, als erwachsen anzunehmenden Exemplaren zwischen  $68\frac{1}{2}$  und 30 Mill., die absolute Breite zwischen  $24\frac{1}{2}$  und  $13\frac{1}{2}$  die Länge der Mündung zwischen 38 und 21; relativ wechselt die Breite zwischen  $\frac{1}{2}$  und  $\frac{1}{3}$  der Länge, die Mündung zwischen  $\frac{3}{4}$  und  $\frac{3}{5}$  der Gesamtlänge. Noch nicht ganz ausgewachsene Exemplare können schon einen verdickten Aussenrand haben, da auch bei dieser Art Varicen vorkommen, sind aber doch daran zu erkennen, dass dieser Rand nicht sehr dick und nicht breit nach aussen umgelegt, namentlich aber der unterste Theil der Mündung schmal und nicht ausgebreitet ist; die Abbildungen bei Schröter und Küster scheinen mir solche Jugendzustände darzustellen.

A. Judae fand ich zu Singapore im Brackwassergräben im Cocoswäldchen am östlichen Ende der Rheede; bei Larentuka an einem Bächlein nahe am Meeresstrand, in faulendes Holz eingebohrt. Lesson fand sie in der Mitte schlammiger Sümpfe (au milieu des marécages fangueux) welche von grossen Mangle-sträuchern bedeckt waren, Th. Studer in der Galewostrasse (Neu-Guinea) in Mangle-sümpfen, Souleyet auf Pulo Pinang in Brackwassersümpfen nahe am Meeresufer.

Sie scheint nach beiden Seiten noch etwas weiter verbreitet zu



sein, als ihre grössere Schwester *A. Midae*. Abgesehen von Bombay an der Westküste von Vorderindien, was Nevill a. a. O. für eine Varietät von *A. Judae*, Mitchell (catal. Mollusc. Madras Mus. 1867 p. 53) für eine mir unbekannte *A. fustis* Bens. angibt, ist sie an der Ostküste von Vizagapatam, halbwegs zwischen Madras und Calcutta im Madras Museum vorhanden (Mitchell ebenda), von Port Cuning an der Ganges-Mündung, von Arakan und den Andamanen im Calcutta-Museum (Nevill), vom Irawaddj-delta (Blanford), von Mergui in Tenasserim und den benachbarten Inseln durch Th. Philippi und John Anderson (Journ. Linn. Soc. Zool. XXI 1886 p. 166), von der Insel Salang durch Joh. Weber im Berliner Museum, auf Pulo Pinang von Souleyet beobachtet und auch im Calcutta-Museum, von Malakka schon von Humphreys bei Ferussac angegeben, bei Singapore von Feod. Jagor, mir und Nevill gefunden. Aus Siam sah ich sie in der Sammlung von Castelnau, aus Cochinchina erhielt sie Morelet. Auf Sumatra fand sie Teysmann bei Palembang, auf Banka derselbe bei Jebus und ich bei Muntok, auf Java Strubell bei Tandjong Priok, Resid. Bantam; von Sumenap auf Madura ist sie in Mousson's Sammlung. An der Westküste von Borneo sah ich sie bei Mampawa und Singkawang; Aus Süd-Celebes ist sie im Leydner Museum von Makassar, und ebenda wurde sie von mir gefunden, aus Nord-Celebes von den Togian-inseln in der Bucht von Gorontalo durch A. B. Meyer im Berliner Museum. Für die Philippinen wird ihr Vorkommen von Mörch (cat. collect. Kierulf) Beck und L. Pfeiffer bezeugt, in Mousson's Sammlung ist eine kleine Form, 30 Mill. lang, von Manilla. Auf der Molukken fand ich sie in den Strandsümpfen von Batjan und von Wahai auf Ceram, Lesson auf der Insel Buru, Th. Studer (Exped. d. Gazelle) auf Amboina selbst und daran schliesst sich ihr Vorkommen auf den Aru-inseln (Beccari), Waigiou oder Waigame (Lesson), Salawatti (Exp. d. Gazelle) und Neu-Guinea selbst (Albertis). Östlich von Java leitet das Vorkommen auf Flores, wo ich sie bei Larentuka und Oka, und auf Timor, wo ich einzelne Stücke bei Kupang, Th. Studer bei Pariti fand, nach Australien hinüber, wo sie nicht nur im nördlichsten noch tropischen Theil bei Cap York (Cox bei Nevill), sondern auch an der Westküste bis mindestens zur Meermädchenstrasse etwas südl. vom Wendekreis (Exp. Gazelle), an der Ostküste bis Queensland (Mus. Godeffroy) vorkommt.

Bei dieser weiten Verbreitung und der grossen Variabilität in der äussern Form, die sich aus den verschiedenen Combinationen innerhalb der oben angegebenen Gränzen ergibt, ist es nicht zu verwundern, dass manche Autoren nicht nur verschiedene Varietäten (Lesson, Beck, Tapparone-Canefri), sondern auch besondere Arten unterschieden haben, welche schliesslich doch auf individuelle oder lokale Variationen herauskommen, aber kaum ein abgeschlossenes geographisches Gebiet für sich haben dürften. Für solche Variationen bin ich geneigt zu halten:

- A. *ponderosa* Ferussac prodr. p. 102, Pfr. mon. 131, Bonanni Kirch. fig. 412, Philippinen?, anscheinend dieselbe mit Pfeiffer's *turrita*.
- *reticulata* Anton verz. conch. samml. 1839 p. 48, eine kleine, stark gekörnte Form mit kurzem Gewinde, schon von Pfeiffer p. 131 zu Judae als Varietät gestellt.
- *polita* Metcalfe Proc. Zool. Soc. 1851 p. 132 Pfr. novitat. I Taf. 7 Fig. 12. 13; mon. p. 132, Issel moll. Born. p. 59 mit einer var. *elata*, aus Borneo, ist doch vielleicht nur eine nicht ganz vollständig ausgebildete A. Judae.
- *dactylus* Pfr. novitat. conch. I Taf. 5 Fig. 15, 16; mon. p. 129, von Borneo, aber nach Nevill auch von Port Canning, Arakan, den Andamanen und Singapore, nach Brazier auch in Neu-Guinea, also ungefähr im ganzen Gebiet von A. Judae; schon von Nevill als Varietät zu A. Judae gestellt, worin ich ihm nur recht geben kann; es ist eine verhältnissmässig grosse und dicke, stark granulirte Form mit kürzerem Gewinde, so zu sagen, eine var. *reticulata* im Grossen.
- *turrita* Pfr. novitat. conch. I Taf. 4 Fig. 8. 9; mon. p. 129. Reeve conch. ic. fig. 31 von den Philippinen. Scheint zwar durch auffallende Schlankheit sehr verschieden, aber das Berliner Museum besitzt ein Exemplar (var. *subturrita* m.), leider ohne Fundortsangabe, das zwischen dieser und einer normalen Judae gerade in der Mitte steht, und daher den Werth dieser Unterschiede sehr beeinträchtigt.
- *Australiana* Tapparone-Canefri Zool. viaggio Magenta, Malac. (Mem. Accad. Torin. 2. XXVIII 1874) p. 105 Taf. 2 Fig. 10, ziemlich lang gestreckt, von Australien; der Verfasser bezeichnet sie selbst als zwischen A. Judae und *turrita* stehend.

Ein Zusammenstellung der Formverhältnisse dieser angeblichen Arten ergibt Folgendes:

	Länge	Breite		Mündung	
	absolut	absolut	im Verhältn. zur Länge	absolut	im Verhältn. zur Länge
Judae sehr gross	68 $\frac{1}{2}$ Mill.	24 $\frac{1}{2}$	= $\frac{3}{23}$ Mill.	38	= $\frac{5}{8}$ Mill.
normal, fig. 7	53 "	22	= $\frac{2}{5}$ "	34	= $\frac{3}{5}$ "
klein, fig. 8	44 "	18	= $\frac{2}{5}$ "	26	= $\frac{2}{3}$ "
jung	43 "	20	= $\frac{5}{11}$ "	29 $\frac{1}{2}$	= $\frac{1}{2}$ "
var. dactylus Pfr.	52 "	25	= $\frac{1}{2}$ "	31	= $\frac{3}{5}$ "
— polita Metc.	57 "	24	= $\frac{3}{7}$ "	39	= $\frac{2}{3}$ "
— elata n	47 "	20	= $\frac{5}{12}$ "	30	= $\frac{5}{8}$ "
— subturrita n fig. 9	48 "	17	= $\frac{1}{3}$ "	29	= $\frac{5}{8}$ "
— turrita Pfr.	50 "	16	= $\frac{3}{10}$ "	24 $\frac{1}{2}$	= $\frac{1}{2}$ "
— subponder. n fig. 11	49 "	23	= $\frac{1}{2}$ "	35	= $\frac{5}{7}$ "
— — klein fig. 10	35 "	17	= $\frac{1}{2}$ "	23	= $\frac{5}{7}$ "
— reticulata Ant.	28 $\frac{1}{2}$ "	14	= $\frac{1}{2}$ "	20	= $\frac{2}{3}$ "

#### **Auriculastra** Marts.

Schale länglich, nicht gekörnt, mit einer Parietal- und einer Columellarfalte; Aussenrand etwas verdickt, aber ohne Zähne.

Augen an der Oberfläche der Innenseite der Wurzel der Fühler, wie bei der Mehrzahl der Auriculiden.

##### 1. *Auriculastra subula* Q. G.

*Auricula subula* Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe, Zool. II p.

171 pl. 13 fig. 39, 40 kopirt bei Küst. Auricul. Taf. 8 fig. 9. 10.

Desh. Lam. an. s. vert. ed. 2 VIII p. 334. — A. Adams und

Reeve Zool. Voy. Samarang, Moll. p. 55 pl. 14 fig. 15, lebendes

Thier. — Pfeiffer mon. Auricul. p. 141. — Sowerby-Reeve conch.

icon. XX fig. 12. — Tapparone-Canefri faun. malac. della Nuova

Guinea p. 222. — Gassies faune conchyl. de la Nouv. Calédonie

p. 69 pl. 6 fig. 4. — Canefri faun. malac. della Nuova Guinea p. 222.

*Pythia subula* Beck ind. moll. p. 104.

*Auricula*, eine weit kleinere Art, v. Martens Malak. Blätt. 1863

S. 127.

*Marinula* (*Auriculastra*) *subula* v. Martens in Möbius Beiträge zur Meeresfauna v. Mauritius 1880 S. 208.

*Auricula* (*Auriculastra*) *subula* v. Martens in Linn. Soc. Journ. XXI 1886 p. 167.

Länglich spindelförmig, glatt und glänzend, einfarbig bräunlich gelb; Gewinde, wenn gut erhalten, sehr spitzig, aber oft cariös; Naht oft zackig eingerissen. Mündung innen weiss, oben sehr spitz. Eine ziemlich starke, quer verlaufende Parietalfalte, der unteren bei *Auricula Judae* und bei *Cassidula* entsprechend. Columellarfalte klein, ziemlich vertikal, Columellarrand bei unausgewachsenen Stücken unten abgestutzt. Aussenrand ziemlich geradlinig, unten sehr dick, in der Mitte etwas anschwellend. 11–15 Mill. lang, 5–5½ breit, Mündung 5–8 Mill.

Port Canning in Bengalen, Wood-Mason bei Nevill. Mergui, auf Schlammflächen, J. Anderson. Singapore, Benson in Mousson's Sammlung. Petshabari in Siam, v. Martens. Nördliches Celebes an schlammigen Flussufern über dem Bereich des Wassers, A. Adams.

Dodinga auf Halmaheira und Wahai auf Ceram, am Meeresstrand und im Mangle-dickicht auf Schlammboden, an letzterer Stelle zusammen mit *Auricula Midae* von mir gefunden, ferner bei Oka unweit Larentuka auf Flores, am schlammigen Rand eines Baches, nahe dem Meeresstrande, zahlreich, lebend. Philippinen, Cuming. Palaos, Semper. Key-inseln, Beccari. Port Dorey auf Neu-Guinea, Raffray. Neu-Ireland, Quoy und Gaimard. Neu-Caledonien, Gassies.

Der Unterschied zwischen unausgebildeten Stücken mit, wie bei *Achatina* abgestutzter Columella und vollständig ausgebildeten, bei denen der Columellarrand sehr dick ist und nur durch eine öfters kaum merkliche Falte vom Unterrande sich abgränzt, ist so beträchtlich, dass man erst durch eine Reihe von Exemplaren von dem völligen Übergehen der einen in die andern sich überzeugt. Daher auch die verschiedenen Angaben über die Zahl der Columellarfalten bei verschiedenen Autoren. *Auricula elongata* Parr., Pfr. mon. Auric. p. 140 von den Sandwich-inseln liegt mir in denselben zwei Formen vor und damit fällt der Unterschied, welchen Pfeiffer in der Anzahl der Columellarfalten zwischen *A. elongata* und *subula* angibt, weg, so dass erstere hauptsächlich nur noch durch die dunkle schwarzbraune Farbe von *subula* sich unterscheiden lässt und vielleicht nicht scharf von ihr getrennt werden kann. Quoy und Gaimard scheinen von *A. subula* nur

die unausgebildete Form gekannt zu haben, da sie die 3 Columellarfalten in die Diagnose aufnehmen, (die erste ist die Parietalfalte, die dritte die Abstützung des Columellarrandes) und ebenso Pfeiffer, „plicis 2 columellaribus, oblique tortis; peristoma simplex“, dagegen von *A. elongata* nur die ganz erwachsene „plica columellaris exigua, leviter torta, margine dextro intus calloso, columellari dilatato adnato“. Dagegen hat schon A. Adams a. a. O. angegeben, dass an jungen Stücken die Columella abgestutzt und die Aussenlippe dünn sei, was ich erst bemerkte, nachdem ich an den von mir gesammelte Exemplaren zu demselben Resultat gekommen war.

*Auricula Dunkeri* Pfr. von Borneo, mon. Auric. p. 360, kann ich nach der Beschreibung nicht von einer völlig ausgewachsenen *A. subula* unterscheiden, nur ist sie grösser, 20 Mill. lang, Mündung 13, als ich *subula* je gefunden; abgebildet ist sie nicht; nach Issel auch auf Neu-Guinea.

*Auricula semiplicata* Ad. von Singapore, Pfr. novitat. I Taf. 6, Fig. 3, 4. *A. saccata* Pfr. von Manila, mon. Auric. p. 140 und *A. Oparica* Ad. stehen der Schale nach der *subula* so nahe, dass sie höchstwahrscheinlich auch in der Augenstellung mit ihr übereinstimmen und demnach zu *Auriculastra* gehören. Wie es sich aber hierin mit *A. pellucens* Menke, für welche sehr verschiedene Fundorte angegeben werden, verhalte, muss die Zukunft lehren. *A. gangetica* Bens., *tornatelliformis* Petit und *stagnalis* Orb. dürften vermuthlich, der granulirten Oberfläche wegen, in derselben Gattung mit *A. Judae* und *Midae* bleiben. Auch *Melampus Wilkei* Dohrn, Pfr. mon. pneum. IV p. 325 dürfte besser hier als unter *Melampus* stehen.

### **Melampus Montf.**

*Melampus* Montfort Conch. syst. II 1811. Pfr. mon. Auric. p. 13.

*Conovulus* Lamarck extr. du cours 1812. *Auricula* groupe *Conovules*

*Ferrusac* prodr. p. 104.

*Melampus* und *Tralia* H. et A. Adams genera of moll. II p. 243, 244.

Schale mässig klein, (6—18 Mill.), verkehrt konisch, wie die Gattung *Conus*, mit kurzem Gewinde und langer schmaler Mündung; Aussenrand derselben gerade, einfach, aber tiefer nach innen mit spiral laufenden (weissen) Falten. Columellarfalte immer vorhanden, meistens auch einige oder mehrere Parietalfalten.

Fühler zugespitzt, an der Basis einander sehr nahe; Augen nach innen und hinten von ihrer Basis deutlich sichtbar; Schnauze ziemlich verlängert. Fuss zuweilen, aber nicht immer in zwei Spitzen ausgehend.

Durch alle Tropengegenden verbreitet, lebt meist auf dem vom Seewasser durchdrungenen Boden der Stranddickichte, öfters mit *Auricula* und *Cassidula* zusammen, scheint aber stellenweise auch auf Felsengrund am offenen Meer vorzukommen, so z. B. auf den Kanarischen Inseln und auf Madeira gemeinschaftlich mit der Gattung *Pedipes*, doch auch hier gern über Wasser und auch an der Luft das Athemloch öffnend, siehe Lowe im *Zoological Journal* V 1835 p. 284, *M. exiguus*.

Eine systematische Trennung der Arten mit zweispitzigem Fuss (*Melampus* im Sinn von Adams) von denen mit einfachem (*Tralia*) lässt sich bis jetzt nicht durchführen, da die Angaben der Beobachter über dieselbe Art darin abweichen: *M. coffea* L. einfach nach Pfeiffer *mon. auric.* p. 15, und Adams *genera* pl. 82, fig. 7, zweispitzig nach Örsted bei Mörch *Malak. Blätt.* VI 1859 S. 117 und diese Art ist gerade der historische Typus der Gattung, der unter allen Umständen den Namen *Melampus* behalten muss. Auch lassen sich keine Schalencharaktere angeben, welche mit diesem Unterschied parallel gehen würden.

#### A) Schale im Ganzen glatt.

##### 1. *Melampus fasciatus* Desh. Tab. VIII, Fig. 4.

*Auricula fasciata* Deshayes in *Encycl. meth.* Vers II 1830 p. 90 und in Lamarck *an. sans vert.* ed. 2. VIII p. 337. Küster *Auriculaceen* S. 33, Taf. 5, Fig. 9—11. Mousson *moll. jav.* S. 46, Taf. 5, Fig. 7.

— *monile* (non Lamarck) Quoy et Gaimard *Voy. Astrolabe. Zool.* II p. 166 pl. 13 fig. 28—33, lebendes Thier, kopirt bei Küster Taf. A, fig. 2, 3 und bei Gray *fig. moll. animals* III, pl. 306, fig. 10, 11.

*Melampus fasciatus* (Beck. *ind. moll.* p. 107). Pfeiffer *mon. Auricul.* p. 38. v. Martens in Möbius *Beitr. Faun. Mauritius* S. 208; *donum Bismarckianum* p. 55. Nevill *handlist* p. 216. — Böttger *Ber. Senckenberg. Gesellsch.* 1891 S. 278.

*Conovulus fasciatus* Guérin *iconographie du règne animal, Mollusques* pl. 7, fig. 8.

*Auricula soricina* Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 9, fig. 23 – 26.

*Tralia* (Pira) *fasciata* Adams genera moll. II, p. 244.

Bauchig-eiförmig, blass röthlich oder gelblich mit mehreren schmalen dunkelbraunen Bändern; Gewinde convex, oben stark zugespitzt; die obern Windungen radial (vertikal) gefurcht; Naht angedrückt und eingerissen. Drei Parietalfalten, die mittlere meist stärker; vier bis sechs Falten am Aussenrand. 13–15 Mill. lang, 8 breit, Mündung 9–10½ lang, 3–4 breit.

Äussere Weichtheile blass gelb, Fuss schlank, hinten zweispitzig mit einer schwachen Querfurche in seiner vordern Hälfte (Quoy und Gaimard).

Java: van Hasselt im Leydner Museum u. Göring im Berliner Museum; Tjiringin, von Zollinger, Anjer von mir gefunden.

Molukken: Ceram, Hombron und Jacquinot, ebenda bei Wahai von mir gefunden, todt am Strande. Amboina, Dr. Ludeking und Strubell. Tawalli bei Batjan unter Strandpflanzen, todt, v. Martens.

Flores: Oka bei Larentuka, v. Martens.

Timor: bei Kupang in brackischem stehendem Wasser, das nur durch einen Sandstreifen vom Meer getrennt ist und bei hoher Fluth oder Stürmen wohl von demselben erreicht wird, hier die einzige lebende Schnecke, v. Martens.

Quoy und Gaimard sagen, sie lebe nicht fern vom Strande und sei sehr beweglich, namentlich bei regnerischem Wetter.

Im Berliner Museum ausserdem aus Mauritius, Bengalen, der Insel Salangan an der Küste von Malacca (Joh. Weber), Finschhafen in Neu-Guinea, den Neuen Hebriden (Cox) und Neu-Caledonien, Port Curtis in Queensland, Manila (von Besser), Bohol und den Palaos, (Semper), Samoa, Tahite und Jaluit vertreten, ferner von Mayotte, (Comoren), Réunion und den Seychellen durch Morelet, Deshayes, Nevill u. s. w. angegeben, von Ceylon, Arakan, den Andamanen und Nikobaren durch Nevill, Stoliczka und Frauenfeld, von Saigon durch Morelet, von den Philippinen durch Cuming, von Sorong und den Keyinseln durch Albertis und Beccari, von Neu-Guinea und Neu-Irland durch Quoy und Gaimard, von Viti, Uvea, Mangareva, den Ellice-

inseln und Vaitupu durch Godeffroy, Hombron, Pease etc., von der Christmas-insel durch P. Fischer.

Demnach weit verbreitet durch den indischen und stillen Ocean; dagegen ist der angebliche *M. fasciatus* von den Küsten des rothen Meers (Morelet) nach Jickeli eine andere Art, *M. Siamensis* Marts.

Die Farbe frischer Exemplare ist mehr blondgelb oder röthlich, die todter verbleichter mehr violettgrau, die obern Windungen sind nicht selten lebhafter violett gefärbt, die Columellargegend bald gelblich, bald röthlich, bald rein weiss, niemals aber so lebhaft und scharf umschrieben rothbraun wie bei dem südafrikanischen *M. lividus* Desk. Zuweilen sind die Bänder blass oder nur spurweise vorhanden; in der Regel 4—5 anwesend, das zweite und dritte zuweilen unter sich verbunden.

## 2. *Melampus luteus* Q. G.

*Auricula lutea* Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe, Zool. II, p. 163, pl. 13, fig. 25—27, lebendes Thier, copirt bei Küster *Auricul.* Tab. A, fig. 4 und bei Gray fig. moll. an. III pl. 306, fig. 5. Desh. bei Lamarck an. s. vert. ed. 2. VIII, p. 338. Küster *Auricul.* S. 39, Taf. 6, Fig. 1—3. Mousson moll. jav. S. 47, Taf. 5, Fig. 5—6.

*Melampus luteus* (Q. G.), Beck ind. moll. p. 166. Adams gen. moll II, p. 243. Pfeiffer mon. *Auricul.* p. 36. Martens Donum Bismarckianum S. 55. Nevill handlist p. 217.

Etwas grösser und breiter als die vorhergehende, einfarbig gelb, oben etwas stumpfkantig, die Spitze nicht so vorstehend, die Mündung etwas breiter, 18—21 Mill. lang,  $10\frac{1}{2}$ —12 breit, Mündung 14—16 lang, 4—5 breit.

Äussere Weichtheile blassgelb, Fusssohle mit einer Queerfurche vor der Mitte, hinten zweispitzig (Quoy u. Gaimard).

Java: Insel Nusa-Baron, Zollinger. Südküste, v. Richthofen im Berliner Museum.

Im Berliner Museum auch von Mauritius, den Salomons-inseln (Cox), Samoa, Suwarow-, Kingsmill-, Mac Kean- und Marshall- Inseln, Jaluit (Finsch) und Port Essington vertreten; ausserdem von Réunion und Diego Garcias durch Nevill und Deshayes, von den Philippinen bei Pfeiffer, von Sorong und Neu-Guinea durch Raffray und Albertis, Louisiaden, Cox, Neu-Caledonien durch Gassies, von Guam (Marianen) und Vanikoro durch Quoy und Gaimard, den Loyalty-Inseln durch



Newcomb bei Nevill, von Viti, Phoenix, und Lord Hood's island durch Godeffroy, Pease und Cuming angegeben, also ungefähr ebenso weit verbreitet als *M. fasciatus*. Zweifelhafte ist das angebliche Vorkommen an der Westküste von Südamerika: Tumaco an der Grenze von Neugranada und Ecuador nach Anton, und Peru, von wo Tschudi Exemplare mitgebracht hat, welche ich vom Neuchateler Museum erhalten habe und nur durch vollständige Ausfüllung des Nabelritzes von den javanischen unterscheiden kann.

Quoy und Gaimard geben als Fundort „unter Bäumen am Meeresstrand“ an, es sind wohl Rhizophoren oder ähnliche gemeint.

B) Mit schwacher Spiralskulptur, namentlich an der Basis.

3. *Melampus nucleolus* Marts. Tab. VIII, Fig. 21.

v. Martens in Monatsberichte d. Akad. d. Wiss. Berlin 1865, S. 55.;  
Pfeiffer mon. pneum. IV p. 308. Tapparone-Canefri faun. mal. d.  
Nuova Guinea p. 231.

Birnförmig, ohne Schulterkante, undurchbohrt, nur an der Basis mit einigen Spiralfurchen, schwarzbraun, Gewinde kurz, aber ziemlich spitz. Mündung unten schmaler bleibend als bei den meisten Arten. Zwei Parietalfalten auf weissen Grund, beide weit unten, ziemlich gleich gross, rein weiss. Columellarfalte sehr schief; Columellarrand röthlichgelb. Falten am Aussenrand ungefähr 10, abwechselnd kleiner und grösser, durch eine Lippe verbunden. 6—8 Mill. lang, 4—5 breit, Mündung 5—6½.

Amboina, bei der Mündung des Flüsschens Weynitu auf weichem Schlamm Boden im Mangle-dickicht, zwischen Rhizophoren-Wurzeln, zusammen mit *Cassidula sulculosa* von mir gefunden, kleiner und mehr einfarbig bei Wahai auf Ceram.

Insel vor Calape auf der philippinischen Insel Bohol, von Semper im Berliner Museum, 6 Mill. Key Bandan, Neu-Guinea, Beccari.

Jüngere Exemplare sind mehr elliptisch, d. h. unten weniger verschmälert, die Falten des Aussenrandes noch wenig und unregelmässiger ausgebildet, die Farbe des Columellarrandes bald nur blassgelb, bald rostroth, die Spiralstreifung kaum zu erkennen.

*Melampus castaneus* Meg. von den Sandwich-inseln, Küster

Auricul. Taf. 5, Fig. 18—20 und Pfeiffer mon. Auricul. p. 30, pneum. IV, p. 306, wo die weitere Synonymie zu finden, ist dieser Art sehr ähnlich, namentlich in der Färbung, aber bedeutend grösser, 15—16 Mill. lang,  $9\frac{1}{2}$ —10 breit, Mündung  $12\frac{1}{2}$ —13, ohne Spiralstreifung an der Basis und mit weniger Falten, 6—7, hinter dem Aussenrand. Diese Art hat A. Adams, Zool. voy. Samarang p. 55, pl. 14, fig. 17, (*M. leucodon*), auch auf der Insel Mayo zwischen dem Nordostende von Celebes und Ternate gefunden (nach p. V vielleicht auch bei Manado selbst), in Gesellschaft von *Assiminea*, sie ist daher wahrscheinlich auch noch unter die Arten von Niederländisch-Indien aufzunehmen. Mousson kennt sie von den Samoa-inseln, P. Fischer führt sie als sehr zweifelhaft von Cochinchina an, Nevill auch von den Palaos, Nikobaren und Mauritius, Deshayes von Réunion (*M. fuscus*). Hienach würde sie weit verbreitet sein, wie *M. fasciatus* und *luteus*, wenn die Bestimmungen alle richtig sind.

Von den Palaos oder Pelew-inseln habe ich durch Semper eine eigenthümliche Zwischenform zwischen *M. castaneus* und *nucleolus* erhalten, 13 Mill. lang, 8 breit, Mündung 9, umberbraun, mit sehr feinen und gedrängten, kaum sichtbaren Spiralstreifen an der Basis, Falten 7, vorn verbunden; leider nur Ein Exemplar; sie möge als *M. nucleolus* var. *Semperi* bezeichnet werden.

4. *Melampus Singaporensis* Pfr. Tab. VIII, Fig. 5 und 23.

Pfeiffer in Malak. Blätt. 1855, p. 8; novitat. conch. I Taf. 12, Fig. 15, 16; monogr. Auricul. p. 41.

Spindelförmig-länglich, undurchbohrt, mit feinen, an der Basis etwas stärkeren Spiralstreifen, glänzend, grünlich-gelblich mit braunen Rändern; Gewinde konisch, oben entschieden zugespitzt. Drei Paritalfalten, die beiden obern klein und öfters fehlend; Columellarfalte vortretend; 3—4 lange, ganz von einander getrennte Falten am Aussenrand, dazwischen zuweilen kleinere Zähnen. 8— $12\frac{1}{2}$  Mill. lang,  $4-7\frac{1}{2}$  breit, Mündung  $5\frac{1}{2}$ —10 Mill.

Singapore, Bacon bei Pfeiffer, auch von mir daselbst gefunden.

Ceram und Amboina, in Gesellschaft von *Cassidula sulculosa*, von mir.

5. *Melampus Siamensis* Marts. Tab. VIII Fig. 24.

Von Martens in Monatsberichte d. Akad. d. Wiss. Berlin 1865 p.

54. Jickeli Moll. v. Nordostafrika S. 176 Taf. 7 Fig. 2. Morelet series conchyl. IV p. 271. Issel moll. Born. p. 57. Pfeiffer mon. pneum. IV p. 307.

Eiförmig, etwas bauchig, glatt, nur an der Basis mit einigen Spiralfurchen, etwas glänzend, hellbraun, meist mit mehreren dunkelbraunen Bändern; Gewinde konisch, ziemlich stumpf. Zwei Parietalfalten, die obere vertikal gestellt, etwas gezähnt, die untere horizontal, stark; Columellarfalte schief herabsteigend, weit vortretend; Columellarrand dicht an die Aussenseite angelegt; 4–6 Falten am Aussenrand, alle am vordern Ende unter sich durch eine weisse innere Lippe verbunden.

11–13½ Mill. lang, 6–7½ breit, Mündung 7½–10.

Zuerst bei Petshaburi in Siam auf Schlamm Boden in Gesellschaft von *Pythia plicata* und *Cassidula auris-felis* von mir gefunden, später auch ein Stück bei Singapore und eines bei Mampawa an der Westküste von Borneo. Aus Borneo erhielt sie Issel auch durch die Händler Damon. Schech said bei Massaua und Dahlak-inseln im Rothen Meer, Issel und Jickeli; letzterer sammelte sie daselbst auf Stämmen von *Avicennia*, immer gesellig unter sich, doch nicht mit *Cassidula* zusammen.

C) Schale mit ausgeprägter Skulptur (*Signia* Ad.).

6. *Melampus granifer* Mouss.

*Auricula granifera* Mousson moll. jav. S. 46 Taf. 5 Fig. 9 und Taf. 20 Fig. 7 (Skulptur).

— *granosa* Hombron et Jacquinot. Voy. pole sud V pl. 9, fig. 20, 22. *Melampus granifer* (Mouss.) Pfeiffer mon. Auricul. p. 42. Tapparone-Canefri faun. mal. Nuov. Guinea p. 229.

*Tralia* (*Signia*) *granifera* Ad. gen. moll. II p. 245; Chenu manuel de conchyl. I p. 477 fig. 3528.

Eichelförmig, in der obern Hälfte scharf und zierlich granuliert, Gewinde convex, oben zugespitzt. Drei Parietalfalten, die oberste punktförmig, zwei bis vier Falten am Aussenrand.

10½–13 Mill. lang, 6–7 breit, Mündung 8½–10.

Java: Bai von Pampang, Resid. Banjuwangi, an der Wurzel von Rhizophoren, Zollinger.

Insel Burias, Philippinen, Cuming. Port Dorey auf Neu-

Guinea, Raffray. Torresstrasse, Hombron und Jacquinot.  
Nach Nevill und Robillard auch auf Mauritius.

7. *Melampus sulculosus* Marts. Tab. VIII Fig. 20.

Von Martens in d. Monatsberichten d. Akad. d. Wiss. Berlin 1865  
S. 55; Pfeiffer mon. pneum. IV p. 305.

Länglich-eiförmig, dicht spiralgefurcht, dunkelbraun mit mehr oder weniger deutlichen blassen Bändern; Gewinde convex, oben meist cariös. Eine untere Parietalfalte, 2—3 Falten am Aussenrand.

8 Mill. lang, 4 breit, Mündung 6.

Amboina: an der Mündung des Weynitu-flusses.

Nahe unter der Naht sind die Anwachsstreifen etwas stärker und bilden mit den Spiralfurchen eine schwache Körnelung; dadurch, sowie durch die Färbung erhält die Schale eine auffallende Ähnlichkeit mit *Cassidula sulcosa* Mouss. Man könnte sich fragen, ob es nicht etwa der Jugendzustand derselben sei, aber ganz abgesehen davon, dass bei keiner Art von *Cassidula* noch im unausgewachsenen Zustand Falten an der Innenseite des Aussenrandes gesehen worden sind, ist doch auch das was man von den obern Windungen sieht, nicht übereinstimmend genug für eine solche Annahme.

D) Ohne Falten an der Innenseite des Aussenrands.

8. *Melampus edentulus* Marts. Tab. VIII Fig. 22.

Von Martens in Monatsberichte d. Akad. d. Wiss. Berlin 1865 S.  
55; Pfr. mon. pneum. IV p. 323.

Annähernd eiförmig, sehr stumpf-kantig, mit undeutlicher Spiralstreifung, einfarbig schwarzbraun, zuweilen mit Spuren von helleren Bändern, namentlich in der Schultergegend; Gewinde mässig, oben stumpf. Nur Eine Parietalfalte (die untere) und diese klein; Columellarfalte stark, ziemlich horizontal, vortretend. Aussenrand weisslich, sehr schwach verdickt, ohne Falten.

8 Mill. lang, 5 breit, Mündung 5½.

Flores: Oka bei Larentuka, auf Schlamm Boden an einem kleinen Bache nahe seiner Mündung, in Gesellschaft von *M. fasciatus*, *Auriculastra subula*, *Cassidula triparietalis*, *sulcosa* und *Pythia scarabaeus*.

In allen übrigen Beziehung ein ächter *Melampus*, aber durch den Mangel der Falten an der Innenseite des Aussenrandes von der gros-

sen Mehrzahl der Arten abweichend; da diese Falten auch schon bei jüngern Exemplaren der anderen Arten vorhanden sind, kann man ihre Abwesenheit nicht als Jugendcharakter ansprechen.

### b) PROSOBRANCHIEN.

#### CERITHIIDEN UND MELANIIDEN.

Diese zwei Familien sind sowohl nach der Schale als nach den Weichtheilen nahe mit einander verwandt, taeniogloss mit vorragender Schnauze, spitzen Fühlern mit Augen an der äussern Basis und kurzem, fast wappenschildförmigen Fuss; der Deckel spiral, meist mit wenig, selten mit mehr Windungen. Der Unterschied in der Bildung am Unterrande der Mündung, ein deutlich abgegränzter zurückgebogener Kanal bei den typischen Cerithien und ein flacher Ausguss bei den typischen Melanien, zeigt vielerlei Abschwächungen und Zwischenstufen innerhalb beider Familien.

#### *Cerithium* Adanson, Brug.

Ein deutlicher kurzer, etwas zurückgebogener Kanal an der Mündung. Sculptur mehr oder weniger höckerig. Deckel oval mit wenig Windungen.

Die meisten Cerithien leben im Meer, doch manche gern an Flussmündungen oder sonst an schwächer salzhaltigen Stellen auf Schlammgrund, so schon *C. vulgatum* Brug. in den venetianischen Lagunen.

Es sollen hier nicht alle Arten dieser Gattung, welche in Niederländisch-Indien vorkommen, aufgeführt werden, sondern nur diejenigen, welche an Flussmündungen auf Schlammflächen oder im Mangle-dickicht beobachtet wurden und diejenigen, welche diesen im allgemeinen Habitus so nahe stehen, dass man einen ähnlichen Aufenthalt für sie annehmen kann und im indischen Ocean weit verbreitet sind.

A) Gethürmte, oben schlank zugespitzte Arten, mit auffälligen Wülsten (Wachsthumsabsätzen).

#### 1. *Cerithium Trailli* Sow.<sup>2</sup>

? *Cerithium lineolatum* Traill in Journal of the Indian Archipelago 1847. 8. p. 226. fig. (Figur ohne Beschreibung).

*Cerithium* Trailli Sow.<sup>2</sup> thes. II fig. 93. 1855. Reeve conch. ic. XV fig. 24.

Feinknotige Spiralrippen, diejenige zunächst unter der Naht mit etwas stärkeren Knoten. Blass weisslichgrau, Knoten meist etwas dunkler. Spitze sehr schlank. Aussenrand der Mündung dünn, etwas ausgebogen.

Singapore, häufig, Traill und v. Martens; Pulo Los oder Loz am Eingang der Bai von Bintang, von einem Missionär an das Berliner Museum gegeben. Lakkediven, Theobald.

Die bleiche Färbung und schwache Skulptur deutet auf Aufenthalt im Schlamm.

## 2. *Cerithium corallinum* Kien.

*Cerithium corallium* Dufresne bei Kiener iconogr. p. 32. pl. 8. fig. 3.

Deshayes Lamarck an. s. vert. ed. 2. IX. p. 317. Reeve conch. icon. XV. pl. 5 fig. 29.

*Cerithium ustum* Hombron et Jacquinot Voy. au pôle sud, moll, pl. 23. fig. 18, 19.

Schlank spindelförmig, vertikal gefaltet mit Spiralreihen von Körnern; ein starker Wulst in der Regel im ersten Drittel der letzten Windung, in der Mündungsansicht die linke Seite der Schale einnehmend. Mündung schmal, mit kurzem gerade vorstehendem Kanal. Farbe frisch dunkelbraun oder schwärzlich, verbleicht mehr oder weniger roth (daher der Artname). Länge  $16\frac{1}{2}$ —34 Mill., Breite 7—12, Länge der Mündung 5— $10\frac{1}{2}$ .

Wijnkoops-Bai bei Palabuan auf Java, v. Martens 1861. Togian-inseln in der Bucht von Tomini, Celebes, A. B. Meyer. Batjan; bei Wahai auf Ceram; Weynitu in der Bai von Amboina und in der Bai von Kupang auf Timor, v. Martens 1862. Auch von Ceylon, den kleinen Inseln bei Mergui in Tenasserim, von Singapore, den Philippinen, Salomons- und Viti-inseln bekannt.

Kiener, bei dem der Artname zuerst vorkommt, schreibt „corallium“, französisch corail; da der Name sich doch nur auf die rothe Farbe beziehen kann, dürfte *corallinum* richtiger sein.

Nahe verwandt ist *C. rubus* Reeve fig. 75 (non Martyn) von Ceylon und den Inseln bei Mergui und *C. turritum* Sow.<sup>2</sup>, Reeve fig. 88 von der Philippinen-Insel Burias; ersteres hat stärkere, mehr spitze Knoten, letzteres tiefer eingeschnittene Nähte.

### 3. *Cerithium patulum* Sow.

*Cerithium patulum* Sowerby thesaur. conch. I fig. 74. Reeve conch.

ic. fig. 33, v. Martens in Journ. Linn. Soc., Zool. XXI 1886 p. 168.

— *pellucidum* Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 23, fig. 24. 25.

— *gibberosum* Dunker Mollusken d. Novara Expedition Taf. 1 Fig. 7.

Gedungen konisch, mit einem starken Varix auf der Rückenseite des letzten Umgangs, schwärzlich. 3 Reihen Höcker auf der vorletzten Windung sichtbar, die der obersten Reihe kleiner. Mündungsebene schief nach unten vorgezogen. Schale 22 Mill. lang, 11 breit, Mündung 8 lang.

Bei Wahai auf Ceram, an Steinen am äussern Rande der Mangle-dickichte, bei Ebbe auch über Wasser, und auf Amboina an der Mündung des Flüsschens von Weynitu an den Wurzeln der Manglesträucher selbst. Auf Gross-Tawalli nördlich von Batjan an den Wurzeln und Ausläufern von *Sonneratia*, unter Wasser, im Brackwassergebiet. Auch von John Anderson in der Elphinstone Island Bay bei Mergui, Tenasserim, in den Mangle-sümpfen gesammelt.

B) Kürzere und stumpfere, stark körnige oder knotige Arten.

### 4. *Cerithium tuberculatum* Linne.

*Strombus tuberculatus* Linne, syst. nat. ed. XII. p. 1213. Hanley ipsa linn. conch. p. 276. pl. 4. fig. 4.

— *rugosus* Wood ind. test. suppl. 1628, pl. 4, fig. 10.

*Cerithium rugosum* Kiener icon. p. 54, pl. 15, fig. 3. Deshayes Lamarck an s. vert. ed. 2, IX p. 319. Sowerby<sup>2</sup> thesaur. conch. II, fig. 195, 19b. Reeve conch. XV, fig. 45.

— *gemmulatum* var. Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Mollusq. pl. 24, fig. 7, 8.

— *tuberculatum* Reeve conch. icon. XV, fig. 21. Nicht *Cerithium tuberculatum* Lamarck und anderer Autoren.

Zahlreiche rundliche Körner in Spiralreihen, drei Reihen auf der vorletzten Windung sichtbar bleibend; die einzelnen Körner in derselben Reihe öfters etwas ungleich an Grösse, schwarze (dunkelbraune) und weisse (blassgelbe) an demselben Individuum. Naht unmittelbar vor der Mündung nicht auffällig aufsteigend, Mündung verhältnissmässig klein, mit dickem weissem Rand. Ältere Mündungswülste stellenweise vorhanden. Länge 17—24 Mill., Breite 9—13½, Mündungslänge 7—10½; ein ungewöhnlich grosses Stück 26, 14, 9½.

Anjer auf Java, Batjan, Dodinga auf Halmaheira an der Ostküste, Wahai auf Ceram, Larentuka auf Flores und Cap Gonsalvi auf Adonara, Atapapu auf Timor, v. Martens. Häufig im Rothen Meer, von Ehrenberg bei Djidda gefunden, ferner an der Ostküste Afrika's bei Zanzibar (v. d. Deken) und den Querimba-inseln (Peters), an den Seychellen und an der Küste von Tenasserim, andererseits an den Philippinen, der Geelvinks-bai in Neu-Guinea, der Torres-strasse. Findet sich oft an einzelnen Steinblöcken.

Var. *bifasciatum* Sow.

*Cerithium bifasciatum* Sow. Reeve loc. cit. fig. 34.

— *nigrofasciatum* Reeve ebenda fig. 58.

Zwei bis drei breite braune oder schwärzliche Spiralbänder auf weisslichem Grund.

Wahai auf Ceram, mit der gewöhnlichen Färbung. Auch Philippinen und von mir bei Hongkong gefunden.

#### 5. *Cerithium variegatum* (Q. G.?) Kien.

Favanne conchyliologie 1780, pl. 39, fig. C 7.

*Cerithium variegatum* (Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe, Zool.

II, pl. 55 fig. 17?) Kiener iconogr. p. 55, pl. 15, fig. 2 (bräunlich).

Reeve conch. icon. XV, fig. 41.

Körner ungleichfarbig oft zusammengedrückt, in mehr als drei Reihen auf dem sichtbaren Theil der vorletzten Windung, auf der letzten deutliche dünne Spiralleisten zwischen den Körnerreihen. Färbung verschieden, öfters röthlichbraun. Mündung klein, oft rosenroth. Länge 15—22 Mill., Breite 7—10, Mündungshöhe 5—7.

Wijnkoops-bai bei Palabuan auf Java, Larentuka auf Flores und Atapapu auf Timor, v. Martens. Philippinen, Cuming. Geelvinks-bai, Strubell.

Ob Quoy und Gaimard's *C. variegatum* von Tongatabu dieselbe Art sei, ist mir zweifelhaft, da ihre Figur nur drei Knotenreihen auf der letzten Windung und keine Spiralleisten dazwischen zeigt.

Var. *Janellei* H. J.

*Cerithium zonale* var. Quoy u. Gaimard Voy. Astrolabe, Zool. II, pl. 55, fig. 9.

— *Janellei* Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 24, fig. 19, 20.

Grösser und verhältnissmässig dicker, 21—25 Mill. lang, 10—23



breit, Mündung  $9-9\frac{1}{3}$ . Ein ungewöhnlich grosses Stück von Samoa 32 Mill. lang, 18 breit, Mündung  $12\frac{1}{2}$ . Vorherrschende Färbung weiss mit zahlreichen kurzen schwarzen Spiralbändchen, haufenweise zusammengruppirt.

Batjan, v. Martens. Ferner vom Rothen Meer im Berliner Museum. Seychellen, Möbius. Segarbai in Neu-Guinea, Expedition der Gazelle. Neu-Irland, Finsch. Salomons-inseln, Dr. Hartmann. Insel Vavao, Hombron u. Jacquinot. Samoa, Museum Godeffroy.

In der allgemeinen Gestalt dem *C. petrosus* Wood ind. conch. suppl. 4, 9 und Reeve fig. 43 ähnlich, aber bei diesem ordnen sich die stärkeren Körner zu vorstehenden vertikalen Falten.

#### 6. *Cerithium morum* Lam.

Lister hist. conch. pl. 1024, fig. 90.

*Cerithium morus* <sup>1)</sup> Lamarck hist. nat. an. s. vert. ed. 1. VII, n° 26; ed. 2. IX, p. 302. — Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe, zool. II, pl. 54, fig. 13, 15 mit lebendem Thier und Deckel. — Kiener iconogr. pl. 15, fig. 1. Reeve conch. ic. XV, fig. 42.

*Cerithium concisus* Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Mollusq. pl. 24, fig. 1, 2.

— *obscurus* Hombron et Jacquinot ebenda. fig. 5, 6.

Körner gleichmässig, alle schwarz (verbleicht rothbraun), auf dem sichtbaren Theil der vorletzten Windung in drei Reihen. Rückenseite hoch gewölbt; Naht vor der Mündung stark aufsteigend. Allgemeine Form etwas variabel, durchschnittlich kürzer und bauchiger als bei den vorigen, schon mehr der dritten Gruppe sich nähernd. Länge 18—25 Mill., Breite  $10\frac{1}{2}-14\frac{1}{2}$ , Mündungslänge 10—11; eine auffallend kleine Form von Benkulen nur 12, 6, 5.

*C. morum* lebt nach Dufo (Ann. Sci. nat. 2. XIV, 1840 p. 61) auf sandig-schlammigem Grund, bei Fluth 1— $1\frac{1}{2}$  Meter unter Wasser und bei Ebbe im Trockenen, zahlreich, gruppenweise auf kleinen Erhöhungen, welche mehr von Meerpflanzen bedeckt sind.

Muntok auf Banka, Benkulen auf Sumatra, Anjer auf Java, Batjan und Amboina, v. Martens. Togian-inseln bei Celebes, A. B. Meyer.

---

1) Lateinisch *morus* Maulbeerbaum, *morum* Maulbeere, daher dürfen Conchylien welche mit einer Maulbeere verglichen werden, nur *morum*, nicht *morus* genannt werden. Lamarck selbst nennt sie französisch *mûre*, nicht *murier*. Dasselbe gilt für *Ricnula morus* Lam.

Insel Rotti bei Timor, Dr. ten Kate. Hr. F. Jagor fand sie zu Blakang-mati bei Singapore in Gesellschaft von *Enzina duclosiana*, ich auch bei Simaharadscha an der Ostküste des Golfs von Siam und auch zu Aberdeen bei Hongkong, die Expedition der Gazelle auf Neu-Britannien. Ferner wird sie vom Rothen Meer, Persischen Meerbusen, Madagaskar, Mauritius, den Seychellen, Bombay, dem südlichen Japan, den Philippinen, Vanikoro und den Salomons-inseln angegeben.

*Var purpurascens* Sow..

*Cerithium purpurascens* Sow.<sup>2</sup> thes. conch. II, fig. 99. — Reeve conch. icon. XV, fig. 36 (von den Philippinen).

Die Körner spitziger und mehr ungleich; ein starker Wulst auf der Rückenseite der letzten Windung wie bei *C. patulum*; 18—21 Mill. lang, 11—13 breit, Mündungslänge 10.

Insel Batjan und an der Ostküste von Halmahera bei Dodinga v. Martens. Häufig an der Ostküste des Golfs von Siam bei Simaharadscha, Ko-Sichan und Lemkobang, v. Martens und v. Richthofen. Singapore bei Blakang-mati, Jagor. Tuticorin gegenüber Ceylon, Thurston.

Mit *C. morum* verwandt, aber grösser mit plumperen Knoten in geringerer Anzahl sind die beiden folgenden, welche zwar bis jetzt noch nicht in Niederländisch-Indien gefunden worden sind, aber mehrfach mit *C. tuberculatum* verwechselt wurden.

*Cerithium Borni* Sow.

*Strombus tuberculatus* (L.) Born test. mus. Caes. Vindobon. 1780, tab. 10, fig. 16, 17 und Chemnitz Conch. Cab. IV, fig. 1490.

*Cerithium Borni* Sowerby<sup>2</sup> thes. conch. II, fig. 68. Reeve conch. icon. XV, fig. 26.

Nur zwei Reihen dunkler Knoten auf der vorletzten Windung. Bis 36 mm. lang, 17 breit, Mündung 15 lang.

Insel Hongkong bei dem Orte Aberdeen und Insel Formosa bei Tamsai, an einzelnen Steinen auf Schlammgrund, v. Martens. Nach Reeve auch auf den Seychellen.

*Cerithium Schröteri* Mörch.

*Murex asper* (L.) Schröter Einleitung in die Conchylien-kenntniss Bd. I, (S. 540), Taf. 3, Fig. 7.

*Cerithium tuberculatum* (L.) Description de l'Egypte, Moll. pl. 4, fig. 11. Lamarck hist. nat. d. an. s. vert. ed. 1. VII nro 28; ed. 2, IX, p. 324. Kiener icon. p. 35, pl. 13, fig. 1. Issel malacologia del mare rosso p. 148.

— *Schroeteri* Mörch cat. collect. Yoldi 1852, p. 58.

— *caeruleum* Sowerby<sup>2</sup> thes. conch. II, fig. 72. Reeve fig. 8. Issel malacologia del mar rosso p. 147.

Blaugrau mit nur Einer Reihe starker Knoten auf der vorletzten Windung. Bis 38 mm. lang und 20 breit; Mündung 17 mm.

Im Rothen Meer von Savigny, Ehrenberg u. A. gefunden, auch von Suez im Berliner Museum. Querimba-inseln an der Küste von Mosambique, W. Peters.

*C. tuberculatum* (L.) bei Sowerby<sup>2</sup> genera of shells part. 42, pl. 249, fig. 4, nach 1828, identisch mit Reeve conchologia systematica pl. 226, fig. 4, ist wieder eine andere Art, *C. semiferrugineum* Lamarck aus West-indien.

C) Kurz-konisch, Rückenseite stärker gewölbt, Bauchseite etwas abgeflacht.

#### 7. *Cerithium breviculum* Sow.<sup>2</sup>

Sowerby<sup>2</sup> genera of shells part 42 nach 1828 pl. 259, fig. 1; identisch mit Reeve Conch. icon. pl. 226, fig. 2; Kiener iconogr. p. pl. 45, fig. 4; Deshayes Lamarck an. s. vert. ed. 2. IX, p. 320; Sowerby<sup>2</sup> thes. conch. II, fig. 1; Reeve conch. ic. XV, fig. 46.

Starke, unter sich gleiche, rundliche, schwarze Körner in drei Spiralreihen auf der vorletzten Windung. Schwarzbraun, zuweilen mit helleren Punkten, Mündung weiss. 16—21 mm. lang, 10—14 breit, Mündung 8—9.

Palabuan auf Java, Batjan und Wahai auf Ceram, v. Martens. Philippinen, Cuming. Geelvink-bai in Neuguinea, Strubell.

#### 8. *Cerithium inflatum* Q. G.

Lister hist. conchyl. pl. 1024, fig. 89, 1687—88; Quoy et Gaimard voy. Astrolabe, Zool. II, pl. 55, fig. 10; Kieuer iconogr. pl. 7, fig. 1; Deshayes Lamarck an. s. vert. ed. 2. IX, p. 319; Reeve conch. icon. XV, fig. 60.

Körner sehr ungleich, auf der letzten Windung in der zweiten und dritten Reihe zusammengedrückt, grösser und weniger zahlreich, öfters

höckerartig vorstehend; auf der vorletzten Windung drei Reihen, die Körner der zweiten und dritten Reihe unter sich gleich, die der ersten nur spurweise vorhanden. Dunkelbraun, Mündung dunkel. 20.27 mm. lang, 13–16 breit, Mündung  $10\frac{1}{2}$ –14 mm.

Nord-Celebes, A. B. Meyer. Ostküste von Halmaheira bei Dodinga, auf Schlammgrund an Steinen und auf Flores bei Oka unweit Larentuka, im Mangle-gebiet, v. Martens. Amboina, Expedition der Gazelle. Vanikoro, Quoy und Gaimard zwischen Salomon-inseln und Neuen Hebriden.

#### 9. *Cerithium obesum* Sow.

Sowerby<sup>2</sup> thes. conch. II, fig. 79. Reeve conch. icon. XV, fig. 64.

Fast glatt, mit schwachen Vertikalfalten und Spiralstreifen, erstere nur an der Naht deutlich; schwärzlich, die Furchen öfters heller; Mündung innen schwarz-liniert. 18 mm. lang, 11 breit; Mündung 8 mm.

Nord-Celebes, A. B. Meyer. Ternate und Adonara, hier an Wurzeln und Ausläufern der Mangle-büsche, v. Martens. Philippinen-insel Bohol, Cuming.

Auch *Cerithium obeliscus* Brug., an dem ziemlich langen, rechtwinklig zur Columelle rückwärts gestreckten Kanal kenntlich, führt Blanford unter den „estuarine shells“ auf. Diese Art ist in Niederländisch-Indien weit verbreitet, (Rumph Taf. 30, Fig. N) ich habe Schalen bei Benkulen auf Sumatra, auf Java, bei Mampawa auf Borneo, Buru, Larentuka auf Flores und Atapupu auf Timor gefunden, sie ist mir aber nicht besonders als Brackwasser-art aufgefallen.

#### Potamides Defr.

Potamide (franz.) DeFrance 1810.. Vibex Oken Lehrbuch d. naturg. 1815, grössentheils.

Deckel kreisrund, mit vielen engen Windungen. Schale gethürmt, meist braun oder bräunlich, zuweilen violett und gebändert, mit deutlicher Skulptur; Rand der Mündung in der Regel flach ausgebreitet (ausgenommen Telescopium), Kanal deutlich eingeschnitten und abgesetzt, aber kurz und gerade. Schnauze lang vorstehend, am Ende zwei-lappig; Fühler spitz, Augen in  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{2}$  ihrer Länge. Fuss breit und vorn abgerundet. Radula ähnlich wie bei *Cerithium*, aber die äussere Platte am Aussenrand eingekerbt.

Die meisten Arten werden von den Eingebornen gern gegessen.

## 4) PYRAZUS Montf. (Terebralia Swains.)

Vertiefte Spirallinien und oberflächliche Längsfalten; Naht vor der Mündung merklich aufsteigend. Färbung der äussern Weichtheile einfarbig schwärzlich.

1. *Potamides palustris* L. Tab. IX, Fig. 24, 25.

Lister hist. conch. IV, 1688, pl. 836, fig. 62 und pl. 837 fig. 63.

*Strombus palustris* Rumph amb. rar. p. 101 (deutsche Ausg. 8, 71). Taf. 30, fig. Q. Linne syst. nat. ed. XII, p. 1213. Chemnitz Conch. Cab. IX, Fig. 1472. Seba thesaur. III, Tab. 50 fig. 13, 14 erwachsen, fig. 17 und 15, jünger.

*Cerithium palustre* Brug. Encycl. Vers I, p. 467 nro 19. Lam. an. s. v. ed 2 IX, p. 284. Kien pl. 1, lebendes Thier, copirt bei Gray fig. moll. an. II pl. 127, fig. 6. Quoy et Gaimard Voy. Astrol. III p. 121 pl. 55, fig. 14—16 lebendes Thier und Deckel cop. Gray fig. 6, I pl. 54, fig. 4. Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 23, fig. 2 lebendes Thier, copirt bei Gray fig. moll. an. III pl. 267, fig. 2. Tennent nat. hist. of Ceylon 1861. I pag. 381 fig. 12. Berkeley in Zoological Journal V 1831, pl. 31, 32.

*Pyrazus palustris* (L.) Adams gen. moll. pl. 30, fig. 8, 8<sup>a</sup> Deckel, 8<sup>b</sup> Schale. Reeve conch. ic. XV, fig. 1.

Aussenrand oben eingebuchtet, unten vom Columellarrand getrennt. Er wachsen 46—107 lang, 34—46 breit, Mündung 28—37 Mill. (in Turin soll ein Stück von 160 Mill. Länge sein).

Celebes: bei Makassar, M. Weber.

„Diese Schnecke hält sich in dem morastigen Sago-dickicht auf, wird auf Amboina gar nicht, aber viel auf Ceram, Buru and Celebes gefunden“, Rumph.

Diese Sagogebüsche werden von *Sagus Rumphii* Willd. = *Metroxylon Rumphii* Martius gebildet, welches nach Miquel, Flora van Nederlandsch Indië III, p. 141 in sumpfigen Gegenden nahe der Küste wächst und namentlich auf Ceram und Djilolo (Halmahera) grosse Wälder bildet. In der Bai von Amboina habe ich bei Weynitu jüngere Exemplare gesammelt, erwachsene auf Ceram bei Wahai am Strande und bei Hrn Hoed in Amboina Exemplare von Buru gesehen. A. Adams fand sie an der Nordostküste von Borneo bei der Insel Ligitan. 4° 20' N., in den ausgedehnten Mangle-sümpfen, theilweise in

den Schlamm eingesenkt und nur mit den Gewinde vorstehend (their spires bristling the surface, Zool. Samarang, Moll. p. VI); Reinhardt fand sie auf Pulo Panjang, Nikobaren, sehr zahlreich zwischen den Zweigen [Wurzeln?] der Mangle-büsche (Mörch. Journ. de Conch. XX p. 321); Dufo sah sie auf den Seychellen ebenfalls auf Schlammgrund, an und in Flussmündungen.

Die geographische Verbreitung dieser Art erstreckt sich vom Rothen Meer und Mossambique bis Australien; aus Niederländisch-Indien und dessen näherer Umgebung mögen noch folgende Fundorte genannt werden: Singapore, Traill. Sumatra, Tapparone-Canefri, Palabuan, Südwestküste von Java, v. Frauenfeld und v. Martens. Muara Tangerang (ob vielleicht Tangulang in Res. Djapara, Nordküste?) auf Java, de Filippi und Giglioli, Exp. Magenta. Makassar, M. Weber, Manado, Quoy und Gaimard. Kajoa nördl. von Batjan, v. Martens. Insel Lucipara zwischen Timor und Amboina, Expedition der Gazelle. Sorong, Beccari, und Raffles-Bay in Neu-Guinea, Hombron und Jacquinot. Somerset in Nord-Australien, O. Finsch. Siam, in der Sammlung von Castelneau. Mariveles, Prov. Bataan, auf Luzon, F. Jagor.

Tennent a. a. O. unterscheidet eine kürzere, mehr in einander gedrungene Form des Felsengrundes und eine schlankere des Sandgrundes.

Junge Exemplare sind durch schlankere Gestalt, sowie die etwas schiefer Stellung der Längsfalten von solchen der folgenden Art zu unterscheiden; Kiener pl. 27 fig. 2a stellt ein solches vor. Etwas ältere, aber noch nicht vollständig ausgebildete zeigen eine starke Columellarfalte, zwei schwächere Parietalfalten und mehrere Zähne an der Innenseite der Varicen (Fig. 25).

Mitten durchgeschnitten zeigen auch erwachsen eine um die Columelle durch alle Windungen sich schlingende Spiralfalte, ferner eine Spiralfalte auf der früheren Mündungswand, jetzt Scheidewand der Umgänge, und einzelne Knoten an der Innenseite der Aussenwand, was sehr an *Nerinea* erinnert (Fig. 24).

## 2. *Potamides semistriatus* Mörch.

*Cerithium sulcatum* Kiener icon. pl. 27, fig. 1.

— *semistriatum* (Bolten) Mörch catal. collect. Yoldi p. 57, 1852.

*Pyrazus semitrisuleatus* (wohl Schreibfehler) Reeve conchol. icon. XV fig. 4.

Der folgenden Art sehr ähnlich, nur grösser und mit bedeutend

schwächerer Skulptur. Mündungsraum ebenso angelegt. Ein Exemplar von Timor 58 Mill. lang, 23 breit, Mündung 24; von Nord-Australien 73, 34 und 33.

Bei Pariti auf Timor von Th. Studer, Expedition S. M. Sch. Gazelle, gefunden. Sonst von Nord-Australien bekannt: Port Essington bei Reeve, Somerset in einem Mangrove-sumpf, Finsch, Port Darwin in Nord. Australien, R. Schomburgk im Berliner Museum.

3. *Potamides sulcatus* Born. Tab. IX, Fig. 27.

Bonanni recreatio mentis et oculorum 1680, fig. 68. — Lister hist. conch. IV pl. 1021 fig. 85 (jung).

*Strombus mangiorum* Rumph. amb. rar. S. 101, Taf. 30, Fig. T., deutsche Ausgabe S. 71, aber hier die Abbildung ganz verändert, ein ächtes *Cerithium* darstellend. — Gualtieri ind. test. tab. 57, fig. E. *Murex sulcatus* Born index Mus. Caes. 1778 p. 324; testacea Mus. Caes. p. 320.

*Turbo mangiorum* Chemnitz Conch. Cab. IV, S. 323. Fig. 1484, 1485. Favanne conchyl. pl. 40 fig. A. 3.

— *Moluccanus* Gmelin Linn. syst. nat. ed. XIII p. 3563.

*Strombus fuscus* Gmelin ebenda p. 3523, nach Knorr Vergnüg. d. Aug. V, Taf. 13 Fig. 8 (unausgewachsen).

*Cerithium sulcatum* Bruguière Encycl., Vers I, p. 486, nro 20, pl. 442 fig. 2, sehr gross. Lamarck an. s. vert. VII p. 63, ed. 2. IX p. 285. Lesson Voy. de la Coquille, zool. II 1 p. 408. Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe, Zool. III p. 121 pl. 54 fig. 22, 23, lebendes Thier und Deckel, kopirt in Oken's allgem. Naturgeschichte. Taf. 23, Fig. 5 und Gray, fig. moll. an. I, pl. 52, fig. 1. Sowerby genera of shells pl. 260. fig. 3. = Reeve conch. syst. pl. 227, fig. 3. Kiener iconogr. pl. 27 fig. 2 (nicht 1). v. Martens Malak. Blatt 1863 S. 128.

*Pyrazus sulcatus* Reeve conch. ic. XV fig. 1. Troschel Gebiss. d. Schnecken I S. 148. Taf. 12, Fig. 5 (Radula).

*Potamides sulcatus* (Born) v. Martens Monatsber. Berlin. Akad. 1877 p. 288. Tapparone-Canefri faun. malac. de la Nuova Guinea p. 57.

Aussenrand oben nicht eingebuchtet, unten, wenn völlig ausgebildet, mit dem Columellarrand verwachsen, so dass aus dem Ausschnitt ein ringsum geschlossenes Loch wird, wie bei *Triforis*. 26—51 Mill. lang, 14—23 breit, Mündung  $11\frac{1}{2}$ —21.

Sumatra: Brandewijnsbai an der Westküste, M. Weber.

Celebes: Makassar, M. Weber.

Nach Rumph an morastigen Stellen, an den Wurzeln von „*Mangium caseolare*“ und an Steinen in deren Nähe; diese Staude, herb. amboin. III, Taf. 73 und 74, ist *Sonneratia alba* L. fil. und *S. acida* Smith, an den Küsten von Niederländisch-Indien weit verbreitet, aus der Familie der Myrtaceen, vgl. Miquel Flora van Nederlandsch-Indië I p. 495—497. Lesson fand diese Art auf schlammigen Küstenstrecken in Neu-Guinea und der nahen Insel Waigiou (Waigame), in brackischem (saumâtre) Wasser der mit Manglebüsch bedeckten Stellen, längs der Bäche, welche in die Buchten einmünden. Ich fand sie bei Singapore auf Schlammboden im Mangle-sumpf am Rande eines Rinn-sals, das bei Ebbe noch Wasser enthielt, auf Batjan in Salzwasser, an Stämmen von Bäumen, die im Wasser standen, in oder etwas über Wasser. Bei Wahai auf Ceram war es die erste Schnecke, welche ich vom festen Land in den Mangle-sumpf eindringend fand, zahlreich an den Wurzeln der Rhizophoren oder an vereinzeltten Steinen sitzend, einen Theil des Tages über Wasser, zusammen mit *P. telescopium*, *Cassidula sulculosa* und *Neritina communis*; weiter hinaus gegen das offene Meer zu, auf offenem von abgestorbenen Korallenblöcken gebildeten Boden gesellt sich ein ächtes *Cerithium*, *C. patulum*. dazu, aber *P. sulcatus* ist da seltener und verschwindet bald ganz. Auf Batjan an Baumstämmen in salzigem Wasser, unter und auch etwas über Wasser. Auch auf Flores und Adonara fand ich diese Art an den Wurzeln der Mangle-büsche.

Ebenfalls durch die ganze Ausdehnung von Niederländisch-Indien verbreitet, aber weiter westlich nur von Madagascar durch Sganzin 1843 bekannt. Singapore, F. Jagor und v. Martens. Brandewijnsbai an der Westküste von Sumatra, M. Weber. Anjer auf Java, Schottmüller während der preussischen Expedition. Batavia, de Filippi und Giglioli. Makassar M. Weber. Togian-inseln im Golf v. Gorontalo, A. B. Meyer. Auf den Molukken von mir auf Batjan, auf Ceram bei Wahai, auf Amboina bei Weynitu, auf Flores bei Larentuka und auf Timor bei Atapupu gefunden. Pariti auf Timor, Th. Studer, Insel Rotti bei Timor, Dr. ten Kate. Ferner fand ich sie bei Hongkong und Makao, Cuming auf den Philippinen, Tasson und Morlet in der Bai Halong in Tonkin, Beccari auf den Aru und Kei-Inseln, Sorong und Jobie in Neu-Guinea. Fernere Fundorte sind: Arwani in Neu-Guinea, Berliner



Museum. Meermid-Strasse an der Westküste von Australien, schon ausserhalb des Wendekreises, Th. Studer bei der Expedition der Gazelle, und noch südlicher, zwischen Freemantle und Geographe-Bay,  $33-33\frac{1}{2}^{\circ}$  S.Br., Dr. Preiss 1835–42. Nord-ostküste zwischen  $15$  und  $17^{\circ}$  N.Br. Tenison-Woods.

Jüngere Exemplare zeigen eine sehr schiefe Columellarfalte, eine Paritalfalte und einen starken Zahn innen am Varix. Dasselbe sieht man noch an aufgeschnittenen Schalen, Fig. 27.

4. *Potamides tenerrimus* Schepm. Taf. IV, Fig. 33.

Schepman in Notes from the Leyden Museum XVI 1894, p. 133, pl. 6 (radula).

Glänzend schwarz, ziemlich dünnschalig, konisch-gethürmt, mit Spiralfurchen auf allen Windungen und gut ausgeprägten geradlinigen Vertikalfalten auf den mittlern Windungen, etwa 11–12 auf jeder Windung; auf der letzten Windung sind die Vertikalfalten geschwunden, aber die erhöhten Leisten zwischen den Spiralfurchen zwischen Naht und grösstem Umfang erscheinen durch vertiefte Vertikallinien mehr oder weniger in quadratische Warzen zerschnitten.

Grösstes Exemplar, oben abgestutzt, mit noch 6 Windungen, 29 Mill. lang, 14 breit, Mündung  $13\frac{1}{2}$  lang und 8 breit.

Insel Roti: Salzsee Oëmassapoka, Prof. Wichmann.

Obgleich nicht in allem mit Schepman's Beschreibung übereinstimmend, namentlich auch grösser, dürfte die vorliegende hier abgebildete Schnecke doch nicht als Art zu trennen sein.

B) *TELESCOPIUM* Montf.

Scharf konisch d. h. hoch kreiselförmig, Basis fast eben, durch eine Kante abgegrenzt; Spiralskulptur vorwiegend; Mündungsrand einfach. Unterer Theil des Aussenrandes der Mündung lappig vorgezogen; Columella fast horizontal, spiral gedreht. Äussere Weichtheile bräunlich oder schwärzlich, etwas fleckig, mit denen von *P. palustris* übereinstimmend.

5. *Potamides telescopium* L.

Lister hist. conch. IV 1688 pl. 624 fig. 10.

Zee-ton (Seetonne), Schijnvoet bei Rumph amb. rar. S. 75 (deutsche Ausg. S. 29) Taf. 21 Fig. 12. Gualtieri index test. Tab. 60 fig. D. E.

Telescope, Argenville conchyliologie ed. I. 1742 pl. 14 (ed. 2 pl. 11) fig. B. = Favanne pl. 39 fig. B 1. Seba thesaur. III pl. 50 fig. 1—12. Trochus telescopium Linne syst. nat. ed. X p. 760; ed. XII p. 1231. Chemnitz Conch. Cab. V S. 14 Fig. 1507—1509.

Cerithium telescopium Bruguière Encycl. meth., Vers I p. 485 nro. 17. Lamarck an. s. vert. VII, p. 67; ed. 2. IX, p. 286. Quoy et Gaimard Voy. Astrol., Zool. III p. 125 pl. 55 fig. 4—6; lebendes Thier und Deckel, copirt bei Gray, fig. moll. an. I, pl. 54 fig. 2. Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 23 fig. 1, lebendes Thier, copirt bei Gray fig. moll. an. III pl. 267 fig. 1. — Kiener icon. pl. 28 fig. 1. Berkeley in Zoological Journal V 1835 431—439, pl. 20, 21 lebendes Thier und Anatomie, cop. bei Gray fig. moll. an. II, pl. 127, fig. 5 und Adams gen. moll. pl. 31 fig. 1. Chenu manuel de Conchyl. I p. 286 fig. 1930.

Telescopium indicator Montfort conch. syst. II 1811 p. 438.

— fuscum Schumacher essai 1828 p. 233. Reeve conch. icon. XV fig. 1. Gray guide p. 106, Radula. Tapparone-Canefri Zool. Viagg. Magenta Malac. (Mem. Accad. Torin. 2 XXVIII) p. 42. Tapparone Canefri faun. malac. della Nuova Guinea p. 57. A. Adams. Zool. of the Samarang. Moll. p. VI; gen. moll. I, p. 292, pl. 31, fig. 1<sup>a</sup>, Deckel. Potamides Telescopium (L.) v. Martens Monatsberichte d. Berlin. Akad. 1877 S. 289.

Einzigste Art dieser Unterabtheilung. A. Adams fand sie an der Küste von Borneo in einem von tröpfelndem (trickling) Bächlein bewässerten Mangle-sumpf, theilweise in den Schlamm vergraben, aber die Spitzen vorstehend; ich bei Wahai auf Ceram, ebenfalls im Mangle-sumpf, in Gesellschaft von *P. palustris* und *sulcatus*, und bei Singapore in kleinen Brackwasser-gräben, zwischen Cocos-pflanzungen am Meeresstrande; Reinhardt auf den Nikobaren ebenfalls in Gesellschaft von *P. palustris*, nur weniger zahlreich. Th. Studer auf Timor und in Nordwest-Australien ebenfalls im Mangle-dickicht.

Im indischen Archipel auch ziemlich verbreitet, doch weniger häufig als *P. palustris* und *sulcatus*; auffallend ist, dass Rumph selbst sie nicht gekannt hat, sondern sie erst durch den Herausgeber Schijnvoet in Holland in sein Werk eingeführt wurde. Madagascar nach Sganzin. Ins. Reunion oder Bourbon, Maillard. Malabar-küste, Kiener. Trankebar, Chemnitz. Ceylon, Tennent. Strandsee von Pulicat bei Madras, Mitchell catal. Moll. Madras Mus. p. 24. Calcutta,

Reeve, Brackwasser (estuaries) von Birma, Blanford. Salang, Joh. Weber. Singapore, Traill. Sümpfe bei Batavia; de Filippi und Giglioli. Tandjong Priok bei Batavia, im Mangle-sumpf, Strubell. Borneo, Reeve; Ligitan an der Nordostküste von Borneo, 4° 20' N., A. Adams. Amboina, Quoy und Gaimard. Ceram, v. Martens. Insel Buru, Quoy et Gaimard und Hoed. Pariti auf Timor, Th. Studer. Mariveles, Prov. Bataan, Luzon, F. Jagor. Raffles-bay in Neu-Guinea, Hombron und Jacquinot. Insel Sorong, Beccari. Meermaid-strasse, schon ausserhalb des Wendekreises, Th. Studer Exped. d. Gazelle, und ebenfalls an der Westküste Australiens, Dr. Preiss.

Man kann bei dieser Art zwei Formen unterscheiden, auf welche schon Tapparone-Canefri a. a. O. aufmerksam gemacht hat:

- a) eine schlankere, mehr genau konische, so z. B. ein Stück 94 Mill. lang, aber nur 40 breit, Mündung 21 hoch; die Kante der letzten Windung ist meist deutlich ausgeprägt. Hieher gehören die Stücke von Wahai, von Timor und von der Meermaid-strasse, welche mir vorliegen, und die Abbildung bei Quoy und Gaimard (aus Amboina), während diejenige bei Kiener zwar auch eine schlanke Gestalt, aber doch eine abgerundete Kante zeigt.
- b) eine breitere, kürzere, mit mehr bauchig vortretender letzter Windung, deren Kante sehr abgerundet ist, z. B. ein Stück 86 Mill. lang und doch schon 48 breit, Mündung 22 hoch. Hieher die Exemplare von Buru, von Batavia und von Mariveles auf Luzon, und die Abbildung bei Hombron und Jacquinot, ein Exemplar von Neu-Guinea darstellend. Dagegen ist die Figur bei Reeve zwar auch breit und kurz, zeigt aber doch eine schärfere Kante.

Diese beiden Formen gränzen sich demnach ebenso wenig geographisch bestimmt von einander ab, als sie formell scharf von einander geschieden sind. Man könnte vermuthen, dass es Geschlechtsunterschiede seien, die zweite Form etwa Weibchen, aber dagegen spricht der Umstand, dass die von Einem Fundort mir vorliegenden 2—4 Stück stets derselben Form angehören; wahrscheinlicher sind es Habitusformen, durch die Art des näheren Aufenthaltes bedingt, die breitere, kürzere und stumpfe auf sehr steinigem Grund, stärkeren mechanischen Insulten ausgesetzt, die schlankere, schärfere auf weichem Schlammgrund mit geringer Wellenbewegung, analog den von Ten-

nent auf Ceylon unterschiedenen zwei Formen von *P. palustris* (S. 177).

Die Lebenszähigkeit dieser Gattung zeigt sich unter anderm darin, dass Benson ein Exemplar von *Potamides telescopium* 14 Tage in Süßwasser, hierauf über 4 Monate in Salzwasser und dann wieder 14 Tage ohne Wasser aufbewahrt hat und es doch am Leben geblieben ist, während sonst Meerthiere rasch in süßem Wasser sterben (Zool. Journal V 1835 p. 465).

### C) TYMPANOTONOS (Mörch) Ad.

Knotige Spiralgürtel. Die einzelnen Windungen, namentlich die letzte, unterhalb der Naht in der Schultergegend eckig vorstehend. Mündung rundlich. Spitze nicht regelmässig in grösserer Ausdehnung verloren.

Tympanotonos soll „Trommel-schlegel“ bedeuten und wurde von den Conchyliologen des vorigen Jahrhunderts für verschiedene gethürmte Schnecken, namentlich Turritellen und Cerithien, gebraucht; Klein method. ostraeolog. 1753 begreift darunter das, was wir jetzt *Potamides* im weitesten Sinn nennen, aber auch ächte Cerithien, sowie *Vibex auritus* und *fuscus*, als Illustration gibt er letzteren Tab. II fig. 34 und *P. muricatus*, fig. 35. Mörch catal. Yoldi 1853 hat den Namen wieder aufgebracht, aber fälschlich *Tympanostoma* geschrieben, für die charakteristischen westafrikanischen *P. muricatus* und *radula*, die Gebrüder Adams den Namen in richtiger Schreibweise angenommen für dieselben Arten, ihnen aber auch die indischen hier zu erwähnenden beigefügt.

#### 6. *Potamides cingulatus* Gm.

Lister hist. conch. II 1685 pl. 122 fig. 19. Martini Conch. Cab. IV S. 328. Taf. 157 Fig. 1492 (von Trankebar).

*Murex cingulatus* Gmelin Linn. syst. nat. ed. XIII p. 3561, auf das vorhergehende Citat gegründet.

*Cerithium fluviatile* Potiez et Michaud galerie d. moll. I, p. 363 pl. 31 fig. 19—21. 1838. Kiener iconogr. Cerith. pl. 19 fig. 3. Desh. bei Lam. an. s. vert. ed. 2 IX p. 320. Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 23 fig. 10, 11.

*Tympanotonos fluviatilis* (Pot. Mich.) Reeve conch. ic. XV fig. 9. Troschel Gebiss d. Schnecken I S. 14 Taf. 12 Fig. 2 (*Radula*).

*Cerithium incisum* Hombron et Jacquinot Voy. pole sud, Moll. pl. 23 fig. 8, 9.

*Tympanotonos retifer* Reeve conch. ic. XV fig. 1.

? *Tympanotonos fluviatilis* (Pot. Mich.) Reeve fig. 9.

*Potamides fluviatilis* (Pot. Mich.) v. Martens in Journ. Linn. Soc. XXI p. 109.

— *cingulatus* (Gm.) v. Martens Monatsberichte d. Berl. Akad. 1877 S. 288.

Auf den obern Windungen drei Reihen gleich grosser flacher Körner, von welchen auf dem Rücken der letzten Windung nur die oberste erhalten bleibt, die zwei andern zu flachen Leisten werden. Mündung schief länglich, unten vorgezogen, oben eckig, aber an die vorhergehende Windung noch angelegt. Die Körner meist gleichfarbig, zuweilen aber auch die der obern Reihe heller, gelblichweiss. 19–40 Mill, lang,  $8\frac{1}{2}$  breit, Mündung  $5\frac{1}{2}$ – $10\frac{1}{2}$  Mill.

Makassar auf Celebes: M. Weber.

Weit verbreitet im Gebiet des indischen Oceans: Malabar-Küste in Brackwasser, Potiez und Michaud; Trankebar auf der Koromandelküste, Martini; Ceylon, Hanley, Tennent und Nevill; Tuticorin und Pamban im Golf von Manaar, Thurston; Ganges-Mündung, Lamare-Picquot im Berliner Museum; Mergui, Theod. Philippi; Mergui und die benachbarten Inseln King-, Elphinstone- und Sullivan-island, auf Mangle-Stämmen und im Sand unterhalb derselben, unmittelbar über der Fluthgrenze, J. Anderson. Insel Salang, Joh. Weber.

Auf Singapore, Sumatra bei Benkulen, Banka bei Muntok, Java bei Surabaya von mir gefunden; bei Banjuwangi ebenfalls im östl. Java von Dr. Semmelink. Borneo, Reeve und Hombron, Jacquinot (*incisum*). Makassar, in Salzwasser und Wahai auf Ceram, v. Martens. Philippinen, Reeve. Siam, Cochinchina und Lagune Thuan-An in Annam Rochebrune und Morlet. Makao und Hongkong, in Salzwasser, v. Martens. Nangasaki, Lischke. Meermaidstrasse an der Westküste Australiens, im Mangle-dickicht, Th. Studer auf der Expedition der Gazelle.

Diese Art schliesst sich nach Mündung und Skulptur näher an *P. palustris* und *sulcatus*, als an *decollatus* an, neben welcher letzteren sie von Reeve und Andern gestellt wird. Im Innern zeigt sie an jüngern Exemplaren allerdings keine Falten, aber doch einen mässigen Zahn an der Innenseite des Varix.

7. *Potamides alatus* Phil.

*Cerithium alatum* Philippi abbild. neuer Conch. I 1849. 1. Fig. 11.

— fluviatile (Pot. Mich.) Hombron et Jacquinot Voy. pole sud pl. 23 fig. 10, 11.

*Tympanotonos eurypterus* Reeve conch. ic. XV fig. 8. 1866.

Durch spitzwinkliges Vorstehen der obern Mündungsecke, welche sich von der vorhergehenden Windung ganz ablöst, von *P. cingulatus* verschieden, Gesammtform lang und schmal.

Mergui Theod. Philippi. „Burmese estuaries generally“ Blanford. Singapore, Hombron und Jacquinot; Philippinen, Reeve; Siam und Tonkin, Morlet, also wohl auch in Niederländisch-Indien noch zu finden. Pamban im Golf von Manaar, Vorderindien, Thurston.

Reeve's *Tymp. alatus*, fig. 8, angeblich von West-Africa, ist ganz verschieden von Philippi's Art und mindestens sehr nahe dem *P. cingulatus*.

8. *Potamides micropterus* Kiener.

*Cerithium micropterus* Kiener iconogr. pl. 30 fig. 3.

*Tympanotonos micropterus* Reeve conch. ic. XV fig. 7, Chenu manuel conchyl. I p. 265, fig. 1924.

Grösser und breiter conisch. Mündungsecke noch mehr vorstehend, Borneo, Kiener. Philippinen, Reeve.

## D) CERITHIDEA Swains.

Oberes Ende bei den erwachsenen regelmässig abgestossen. Vertikalfalten schärfer ausgeprägt, schmaler als ihre Zwischenräume. Mündung rundlich, der Aussenrand nach oben nicht wirklich ausgebuchtet, immer deutlich umgeschlagen. Keine Falten oder Zähne im Innern.

Äussere Weichtheile, namentlich Schnauze und Fussrand öfters lebhaft gefärbt, namentlich auch roth.

Radula einer unbestimmten Art, Gray, guide moll. p. 108.

Die einzelnen Arten unter sich sehr ähnlich.

Auf Singapore habe ich zu zwei verschiedenen Malen, im August 1860 und September 1861 zwei Arten dieser Gattung lebend beobachtet und gefunden, dass die Augen im untern Drittel der Fühler stehen, der Fühler oberhalb derselben aber gleich viel dünner ist und nur unter Wasser ausgestreckt getragen wird, über Wasser an der Luft aber so dicht an den untern Theil angelegt wird, dass er nicht

leicht zu sehen ist und man sich erst, indem man das Thier wieder unter Wasser bringt, von seiner Anwesenheit überzeugen kann; auf Tafel X, Fig. 4, 5, 7, ist das nach den Zeichnungen, die ich an Ort und Stelle machte, dargestellt. Aus diesem Umstand erklären sich, glaube ich, auch die abweichenden Angaben von A. Adams, Zoology of the voyage of H. M. S. Samarang 1848, p. 44, wonach die Augen bei *P. obtusus* [quadratus] und einer dem *decollatus* ähnlichen Art endständig sein sollen, dagegen bei *P. decollatus* selbst der Fühler sich als dünner Faden darüber hinaus verlängert. Da die Arten im Übrigen so nahe unter sich verwandt sind, kann ich nicht annehmen, dass sie hierin so wesentlich verschieden seien und glaube eher, dass A. Adams die ersteren eben nicht unter Wasser beobachtet hat. P. Fischer hat für diejenigen mit angeblich endständigen Augen eine eigene Gattung *Aphanistylus* vorgeschlagen, Manuel p. 682, welche als auf einem Beobachtungsfehler beruhend nicht anzunehmen ist. Bei *Assimineae* dagegen ist auch unter Wasser keine beträchtliche Verlängerung des Fühlers über das Auge hinaus zu sehen.

Nach der Beobachtung von A. Adams hängen sie sich mittelst selbstgesponnener Fäden an die Zweige der Mangle-stauden, so dass sie auch bei geschlossenem Deckel nicht herabfallen (Zoology of the voyage of H. M. S. Samarang, Moll. p. 44, pl. 13, fig. 3).

9. *Potamides obtusus* Lam. Tab. IX, fig. 22.

*Cerithium obtusum* Lamarck an. d. vert. VII, ed. 2, IX, p. 294;

Kiener icon., pl. 29, fig. 1. Hombron et Jacquinot, Voy. pole sud pl. 23, fig. 3, lebendes Thier, copirt bei Gray fig. moll. an. III, pl. 267, fig. 3. — Eydoux et Souleyet, Voy. Bonite, Zool. II, p. 600, pl. 39, fig. 1, cop. Gray, II, pl. 127a, fig. 10.

*Cerithidea obtusa* (Lam) Adams gen. moll. pl. 31, fig. 2b. Reeve conch. icon. XV, fig. 4. Chenu manuel conchyl. I, p. 286, fig. 1927.

Die grösste Art, 35—52 Mill. lang, 22—27 breit, Münd. 14—20 Mill.

Die Falten am letzten Umgang um das Doppelte ihrer Breite von einander abstehend, recht schief. Unterseite ziemlich flach, nur durch eine sehr stumpfe Kante von der Seitenfläche getrennt. Hellbraun ohne Flecken, die Nahtgegend und öfters auch ein Band unter der Kante weisslich. Mündungsraum dick. Schnauze scharlachroth und schwarz queergebändert. Fühler und vorderer Fussrand scharlachroth.

Calcutta, von Nevill erhalten. Mergui, Theod. Philippi; ebenda in

Mangle-gebüsch, J. Anderson; Salang, Joh. Weber; Pulo Pinang in Pfützen brackischen Wassers, Souleyet; Malakka, Reeve. Singapore, Traill und F. Jagor; ebenda auf Schlamm Boden an der Mündung eines Baches bei Ebbe über Wasser, v. Martens; Singkawang, Mampawa und unterhalb Pontianak, an der Westküste von Borneo, v. Martens. Tanah-laut, Südöstliches Borneo, Dr. Semmelink; Timor, Peron bei Lamarck.

Auch von Siam aus Mouhot's Sammlung erhalten und aus Cochinchina von den französischen Autoren genannt.

Von Ostafrika nur aus Madagascar bei Lamarck und Sganzin angegeben.

10. *Potamides quadratus* Sow. Tab. IX, Fig. 23.

*Cerithium obtusum* (Lam.) Quoy et Gaimard, Voy. Astrolabe, Zool.

III, pl. 55, fig. 19—24, lebendes Thier und Deckel, copirt bei Gray fig. moll. an, I, pl. 52, fig. 2. — Adams et Reeve Zool. Samarang, Moll., p. 43, pl. 13, fig. 3; lebendes Thier.

— *obtusum* var. Kiener iconogr. pl. 29, fig. 2.

— Quoyi Hombron et Jacquinot, Voy. pole sud, Moll pl. 23, fig. 6. 7.

*Cerithidea quadrata* Sowerby bei Reeve conch. icon. XV, fig. 5.

Adams gen. moll. pl. 31, fig. 2. — Tapparone-Canefri Zool. Viagg. Magenta, Malac. C. Mem. Accad. Torino 2 XVIII, 1874, p. 40.

— Kieneri (Hombr. Jacq.) bei Reeve conch. icon. XV fig. 6.

Kleiner und schlanker, die Falten kaum oder gar nicht schief, auf den früheren Windungen näher bei einander als auf der letzten, Falten und Spiralleisten scharf, an ihrer Kreuzung zu Spitzen sich erhebend; Unterseite fast eben, scharf von der Seite abgesetzt. Färbung ähnlich wie bei *P. obtusus*, aber die blasse Farbe unterhalb der Naht weiter abwärts, bis zur vierten Knotenreihe reichend.

Mündungsrand dünner. 24—33 M. lang, 13—16 breit, Münd. 9—11 $\frac{1}{2}$ .

Schnauze etwas warzig, in der vorderen Hälfte schwarz, mit goldenen Punkten, in der hintern und ebenso die Fühler von der Basis bis zu den Augen gelb mit zahlreichen rothen Flecken; so habe ich es auf Singapore gesehen; A. Adams beschreibt die Schnauze als braun mit drei gelben Längslinien, die mittlere vorn gegabelt und die Fühler geringelt; nach der Abbildung bei Quoy und Gaimard Schnauze gelb und schwarz gebändert.

An Steinen und an Wurzeln von Mangle-sträuchern, zur Ebbezeit



über Wasser auf Amboina von mir gefunden. A. Adams sah sie ebenfalls in brackischem Wasser in Mangle-sümpfen und Flussmündungen, an Steinen und Blättern kriechend und öfters mittelst eines Schleimfadens an Zweigen oder Wurzeln der Mangle-stauden aufgehängt.

Malakkka, Reeve; Salang, Joh. Weber; Singapore, A. Adams, F. Jagor, v. Martens, Giglioli, Hombron und Jacquinot (Quoyi). Borneo, A. Adams; Siam und Cambodja, französische Autoren; Makassar, v. Martens; Mariveles, Prov. Bataan, Luzon, F. Jagor. Insel Buru, Quoy und Gaimard. Wahai auf Ceram, Weynitu auf Amboina und Atapupu auf Timor, v. Martens; Pariti auf Timor, Th. Studer Expedition der Gazelle.

*Cerithium Kennerii* Hombr. et Jacq., Voy. pole Sud, Moll. pl. 23, fig. 4. 5 (Gray III, pl. 267, fig. 4. 5), von Neu-Guinea (im Text von Rousseau p. 96 Kieneri) scheint mir eine Zwischenform zwischen *P. obtusus* und *quadratus*.

#### 11. *Potamides decollatus* Brug.

*Cerithium decollatum* Bruguière Encycl. meth., Vers I, nr. 45; Lam. an. s. vert. ed. 1, VII, ed. 2, IX, p. 294; Sow. genera of shells pl. 260, fig. 2 = Reeve conch. syst. pl. 227, fig. 2. Kiener icon. pl. 28, fig. 2.

*Cerithidea decollata* (Brug.) Reeve conch. icon. XV, fig. 14. Adams gen. moll., pl. 31, fig. 2a; Deckel, Chenu manuel de conchyl., I, p. 286, fig. 1931; Troschel Gebiss. d. Schnecken, I, S. 147, Taf. 12, Fig. 4 (Radula).

Falten ziemlich senkrecht, zahlreich, auch auf der letzten Windung, ihre Zwischenräume kaum breiter als sie selbst. Unterseite gewölbt, nicht durch eine Kante von der Seitenfläche abgesetzt. Färbung dunkler, violett-braun, Nahtgegend weisslich, Mündungsrand mässig stark, gefärbt.

Zanzibar von der Decken, und Mossambique, Prof. Peters im Berliner Museum. Madagaskar, Bruguière. Ganges-mündung, Lamare-Picquot. Singapore, Jagor. Mampawa an der Westküste von Borneo, v. Martens. Nach Tenison-Woods an der Nordostküste Australiens an kleinen Stämmen von *Melaleuca leucodendron*, welche auf den überflutheten Flächen ausserhalb des Randes der Manglebüsche wächst; übrigens mir zweifelhaft, ob gerade diese Art oder eine der nächstverwandten.

*Murex decollatus* Linn. ist nicht diese Art (vgl. Hanley ipsa Linn. conch. p. 341), sondern wahrscheinlich die südamerikanische *Melania atra* Richard (*truncata* Lam.).

12. *Potamides rhizophorarum* A. Ad.

*Cerithidea rhizophorarum* A. Adams bei Reeve, conch. icon. XV, fig. 13.

Mehr cylindrisch, Sculptur dicht gegittert.

Borneo und Philippinen, an Mangle-wurzeln. Cochinchina, P. Fischer.

Es scheint mir noch etwas zweifelhaft ob die japanischen Exemplare, welche Tapparone-Canefri in Zool. del viaggio delle Magenta Malacolog. (Mem. Acad. Torin. 2, XVIII, 1874) p. 38 als *C. rhizosperarum*, Druckfehler für *rhizophorarum*, beschreibt und Taf. 1, Fig. 14 abbildet, zu dieser Art gehören; ähnliche Stücke, welche ich in Japan gesammelt, passen auch nicht genügend zu Reeve's Beschreibung und Abbildung.

13. *Potamides ornatus* A. Ad.

*Cerithidea ornata* A. Ad. Reeve conch. icon. XV, fig. 22, Sowerby thesaur. fig. 277, 278. Böttger, Bericht d. Senkenberg. Gesellsch. 1890, S. 167. Schepman Not. Leyd. Mus. XIV, p. 155.

Klein und schlank, Windungen gewölbt, Falten senkrecht, auch auf den früheren Windungen um mehr als ihre eigene Breite von einander abstehend. Färbung dunkel-violettbraun, ein helleres röthlich-gelbes Band oben gleich unter der Naht und ein zweites ähnliches in der Mitte jeder Windung, beide über Rippen und Zwischenräume hinweggehend, daher die Rippen gefleckt erscheinen. 26—29 Mill. lang, 12—13½ breit, Mündung 9—9½ Mill.

Tandjong Priok bei Batavia, in Brackwasserlagunen, Strubell. Nordwestküste von Sumatra, nach Schepman. Molukken, bei Batjan von mir an schwach salzhaltigen morastigen Stellen gefunden, zusammen mit *Neritina communis* Q. G., *turrita* var. *Cumingiana* Recl. und mit *N. (Neritodryas) cornea* L.; ebenda auch in dem Brackwasser-see Telaga an den Stämmen von *Sonneratia*, zur Fluth-zeit etwas über Wasser.

Auch bei Kajeli auf Buru und Kupang auf Timor von mir gefunden. Nordwestküste von Sumba, Dr. ten Kate. Ferner bei Manila. Reeve nennt sie von einer andern Insel der Philippinen, Negros.

14. *Potamides Charbonnieri* Petit.

*Cerithium Charbonnieri* Petit in Journ. de Conchyliologie II, 1851, p. 264, pl. 7, fig. 7.

*Cerithium uncarinatum* Metcalfe in Proc. Zool. Soc. 1851, p. 73 und Ann. Mag. n. h. (2) XI, 1853, p. 70.

*Cerithidea Charbonnieri* (Petit) A. A. Adams genera moll. pl. 31, fig. 2, lebendes Thier. Reeve conch. icon. XV, fig. 12.

Windungen flach, Falten senkrecht, zahlreich. Unterseite durch einen vortretenden Kiel umgrenzt. 38—48 Mill. lang, 19—20 breit, Mündung 53 Mill.

Borneo, Schiffsarzt Charbonnier; Umgegend von Sarawak, Metcalfe; Tanah-laut im südöstlichen Borneo, Dr. Semmelink. Eine kleinere Form „Rivière de Moeara Kempick, île de Palembang, von Hrn. Wallays gesammelt“, Petit a. a. O. vermuthlich eines der vielen Muara (Vereinigung von zwei Flüssen) im Gebiet von Palembang auf Sumatra. Siam, Cochinchina und Tonkin, Mabilie und Andere.

15. *Potamides corneus* A. Ad.

*Cerithidea cornea* A. A. Adams bei Reeve conch. icon. XV, fig. 21.

Falten stark, ziemlich senkrecht, nicht ganz nahe an einander. Windungen flach, nur an der Naht eingezogen. Spiralskulptur nur an der Unterseite, diese durch eine einfache Kante abgegrenzt. 29 Mill. lang, 14 breit, Mündung 10 Mill.

Borneo, an Flussmündungen, (Reeve); Südostküste von Neu-Guinea, Semon.

16. *Potamides Tenkatei* Schepm.

*Cerithidea Tenkatei* Schepman in Tijdschr. Ned. Dierk. Vereenig. (2) IV, 1893, p. 66.

Gethürmt, braunschwarz oder röthlichbraun, mit zahlreichen scharf ausgeprägten, etwas bogenförmigen Vertikalfalten, welche an den untersten Windungen etwas weitläufiger auseinanderstehen, und dazwischen ähnlich verlaufende schwachen Linien. Spiralfurchen nur auf den 2—3 letzten Windungen, eine stärkere nahe unter der Naht und einige schwächere zwischen ihr und dem grössten Umfang; stärker ausgeprägt an der Basis der letzten Windung, namentlich gegen die Peripherie zu.

Insel Rotti bei Timor, im Salzsee Tasi-Poko. Dr. H. ten Kate.

A. Adams, Zool. Samarang p. 44, spricht noch von einer unbestimmten

Art, welche er in Borneo viele (englische) Meilen landeinwärts, wo das Wasser vollkommen süß, an den Blättern von *Pontederia* und an Riedgräsern (sedges, ? *Carex*) im Schlamm an den Fluss-ufern gefunden habe; die Farbenbeschreibung der Weichtheile stimmt mit derjenigen bei *P. obtusus* überein. Mir ist weder auf Borneo, noch sonst ein *Potamides* bedeutend landeinwärts vorgekommen.

### **Faunus** Montf.

#### *Pirena* Lam. z. Theil.

Schale glatt, schwarz oder dunkelbraun, lang gethürmt; Mündung mit einem breit abgerundeten obern und untern Ausschnitt, zwischen welchem der Aussenrand lappenartig vortritt. Radula mit 3 lappigen Seitenplatten.

#### 1. *Faunus ater* L.

*Strombus palustris laevis* Rumph. amb. rar. S. 101 (deutsche Ausg. S. 71), taf. 30, fig. R.

— *ater* Linne syst. nat. ed. X, p. 746. Chemnitz conch. cab. IX, S. 191, fig. 2227.

*Nerita atra* Müll. hist. verm. II, p. 188. — *Cerithium atrum* Brug. Encycl. Vers. I, nro 18.

*Cerithium fluviatile* Brug. Encycl. meth. I, p. 485. Ferussac essai meth. conch. p. 69.

*Pirena terebralis* Lam. an. s. vert. ed. 1. VI 2, p. 169; ed. 2, VIII, p. 499. Lesson Voy. de la Coquille, zool. II 1, p. 360. Quoy et Gaimard Voy. de l'Astrolabe, zool. III, p. 161, pl. 56, fig. 40—42, lebendes Thier, copirt bei Gray, fig. moll. an. I, pl. 55, fig. 1.

*Ebena nigra* Schumacher essai syst. test. 1817, p. 207.

*Melanopsis atra* Ferussac in Mem. Soc. d'hist. nat. de Paris 1821, p. 141. Sowerby Genera of shells nro 22, pl. 131, Fig. 1, (mit *Auster*).

*Pirena atra* (L.) Mousson moll. jav. S. 63, Taf. 10. Fig. 1. — Troschel Gebiss d. Schnecken I, S. 118, Taf. 9, Fig. 7, Radula.

*Faunus ater* (L.) Brot Melaniaceen S. 410, Taf. 44, Fig. 3. Nevill handlist moll. Indian Mus. II, p. 217.

„Man findet diese Art ebenfalls (mit Bezug auf den vorherbeschriebenen *Potamides palustris*) an morastigen Flüssen und an den Wurzeln der Bäume, sind auch gut zu essen“, Rumph. Ich fand diese Schnecke

auf Batjan, an Bachmündungen in schwach salzigem Wasser auf kahlem Schlammgrund, bei Ebbe öfters über Wasser, nicht selten kleine Austern an der Schale angewachsen; ganz ebenso auf Buru auf kahlen morastigen Stellen der Flussmündung, bei Ebbe über Wasser; bei Weynitu auf Amboina an der Mündung eines Baches. Lesson fand sie auf Buru im Brackwasser (eaux saumâtres) auf Sumpfboden, der theilweise nicht vom Wasser bedeckt war (marécages à demi découverts) und auch auf Neu-Guinea. Die Expedition der Gazelle auf der Bougainville-insel (Salomons-inseln) auch im Manglesumpf.

Java, „aus dem Flusse Tjimarra“, Zollinger; Celebes mit Fragzeichen Nevill Calcutta Mus. (handlist II, p. 217). Neu-Guinea und Neu-Irland, Lesson und Quoy et Gaimard. Ceylon und Nikobaren Nevill. Philippinen, Cuming. Pulo-Condor Rochebrune.

Auf Batjan habe ich an mehreren noch lebenden Exemplaren eine eigenthümliche glatte Abschleifung der einen langen Seite der Schale, der Mündungsseite entsprechend, gesehen, bis auf ein Drittel des Durchmesser, und die dadurch entstandenen Öffnungen durch Neu-Ablagerung geschlossen, also offenbar während des Lebens, wahrscheinlich durch Nachschleifen der langen schweren Schale auf dem Boden entstanden.

#### Quoyia Desh.

Schale konisch-geöhürmt, die obern Windungen regelmässig abgestossen; Mündung mit einer Spiralfalte am obern (hintern) Ende des Columellarrandes und einem kleinen Ausschnitt am untern Rande. Deckel mit sehr wenigen Windungen. Schnauze sehr vorstehend, mit dunkeln Queerlinien; Augen an der Aussenseite der langen und spitzen Föhler, nahe der Basis.

##### 1. *Quoyia decollata* Q. G.

*Planaxis decollata* Quoy et Gaimard Voy. Astrolabe, Zool. III, p. 489, pl. 33, fig. 33, 37; lebendes Thier und Deckel, copirt bei Gray fig. moll. an. I, pl. 24, fig. 4 und Adams Gen. moll. I, p. 323, pl. 34, fig. 3, 3 a b c.

Spiralgefurcht, braun mit dunkleren Striemen, 14–18 Mill. lang, 12–13 breit, Mündung 11–12. Kopf und Fuss schwärzlich.

Diese Gattung gehört schon mehr zu den wirklichen Meerschnecken, als zu den nur submarinen; ich fand sie zu Batjan an der Küste

schon näher dem niedrigsten als dem höchsten Wasserstande, neben kleinen Purpura-arten und Columbellen und bei Ternate am offenen Meer, etwas über Wasser, an Lavablöcken bei Ebbe über Wasser; in einer Schüssel mit Seewasser kroch sie alsbald über Wasser heraus. Strubell gibt an sie am Fluss Batugadja bei der Stadt Amboina (Böttger, Bericht d. Senkenb. Gesellsch. 1891, S. 208), A. Adams an der Nordostküste Borneos zwischen der verschlungenen Wurzeln der Mangrove-[Mangle]-Büsche (Zool. Sam. Moll. p. V, VI) gefunden zu haben. Quoy und Gaimard fanden sie an Flussmündungen bei Port Dorey, Neu Guinea. Th. Studer in Neu Hannover an Mangle-büschen.

Im Gebiet von Niederländisch-Indien fand ich sie noch auf Tawalli, nördlich von Batjan und auf Adonare, Beccari auf den Kei-inseln. Quoy und Gaimard fanden sie an Bachmündungen an der Küste von Neu Guinea.

Diese Gattung scheint dem östlichsten Theil des indischen und dem nächst anliegenden des stillen Oceans anzugehören, westwärts nicht weiter als bis zur Ostküste Borneos, ostwärts bis zu den Carolinen (Insel Yap) und Neu-Irland vorzukommen. Das Berliner Museum erhielt sie namentlich von Neu-Hannover und dem Macluer-golf auf Neu-Guinea durch die Expedition der Gazelle, von Neu-Britannien und von Ponape (Carolinen) durch O. Finsch.

#### **Melania.**

Als Brackwasserbewohner sind auch einige der schon oben behandelten Melanien, namentlich *M. Celebensis* Q. G. var. *minor* aus der Untergattung *Tarebia* (S. 70), *M. semicostata* Phil. und *Riqueti* Grateloup (S. 37, 74) aus der Untergattung *Sermyla* zu nennen.

#### **LITTORINIDEN UND RISSOIDEN.**

Auch diese sind den Cerithiiden und Melaniiden in Deckel, Fühlern, Fuss und Radula sehr ähnlich und an der Schale im Allgemeinen nur dadurch zu unterscheiden, dass dieselbe nicht so gethürmt, meist eiförmig, die Mündung meist ohne Ausschnitt oder Ausguss, der Columellarrand oft verbreitert ist. Sculptur sehr verschieden. Ein Ausschnitt an der Mündung kommt übrigens bei der Gattung *Rissoina* vor. Deckel ebenfalls hornig, spiral, in der Regel mit wenig Windungen, aber bei einer Untergattung von *Littorina*, *Pagodus*, auch mehr kreisrund mit zahlreicheren Windungen, wie bei *Potamides* und *Brotia*.

**Littorina** Fer.

Schale meist dick, konisch, aber nach unten abgerundet. Columellar-seite der Mündung flächenartig ausgebreitet. Radula ungewöhnlich lang, mehrfach länger als die Schale. Obwohl wasserathmend, doch viel über Wasser lebend.

**A) LITTORINOPSIS** Mörch 1870.

Dünnschalig, spiralgestreift und bunt gezeichnet, Columellarrand oft etwas violett gefärbt.

Hauptsächlich im Mangle-gebüsch vorkommend und daher zu den Brackwasser-Schnecken zu rechnen.

**1. *Littorina scabra* L.**

Buccinum foliorum Rumph amb. rar. 1705, p. 98, Taf. 29, Fig. Y. deutsche Ausgabe S. 66, aber die Figur etwas verändert, eine Nassa darstellend. Gmelin Linne syst. nat. ed. XIII, p. 3493; Martens in Mal. Blätt. X, 1863, p. 80.

Helix scabra Linne syst. nat. ed. X, 1758, p. 770; Hanley ipsa Linn. conch. p. 305.

Littorina Novae-Hiberniae Lesson Voy. de la Coquille, Zool. II, 1, p. 338.

Littorina angulifera (Lam.) Quoy et Gaimard Voy. Astrol. Zool. II, p. 770, pl. 33, fig. 2, 3, lebendes Thier, copirt bei Gray fig. Moll. an. I, pl. 51, fig. 1, 1a.

Littorina scabra (L.) Philippi Abbild. neuer Conchylien, I, Littorina IV, S. 38, Taf. IV, Fig. 3, 5. Reeve conch. icon. X, fig. 21. Chenu manuel conch. I, p. 300, fig. 2106. Nevill hand-list Moll. Indian Mus. II, p. 145. Troschel Gebiss der Schnecken I, S. 133, Taf. 10, Fig. 18. (Radula). Martens Mal. Blätt. 1863, S. 80 und 129; Weinkauff Littorina in d. neuen Aufl. v. Chemnitz S. 37, Taf. 4, Fig. 7–10. Böttger Bericht d. Senkenb. Gesellsch. 1890, S. 169 und 1891, S. 309. v. Martens in Don. Bismarckianum, S. 39 und in Möbius Beitr. Meeresfaun. Mauritius, S. 284.

Länglich-konisch, mit einer mehr oder weniger kielförmig vorspringenden Kante an den obern Windungen in der Naht; an der letzten etwas unterhalb des grössten Umfanges, eine Basalfläche von der

Seitenfläche abscheidend. Durch vertiefte Spirallinien werden 11 Spiralleisten zwischen der Naht und dieser Kante gebildet, von denen aber mehrere oder alle wieder durch eine Mittellinie zweigetheilt werden, sodass die Zahl der Spiralfurchen bis 22 steigen kann; die Zahl ist daher kein festes Artkennzeichen gegenüber der westindischen und westafrikanischen *L. angulifera* Lam., wohl aber die schlankere Gestalt, weniger gewölbte Windungen und die untere Kante. Strohgelb bis hellbraun, mit unregelmässig schiefen, öfters unterbrochenen oder zu Flecken aufgelösten braunen Striemen, 20–30 Mill. lang, 15–20 breit, Mündung 14–17 Mill.

Das grösste Stück, das ich bis jetzt gesehen, fand ich bei Palabuan auf Java; es ist 38 Mill. lang und 25 breit, die Mündung in ihrer schiefen Ebene 22 Mill. lang und 15 breit.

Rumph sagt: „Man findet sie in Menge an den Blättern und Aesten solcher Bäume sitzen, welche am Strand wachsen, vorzüglich auf dem *Mangium fruticans*“, das ist nach seinem herbar. amboin. III, Tab. 77 *Aegiceras majus* Gärt. (*Rhizophora corniculata* L.), ein mit den Myrsineen nächstverwandter, aber in Habitus und Vorkommen den Rhizophoren gleichender Baum, der gesellig an vielen Küsten des indischen Oceans wächst, vgl. Miquel Flora van Nederlandsch Indie II, p. 1030, 1031.

Ich habe diese Littorine an den Zweigen und Blättern von *Sonneratia* und *Rhizophora* auf den Molukken-inseln Ternate, Tawalli, Batjan und bei Dodinga auf Halmahera gefunden, auf Ceram bei Wahai im Mangle-dickicht, auf Amboina selbst an den Mangle-büschen bei Weynitu, die grössten Stücke auf einzeln stehenden Bäumchen von *Bruguiera Rumphii* Blume (*Mangium celsum* bei Rumph herb. amboin. Tafel 68) am Meeresstrand selbst, sowie auch an Pfählen; ferner bei Oka nahe Larentuka auf Flores, hier zahlreich auf Steinen am Rand eines Bächleins dicht am Meeresstrand. F. Jagor fand sie zu Blakang-mati bei Singapore lebend „auf allen Zweigen und Blättern der Manglebäume“, ebenso Th. Studer in der Segaarbai und Galewostrasse (Neu-Guinea) an Mangle-Stämmen und Blättern. Bei Makassar fand ich sie an Pfählen sitzend in einer schlammigen Einbucht. Weit verbreitet im Gebiet des indischen Oceans. Philippin gibt als Fundorte Singapore und die Philippinen-inseln Mindoro, Panay, Masbate und Mindanao, ferner Kanton, Neu-Guinea, Neu-Irland und Australien an. Das Berliner Museum besitzt sie von Bagamoyo (G. A. Fischer) und



Inhambane südlich von Mossambique (Peters), Mauritius und den Seychellen (Möbius), „Burmese estuaries generally“ (Blanford), Salang an der Küste von Malacca (Joh. Weber), Singapore (F. Jagor und v. Martens), Tandjong Priok und Pulo Lang bei Batavia (Strubell); Surabaya, Makassar, Banka, Ternate, Batjan, Halmaheira, Amboina (v. Martens); Sarawak (Metcalf); Ceram (Ida Pfeiffer); Aru-inseln (Beccari); Salawatti (Exp. d. Gazelle); Neu-Guinea (Neu-Guin. Compagnie); Neu-Irland (durch Kobelt erhalten); Siam, den Philippinen-inseln Luzon und Samar (Jagor); Zamboanga auf Mindanao und Tamsui auf Formosa (v. Martens); dem Maccluer-golf an der Westküste von Australien (Exp. d. Gazelle); Kingsmill-inseln (Pease); Jaluit (Finsch) und Puripet (Dunker's Sammlung). Im Leidner Museum auch von Gorontalo, Adonara und Solor. An der Ostküste Australiens reicht sie nach Tenison-Woods südlich soweit als die Strandgebüsche von *Avicennia* vorkommen, bis Port Jackson.

Weinkauff a. o. gibt ihr noch eine weitere Verbreitung, vom Cap bis zu den Sandwich-inseln; das Cap nennt er wohl desshalb, weil Krauss in seinen „südafrikanischen Mollusken“ *L. intermedia*, welche Weinkauff zu *scabra* rechnet, aufführt, aber er fand sie in Natal, das schon eine viel mehr tropische Fauna hat als das Cap. Auf den Sandwich-inseln lebt *Lit. Newcombi* Reeve, welche Weinkauff mit *scabra* vereinigt, doch lässt sie sich ihrer Form nach noch davon unterscheiden. Die älteste Abbildung einer derartigen Schnecke, bei Lister hist. conch. IV, 1688, Taf. 583, Fig. 38, passt gut zu dieser Art, doch ist nach der Beischrift Barbados zu vermuthen, dass die verwandte west-indische Art, *angulifera* Lam. (*Phasianella*) gemeint sei; auch Chemnitz's *Helix scabra*, Conchyl. Cabinet XI, fig. 2077 ist diese *angulifera*. Dagegen ist ziemlich zweifelhaft, ob Bonanni recr. 1681, fig. 143 diese Art vorstellt.

Weinkauff in seiner Monographie von *Littorina* S. 70 tadelt, dass ich *L. ambigua* Reeve fig. 64 zu dieser *Newcombi* und Philippi's *ambigua*, Taf. 7, Fig. 6, zu *pintado* Wood citirt habe; Reeve's *ambigua* soll nach ihm zu *picta* Phil. und Philippi's *ambigua* zu *Newcombi* gehören; ich bin hierin den Angaben von Pease Americ. Journ. of Conchology IV, p. 127, welcher ein reiches Material von Conchylien der Sandwich-inseln hatte und mit der Cuming'schen Sammlung verglich, gefolgt und halte es auch jetzt noch, nach erneuter Vergleichung der Figuren mit sicher bestimmten Exemplaren, für das Richtigere.

*Littorina scabra* var.

*Littorina arboricola*, Reeve conch. icon. X, fig. 27, 1857. Nevill handlist II, p. 147.

Mit stärkeren Spiralleisten, meist eine stärkere mit einer schwächeren abwechselnd, durchschnittlich schlanker, bis 29 Mill. lang, 19 breit, Mündung 13.

Singapore auf Zweigen der Mangle-bäume, Cuming, Jagor, Stoliczka und v. Martens. Muntok auf Banka, Zamboanga auf Mindanao und Gross-Tawalli bei Batjan, v. Martens; Mambulao auf Luzon, Jagor. Larentuka und Solor, Leidn. Mus. Salawatti bei Neu-Guinea und Bougainville-insel, Expedition der Gazelle. Kuschai, Karolinen, Finsch. Kingsmill-inseln, Pease.

2. *Littorina intermedia* Phil.

Philippi Proc. Zool. Soc. 1845, p. 141; Abbild. neuer Conchyl. II, S. 223, Taf. 5, Fig. 7—9. (Reeve conch. icon. X, fig. 101 nicht gut, ob dieselbe Art?) v. Martens Donum Bismarckianum S. 39. Journ. Linn. Soc. XXI, 1886, p. 169. Nevill handlist II, S. 146. Böttger Bericht d. Senckenberg. Gesellsch., 1890, S. 168.

*Littorina Winteriana* Dunker in coll.

— *scabra* var. 3 Weinkauff, Lit. in d. Forts. v. Chemnetz S. 38, Taf. 4, Fig. 16—18.

— *ziczac* (Chemn.) Blanford in Brit. Birmah Gazetteer I, p. 714 (nach Exemplaren in der Dunker'schen Sammlung).

Ähnlich *L. scabra*, aber kleiner, die letzte Windung ohne Kante, mit nur 8 vertieften Spirallinien auf dem sichtbaren Theil der vorletzten Windung. 14—22 Mill. lang, 9—10 breit, Mündung  $7\frac{1}{2}$ —8.

Muntok auf Banka und Anjer in der Sundastrasse, v. Martens; Krakatau, Strubell; Mündung des Tjiliwong bei Batavia, Leid. Mus. Amboina, Oka bei Larentuka und Adonara, v. Martens.

Bei Muntok sah ich diese Art nur unter Wasser, nicht so hoch oben wie *L. vilis*. Philippi kannte sie vom Rothen Meer, Natal (Krauss), Mergui (Theod. Philippi), dem nördlichen Australien, Tahite und Elizabeth-Island in Polynesien; Nevill ebenfalls von Rothen Meer, den Malediven, Ceylon, Andamanen und Nikobaren, Arakan, Pulo Pinang, ferner den Samoa- und Kingsmill-inseln; das Berliner Museum hat sie auch vom Rothen Meer, Natal, Inhambane, Nossi-Be bei Madagascar, dem Golf von Manaar, Port Canning in Bengalen, Formosa, Moreton-

Bai an der Ostküste Australiens, und etwas abweichend von den Kingsmill-Inseln. F. Krauss fand sie in Natal ebenfalls an Stämmen der Rhizophoren in Gesellschaft mit *Potamides decollatus*.

### 3. *Littorina carinifera* Menke.

*Phasianella carinifera* Menke synops. moll. 1830, p. 51 u. 141.

*Littorina perdix* King in Zoological Journal V, 1831, p. 345.

— *carinifera* Philippi Abbild. neuer Conch. II, S. 227, Taf. 5, Fig. 22—24. Weinkauff S. 48, Taf. 6, Fig. 2—3; Böttger Bericht d. Senckenb. Gesellsch. 1890, S. 167; Nevill. handlist II, S. 151; Reeve conch. icon. X, fig. 29.

— *filosa* (Sow.) Weinkauff *Littorina* S. 57, Taf. 7, Fig. 10, 11.

Mit starken Spiralkielen, 2—4 auf der drittletzten und vorletzten, 4 oberhalb des Hauptkiels auf der letzten Windung; trüb graubraun mit röthlichen Flecken oder Flammen auf den Kielen. 18—24 Mill. lang, 12—17 breit, Mündung 9—14 hoch.

Benkulen, v. Martens; Java, Macklot (bei Philippi) u. Winter in Dunker's Sammlung; Krakatau und Tandjong Priok bei Batavia, in Mangle-sümpfen, Strubell; Nusa-Kembangan an der Südküste von Java, Jagor; Borneo, Reeve (wahrscheinlich Sarawak); Philippinen-Insel Negros, Cuming; China, Cecille bei Philippi; Bombay und Arakan, Andamanen und Nikobaren bei Nevill. Mergui, Anderson; Insel Salang an der Küste von Malakka, Joh. Weber; Singapore, Jagor und Martens. Karolinen, O. Finsch.

Weiter nach Osten ist sie nicht bekannt.

### 4. *Littorina conica* Phil.

Philippi Proc. Zool. Soc. 1845, p. 141; abbild. neuer Conch. III S. 9, Taf. 6, Fig. 1. 2; Reeve, X, fig. 36; Weinkauff, *Littorina* S. 54, Taf. 7, Fig. 1 und 4. Nevill. handlist II, p. 149.

Konisch mit ebenen Seitenwänden und deutlichem Kiel, dünnschalig, fein spiral gestreift, blass gelblich oder hellgrau, einfarbig oder mit dunkleren Flecken. Mündungsrand oft etwas ausgebogen. Nahe mit *L. scabra* verwandt und höchst wahrscheinlich wie diese auf Mangle-gebüsch lebend.

Java, Philippi. Ferner Mergui, Th. Philippi. Singapore, in Lischke's Sammlung; Port Canning in Bengalen, Nevill.

5. *Littorina melanostoma* Gray.

Gray Zoology of Beechey's voyage 1839, p. 140; Philippi a. a. O. Taf.

5, Fig. 16; Reeve X, fig. 45; Weinkauff S. 41, Taf. 4, Fig. 19.

Schlank konisch, mit deutlichem Kiel, blassgelb, spiral- gestreift, mit dunkelbraunem Columellarrand. Lebt auch auf Mangle-gebüsch, ist mir aber in Niederländisch-Indien noch nicht vorgekommen. Zwar gibt Philippi a. a. O. Java als Fundort an, aber das ist ein Irrthum, indem er sich auf das Berliner Museum beruft, wo diese Art schon lange aus Bengalen durch Lamare-Picquot vertreten ist, aber nicht aus Java; auch in der Sammlung Dunker's, welcher viel durch Hr. Winter aus Java erhalten hat und mit Philippi sehr befreundet war, ist sie nicht aus Java vorhanden. Metcalfe erhielt sie von Sarawak, wesshalb Reeve auch Borneo als Vaterland angiebt. Sonst kennt man sie von Mergui (Th. Philippi), „Burmese estuaries generally“ (Blanford), Port Canning in Bengalen (Stoliczka).

6. *Littorina albicans* Metc.

Metcalf Proc. Zool. Soc. 1851, p. 73 und Ann. Mag. n. h. (2) XI,

1853, p. 70; Reeve X, fig. 44, copirt bei Weinkauff Lit. S. 81,

Taf. 11, Fig. 2, 3. Chenu manuel de conchyl. I, p. 300, fig. 2098.

Schlank, mit abgerundetem Kiel, weiss, auf der letzten Windung mehrere frühere Mündungsränder rippenartig vorstehend.

Bis jetzt nur von Sarawak auf Borneo bekannt, von Sir James Brooke seiner Zeit an Cuming gegeben, selten in unsern Sammlungen.

7. *Littorina undulata* Gray.

Gray in Zoology of Beechey's voyage p. 140. Philippi Abbild. neuer

Conch. II, S. 225, Taf. 5, Fig. 18. Reeve conch. icon. X, fig. 67.

v, Martens Don. Bismarck. p. 39. Weinkauff Littorina S. 73, Taf.

9, Fig. 14, 15. Chenu manuel moll. I, p. 300, fig. 2108. Nevill

handlist Moll. Indian Mus. II, p. 143.

*Littorina ramosa* Menke in collect. Dunker.

Bläulich-weiss mit braunen, wellenförmig gebogenen Striemen. Mehr dickschalig und kleinmündig als *L. scabra*, mit schwächerer Spiralstreifung. Columellarfläche violett-rosenroth: 21 Mill. lang, 12—13 breit, Mündung 10—11 hoch.

Sumatra: bei Benkulen, an einzelnen Steinen des sandigen Meeresstrandes, über Wasser, v. Martens. Banka bei Muntok v. Mar-

tens. Krakatau, Strubell. Java, v. d. Busch; Anjer und Palabuan im westlichen Java, v. Martens; Tjilatjap, Leidner Mus. Celebes bei Kema und bei Makassar, an Felsen über Wasser, v. Martens. Ternate, Batjan, Amboina, Banda, Flores bei Larentuka, Adonara und Timor bei Kupang, v. Martens. Samao, Leidner Mus. Im Berliner Museum von Ceylon bei Pointe de Galle (v. Martens) und der gegenüberliegenden Küste bei Pamban (Thurston), den Philippinen Luzon und Samar (Jagor), sowie Mindanao (v. Martens), Bougainville-insel und Macluer-Golf in Neu-Guinea (Exped. der Gazelle), Formosa (Schmackerl), Palaos-inseln (Semper), Karolinen (Pease) und Jaluit (Finsch). Ferner ist sie in der Literatur angegeben von der Annesley-Bai im Rothen Meer, den Lakkediven, Madras, Arakan, Pulo-Pinang und Singapore, sowie den Aru-inseln, Neu-Caledonien, Nordost-Australien, Viti-inseln, Uvea und Gesellschafts-inseln. Also weit verbreitet durch den indischen Ocean und Polynesien; von Ost-Afrika ist sie mir unter manchen von dort erhaltenen Sammlungen noch nicht vorgekommen.

Lebendes Thier mit hellbraunen, dunkler geringelten Fühlern und dunkelbrauner Schnauze, an den Seiten des Fusses gelbbraun gewellt. Die Grundfarbe der frischen Schale bald röthlich, bald weiss, bald bläulich, der Columellarrand immer hell violett.

Ein ganz ungewöhnlich grosses Stück in Dunker's Sammlung, leider ohne nähere Fundortsangabe, 23 Mill. lang, 15 im Durchmesser, Mündung  $11\frac{1}{2}$  lang und 8 breit, dabei sehr dickschalig, was auf hohes Alter schliessen lässt; das grösste Stück unter den von mir bei Palabuan gesammelten, ist übrigens fast ebenso gross, 22 Mill. lang, 14 im Durchmesser, Mündung 11. Die meisten Stücke sind aber bedeutend kleiner. Lit. column Jonas bei Phillippi Abbild. III, S. 14, Taf. 6, Fig. 15, unbekannter Herkunft, nur nach einem Exemplar bisher bekannt, dürfte wohl eine etwas schlankere Abart mit mehr ausgezogenem Gewinde darstellen, wenigstens passen mehrere der von mir bei Benkulen und Tidore gesammelten Exemplare recht gut zu der Figur.

*Lit. picta* Phil., Reeve fig. 81, von den Sandwich-inseln, ist ähnlich gezeichnet wie lebhaft gefärbte *undulata*, aber kürzer und mehr kugelig, mit dickerer Schale und dem für die Untergattung *Melarrhaphe* charakteristischen weissen Bande im untern Theil des Innern der Mündung, das ich bei keinem Stücke von *L. undulata* finde; wohl zeigen sich bei dieser auch öfters hellere Stellen im Innern der Mün-

dung, den Zwischenräumen zwischen den dunklen Wellenstriemen der Aussenseite entsprechend, aber eben desshalb unregelmässig gebogen und mehr senkrecht, nicht gerade und in der Richtung der Spirale.

---

Die folgenden Littorinen sind mehr Bewohner von Felsen an der offenen Meeresküste, als Brackwasserbewohner; ich nehme sie aber doch hier auf, da sie oft über Wasser zu finden sind und daher auch submarin genannt werden können.

B) TECTUS Montf. 1811.

Tectarius Valenciennes 1833, Pagodus Gray 1839, Pagodella Swainson 1840.

Stark knotig. Mündung sehr schief zur Achse, mit zahnartiger Verdickung am Columellarrand. Deckel mehr rundlich, mit vielen Windungen.

8. *Littorina pagodus* L.

Trochus tertius sive Papuanus longaevus Rumph amb. rar. S. 74 (deutsch S. 28) Taf. 21, Fig. D. Le toit chinois Argenville conchyliologie ed. 1, pl. 11 (ed. 2, pl. 8) fig. A.

Turbo pagodus Linne syst. nat. ed. X, p. 762. Chemnitz Conch. Cab. V, fig. 1541, 1542.

Monodonta pagodus et M. bicolor Lamarck hist. nat. an. s. vert. ed. 1, VI, nro 2 und 1; ed. 2, IX, p. 172 und 171. Delessert recueil d. coq. pl. 36, fig. 12.

Trochus pagodus Quoy et Gaimard, Voy. Astrolabe III, p. 269, pl. 62, fig. 1—4, lebendes Thier.

Littorina pagodus Philippi abbild. neuer Conch. II, S. 139, Taf. 2, Fig. 1. — Chenu manuel de conchyliologie I, p. 301, fig. 2117 und (bicolor) 2118. — Weinkauff Littorina S. 41, Taf. 5, Fig. 42.

Die grösste Art, mit zwei Spiralreihen starker, spitziger Knoten, 7—17 in einer Reihe auf der letzten Windung, spiralgefurcht, blass bräunlich, zuweilen die obern Windungen dunkelbraun oder schwärzlich (bicolor). Bis 64—67 Mill. lang und 52—54 breit, Mündung senkrecht gemessen 32 Mill. Der Deckel ist nicht so kreisförmig und eng gewunden wie bei den folgenden Arten (*Echinella* Swains.).

Auf Timor bei Kupang fand ich diese Art an einem durch die Brandung stark zernagten Kalkfelsen, dessen Oberfläche in Farbe und Skulptur so sehr der Schale dieser Schnecke ähnlich war, dass ich erst bei ganz nahem Herantreten sie bemerkte. Rumph kannte sie von den Inseln Manipa und Kelang zwischen Ceram und Buru, sowie von Messoal (Misool) bei Neu-Guinea. Aus Java, von Winter erhalten, in Dunker's Sammlung und im Leidner Museum. Zanzibar, nach Cuming; Misool, Leidn. Mus. Neu-Irland, Quoy und Gaimard, Torres-strasse, Nevill und Cox.

9. *Littorina bullata* Martyn.

*Trochus bullatus* Martyn univ. conch. pl. 38 (ed. Chenu pl. 10, fig. 6).

— *grandinatus* Chemnitz Conch. Cab. X, fig. 1639 (Copie nach Martyn).

*Monodonta papillosa* Lamarck hist. nat. an. s. vert. ed. 1, VI, nro 4; ed. 2, IX p. 173.

*Littorina papillosa* Deshayes bei Lamarck, a. a. O.; Delessert recueil pl. 36, fig. 10. Philippi abbild. II, S. 140, Taf. 2, Fig. 3—6.

Chenu manuel de conchyl. I, p. 301, fig. 2113.

*Littorina bullata* Weinkauff *Littorina* S. 87, Taf. 12, Fig. 5—7.

Mehr kreiselförmig mit nur Einer vorspringenden Kante, aber 3—4 Reihen kleinerer stumpfer Höcker auf der letzten und vorletzten Windung, auf den früheren meist nur zwei; diese Höcker sind öfters, doch nicht constant, innerhalb derselben Spiralarreihe durch schwarze oder braunrothe Linien verbunden. Grundfarbe blass braun, zuweilen ins Orangerothe ziehend; nicht selten ein breites schwärzliches Band dicht unter der Naht. Dimensionen sehr variabel, Länge erwachsener Stücke 34—43 Mill., Breite 25—34, senkrechte Höhe der Mündung 13—15.

Java, Leidn. Mus. Nord-Celebes, A. B. Meyer. Timor, Lamarck, wahrscheinlich durch Peron. Kupang auf Timor, v. Martens. Auch von den Philippinen und Nord-Australien bekannt, nach Reeve auch von Zanzibar. Die Angabe Neuseeland ist höchst wahrscheinlich falsch, da Hutton sie nicht von da aufführt.

Philippi unterscheidet mehrere Varietäten nach der allgemeinen Form, der Zahl der Höckerreihen und der An- oder Abwesenheit der die Höcker verbindenden Farbstreifen; die beiden letzteren Momente wechseln aber an Exemplaren ähnlicher Form und gleichen Fundortes, so dass sie nicht gut zur Unterscheidung von Varietäten dienen. Für Niederländisch-

Indien kommen hauptsächlich zwei Formverschiedenheiten in Betracht:

- a) die ächte *papillosa* Lam. bei Delessert abgebildet, gleich var. *rustica* Philippi fig. 3. Reeve fig. 1a und 1d. Weinkauff fig. 5, 6, 8. Chenu fig. 2114, verhältnissmässig breit, Trochus-förmig, Höhe (Länge) zur Breite wie 6 : 5. Höcker mässig gross und spitz, meist in 3 Reihen, die oberste dicht an der Naht, oft ohne Farblinien, doch auch mit schwarzen und rothen. Hieher die Exemplare von Timor; Amboina und Batjan, Leidner Mus.
- b) die eigentliche *bullata* Martyn oder *grandinata* Chemnitz, var. *elegans* und *quadriseriata* Philippi fig. 2, 5 und 7, Reeve fig. 1b, fehlt bei Weinkauff. Höher und schlanker, Höhe zur Breite wie 7 : 6 (14 : 9—11), Höcker kleiner, stumpfer, meist in 4 Reihen, doch auch in 3 oder 5, oft durch schwarze Farblinien verbunden, wenigstens in der obern Reihe. Hieher die Exemplare von Nord-Celebes, sowie solche von den Philippinen (Pasacao, Provinz Camarines-Sur, von Jagor gesammelt).

Eine weitere Varietät, ebenso kreiselförmig, aber nur die unterste, die Kreiselkante bildende Höckerreihe gut ausgebildet, die höheren sehr schwach, ist var. *subinermis* Phil. Fig. 4, Reeve Fig. 1, Weinkauff Fig. 7; für diese kenne ich noch keinen bestimmten Fundort.

Nächst verwandt und wohl auch noch im Gebiet von Niederländisch-Indien zu finden sind *L. (P.) tectum-Persicum* L. Phil. fig. 9, Reeve fig. 3, und *coronaria* Lam., Phil. fig. 8, Reeve fig. 2. Erstere stellt sich zwischen *L. pagodus* und *bullata* var. *rustica*, hat nur zwei stärkere Höckerreihen von meist dunkler Färbung und dazwischen eine dunkles Spiralband, in welchem kleine Höcker auftreten können; Java, Leidner Museum. Letztere schliesst sich an die oben geschilderte schlanke *bullata* b an, ist noch heller, isabellgelb oder weisslich, mit kleinen Höckern, aber der letzte Umgang abgerundet, indem die zweitunterste Höckerreihe im grössten Umfang liegt, die unterste schon zur Unterseite gehört; Mündungsrand verdickt und gekerbt. Spezielle Fundorte Philippinen und Lord Hood's-insel (Maratea); ferner Hervey- oder Mangia- oder Cook's-inseln, wozu Rarotonga (Peasé und Museum Godeffroy unter den Namen *bullata*).

Auch *Lit. (Echinella) cumingi* Phil., niedriger kreiselförmig mit zwei (scharf) vorstehenden Spiralreihen kleiner scharfer Knoten und offenem Nabel, sonst von den Philippinen und Polynesen bekannt, soll nach Exemplaren im Leidner Museum bei Java vorkommen.



## C) NODILITTORINA n.

Schale mit starken Knoten in Spiralreihen, wie bei *Tectus*, aber Mündung und Deckel typisch, d. h. die Mündung mehr vertikal stehend, oben spitzwinklig, Columellarrand und Unterrand verdickt und abgeflacht. Färbung meist dunkel. Deckel oval, mit wenig Windungen, Anfang der Windungen im untern Drittel.

Hieher neben den im Folgenden erwähnten auch die westindischen *nodulosa* Pfr., *dilatata* Orb., *trochiformis* Dillw. und *antoni* Phil. sowie die westafrikanische *granosa* Phil.

10. *Littorina vilis* Menke.

Philippi abbild. neuer Conch. II, S. 145, Taf. 2, Fig. 21, 1846 (vergrössert). Reeve conch. icon. X, Fig. 12.

*Littorina pyramidalis* (Q. G.) Martens und Langkavel Donum Bismarckianum pag. 40.

*Littorina Malaccana* (Philippi?) Reeve conch. icon. X, Fig. 7.

Hoch und spitz konoidisch, mit zwei Reihen grosser, weisslich oder blass orange gefärbter Knoten auf aschgrauem Grund, 12—16 in einer Reihe auf der letzten Windung, je nach der absoluten Grösse der Schnecke; daneben spiralgefurcht und dicht unterhalb der Naht eine mehr oder weniger deutlich ausgebildete Reihe kleinerer Knoten, an der Unterseite der Schale die Spiralfurchen stärker und dadurch die erhöhten Leisten zwischen ihnen mehr hervortretend, öfters etwas uneben. 7 Windungen, die drei obersten glatt, glänzend weiss oder dunkel rothbraun gefärbt, so dass die Spitze, wenn erhalten, immer weiss; auf der vierten beginnen die Knoten verhältnissmässig schwach, erst auf der fünften und sechsten treten sie stärker hervor, es ist aber nur die eine Reihe starker Knoten frei sichtbar, die zweite von der Naht halb oder noch mehr verdeckt. Die Mündung nimmt etwas weniger als die halbe Schalenlänge ein und steht nur wenig schief, Columellarrand und Unterrand sehr dick, letzterer namentlich bei jüngeren Exemplaren öfters etwas lappenförmig vorgezogen und ausgehöhlt, beide braungelb oder dunkelbraun; Inneres der Mündung sehr dunkelbraun mit einer weissen Spiralbinde im untern Theil, die bis an den Rand ausläuft, wie bei *Melarrhaphe*. Bis 11 Mill. hoch und  $7\frac{1}{3}$  im Durchmesser, Mündung mit dem Rand 5 hoch und 4 breit.

Java, Winter in Dunker's Sammlung. Banka bei Muntok, unweit

des Leuchthurms über Wasser auf einzelnen Felsblöcken, v. Martens. Ferner Singapore, v. Martens. Inseln Lampe und Pilai bei Mergui, J. Anderson; Ceylon, Blanford in Dunker's Sammlung, und Pamban am Golf von Manaar, Thurston. Im Golf von Siam bei Lemsoba an der Mündung des Flusses von Phantaburi, v. Martens, und bei der Insel Kosülian an der Ostseite des Golfs, von Richthofen. Im südlichen China bei Hongkong, v. Martens und Schmacker, bei Swatau, Denicke und v. Möllendorff; Formosa, Schmacker. Luzon, Jagor. Auch Exemplare aus Neu-Britannien, von der Expedition S. M. Schiff *Gazelle* gesammelt, und von den Marquesas-inseln, durch Pease erhalten, scheinen hieher zu gehören.

Ob Litt. Malaccana Phil. abbild. III, S. 5, Taf. 6, Fig. 17 von Pulo Pinang an der Küste von Malakka dieselbe Art sei, ist mir noch etwas zweifelhaft, da ihre Knoten viel kleiner und nicht so auffallend gefärbt sind.

Nahe verwandt mit dieser Art sind:

*Littorina pyramidalis*: Quoy et Gaimard Voy. Astrol. Moll. III, p. 482, pl. 33, fig. 12—15. Phil. abbild. II, Taf. 2, Fig. 10 und 20, Reeve fig. 14. Chenu manuel fig. 2115.

Mit derselben Anordnung der Knoten, aber breiter und grösser, 10—15 Mill. breit, bei 13—18 Höhe. Die grossen Knoten meist von zwei bis drei Spiralfurchen durchzogen, bei *L. vilis* nur von Einer. Von Südost- und Süd-Australien.

*Littorina Natalensis*: Krauss bei Philippi abbild. II, Taf. 3, Fig. 4.

Mit 3—4 Spiralsreihen ungefähr gleich starker Knoten, in der allgemeinen Form zwischen *L. vilis* und *pyramidalis*, schlanker als diese, breiter als jene. Von Südost-Afrika.

*Littorina subnodosa*: Phil. abbild. II, Taf. 3, Fig. 8, 9; Reeve fig. 10. Weinkauff Taf. 13, Fig. 10, 4.

Mit 3 Reihen schmaler (von oben nach unten zusammengedrückter) Knoten, so breit wie *pyramidalis*, aber mit minder tiefer Naht. Rothes Meer.

Zweifelhaft bleibt mir noch Litt. *trochoides* Gray Zool. Beechey p. 140, 1839; Phil. abbild. II, Taf. 3, Fig. 3, Reeve fig. 105 und Weinkauff Taf. 14, Fig. 7, unbekannter Herkunft; sie ist im ganzen Habitus der eben beschriebenen *L. vilis* ähnlich, aber scheint noch

eine weitere Reihe von grössern Knoten an der Unterseite zu haben; denn Gray in der Originalbeschreibung spricht, nachdem er die beiden Reihen schon erwähnt hat, noch von einer weiteren „in front“, was bei ihm die Unterseite der letzten Windung, entsprechend der Stellung am kriechenden Thier, bezeichnet und Reeve's Abbildung zeigt unten am Aussenrand der Mündung noch einen stärkern Knoten tiefer als die untere Knotenreihe bei *L. vilis*.

D). *MELARRHAPHE* MEG. 1828, Ad.

Klein, mit schwächerer Spiralskulptur oder glatt, bläulich oder schwärzlich gezeichnet, Columellarrand oft dunkel gefärbt. An der Basis meist eine schwache Kante und ihr entsprechend im Innern der dunkeln Mündung ein weisser Streifen.

In den Tropengegenden weit verbreitet und auch im Mittelmeer vertreten; wenig zahlreich und nicht sehr typisch in Niederländisch-Indien.

11. *Littorina granularis* Gray.

Gray in Zoology of Beechey's voyage 1839, p. 140 (Phil. abbild. neuer Conch. III, p. 63, Taf. 7, Fig. 7 stark abgerieben). Reeve conch. icon. X, fig. .

*Littorina exigua* Dunker moll. jap. 1860, tab. 2, fig. 3; Lischke jap. Meermoll. II, S. 70; Weinkauff, Litt. S. 95, Taf. 13, Fig. 13 und 16 (schlecht).

*Littorina ventricosa* var. *subgranosa* Nevill handlist II, p. 152.

Konoidisch kugelig, mit mässig tiefer Naht und 5–6 stärkeren gekörnten, erhabenen Spiralleisten, die zweite und die letzte eine stumpfe Kante bildend, darüber und darunter noch mehrere, dazwischen einzelne nicht gekörnte schmälere Spiralleisten. Weisslich, die oberen Windungen oft etwas dunkler, bläulich. Spitze meist hellbraun. Unteres Ende der Mündung etwas lappenartig vorgezogen wie bei *Litt. rudis*. Inneres der Mündung dunkelbraun mit weissem Rande und unten mit weissem Band; Columellarrand weisslich, nach aussen dunkelbraun gesäumt und ausserhalb desselben eine schmale Abschleifungsfläche. 8 Mill. lang,  $7\frac{1}{2}$  breit, Mündung 6 lang und  $4\frac{1}{2}$  breit; jüngere Stücke verhältnissmässig schmaler mit verhältnissmässig längerem Gewinde, z. B. 6 lang und  $4\frac{1}{2}$  breit, Mündung 4 lang und  $2\frac{1}{2}$  breit.

Singapore und Hongkong, v. Martens, daher wohl auch in Niederländisch-Indien noch zu finden; Andamanen, Irawaddi-delta und Ceylon, Nevill.

Eine Zwischenform zwischen *granularis* und *ventricosa*, mit sehr undeutlichen braunen Striemen und einzelnen körnigen Leisten, 11 Mill. lang und  $5\frac{1}{2}$  breit, habe ich aus dem Golf van Siam.

Lischke und ihm folgend Weinkauff glauben, dass Reeve's Litt. *granularis* nicht diejenige von Gray sei und ziehen daher den Namen *exigua* Dkr. vor; es scheint mir aber doch nach der Beschreibung, dass Gray dieselbe Art vor sich hatte wie Reeve, nur ein abgeriebenes und daher rothbraun erscheinendes Exemplar, wie auch Philippi ein solches abbildet; die Art ist auch an der chinesischen Küste verbreitet und daher schon seit längerer Zeit in den europäischen Sammlungen.

## 12. *Littorina ventricosa* Phil.

Philippi a. a. O. III, S. 51, Taf. 6, fig. 19. Reeve conch. icon. X, fig. 93. Weinkauff, a. a. O. S. 79, Taf. 10, Fig. 14, 15. Nevill. handlist II, p. 152.

Konoidisch-kugelig, die einzelnen Windungen stark gewölbt und durch eine tiefe Naht getrennt, die letzte mit einer sehr stumpfen undeutlichen Kante, ein klein wenig unterhalb der obern Mündungsecke; deutlich spiralgefurcht, die Leisten zwischen den Furchen auf der vorletzten Windung und zuweilen auch noch am Anfang der letzten etwas körnig; schmutzig aschgrau mit nach vorn und stärker nach unten herabsteigenden, ziemlich hellbraunen Bändern, welche mehr im Zikzak verlaufen und zuweilen sich netzartig untereinander verbinden; Spitze schwarzbraun; Inneres der Mündung nur am Rande weisslich mit hellbraunen Flecken, weiter innen gleichmässig mittelbraun, mit gut ausgeprägtem weissem Band im untern Theil; Columellarrand blass leberbraun, mit sehr schmaler Abschleifungsfläche ausserhalb desselben.

Bis 10 Mill. lang und  $8\frac{1}{2}$  breit, Mündung 6 lang und einschliessl. Columellarrand  $5\frac{1}{2}$  breit.

Amboina am steinigen Vorsprung von Batu-merah, und Ceram bei Wahai, v. Martens. Ebenfalls bei Amboina an Ufersteinen in der Ebbezone von der Expedition der Gazelle gefunden. Malacca, Philippi; Pulo Pinang, Reeve; Bombay, Arakan und

Andamanen, Nevill. Mergui, J. Anderson. Aus Neu-Caledonien durch P. Godet erhalten.

Die vorletzte und die früheren Windungen, wenn sie nicht abgerieben sind, deutlich gekörnt, die Spitze schwärzlich. Junge Exemplare, denen die ganze letzte Windung noch fehlt,  $5\frac{1}{2}$  Mill. hoch und 4 im Durchmesser, können daher leicht, der feinen Körnelung wegen, viel feiner als bei *granularis*, für eine eigene Art (? *millegrana* Philippi abbild. 7, 15) gehalten werden; namentlich wenn sie auch in ihrer Färbung abweichen. So fand ich bei Palabuan auf Java ein so kleines, weiss mit zwei schwarzen schmalen Spirallinien, und zu Larentuka auf Flores ein fast einfarbig schwärzliches.

*Littorina ventricosa* var. Strubelli.

*Littorina pusilla* (?? Philippi abbild. neuer Conch. II, 1847, S. 164, Taf. 4, Fig. 15). ? Küster bei Weinkauff *Littorina* S. 11, Taf. 1, Fig. 20—22. Böttger Bericht Senckenberg. Gesellsch. 1890 S. 168.

Konoidisch-kugelig, spiralgefurcht, hell aschgrau mit ziemlich zahlreichen von oben und hinten nach vorn und unten verlaufenden, schwach S-förmig geschwungenen, dunkelbraunen Bändern; Spitze schwarzbraun; Inneres der Mündung mittelbraun mit denselben dunkeln Bändern, ein weisses Band im untern Theil der Mündung vorhanden; Columellarfläche einfarbig leberbraun. Abschleifungsfläche ausserhalb derselben wenig ausgebildet.

Grösstes Stück von Krakatau 7 Mill. lang,  $5\frac{1}{2}$  breit; Mündung 5 lang und einschliesslich des Columellarrandes 3 breit.

Krakatau, Strubell 1889 oder 1890.

Durch weniger tiefe Naht, gleichmässig convexe letzte Windung und bestimmtere Ausprägung der schiefen Bänder von der vorhergehenden zu unterscheiden, doch wohl nur Varietät.

### 13. *Littorina subgranosa* Frnfd.

*Littorina subgranosa* v. Frauenfeld, Verhandl. der Zool. bot. Gesellsch.

Wien 1865, S. 913 und Reise d. Novara, Mollusken S. 9, Taf. 1, Fig. 10; Böttger Bericht d. Senckenb. Gesellsch. 1890, S. 169.

— *miliaris* var. *subgranosa* Nevill handlist II, p. 152.

Konoidisch mit seichter Naht, letzte Windung abgerundet zweikantig; schwach spiralgefurcht, trübgrau, auf der letzten Windung mit drei breiten, etwas vorstehenden weissen, braungefleckten Gürteln,

der obere und untere den beiden stumpfen Kanten entsprechend; darüber und darunter, zuweilen auch dazwischen noch einige weisse, braungefleckte Bänder, die aber weniger breit und weniger scharf begränzt sind. Von einer Körnelung kann ich an den vorliegenden Exemplaren nichts sehen. Inneres der Mündung dunkelbraun, mit weissen Flecken am Rand und weissem Bande unten; Columellarrand blass trüb weisslich oder röthlich, nach aussen dunkelbraun gesäumt.

Krakatau, Strubell nach Böttger.

Das Exemplar von Krakatau habe ich nicht gesehen, sondern nur solche von Madras und Ceylon aus Böttger's Sammlung, diejenigen von Madras bis  $8\frac{1}{2}$  lang und 6 breit, Mündung  $5\frac{1}{2}$  lang und fast 5 breit, mit deutlicher Abschleifungsfläche und hellem breitem Spiralband auf derselben, gleich ausserhalb des Columellarrandes, diejenigen von Ceylon dagegen nur 7 Mill. lang und 5 breit, Mündung 4 und 3, mit nur schwach angedeuteter Abschleifungsfläche. Nach Frauenfeld's Originalbeschreibung wird die Art bis 12 Mill. hoch und 8 breit, und zeigt 10—12 gekörnelte Leisten.

14. *Littorina biangulata* n. Taf. IX, Fig. 26.

Testa oblongo-ovata, solidula, leviter spiratim striata, carinis spirali-  
bus duabus albidis sculpta, superiore humerali tenuiore, inferiore  
peripherica crassiore, cinerea, lineis elevatis albidis, saepius fulvomaculatis, fascia basali albida; spira acuta, anf. 5, regulariter crescentes, convexiusculi, sutura leviter impressa; apertura ampla, subovata, intus fusca, fascia basali alba, margine columellari rectilineo, pallide flavido, dilatato, anfr. ultimo prope marginem columellarem attrito et complanato.

Long. 10 diam. maj. 8 min. 5; apert. long. 7 lat. incl. marg. col. 4, excluso 3.

Long. 15 diam. maj. 10 min. 8; apert. long. 10 lat. incl. marg. col. 7, excluso 6.

Benkulan an der Westküste von Sumatra, v. Martens.

Ähnlich der *L. Vitiensis* Reeve fig. 82, aber grösser und keine Knötchen auf den Kielen und an der Basis; von Böttger's *L. subgranosa* durch die Grösse, glattere Oberfläche und Mangel der gefleckten Bänder zu unterscheiden, übrigens ihr auch sehr ähnlich.

Das weisse Band der Basis ist dasselbe, welches auch im Innern der Mündung erscheint, aber hier ist es auch an der Aussenseite scharf ausgesprochen.

Bei einzelnen Exemplaren zeigen einer oder beide Kiele schwache knotenförmige weisse Erhabenheiten auf dunklerem Grunde, während der Raum zwischen ihnen noch einfarbig grau mit sehr feinen Spiral-  
linien bleibt; bei zwei endlich zeigt auch dieser mittlere Theil ein hel-  
leres Band, das durch eine schmale dunklere Linie zweigetheilt ist.  
Dadurch kommt die Art der *L. subgranularis* näher.

Lit. *mauritiana* Lam., angeblich weit verbreitet, ist mir in  
Niederländisch-Indien nicht vorgekommen, aber auch die artliche  
Identität zwischen der ächten *mauritiana* Delessert recueil pl. 37,  
fig. 14 und der australischen (*unifasciata* Gray) scheint mir nach  
Vergleichung von Exemplaren sicherer Fundorte unrichtig; die  
Exemplare von Mauritius haben den kurzen violetten gebogenen  
Columellarrand von *L. obesa*, die australischen von Sidney und  
Adelaide den breiten leberbraunen mit Abschleifungsfläche von  
*L. neritoides* L. und *ziczac* Chemn.

#### **Stenothyra** Bens.

1856. *Nematura* Bens. 1836, schon früher vergeben.

Schale ähnlich derjenigen von *Bithynia*, konisch-eiförmig, glatt,  
aber etwas von der Rücken- zur Bauchseite plattgedrückt wie  
bei *Pythia*; der letzte Umgang vor der Mündung stark herab-  
steigend, diese eiförmig, auffällig klein mit ringsum zusam-  
menhängendem Rand. Deckel kalkig, concentrisch. Radula ähnlich  
derjenigen von *Bithynia*, Mittelplatte mit 2 Basalzähnen (Troschel  
Gebiss d. Schnecken I, Taf. 7, Fig. 11, *St. deltae*).

#### 1. *Stenothyra Moussoni* n. Taf. IX, Fig. 7.

*Paludina ventricosa* (Q. G.) Mousson jav. moll. S. 63, Taf. 8, Fig. 6.

Testa conoidea, ventricosa, laevis, nitidula, pallide cornea vel griseo-  
viridis, unicolor; anfr.  $4\frac{1}{2}$ , convexi, priores spiram conicam efficien-  
tes, penultimus inflatus, ultimus non latior quam penultimus; aper-  
tura valde obliqua, parva, ovata, peristomate subincrassato.

Long.  $2\frac{1}{2}$  Mill., diam.  $1\frac{1}{2}$ , apert. long. et lat. vix 1 Mill.

Java: Lagunen des südlichen Java, Zollinger bei Mousson; in  
aquis salsis stagnantibus littoris australis provinciae Malang  
(Residentschaft Passuruan, östl. Java), Zollinger auf der  
Etikette einer Alge, *Vaucheria Jayanica* Kützing,

an welcher mein Vater mehrere dieser kleinen Schnecken fand. Surabaya, an der Mündung des Kediri-flusses, in salzhaltigem Wasser, v. Martens.

Celebes: Makassar in einem Salzwassersumpf an der Meeresküste, v. Martens.

Die Fühler des lebenden Thiers fand ich bei den Exemplaren von Makassar lang und spitzig, mit zwei dunkeln Ringen, welche an diejenigen der europäischen Brackwasser-Schnecke *Hydrobia* (*Peringia*) *ulvae* erinnern.

Es ist mir sehr zweifelhaft, ob diese Art die von Quoy and Gaimard Voy. *Astrolabe* III, p. 173, pl. 58, fig. 6—8 beschriebene *Paludina ventricosa* sei, welche in dem Süsswasser-See von Tondano, 2204 über dem Meer und etwa 20 Kilometer davon entfernt, gefunden wurde; allerdings habe ich noch keine Exemplare aus diesem See gesehen. Die vorliegende Art von Java und Makassar unterscheidet sich von dem Typus der Gattung, *St. Deltae* Bens. aus dem Ganges-Delta, 5 Mill. lang und  $3\frac{1}{2}$  breit, durch weit geringere Grösse und etwas schlankere Gestalt.

Ausserdem werden aus dem malayischen Archipel noch folgende Arten angeführt beide schon durch die senkrechte Stellung der Mündung von der vorigen verschieden.

2. *Stenothyra strigilata* Bens.

Ann. Mag. n. h. (2) XVII, 1856, p. 498. v. Frauenfeld. Verhandl. zool. bot. Gesellsch. Wien 1862, p. 1158; Issel moll. borneensi p. 89.

Mit feinen Spiralfurchen und kurzen Radialstrichelchen; blass, aber meist mit schwärzlichem Überzug; 7 Mill. lang, 4 breit.

Borneo, Cuming; bei Sarawak, Issel.

3. *Stenothyra polita* A. Ad.

Proc. Zool. Soc. 1851, p. 226 und Ann. Mag. n. h. (2) XII, 1853, p. 284. *St. bicristata* Semper in coll.

Glänzend kastanienbraun, deutlich abgeplattet, mit einem ausgeprägten Kiel am untern Ende der Mündung, welcher sich nach oben als stumpfe Kante schief über die der Mündung entgegengesetzte Seite der letzten Windung bis zur Naht fortsetzt; ein zweiter schwächerer Kiel nach aussen vom innern Mündungsrand, eine nabelartige Vertiefung abgrenzend, ähnlich wie bei manchen Arten von *Assimineae* und bei *Lacuna*.



Singapore und Pulo Pinang in den Sammlungen von Cuming und Mousson. Insel Basilan bei Mindanao, in einem Süßwasser-sumpf, Semper. Also wohl auch noch auf Sumatra und Borneo zu erwarten.

Für die typische Art, *St. deltae*, gibt Benson als näheren Fundort den Fluss Hoogly bei Calcutta und den Salzsee Ballinghat an, also auch Brackwasser; Nevill handlist II, p. 43, Chandipal, Port Canning, Calcutta und Bhagalpur. Auch Blanford führt die beiden in Birma vorkommenden Arten von *Stenothyra* unter den „Estuarine shells“, und nicht unter den Süßwasser-Conchylien auf.

#### **Assimineae** Leach.

1835. *Paludinella* Pfr. 1841. *Optediceros* Leith 1883.

Schale *Paludina*-ähnlich, eiförmig oder abgerundet konisch, meist glatt und etwas fettig glänzend, mit flacher Naht, oben spitz. Mündung eiförmig, Mundrand gerundet, Columellarrand mehr oder weniger verdickt, Aussenrand einfach. Deckel dünn, mit wenig Windungen. Alle Arten klein.

Fühler kurz, cylindrisch, Augen an oder ganz nahe ihrem obern Ende, sodass man die Fühler auch nur als Augenstiele betrachten kann. Radula am ähnlichsten derjenigen von *Lithoglyphus*, s. Troschel Gebiss d. Schnecken I, Taf. 7, Fig. 13, 14 und Gray Ann. Mag. n. h. (3) III, 1859 pl. 3, fig. 12, 13.

Leben auf kahlen Schlammhängen an Flussmündungen oder in ruhigen Meeresbuchten, bei Ebbe über Wasser, nie meines Wissens im Binnenland und sind daher wie die *Auriculiden* den submarinen Schnecken zuzuzählen. Dr. Leith hat beobachtet, dass sie in Meerwasser dasselbe zu verlassen streben, indem sie an den Wänden des Gefäßes emporkriechen, in Süßwasser dagegen gebracht sich sogleich schliessen und nach einiger Zeit absterben.

Benson hat *Ass. fasciata* (Francesi) an den Stufen einer Anlande bei Barrackpore im Gebiet der Gangesmündungen gesammelt, an einer Stelle, an welcher der Einfluss von Fluth und Ebbe auf die Höhe des Wasserstandes sich bemerklich macht und während der Trockenzeit das Wasser schwach salzig, während der Regenzeit süß ist; die Schnecken sassen zwischen Fluth- und Ebbe-Gränze, zeitweise über Wasser (Zoological Journal V, 1835 p. 463). Vgl. auch Jeffreys british Conchology V, p. 97. Blanford in Ann. Mag. nat. hist. (3) XVII, 1887

und Heude moll. terr. de la vallée du fleuve bleu p. 81, 82, pl. 21, lebende Thiere und Anatomie.

In der Nordsee nur durch Ass. Grayana vertreten und auch im Mittelmeer noch selten, ist die Gattung an den Küsten und Inseln des Indischen und Stillen Oceans ziemlich häufig, diesseits und jenseits der Wallace'schen Grenzlinie.

Böttger gibt eine kritische Aufzählung der bis 1887 bekannten Arten im Jahrbuch d. malakol. Gesellschaft XIV, p. 163 ff., es sind 75, sie vertheilen sich auf Nordsee und Mittelmeer, Cuba, West- und Süd-Afrika, einige ostafrikanische Inseln, Vorder- und Hinter-Indien mit Ceylon, Andamanen und Nikobaren, ferner China, Formosa, Japan, die Philippinen, Banka und Borneo, Neu-Caledonien, Australien, Neuseeland, eine Anzahl der polynesischen Inselgruppen bis zu den Marshall's und Gesellschaftsinseln, endlich an der Westküste von Amerika, Californien und Chile. Hiernach könnte es scheinen, als ob gerade in Niederländisch-Indien eine Lücke bliebe, zwischen Banka, Borneo und den Philippinen einerseits, Australien und Neu-Caledonien andererseits, diese wird aber wenigstens theilweise dadurch ausgefüllt, dass Albertis eine Art, *Cyclotropis Papuensis*, an der Südküste von Neu-Guinea gefunden hat, und ich eine bei Anjer auf Java, zwischen Algen; leider ist mir das einzige Stück wieder verloren gegangen, aber die Zeichnung, welche ich damals machte, lässt keinen Zweifel an der Bestimmung der Gattung.

Noch von L. Pfeiffer wurden manche hieher gehörige Arten zu *Hydrocena* oder *Omphalotropis* gestellt: Gattungen, welche sich an der Schale nicht immer leicht von *Assimineae* unterscheiden lassen, aber in der Lebensweise, Form der Fühler und Stellung der Augen, sowie in Deckel und Radula gut davon verschieden sind: *Hydrocena* lebt an feuchten Felsen, hoch über dem Meere, *Omphalotropis* ist eine ächte Landschnecke wie *Cyclostoma*. Vgl. v. Martens in Ann. Mag. nat. hist. XVII, 1866 S. 202.

#### A) ARTEN OHNE KANTE AN DER BASIS DER SCHALE.

##### 1. *Assimineae brevicula* Pfr.

*Hydrocena brevicula* Pfeiffer Proc. Zool. Soc. 1854, p. 306; monogr. pneumonopom. suppl. I, p. 156.

*Assimineae brevicula*. Morelet series conchyl. IV, p. 294. Nevill in

Journ. Asiat. Soc. vol. 50, I, 1881, p. 159; pl. 7, fig. 6, lebendes Thier; handlist II, p. 67. Böttger Jahrb. mal. Ges. XIV, 1887, p. 163, wo noch mehrere Synonyme zu finden.

Var. *miniata* Marts. Taf. IX, Fig. 21 und Taf. X, Fig. 3.

*Assimineia miniata* v. Martens in Ann. Mag. n. h. (3) XVII 1866, p. 204.

— *rubella* (Blanf.) Issel moll. Born. p. 87.

Lebhaft scharlachroth (die typische *brevicula* „*corneofulva*“, röthlich-gelb), fast kugelig, glatt, mit einer Spiralfurche unterhalb der Naht. 6 Mill. lang,  $4\frac{1}{2}$  breit, Mündung 4 und 3 Mill. Auch die äussern Weichtheile röthlich, der Kopf intensiv roth.

Celebes: bei Makassar, M. Weber.

Ich fand dieselbe bei Singapore. Morelet erhielt sie von Bangkok in Siam auf Schlamm Boden am Strande im Manglegebiet, bei Ebbe über Wasser, als die oberste Schnecke in diesem Gebiet. Nevill gibt für die Art *brevicula* überhaupt noch die Andamanen, das Irawaddy-delta, Arakan, Malacca, Borneo und Amoy in China, Böttger Ceylon, Hainan, Luzon und Cebu, Bangkok in Siam an. Von den Andamanen besitzt das Berliner Museum dieselbe, so lebhaft rothe Varietät durch Röpstorff, und von Mergui, wo sie auch auf Schlammflächen gefunden wurde, durch John Anderson.

## 2. *Assimineia variegata* n. Taf. IX, Fig. 19.

Testa ovato-conica, arcuatim rimata, laevis, pallide flavescens, fasciis pallide rufis duabus et macularum dilutarum serie supera et infera picta; anfr.  $5\frac{1}{2}$ , regulariter crescentes, convexiusculi, sutura paululum impressa, ultimus ad peripheriam et in basi rotundatus; apertura modice obliqua, ovata, superne angulata, margine columellari arcuato, subincrassato.

Long.  $4\frac{1}{2}$ , diam. 3; apert. long. 2 diam.  $1\frac{2}{3}$  Mill.

Celebes: Luwu M. Weber.

Erinnert in der Färbung an *A. carinata* Lea (*maculata* Marts., *fasciolata* Morelet) von den Schlamm-bänken des Menam-stromes unterhalb Bangkok, entbehrt aber die diese auszeichnende Nabelkante und ist auch viel kleiner.

Auf Borneo, aber bis jetzt nur vom Englischen Gebiet bekannt, kommen noch vor:

cornea Pfr. (Hydroc.) Proc. Zool. Soc. 1854, p. 306; Mon. pneum. suppl. p. 156. — Ass. subcornea Nevill, Böttg. a. a. O. S. 205, nicht Ass. cornea Leith 1853, eiförmig-konisch, oben zugespitzt, einfarbig gelblich, Nabel fast oder ganz geschlossen, 10 Mill. lang, 5 breit, Mündung  $4\frac{1}{2}$  hoch. Borneo, Bashi-insel, Formosa und ? Japan.

Borneensis Issel (Amnicola) moll. born. p. 88, pl. 7, fig. 16—18. Böttg. a. a. O. S. 162. Bintulu westlich von Sarawak.

Moussoni Issel (Amnicola) moll. born. p. 87, pl. 7, fig. 13—15. Böttg. a. a. O. S. 192. Ebendaher.

B) CYCLOTROPIS TAPPERONE—Canefri faun. malac. della Nuova Guinea, 1883, p. 278.

Mit einer scharfen Kante um den Nabel.

3. *Assimineea carinata* Lea Taf. IX, Fig. 20 und Taf. X, Fig. 6.

*Assimineea carinata* Lea Proc. Acad. Philad. VIII, 1856, p. 114; Journ. Ac. Philad. VI, 1867, p. 120 (Observ. Najad. IX, p. 70), pl. 22, fig. 13; v. Martens in Ann. Mag. n. h. (3) XVII, 1866, p. 203; Böttger a. a. O. S. 166.

*Omphalotropis maculata* v. Martens in Proc. Zool. Soc. 1860, p. 11; Pfr. mon. pneumop. suppl. II, p. 176; Mal. Blatt. 1863, p. 120, zu *Assimineea*

*Hydrocena fasciolata* Morelet in Revue Zool. 1862, p. 478 und *Assim. f.* Morelet series conch. IV, p. 295; *Omphalotropis f.* Pfr. mon. pneum. suppl. II, p. 176.

— *fulvida* Pfeiffer in Journ. de Conch. X, 1862, p. 44, pl. 6, fig. 4; mon. pneum. suppl. II, p. 176.

*Omphalotropis carinata* (Lea) Issel moll. borneensi p. 84, pl. 7. fig. 7—9.

Gestreckt konisch, aber an der Peripherie gerundet, gelblich, unregelmässig gestriemt und mit einem dunkleren Bande; ein scharf ausgeprägter Kiel um den engen Nabel. Länge 10, Breite 6, Mündung  $4\frac{1}{2}$  Mill.

Äussere Weichtheile grau; Fühler lebhaft roth, die schwarzen Augen an der Oberseite derselben ganz nahe der Spitze.

Siam, im Schlamm der Reisfelder und am schlammigen Ufer der Kanäle unterhalb Bangkok von mir 1861 lebend beobachtet und gezeichnet. Auch Missionär Heude und Sir John Bowring hatten sie aus

Siam nach Philadelphia und London geschickt. Nevill kennt sie auch von Mulmein in Tenasserim; Morelet von Siam und Cochinchina, hier an den Ufern des Flusses Bien-Hoa. Doria und Beccari fanden sie im Gebiet von Sarawak auf Borneo, Teysmann auf Banka (Exemplare in Mousson's Sammlung); danach gehört sie auch der Fauna von Niederländisch-Indien an.

Lea hat diese Art, ohne die Weichtheile zu kennen, wegen der Ähnlichkeit mit *Ass. Francesi* schon richtig zu *Assimineea* gestellt; ich kannte 1860 nur erst die Schale und stellte sie deshalb zu *Omphalotropis*, habe dann aber 1861 das Thier lebend beobachtet und als *Assimineea* erkannt.

4. *Assimineea lirata* Morelet.

*Hydrocena lirata* Morelet series conchyl. IV, 1873, p. 296, pl. 13, fig. 8.

*Omphalotropis Paladilhi* Issel moll. born p. 85, pl. 7, fig. 10—12.

*Assimineea lirata* Böttg. a. a. O. S. 183.

Eiförmig-konisch, spiral gerippt, dunkelbraun (mit gelblichen Flecken),  $5\frac{1}{2}$  Mill. lang, 4 breit, Mündung 3.

Banka, Teysmann. Sarawak, Doria und Beccari. Delta des Mekong in Cochinchina, Morelet.

5. *Assimineea radiata* Pfr.

*Hydrocena radiata* Pfeiffer Proc. Zool. Soc. 1854, p. 308; monogr. pneum. suppl. p. 163.

*Assimineea radiata* Böttger a. a. O. S. 199.

Eiförmig-konisch, mit gelber Radialzeichnung, Nabel sehr eng. 7 Mill. lang, 4 breit, Mündung  $3\frac{1}{2}$  hoch.

Borneo.

## RHACHIGLOSSA. RHACHIGLOSSEN.

Unter diesen finden sich nur wenige Arten, welche als Bewohner des Brackwassers und der Mangledickichte zu bezeichnen sind. Aus Niederländisch-Indiën sind mir mit Sicherheit keine bekannt, doch reichen vielleicht einzelne Arten von *Purpara* vom Meere aus noch in dieses Gebiet herein und möchte ich noch auf die zwei folgenden aufmerksam machen:

**Nassa** Lam.1. *Nassa olivacea* Brug.

*Buccinum olivaceum* Bruguière *Encycl. meth.* pl. 304, fig. 7. Kiener *icon. Bucc.* fig. 53. Quoy et Gaimard *Voy. Astrol. Zool.* pl. 32, fig. 13—15 lebendes Thier. Eydoux et Souleyet *Voy. Zool.* pl. 41, fig. 14—16.

— *taenia* Gmelin *Linne syst. nat. ed. XIII*, p. 3493 (1791), auf die Figur bei Knorr *Vergnüg. d. Aug.* V, Taf. 10, Fig. 3 gegründet.

Über die fragliche Priorität zwischen Gmelin und Bruguière vgl. Menke in *Zeitschr. f. Malak.* 1847, S. 42.

*Nassa olivacea* Reeve *conch. icon.* VIII, fig. 19. v. Martens bei Möbius *Beitr. Meeresfauna v. Mauritius* p. 242.

Scheint durch ihre kastanienbraune Farbe und den öfters an ihr vorhandenen Schlammüberzug auf Vorkommen im Schlamm der Flussmündungen hinzuweisen, doch ist mir keine direkte Angabe darüber bekannt. Die grösste Art der Gattung *Nassa*, bis 4 Cm. lang, obere Windungen mit Vertikalfalten, untere mit oder ohne solche; meist ein gelblich-weisses Band in der Mitte der letzten Windung. Weit verbreitet im indischen Ocean von Mauritius und den Seychellen bis Australien und Polynesien, aus Niederländisch-Indien mir nur die var. *approximata* Pease, kleiner, die Vertikalfalten auch auf der letzten Windung noch vorhanden, 31 Mill. lang, 17½ breit, Mündung 15, auf Batjan vorgekommen.

**Engina** Gray.1. *Engina Duclosiana* Sow.

*Columbella Duclosiana* Sow. *thes. conch.* I *Columbella* fig. 15, 16.

Chenu *illustr. conch. gl. Columb.* pl. 8, fig. 19, 20. Reeve *conch. icon.* XI, fig. 76 v. Martens. *Journ. Linn. Soc.* XXI, p. 68.

Schmutzig-braun, glanzlos, verkehrt konisch, mit schmaler beiderseits gezählter Mündung. Irawaddy-delta, Mergui und Singapore auf Schlammflächen in Gesellschaft von *Neritina crepidularia* Lam., also wohl auch auf Sumatra zu erwarten.

## RHIPIDOGLOSSE (NERITIDEN).

**Neritina.**

Unter Neritinen ist in erster Linie zu nennen:

1. *Neritina crepidularia* Lam.

Sowerby thes. conch. II, pl. 113, fig. 139—144. Reeve conch. icon. IX, fig. 36. v. Martens *Neritina* in der Fortsetzung v. Chemnitz S. 36, Taf. 7, fig. 1—14, mit ihrer Varietät *melanostoma* Troschel, Phil. abbild. I, Taf. 1, fig. 11, oft mit rothmündigen an demselben Fundort zusammen, als Brackwasserbewohnerin in Niederländisch-Indien verbreitet; wir kennen sie von Banka, Sumatra, Borneo, Java, Bali, Süd-Celebes und Timor; auf den Molukken ist sie mir nicht vorgekommen.

Ferner die Untergattung *Neritodryas*, mit glattem Columellarrand und bunter Zeichnung, die glatte *N. dubia* Chemn. und die spiral gefurchte *N. cornea* L. (*amphibia* Less.) enthaltend, beide von Sumatra oder Java bis zu den Molukken und Neu-Guinea verbreitet, auf den Büschen von Mangle, *Sonneratia* und *Pandanus* im Brackwassergebiet, bei Ebbe über Wasser häufig; vgl. v. Martens a. a. O. S. 136—143.

Eine entschiedene Salzwasserbewohnerin ist endlich die kleine *N. Ualanensis* Less. (*Mertoniana* Recluz), 7—12 Mill. im grössten Durchmesser, sehr bunt gefärbt, ähnlich der westindischen *N. virginea*, aber durch den Deckel verschieden, dessen zwei Fortsätze durch eine Zwischenwand verbunden sind. Häufig an den Meeresküsten in mehr oder weniger salzigem Wasser, von Sumatra bis zu den Molukken und Timor. S. v. Martens a. a. O. S. 193—196. Taf. 20, Fig. 1—24.

Auf Batjan fand ich in dem brackwasserhaltigen See Telaga auch *Neritina communis* Q. G. auf schlammigem Grund und *Septaria tessellata* Lam. (S. 86) an Stämmen und horizontalen Ästen etwas über Wasser.

**Nerita** L.

Durch dicke Schale mit ausgeprägter Spiralskulptur und ohne glatte glänzende Schalenhaut, starke Zähne in der Mündung, Runzeln auf

der Mündungswand und plattgedrückte Muskelfortsätze am Deckel von *Neritina* unterschieden.

Auch aus dieser sonst marinen Gattung sind zwei Arten bestimmt als Bewohner der Manglesümpfe an Wurzeln und Stämmen von *Bruguiera* und *Aegiceras*, durch Tenison-Woods (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales V, 1880, p. 120) bezeugt, nämlich:

1. *Nerita lineata* Chemn.

Chemnitz Conch. Cat. V, fig. 1958, 59. Hombron et Jacq. Voy. pole sud, moll. pl. 17, fig. 23—25, lebendes Thier und Deckel; Reeve conch. icon. IX, fig. 13. v. Martens Fortsetz. v. Chemnitz *Nerita* S. 15, Taf. 4, Fig. 12—15.

Queer-oval, aschgrau mit zahlreichen vertieften schwarzen Spirallinien; Mündung gelb, Deckel gekörnt. Von Mergui bis Südwest- und Nordost-Australien verbreitet, häufig bei Singapore, in Niederländisch-Indien von mir auf Banka gefunden.

2. *Nerita planospira* Anton.

Anton verz. d. Conch. 1839, S. 30. Philippi abbild. neuer Conch. I, S. 83, Taf. 1. Fig. 1. v. Martens a. a. O. S. 23, Taf. 4, Fig. 4—7. — *Valvata granulata*, zweite Art, Rumph amb. rar. p. 78, deutsch S. 34. — *N. atropurpurea* Recluz Revue Zool. 1841, p. 107. Reeve conch. icon. fig. 38. — *N. angularis* Hombr. et Jacq. Voy. pole sud, moll. pl. 16, fig. 7—11.

Dreieckig, mit flachem Gewinde und Schulterkante, spiral gerippt, grau mit helleren Wellenbinden, an der Mündung schwärzlich, Deckel aussen glatt. Von den Nikobaren und Tenasserim bis zu den Samoa-inseln und Carolinen bekannt, in Niederländisch-Indien bei Banka (v. Martens), Nusa-Kumbangan an der Südküste van Java (Jagor), Togian-inseln im Golf von Gorontalo (A. B. Meyer), Weynitu auf Amboina an den Wurzeln der Wakkat-bäume (*Sonneratia*?) von Rumph, ebenda an losen Steinen auf Schlammgrund von mir gefunden, sowie auf Batjan und bei Atapupu auf Timor. Bei Singapore fand ich sie in einem Mangle-sumpf auf Schlamm Boden am Rande eines bei Ebbe auströmenden Rinnsals.



## BIVALVEN.

## OSTREIDAE.

*Ostrea* L.

Ungleichschalig, die linke Schale an fremde Körper angeheftet, tiefer und von individuell unregelmässigem Umriss, die rechte flach. Ein inneres Band in einer länglichen Bandgrube. Nur ein Muskelein-  
druck. Mantel ringsum offen. Kein Fuss.

A) Schalenrand dünn, nicht scharfzackig.

1. *Ostrea mytiloides* Lam.

*Ostrea radicum* sive *lignorum* Rumph amboin. rar. S. 154 (deutsch S. 151), Taf 46, Fig. O, copirt bei Klein method. ostrac. tab. 8, fig. 17.

— *parasitica* Gmelin Linne syst. nat. ed. 13, p. 3336 zum Theil.

— *mytiloides* Lam. an. s. vert. ed. 1, VI, 1, nro 21; ed. 2, VII, p. 297. Hanley rec. bivalve shells p. 300. Reeve conch. ic. XVIII, fig. 3. v. Martens Linn. Soc. Journ. XXI, 1886, S 173.

*Ostrea arborea* (Chemn.) v. Frauenfeld Verhandl. Zool. bot. Ver. Wien 1867, S. 887.

— *Belcheri* Reeve a. a. O. fig. 11.

Dünnschalig, flach, länglich; der Länge (eigentlich Höhe) nach den Mangle-Zweigen aufsitzend; Innenseite der Schale gegen den Rand zu schwarzviolett und immer in der Nähe des Schlosses, zuweilen in  $\frac{2}{3}$  der Ausdehnung, mit weissen Knötchen und entsprechenden Grübchen in der Fläche versehen.

Buru und die drei Inseln Manipa, Kelang und Bonoa zwischen Buru und Ceram, an den Wurzeln der Mangle-bäume (*Rhizophora* und *Bruguiera*), Rumph. Weynitu auf Amboina, Batjan und Zamboanga auf Mindanao, überall an Mangle-wurzeln v. Martens; die letzteren dicke grosse Stücke mit starken Knötchen. Adonara, Dr. Semmelink; Togian-inseln in der Bai von Gorontalo, A. B. Meyer; Java, Frauenfeld. Zebu, Philippinen, Hanley. Elphinstone-island bei Mergui in Tenasserim, an Stämmen von Manglebäumen, J. Anderson. Ceylon, Reeve. Tonkin, Crosse (*O. arborea*).

Entspricht der *O. arborea* Chemnitz VIII, fig. 681, copirt in Encycl.

meth. pl. 185, fig. 1. Mörch (le gasar Adanson's) von West-Afrika und West-Indien in Habitus und Aufenthalt; diese letztere Art hat aber keine Knötchen und Grübchen an der Innenseite des Randes und ist blasser gefärbt, nicht dunkelviolett. Chemnitz gibt zwar keinen Fundort für seine *O. arborea* an und hält sie für identisch mit Rumph's Art, aber da keine Grübchen erwähnt sind und keine dunkle Randzone gezeichnet, so folge ich Mörch (catal. Yoldi II, 1853, p. 62), welcher vermuthlich die Original-Exemplare von Chemnitz kannte und sie als westindisch bezeichnet; das] Berliner Museum für Naturkunde besitzt derartige Stücke sowohl aus Jamaica und Haiti durch Verkrüzen und v. Maltzan, als von der Westküste Afrika's in Gabun, durch Buchholtz und bei Chiloango (nördl. vom Kongo) durch v. Mechow.

*O. parasitica* Chemnitz Conch. Cab. VIII, fig. 660, Hanley bivalv. p. 298 = *bilineata* Bolten und *rhizophorarum* Guilding gehört wahrscheinlich zu derselben Art. Gmelin's *O. parasitica* umfasst beide. Dieser Artname ist insofern unpassend als die Baumaustern so wenig parasitisch sind, als die auf Steinen sich anheftenden, sie suchen beide nur einen festen Anhalt.

## 2. *Ostrea nigromarginata* Sow.

Sowerby bei Reeve conch. icon. XVIII, fig. 85. v. Martens in Linn. Soc. Journ. XXI, 1886, p. 173.

Der vorigen ähnlich, noch dünner, annähernd kreisrund, mit sehr breiter, schwarz-violetter Rand-färbung der Innenseite.

Makassar, flach an Holzstücken angewachsen, M. Weber. Weynitu auf Amboina, an Mangle-wurzeln (nicht immer scharf von der vorigen zu trennen) v. Martens.

Elphinstone-island bei Mergui, an Mangle-stämmen, J. Anderson. Arakan, Reeve.

## 3. *Ostrea echinata* Q. G.

*Ostrea echinata* Quoy et Gaimard. Voy. Astrolabe, Zool. III, p. 455, pl. 76, fig. 13, 14. Hanley rec. bivalve shells p. 302. v. Martens a. a. O. S. 173.

— *spinosa* (Q. G.) Desh. Lamarck an. s. vert. ed. 2 VII. nro 53. Reeve conch. icon. XVIII, fig. 79.

Klein, flach, mit zahlreichen schwärzlichen, ziemlich stumpfen Stacheln auf der freien Schale.

Amboina, Quoy und Gaimard. Larentuka auf Flores, v. Martens. Inseln bei Mergui, mit den vorigen auf Mangle-stämmen, J. Anderson. Philippinen, Hanley. China, Meyen in Berliner Museum. Auch in Japan: Nangasaki, Schottmüller während der Preussischen Expedition 1860; Enosima, Hilgendorf; Yokohama, v. Martens.

Quoy und Gaimard geben als lateinischen Namen *O. echinata*, als französischen *Huitre épineuse* und daraus hat Deshayes wahrscheinlich aus Versehen *O. spinosa* gemacht.

B) *ALECTRYONIA* Fischer Waldh. 1807.

Lopha (Bolten) Mörch. 1851. *Dendrostrea* Swainson 1840.  
Schalenrand scharfzackig.

4. *Ostrea folium* L.

*Ostreum cratium*, Sery-oesters, Rumph amb. rar. S. 155 (deutsch S. 151) Taf. 47, Fig. A. copirt bei Klein meth. ostrac. Taf. 8, Fig. 22. Feuille, Argenville conch. ed. 1, p. 316, pl. 22, fig. F; ed. 2, pl. 19, fig. F; ed. 3 par Favanne, pl. 45, fig. D 4.

Lorbeerblatt, Knorr Vergnüg. d. Augen I, Taf. 23, Fig. 2.

*Ostrea folium* Linne syst. nat. ed. X, p. 699, ed. XII, p. 1148.

Chemnitz conch. Cab. VIII, S. 21, fig. 662—666, copirt in Encycl. meth. pl. 184, fig. 10—14. Lam. an. s. vert. ed. 1, VI 1 nro 39; ed. 2, VII, p. 232. Hanley rec. bivalve shells p. 307. Reeve conch. icon. fig. 40, v. Martens a. a. O. S. 173.

An Flechtwerk von Reusen (Sery), welches ein halb Jahr in der See gestanden, und kleiner an Wurzeln von „*Mangium fruticans*“ (*Aegiceras majus* Gärtner, fam. Myrsineae) an der Landenge von Baguala auf Amboina, Rumph. Weynitu auf Amboina, an Rhizophoren, v. Martens.

Weit verbreitet im Indischen Ocean; die westlichsten Fundorte, die mir vorgekommen, die Cargados-riffe (Robillard) und Golf von Manaar (Thurston).

Var. *erucella* Lam. an. s. vert. ed. 1. VI, 1. nro. 38; ed. 2. VII, p. 231.

Länglich, der Länge nach in der Mittellinie auf stielrunden Körpern aufsitzend, nach rechts und links annähernd gleichmässig schief und gleich breit, mit zahlreichen (7—8) Falten.

Auf *Virgularia juncea*, Lamarck; auf *Cirripathes spiralis*, ein Exemplar im Berliner Museum 32 Mill. lang, 19 breit; beide Zoophyten sind im indischen Archipel zu Haus.

Diese Form gehört schon mehr dem wirklichen Meere an, möge aber hier noch der nahen Verwandtschaft wegen aufgeführt werden.

#### 5. *Ostrea cucullata* Born.

*Ostreum saxatile* Rumph amb. rar. S. 155 (deutsche Ausgabe S. 151), v. Martens Malak. Blätt. 1863, S. 130.

*Ostrea cucullata* Born index 1778 p. 10; testacea mus. Caes. Vindobon. p. 114, Tab. 6, Fig. 11, 12, copirt in Encycl. meth., Vers. pl. 182, fig. 1, 2. Lamarck an. s. vert. ed. 2. Hanley bivalve shells p. 306. Chenu manuel conchyl. II, p. 197, fig. 1003. Reeve conch. icon. fig. 34.

*Ostrea cornu-copiae* Chemnitz conch. cab. VIII, S. 7 Fig. 679.

Sehr unregelmässig geformt, Rand überall oder doch wo er frei vorsteht, mit scharfen zackigen Falten, innen mit dunkel schwarzblauem Saum und meist einer Reihe von Körnern. Meist ziemlich klein,  $2\frac{1}{2}$ —3, selten bis 6. cm.

Schon mehr im offenen Meer, an Steinen, doch auch noch auf Schlamm-boden an Flussmündungen, auf kleinen Steinen oder Conchylienschalen. An der nördlichen Seite der Bai von Amboina, an allerlei Steinen und Steinchen, Scherben, Ziegeln und dgl., Rumph. Ich fand sie bei Amboina an den Pfählen der Anlande des Dampfschiffes, bei Weynitu unweit Amboina auf der Schale lebender *Potamides sulcatus* aufgewachsen, bei Batjan auf *Faunus ater* und erhielt ein Stück auf *Nerita plicata* sitzend von der Insel Salang (Küste von Malakka) durch Joh. Weber. Sumatra nach Hanley. Bangpra im Golf van Siam, zahlreich, und bei Hongkong, v. Martens. Küste von Mossambique, und Querimba-inseln, die Stämme und Zweige der Mangle-stauden mit dichter Kruste umgebend, Peters.

Ist eine der häufigeren Arten im indischen Ocean.

### AVICULIDEN.

#### **PERNA** Brug.

Schloss geradlinig mit mehreren Vertiefungen und Vorsprüngen, aber so, dass Vertiefung auf Vertiefung und Vorsprung auf Vorsprung passt,

indem das Schlossband (Ligament) in mehrere Theile getrennt, die Vertiefungen ausfüllt. Mittelst eines Byssus angeheftet. Innen perlmutterartig mit einem grossen Schliessmuskel näher dem hintern als dem vordern Rande. Lebend durch Byssus-fäden an feste Körper angeheftet.

1. *Perna vitrea* Rv.

*Perna* spec. v. Martens in Malak. Blätt. 1863, p. 131.

Verhältnissmässig klein, annähernd vierseitig, etwas höher (vom Schloss nach dem entgegengesetzten Rand) als lang (vom vordern zum hintern Rand), Oberfläche glatt, glänzend schwarzbraun, mit deutlichen Wachsthums-absätzen. Vorderende des Schlossrandes schnabelförmig vorspringend, Vorderrand unterhalb desselben eingebuchtet und zwar an der rechten Schale tiefer als an der linken, zum Austritt des Byssus; in der untern Hälfte schwach convex, ohne bestimmte Grenze in den gebogenen Unterrand übergehend; Hinterrand entweder in stumpfem Winkel vom Hinterende des Schlossrandes abgehend und dann convex schwach gebogen, ohne scharfe Grenze gegen den Unterrand, oder mehr geradlinig schief nach unten und hinten, zuweilen selbst etwas eingebuchtet, eine stumpfe, öfters abgerundete Ecke mit dem Unterrand bildend. Innenseite trüb-violett perlmutterartig, gegen die Ränder zu schwärzlich; an den Wirbeln oft mehr oder oder weniger abgerieben, matt hellgrau. Schlossrand mit nur 4—6 Vertiefungen. Bis 42 Mill. lang, 30 breit und 13 im Queerdurchmesser, die meisten Exemplare aber bedeutend kleiner, 24 lang, 19 breit und 6 dick, oder noch darunter.

Diese Art fand ich auf Amboina an der Mündung des Flusses von Batumera, an Stellen, wo das Wasser nicht salzig schmeckte, doch in gleichem Niveau mit dem Meer, an Steinen bei Ebbe über Wasser, zusammen mit *Potamides quadratus* und *Neritina communis*, ich muss sie also auch noch zu den Brackwasserbewohnern rechnen. An einer Stelle fand ich sie noch ein Paar hundert Schritte landeinwärts im Bache, aber da die Eingebornen sehr oft Steine vom Strande holen, zu verschiedenen Zwecken, so wäre es möglich, dass auch der Stein, an welchem sie sassen, vom Strande herbeigeschleppt worden sei. Übrigens waren alle noch fest durch den Byssus angeheftet und enthielten noch die Weichtheile. Dieselbe Art fand ich noch an verschiedenen anderen Stellen von Niederländisch-Indien oberflächlich am Strande,

so auf Java bei Palabuan, auf Ternate, auf Halmaheira nahe Dodinga an der Ostseite des Isthmus (hier bis 35 Mill. lang und 26 breit, hellbraun), Banda-Neira und Timor bei Kupang; Hr. v. Richthofen auch an der Mündung des Udjong-tji auf Java.

Reeve hatte sie von den Philippinen. Durch O. Finsch erhielt sie das Berliner Museum von der Karolinen-insel Ponape „an Wurzeln der Mangrove (Mangle), sehr fein schmeckend“, in einem 32 Mill. langen und 21 breiten dunkelbraunen, etwas strahlig gezeichneten Exemplar. *P. acutirostris* Dunker im Mus. Godeffroy von den Viti-inseln unterscheidet sich nur durch etwas dickere und stärker gewölbte Schale und scheint nicht wohl als Art zu trennen; ebensowenig eine von Prof. Möbius auf den Seychellen gefundene Form. So ist auch diese Art weit verbreitet.

Ob der Hinterrand nach unten sich umbiegt oder geradlinig schief nach hinten bis ganz unten herabsteigt, macht wohl einen merklichen Unterschied im Umriss, wechselt aber bei sonst ganz ähnlichen Exemplaren desselben Fundorts und hängt wahrscheinlich davon ab, wie das angeheftete Thier freien Raum zum Weiterwachsen fand. Auch bei den typischen Arten der Gattung, *Perna isognomon* und *ephippium*, wechselt die Richtung des Hinterrandes in analoger Weise.

## MYTILIDAE.

### **Mytilus.**

Auch von dieser Gattung dürften einige Arten ins Brackwasser reichen. Blanford führt den grossen, schön grünen *Mytilus viridis* L. (*smaragdinus* Lam.) unter den estuarine shells von Birma auf; derselbe ist noch in Singapore häufig, aber in Niederländisch-Indien mir nicht vorgekommen.

### **Modiola.**

#### SUBGEN. BRACHYDONTES Swains.

Schale mit etwas körnigen Radialrippen, daher der Rand ringsum gezähnt. Ein oder zwei schmale schwache Zähne im Schloss. Wirbel ganz nahe dem vordern Ende der Muschel, sodass nur ein kleiner Raum zwischen ihnen und dem Vorderende des Unterrandes bleibt.

1. *Modiola (Brachydontes) subramosa* Hanl.

*Mitulus anataris* Rumph amb. rar. S. 151 (deutsch S. 145) Taf. 46, fig. C, (nicht gut).

*Modiola subramosa* Hanley rec. bivalv. shells p. 241, pl. 24, fig. 30.

Reeve conch. icon. X, fig. 46, copirt bei Clessin Mytiliden in d. neuen Ausgabe von Martini-Chemnitz S. 121, Taf. 31, Fig. 11.

*Modiola striatula* (Hanl.) v. Martens in Jagor Reisen in den Philippinen 1873 S. 191.

*Modiola ramosa* Clessin ebenda S. 134, Taf. 26, Fig. 8.

Die Radialrippen schon am vordern Theil des Oberrandes sich nach vorn umbiegend und mehrfach gegabelt, überhaupt am ganzen Ober- und Hinterrand ziemlich regelmässig gegabelt und dadurch schmärer als im mittlern Theil, nach unten und vorn verflacht und in der Regel den vordern Theil des Unterrandes nicht erreichend. Wirbel beinahe die Vorderspitze der Schale bildend. Ecke des Oberrandes mehr oder weniger deutlich, vor der Hälfte der Länge, Unterrand gerade oder sehr schwach eingebogen. Färbung trüb rothbraun, am vordern Theil mehr oder weniger abgerieben, grau oder röthlich; einzelne Exemplare heller mit concentrischen violettbraunen Bändern. Gesamtmumriss etwas variabel, Höhe von  $\frac{1}{2}$  zu  $\frac{3}{8}$  der Länge wechselnd; mein grösstes Stück von Amboina 36 Mill. lang, an der Ecke 14 hoch und 14 breit (im Queerdurchmesser), also ebenso breit als hoch, gewöhnlich aber etwas höher als breit. Nach Hanley  $\frac{1}{4}$  engl. Zoll. (32 Mill.) lang und  $\frac{1}{2}$  ( $12\frac{1}{2}$  Mill.) hoch; Reeve's Figur 26 Mill. lang und 11 hoch.

Bai von Amboina, bei Ruma-tiga haufenweise an losen Steinen auf weichem Grund, v. Martens 1862; ebenso fand sie Rumph. Vgl. auch S. 87. Ternate, Dunker'sche Sammlung. Celebes, Pätel's Sammlung. Mindanao, Hanley. Rio Catarman, auf der Philippinen-insel Samar, in Löchern der Thonbänke des Ufers oberhalb des Gebiets der Nipa-Palmen (also wohl schon in süssem Wasser) Jagor.

Pätel's *Modiola ramosa* ist nach seinem Exemplare, jetzt im Berliner Museum, ganz sicher eine junge *subramosa* und der Name wohl nur Schreibfehler für *subramosa*, da Hanley als Autorität beigelegt ist.

Ähnlich derselben ist *M. striatula* Hanley ebenda fig. 29. Reeve fig. 72, copirt bei Clessin Taf. 33, Fig. 2 unter dem falschen Namen *strigata*, was eine glatte Art ist, Reeve fig. 33, von Clessin S. 119

beschrieben, aber nicht abgebildet. Rippen zahlreicher, schmaler und schärfer, am vordern Theil des Oberrandes, nur wenig sich aufbiegend und hier gar nicht, am Hinterrand nur seltener, sich gabelnd und daher im Allgemeinen am Rand breiter als in der Mitte der Schale; Ecke des Oberrandes ganz abgerundet, ungefähr in der Hälfte der Länge; Unterrand immer eingebogen. Glänzend graulich, öfters mit dunkeln Farbenstrahlen. Reeve's Figur 39 Mill. lang, 12 hoch, mein grösstes Exemplar von Singapore 36 Mill. lang, 13 hoch, 11 im Durchmesser.

Singapore häufig in einem schwarzen Sumpf dicht bei der Stadt, v. Martens 1861. Philippinen, Hanley.

Ferner *Modiola emarginata* Bens., Reeve fig. 73, Clessin S. 114, Taf. 26, Fig. 3, nach aus Calcutta erhaltenen Exemplaren in der Berippung zwischen den beiden vorgenannten in der Mitte, indem die Rippen am Oberrande vor der Ecke sich etwas stärker umbiegen als bei *striatula* und hier auch einzelne sich gabeln, noch mehr am Hinterrande, aber bei weitem nicht alle. Farbe braun, ähnlich wie bei *subramosa*, doch mehr gelblich. Ein Unterschied gegen beide liegt aber darin, dass das Vorderende stärker angeschwollen ist, die Wirbel höher stehen und der Vorderrand zwischen ihnen und dem vordern Ende des Bauchrandes fast senkrecht abfällt, (in Reeve's Abbildung nicht so auffällig, wie an den mir vorliegenden Stücken), während er bei *M. striatula* noch etwas schnabelförmig nach vorn vorspringt und einige stärkere Rippen zeigt; bei *M. subramosa* fast null ist. Grösse der vorliegenden Exemplare 28 Mill. lang, 11 hoch, 10 im Queerdurchmesser. Unterrand stark eingebogen. Färbung trüb gelbbraun. Auch im Brackwasser der Birmanischen Küste nach Blanford.

Clessin's zweite *M. emarginata*, S. 120, Taf. 25, Fig. 7, 8 kann ich nach dem Original-Exemplar in Pätel's Sammlung nicht für dieselbe Art halten, sie ist viel länger ausgezogen und hat viel schwächere Rippen; wahrscheinlich gehört sie zu *M. Fortunei* Rv. fig. 75 von China. Clessin's *Mod. Paeteliana* S. 111, Taf. 31, Fig. 7, 8 ist nach dem Original-Exemplar in Paetel's Sammlung nichts anderes als die westindische *M. sulcata* Lam.; die Fundortsangabe „Philippinen“ steht nicht auf der Paetel'schen Etikette.



## ARCIDAE.

**Arca.**

Sehr zahlreiche zwischen einander eingreifende Zähnnchen in gerader Reihe.

Die meisten Arten leben auf Steingrund, an Felsen oder auf Korallen und gehören dem offenen Meere an, doch scheinen einige Arten auch noch in das Brackwasser hereinzureichen, so *Arca granosa* L., Cardium-förmig mit starken knotigen Radialrippen, von schlammgrauer Farbe, (Rumph amb. rar. S. 143 deutsch 131, Taf. 44, Fig. K) häufig bei Singapore und auch bei Pulo-tikas unweit Benkulen (Sumatra), Surabaya (Java), Mampawa (Westküste von Borneo), Makassar (Celebes) und Kupang (Timor) von mir gefunden, von Makassar und der Nordküste Ceram's bei Rumph angegeben, ferner bei den Inseln Lucipara (zwischen Timor u. Amboina) und Dana (südwestlich von Timor) von der Expedition der Gazelle. Ihr sehr ähnlich, nur etwas mehr länglich, *A. nodifera* Marts. Proc. Zool. Soc. 1860. 17 mal so lang als hoch, mit mehr auseinander stehenden Rippen, welche zahlreich in Bangkok (Siam) zum Essen verkauft wird und welche ich auch bei Palabuan (Java) gefunden habe. Bei beiden ist die Anzahl der ausstrahlenden Rippen im wesentlichen gleich, 18—21, wenn man die kleinsten vordersten und hintersten mitzählt, 13 davon stark und unter sich ziemlich gleich.

Zwei andere kleinere Arten, *Scaphula pinna* und *deltae* Bens. führt Blanford als „estuarine shells“ von Burma an; *Sc. celox* (*Arca scaphula* Bens. Proc. Zool. Soc. 1835) lebt sogar in ganz süßem Wasser im Ganges-gebiet, von Calcutta aufwärts bis Humerpoor am Jumna, etwa 600 engl. Meilen vom Meer (Woodward); aus Niederländisch-Indien ist diese Untergattung von *Arca* bis jetzt noch nicht bekannt.

## LUCINIDAE.

**Lucina** Brug.

Vorherrschend linsenförmig, ringsum schliessend, mit schwach entwickelten Schlosszähnen und zwei Muskeleindrücken, von denen der vordere, bandförmig verlängert, nach innen dem vordersten Theile der

Mantellinie parallel verläuft; hievon ist die Gattung unter allen andern Muscheln zu erkennen. Fuss lang, fingerförmig, sehr beweglich.

Meermuscheln, von denen aber einzelne auf sumpfigem Boden an Flussmündungen leben, diese gehören zur Untergattung *Anodontia* (Link) Mörch, mit concentrischer schwacher Sculptur und sehr schwachen, fast verschwindenden Schlosszähnen. Die beiden hier aufzuführenden Arten zeichnen sich durch eine deutliche, graubraune schlammfarbige Schalenhaut über der an sich weissen Schale aus.

1. *Lucina edentula* (L.) Taf. XI, Fig. 1, 2.

*Venus edentula* Linne syst. nat. ed. X, p. 689, ed. XII, p. 1135.

*Lucina edentula* (L.) Philippi Zeitschr. f. Malak. 1845, p. 179 und

Philippi Abbild. neuer Conch. II, S. 105, Taf. 1, Fig. 1. v. Martens Linn. Soc. Journ. XXI, 1886 S. 173.

*Lucina Philippiana* Hanley, Reeve conch. ic. fig. 23.

Vorn und hinten abgerundet, mit ungleich starker concentrischer Streifung, ohne Vertiefung im hintern Theile. Schlossrand dünn.

Batjan, v. Martens.

Inseln Elphinstone und Sullivan bei Mergui, J. Anderson. Golf von Manaar, Thurston. Nicht *L. edentula* Lam., Encycl. meth., Vers. pl. 284, fig. 3 und Hanley, was *L. chrysostoma* Phil. ist.

2. *Lucina Philippinarum* Hanl. Taf. XI, Fig. 3, 4.

Hanley rec. bivalve shells p. 348, pl. 14, fig. 18. Reeve conch. ic.

fig. 18. v. Martens a. a. O. S. 174.

Hinten mehr gerade abgeschnitten, mit starken gleichmässigen concentrischen Rippen, im hintern Felde immer eine sichtbare Vertiefung. Etwas dickschaliger als die vorige, Schlossrand stärker, Schlossband sehr dick. Bis 70 Mill. lang und 72 hoch.

Muntok auf Banka, v. Martens. Pariti auf Timor, im Mangle-umpf, Expedition der Gazelle. Inseln bei Mergui in Tenasserim, in brackischem Wasser, zusammen mit *Cyrena proxima*, Singapore, J. Anderson. Manila auf sandigem Schlamm an den Wurzeln der Manglebäume, Cuming. Port Canning an der Ganges-mündung, Brit. Mus. Port Denison, Queensland, Tenison-Woods.

*L. induta* Stoliczka aus dem Gangesdelta bei Port Canning ist eine Zwergform derselben Art.

Junge Stücke dieser Art,  $\frac{3}{4}$  engl. Zoll. (19 Mill.) lang, wurden im

Indischen Ocean nahe Trincomali aus einer Tiefe von 200—350 Faden durch das Schleppnetz erhalten, E. Smith Ann. Mag. N. H. (6) XVI, 1895, p. 14; es ist aber nicht gesagt, ob dieselben lebend, noch mit Schalenhaut bekleidet oder abgestorben waren; dass dieselbe Art jung in solcher Tiefe und erwachsen auf Mangle-boden lebe, ist sehr unwahrscheinlich.

## CYRENIDAE.

### **Cyrena.**

Mehrere Arten der Gattung *Cyrena* im engern Sinne, siehe oben S. 90, kommen im malayischen Archipel nach meinen Erfahrungen nur in der nächsten Nähe des Meeres, nicht im Binnenlande, vor und können daher auch gewissermaassen zu den Brackwasser-Mollusken gerechnet werden, siehe *C. coaxans* und *C. Moluccensis*. *C. Papua* Less. fand Th. Studer auf Neu-Hannover im Flusse bis zur ersten Barre aufwärts, wo das Wasser noch unter Einfluss von Fluth und Ebbe steht. *C. Bengalensis* Sow. wird von Blanford unter den estuarine shells und als in den birmanischen Estuaries allgemein vorkommend angeführt.

## GLAUCOMYIDAE.

### **Glaucomya** Bronn 1854.

*Glaucomya* Gray 1828, nicht Goldfuss 1826.

Muscheln von der Gestalt eines *Unio*, mit grünlicher, oft etwas gerunzelter Schalenhaut; jederseits 3 kleine Zähne im Schloss, einer derselben jederseits zweispaltig; eine tiefe abgerundete Mantelbucht. Mehrere Arten von Cuming an Flussmündungen in der Bai von Manila und sonst auf den Philippinen gefunden, im malayischen Archipel im engern Sinn, wie es scheint, ziemlich selten; auch in China (Salinen bei Taku Exp. der Magenta) und Bengalen; aus andern Meeren bis jetzt nicht bekannt.

#### 1. *Glaucomya virens* L.

*Solen virens* Linne syst. nat. ed. XII, p. 1115; Hanley ipsa Linn. conch. 1855, p. 32, pl. 1, fig. 1.

*Glaucanome virens* Reeve conch. icon. II, fig. 9. Issel moll. born. p. 115.

Nach hinten schnabelförmig verlängert, von der Gestalt des *Unio tumidus*, in der Mitte etwas eingedrückt. Wirbel in  $\frac{1}{3}$  der Länge. 21 Mill. lang, 19 hoch.

Java, nach Linne, seitdem meines Wissens nicht mehr da gefunden.

Borneo, bei Sarawak, Issel.

## 2. *Glaucomya Sumatrensis* Prime.

Prime in Journ. de Conch. X, 1862, p. 384 pl. 14, fig. 3.

Nach hinten schnabelförmig verlängert und der Obberand hier deutlich herabsteigend. 24 Mill. lang, 15 hoch, 10 im Queerdurchmesser. Sumatra.

## 3. *Glaucomya Cumingi* Prime.

Prime in Journ. de Conch. X, 1862, p. 384, pl. 14, fig. 4.

Kürzer, Wirbel in der halben Länge, also vor und hinter den Wirbeln gleich lang. Länge 35, Höhe 25, Queerdurchmesser  $15\frac{1}{2}$ . Hinterer Rückenrand auch deutlich herabsteigend.

Malakka: könnte daher wohl auch bei Sumatra vorkommen.

Nach Tapparone-Canefri würde die grössere *Gl. rugosa* Hanley, welche Cuming auf den Philippinen fand, bei den Aru-inseln vorkommen, was auf ein Vorkommen der Gattung auch in den Molukken schliessen lässt.

## PSAMMOBIIDEN.

Die Psammobiiden sind zwar im Allgemeinen Meerbewohner und leben hauptsächlich auf Sand- und Schlammgrund, aber manche deshalb auch an Flussmündungen, in schwächer salzigem Wasser, eine, den mir zugekommenen Angaben nach, sogar in Süsswasser. Mehrere sind bei den Eingebornen als Speise sehr beliebt. Da die Arten oft unter sich sehr ähnlich und zuweilen mit einander verwechselt worden sind, gebe ich hier eine Übersicht der Arten, welche aus dem malayischen Archipel, von Sumatra und Malakka bis zu den Molukken und Timor einschliesslich mir bekannt geworden sind, theils durch eigenes Sammeln während meines Aufenthaltes in Ost-asien, 1860—63, theils durch spätere Zusendungen oder durch die Sammlung des Museums für Naturkunde in Berlin.

**Soletellina** Blainv.

*Hiatula* Modeer, z. Theil, Ad. 1858, nicht Lacépède 1800  
noch Swains 1835.

Mantelbucht in der ganzen Länge an die Mantellinie angelegt (macrosynapt). Meist grosse, dunkelgefärbte Arten, of mit zwei hellen Farbenstrahlen, welche vom Wirbel zum Unterrande etwas divergirend herablaufen. Schlosszähne rechts 1, links 1—2.

1. *Soletellina rostrata* Spengl.

Batavische peersche Zonne-stralen, Valentyn, oud en nieuw Oost-Indië III, 1726, Taf. 13, Fig. 5.

*Solen diphos* Chemnitz conch. cab. VI, fig. 53, 54, nicht Linne.

— *rostratus* Spengler in Skrivt. naturhist. Selskab Kopenhagen III, 2 1794, p. 99. Lam. an. s. vert. ed. 1 nro 21; ed. 2 VI, p. 61. Encycl. method. Vers pl. 226, fig. 1.

*Sanguinolaria diphos* Sowerby genera of shells part XXX, pl. 148, (oder 151), fig. 3, 4, cop. bei Reeve conch. syst. pl. 52, fig. 3, 4.

*Solen violaceus*, (theilweise). Chenu illustr. conch. *Solen* pl. 3, fig. *a*, *b* und pl. 8, fig. 6, 6*a* (verbleicht).

*Psammobia rostrata* Hanley rec. bivalve shells, p. 58.

*Soletellina radiata* Blainv. traité de malacol. pl. 77, fig. 5; Desmou-lins Act. soc. Linn. de Bordeaux 1832 p. 101.

— *diphos* (L.) Reeve conch. icon. X, fig. 8.

Hinter den Wirbeln länger und etwas niedriger als vor denselben, mit deutlichem Schnabel. Rechts und links nur ein Zahn deutlich ausgebildet, rechts öfters mit einem Nebenzacken nach vorn, links eine zahnartige Längsleiste als zweiter Zahn. Bis 105 Mill. lang, 48 hoch und 25 breit (Chenu's Abbildung sogar 111 lang, 51 hoch). Wirbel in  $\frac{2}{5}$  oder  $\frac{9}{21}$  der Länge.

Malacca, Cuming. Batavia, Valentyn. Ceylon, in dort käuflichen Sammlungen. Estuaries of Pegu, Blanford.

2. *Soletellina diphos* L.

*Solen diphos* Linne mantissa plant. alt. 1771 p. 544; Hanley ipsa Linn. conch. p. 452 und 552. Spengler Skrivt. naturhist. selsk. III<sup>2</sup>, 1794, p. 98.

*Solen violaceus* Lamarck hist. an. s. vert. ed. 1 V, nro. 20; ed. 2 VI, p. 60; Delessert recueil pl. 2, fig. 5. — Chenu illustr. conchyl. Solen pl. 4, fig. 3c (die mittlere untere Figur).

*Soletellina violacea* Blainville dict. sci. nat. tome 49, p. 440. Desmoulins Act. Soc. Linn. de Bordeaux V, 1832, p. 101.

*Solecurtus violaceus* Lesson Voy. Coquille, Zool. II. 1. pag. 432.

*Psammobia violacea* (Lam.) Hanley recent bivalves p. 59. Philippi abbild. neuer Conch. I, S. 97, Taf. 1, Fig. 2.

*Soletellina Cumingiana* Deshayes, Reeve conch. icon. X, fig. 4.

Hinter den Wirbeln breit, abgerundet, nicht wesentlich niedriger als vor denselben. Links ein zweiter (hinterer) Schlosszahn, schief und schwach, rechts nur ein schwacher Zahn. Bis 113 Mill. lang, 52 hoch, 25 breit. Wirbel in  $15/38$  der Länge.

Java, v. d. Busch und in Dunker's Sammlung. Buru, Lesson. Burmese estuaries, allgemein, Blanford. Golf von Manaar, Thurston. Baie d'Hulong in Tonkin, Crosse. Philippinen, Reeve.

*Solet. truncata* und *planulata* Reeve, fig. 9 und 15, beide von den Molukken angegeben, dürften zu *S. chinensis* (Chemn.) gehören, welche mir bis jetzt nicht aus dem malayischen Archipel vorgekommen ist, wohl aber aus Siam.

### 3. *Soletellina atrata* Desh.

Reeve conch. ic. X, fig. 14.

Vorn und hinten abgerundet, hinter den Wirbeln kürzer als vor denselben. Links ein zweiter (hinterer) Zahn kaum angedeutet. 37—38 Mill. lang, 22—23 hoch, 10 im Querdurchmesser, Wirbel in  $3/5$  der Länge.

Batjan, von mir gefunden. Amboina in den Dunker'schen Sammlung. Sonst von den Philippinen und Japan bekannt.

### **Elizia** Gray.

Schale fast kreisrund mit glänzender gelber Schalenhaut. Links 3, rechts 2 Schlosszähne, je einer zweispaltig.

Mantelbucht ganz frei aufsteigend.

### 1. *Elizia orbiculata* Wood.

*Solex orbiculatus* Gray in Wood ind. test. suppl. 1828, p. 3, fig. 6.

*Psammobia orbicularis* Deshayes in Guérin Magaz. de Zoolog. 1839, pl. 7. Chenu illustr. conchyl. *Psammobia* pl. 1, fig. 2.

*Soletellina orbiculata* Reeve conch. icon. X, fig. 18.

*Elizia orbiculata* Adams gen. moll. II, p. 393, pl. 103, fig. 5. Chenu manuel de conchyl. II, p. 66, fig. 270, 271.

Sumatra, Capt. Martin. Mampawa bei Mandhor an der Westküste von Borneo auf Sumpfboden im Mangle-gebiet, v. Martens. Singapore v. Martens. Pulo Pinang, Malacca und angeblich auch Siam Morgan, (Bull. Soc. Zool. de France X, 1885).

Reeve's *S. reversa*, fig. 17 (von Malacca) ist vielleicht nur Jugendzustand.

### ***Psammotellina* P. Fisch.**

*Psammotella* H. u. A. Adams 1856, und Deshayes bei Reeve, non Blainville.

Schale mässig gewölbt, Unterrand ziemlich stark gebogen, Hinterrand ohne deutliche Ecke oder Kante. Schlosszähne jederseits 2, aber einer öfters verkümmert. Mantelbucht mit ihrem untern Rand nahe der Mantellinie und ihr ziemlich parallel verlaufend, doch meist nicht ganz mit ihr zusammenfallend, am vordern Ende abgerundet (hemisynapt), doch an den einzelnen Stücken etwas unter sich abweichend.

#### 1. *Psammotellina serotina* Lam.

*Psammotaea serotina* Lamarck an. s. vert. ed. 1 V, nro. 5; ed. 2 VI, p. 181.

*Psammobia serotina* (Lam.) Philippi abbild. neuer Conch. I, Taf 2, fig. 7.

*Psammotella ambigua* Deshayes bei Reeve conch. icon. X, fig. 5.

— *subradiata* Deshayes bei Reeve conch. icon. X, fig. 6.

Ziemlich gewölbt und öfters, doch nicht immer, ziemlich dickschalig, vorn gerundet, hinten schnabelartig zugespitzt, aussen mässig oder blass violett, mit 1—2 wenig ausgeprägten, weisslichen Strahlen in der hintern Hälfte, Wirbelgegend meist mehr röthlich. Innenseite in der Regel intensiv rötlich-violett, oft mit weisslichem Randsaum, Zähne etwas variabel. Mantelbucht nur wenig weiter nach vorn reichend als die Wirbel, ihr oberer Rand nach vorn einen convexen Bogen bildend,

der untere Rand nach vorn sich etwas erhebend und von der Mantellinie entfernend. Länge 48—55 Mill., Höhe 29—32, Querdurchmesser 16—18, Wirbel in  $\frac{3}{7}$ , zuweilen  $\frac{4}{9}$  der Länge.

Amboina, gekauft, und Adonara bei Flores, am Strand auf-  
gelesen, v. Martens. Luzon, F. Jagor in Mehrzahl.  
Hongkong, Mad. Schütze.

Unter einer grossern Anzahl philippinischer Exemplare finde ich folgende Variationen betreffs der Ausbildung der Zähne:

- 1) rechts der vordere, links der hintere sehr schwach und klein.
- 2) rechts der hintere, links der vordere schwach.
- 3) rechts und links der hintere kaum zu erkennen.
- 4) rechts beide gut ausgebildet, links der hintere schwach.
- 5) rechts und links beide gut ausgebildet.

An mehreren Exemplaren findet sich in der Mitte der Innenseite eine unregelmässige Erhöhung, durch Einnistung eines fremden Körpers, (Schwamm?) verursacht.

Ob diese Art in der That Lamarck's serotina sei, ist nicht ganz sicher, da Lamarck keine Abbildung citirt und sein Exemplar auch nicht von Delessert oder Chenu abgebildet wurde, doch lässt sich Lamarck's Beschreibung damit vereinigen und namentlich die Angabe von zwei weissen Strahlen spricht dafür. Dass er die Schale dünn nennt, ist kein Gegengrund, da in der Dunker'schen Sammlung einige recht dünnschalige Exemplare vorhanden sind. Philippi's serotina passt in der Abbildung sehr gut zu den mir vorliegenden Stücken; zwar ist der Unterrand der Mantelbucht mit der Mantellinie zusammenfallend gezeichnet, aber darin kann man sich leicht irren, wenn man nicht genau zusieht.

## 2. *Psammotellina pallens* n.

Weisslich, mit ziemlich groben Anwachsstreifen und glanzloser gelbbrauner Schalenhaut, Wirbelgegend vorn und hinten blassröthlich; Innenseite rosenroth. Links zwei gleichstarke Zähne, rechts der hintere weniger vortretend. Mantelbucht bedeutend weiter nach vorn reichend als die Wirbel, ihr Oberrand nach vorn herabsteigend, Unterrand in seiner ganzen Länge sehr nahe der Mantellinie. 45 Mill. lang, 29 hoch, 15 im Querdurchmesser, Wirbel in  $\frac{3}{7}$  der Länge.

Pulu Loz am Eingang des Hafens von Bintang, südlich von Singapore, Beierhaus im Berliner Museum, 1837 oder 1840, wahr-



scheinlich von Missionär Böttger erhalten. Bildet einen Übergang zu *Soletellina* betreffs der Mantelbucht.

3. *Psammotellina Malaccensis* Desh.

*Psammotella Malaccensis* Desh. bei Reeve Conch. icon. X, fig. 2.

Klein, oval, gelblich, 26 Mill. lang, 16 hoch, Wirbel in  $\frac{3}{7}$  der Länge. Queerdurchmesser und Form der Mantelbucht unbekannt.

Malakka, Cuming.

4. *Psammotellina Semmelinki* n. Taf. X, Fig. 23, 24.

Längs-elliptisch, Wirbel beinahe in der Mitte der Länge, aber die Schale doch ungleichseitig, das vordere Ende voller abgerundet, der Rückenrand vor den Wirbeln nur schwach absteigend, hinter denselben stärker abfallend, zuerst etwas concav, dann convex; Hinterrand etwas schief, einen abgerundeten Winkel sowohl mit dem Ober- als mit dem Unterrand bildend; Unterrand in der Mitte wenig gebogen, vorn stärker aufsteigend als hinten. Concentrisch gestreift, mehrere Wachstumsabsätze durch concentrische, aus mehreren Streifen bestehende Anschwellungen markirt. Schalenhaut glänzend dunkel-grünbraun; Wirbelgegend in weiterem Umfang abgerieben, röthlich. Innenseite violett, in der Mitte röthlich. Zähne rechts zwei, ziemlich stark, fast quadratisch, am freien Ende etwas zweigetheilt, der hintere merklich kleiner; links einer stark vorstehend, nach dem freien Ende zu breiter und zweigetheilt Mantelbucht weiter als die Wirbel nach vorn ausgedehnt, bis zu  $\frac{2}{5}$  der ganzen Länge von vorn an gerechnet, grossentheils dicht neben der Mantellinie angelegt, aber vorn in kurzem Bogen aufsteigend,

a. Typisch. Länge 32 Mill., Höhe 17, Queerdurchm. 11, Wirbel in  $\frac{17}{32}$  der Länge.

Java: Bezuki in der Nähe des Hauptortes in Süsswasser, in Gesellschaft von Ampullarien und *Melania*, Dr. Semmelink (Militärarzt zu Larentuka 1863, später in Java und Borneo). Fig. 23.

b. Strubelli n. Länge 34 Mill., Höhe 20, Queerdurchmess. 10, Wirbel in  $\frac{8}{17}$ .

Java: bei Talabuan, in Süsswasser, Br. Strubell.

Hinterrand steiler herabsteigend und mit einer niedrigeren Rundung in den Unterrand übergehend. Aussen glänzend dunkelgrün mit Spuren

von zwei helleren Strahlen im hintern Drittel, innen dunkel violett.

c. *Borneensis*: Länge  $20\frac{1}{2}$  Mill., Höhe 12, Queerdurchm.  $6\frac{1}{2}$ , Wirbel in  $\frac{11}{21}$  der Länge.

Borneo: südwestl. Theil, Tanah-laut, ebenfalls von Dr. Semmelink und als Süsswasser Muschel bezeichnet. Fig. 24.

Kleiner, hinten etwas mehr eckig, im untern Theil der Schale heller gelbgrün, innen violett der zweite Zahn der rechten Seite schwächer ausgebildet. Von jeder dieser Formen habe ich nur ein Exemplar gesehen.

Da die Fundorte an der Küste liegen und noch keine Psammobiide unseres Wissens tiefer im Binnenland gefunden ist, führe ich diese Art auch noch unter den submarinen auf, ohne zu bezweifeln, dass das Wasser, in dem sie lebt, wirklich süß sei. Die glänzende, dunkle Schalenhaut gleicht derjenigen von *Soletellina*, aber die Form der Mantelbucht trennt sie von dieser Gattung.

5. *Psammotellina connectens* Marts. Taf. X, Fig. 22.

*Psammobia* (*Psammotaea*) *connectens* v. Martens in Ann. Mag. nat. hist. (3) XVI, 1865, p. 431.

Längs-eiförmig, ziemlich hoch, der Unterrand in der Mitte geradlinig, nicht gebogen, das vordere Ende mehr schmal zugerundet, der Rückenrand vor den Wirbeln geradlinig, entschieden herabsteigend, hinter denselben ganz kurz concav und dann schwach convex. Hinterer Theil der Schale (hinter den Wirbeln) mehr voll gerundet, höher aber kürzer als der vordere. Aussenseite dunkel violett, mit glänzender, dunkel gelbbrauner Schalenhaut, welche aber von den Wirbeln aus in ziemlich weiter Ausdehnung abgerieben ist; Andeutung Eines weisslichen Farbenstrahles, dem hintern von *Soletellina atrata* entsprechend. Innenseite dunkelviolett. Am Schloss rechts ein kleiner zusammengedrückter, rechtwinklig abstehender Zahn, links zwei, zweigetheilt, nicht so weit vorspringend, der vordere schwächer. Ligament-träger (Nymphe) verhältnissmässig länger als bei *S. atrata*, nahezu die Hälfte der Entfernung von den Wirbeln zum Hinterende einnehmend (bei *S. atrata*  $\frac{2}{5}$ ). Mantelbucht nach vorn weit über die Wirbel hinausgehend, bis zu  $\frac{1}{3}$  der Länge der ganzen Schale von vorn an gerechnet, zungenförmig, grösstentheils dicht an die Mantellinie angelegt, nur am vordern Ende einen kurzen Bogen bildend. Länge 27, Höhe 15, Queerdurchmesser 8 Mill. Wirbel in  $\frac{4}{7}$  der Länge.

Banka, bei Muntok, Ein Exemplar v. Martens; wahrscheinlich aus einer sandigen Strecke mit Mangledickicht in der Nähe des Leuchthturms.

Im Habitus der *Soletellina atrata* ähnlich, aber durch das gerundete, ein wenig von der Mantellinie sich ablösende Vorderende der Mantelbucht von dem Gattungcharacter der Soletellinen abweichend; von Ps. Semmelinki durch die Abkürzung und Rundung des Hinterrandes und merklich weiteres Vordringen der Mantelbucht zu unterscheiden.

***Psammotaea* Lam.**

*Capsa* subgen. *Capsella* Desh. 1854. gen. *Capsella*  
Reeve 1857, non Gray.

Mässig gewölbt, Unterrand mehr gerade; eine stumpfe Kante von den Wirbeln zum untern Ende des Hinterrandes verlaufend und hier eine stumpfe Ecke bildend; eine zweite stumpfe Ecke am obern Ende des Hinterrandes. Unterer Rand der Mantelbucht in ihrer vordern Hälfte stark aufsteigend, von der Mantellinie sich mehr und mehr entfernend, oberer ziemlich horizontal, nur ganz vorn einen Bogen bildend (brachysynapt), Zähne rechts zwei, links öfters nur einer, indem der hintere, der meist schon klein ist, ganz schwindet.

1. *Psammotaea radiata* Desh.

*Capsella radiata* Deshayes Proc. Zool. Soc. 1854, p. 348. Reeve conch. icon. X, fig. 7.

Ziemlich gewölbt und nach hinten anschwellend, aussen violett oder rosa-violett, in der Regel mit mehreren dunklen violetten Strahlen und röthlicher, gelber oder weisslicher Färbung der Wirbelgegend; zuweilen der hintere Theil der Schale einfarbig dunkler violett, selten ganz ohne Strahlen. Schalenhaut glanzlos braun, meist nur an den Rändern erhalten. Innenseite blass-violett mit durchscheinenden Strahlen oder einfarbig intensiv-violett, bei älteren Exemplaren Innenseite blasser violett, aber fast immer mit violetten Strahlen, auch wenn diese an der Aussenseite nicht sichtbar.

Mantelbucht soweit als die Wirbel oder etwas weiter nach vorn reichend. Zähne schwach, rechts zwei, der hintere breiter aber aufsitzend, doch zuweilen sehr schwach ausgebildet; links der vordere gut entwickelt, der hintere sehr klein oder ganz fehlend. Länge 35—40 Mill., Höhe 19—21½, Queerdurchmesser 10—13, Wirbel in  $\frac{3}{7}$  der Länge.

Grösstes, anscheinend sehr altes Stück von Luzon 50, 21, 17,  $\frac{2}{3}$ .

Der Färbung nach kann man drei Varietäten unterscheiden, welche aber unter einander vorkommen:

- a) Mit mehreren violetten Strahlen, die aussen und innen sichtbar sind.
- b) Mit einigen sehr blass violetten Strahlen, das hintere Drittel der Schale einfarbig dunkler violett.
- c) Aussen und innen fast einfarbig violett, aussen gegen die Wirbel zu dunkler und mehr röthlich, mit Spuren von zwei weissen Strahlen in der hintern Hälfte; innen sehr intensiv violett.

An der Westküste von Borneo (b), sowie bei Larentuka (b) auf Flores, bei Adonara (a, b, c) und bei Kupang auf Timor (a, b, c) von mir gefunden. Cuming und Jagor haben sie auf den Philippinen gesammelt, letzterer bei Mariveles Prov. Bataan auf Luzon. Nach den individuellen Variationen, welche eine Anzahl von F. Jagor auf Luzon gesammelt und dem Berliner Museum gegeben, aufweist, möchte ich glauben, dass *Capsella candida* Reeve 13 eine ältere radiata ist. Auch seine *Capsella rufa*, fig. 3, ist sehr ähnlich.

## 2. *Psammotaea violacea* Hanl.

*Tellina gari* Rumph amb. rar. p. 146 (deutsche Ausg. S. 137), Taf. 45, Fig. D.

*Psammotaea violacea* (Lam. hist. nat. d. an. s. vert. ed. 1 V, nro. 1; ed. 2, VI, p. 180?). Hanley rec. bivalves p. 60, pl. 12, fig. 60. Mörch. catal. Yoldi 1853, p. 10.

*Capsella violacea* Desh. bei Reeve conch. ic. X fig. 6.

Verhältnissmässig länger als die vorige, mit gröberen Anwachsstreifen, aussen glanzlos, violett-blau, mit schwachen Spuren von weissen Strahlen, Wirbel mehr röthlich mit breiten dunkelvioletten Strahlen; Schalenhaut grünlichbraun, glanzlos. Innenseite bläulich-violett von mässiger Intensität, mit Spuren von weissen Strahlen, gegen die Wirbel zu weisslich. Zähne rechts zwei, gut ausgebildet, der hintere stärker, links der vordere deutlich ausgebildet, aber öfters abgebrochen, der hintere sehr klein. Mantelbucht nach vorn nicht oder kaum über die Wirbel hinausragend. Länge 41—45, Höhe  $19\frac{1}{2}$ — $21\frac{1}{2}$ , Queerdurchmesser 11— $13\frac{1}{2}$ , Wirbel in  $\frac{3}{7}$ — $\frac{5}{11}$  der Länge, ein sehr grosses Exemplar von Java 79 Mill. lang, 36 hoch, 21 im Queerdurchmesser, Wirbel in  $\frac{4}{9}$  der Länge.

Java, in der Dunkerschen Sammlung. Amboina und Adonara, v. Martens. Kei-inseln, Beccari. Auch in Siam von mir auf dem Markte gekauft. Philippinen, Cuming.

Dieses scheint mir nach der kurzen Beschreibung und nach der Abbildung die Muschel zu sein, aus welcher zu Rumph's Zeiten — ob jetzt noch, weiss ich nicht — auf den Molukken eine delikate Brühe, Bokassan genannt, bereitet wurde; auf *Psammotellina serotina*, welche ich auch auf Amboina käuflich erhielt, passt weniger die Beschreibung der Färbung, „schwärzlich oder dunkelblau, mit wenigen blassweissen oder dunkeln Strahlen an den Ecken“ und der längliche Umriss der Figur. Der Name, „gari“ bezieht sich auf eine Vergleichung des Bokassan mit dem alt-römischen „garum“, es ist nicht der einheimische Name. Linne hat den Namen von Rumph entlehnt, aber auf eine andere Art angewandt; Schumacher hat Gari sogar als Gattungsnamen für die Psammobien angewandt, da es doch Genitiv-form ist; wahrscheinlich meinte er, es sei die einheimische Benennung, für welche aber Rumph selbst „blastor“ und „blastol“ angibt.

Ob Lamarck wirklich diese Art meinte, ist noch etwas zweifelhaft, da er jederseits nur einen Zahn angibt, oder gar einerseits einen, andererseits keinen. Sein Exemplar war 50 Mill. lang und stammt aus Neu-Holland.

### 3. *Psammotaea elongata* Lam.

*Psammobia elongata* Lamarck an. s. vert. ed. 1, V nro 7; ed. 2 VI, p. 176. Sow. genera of shells pl. 214 fig. 2, = Reeve conch. syst. I, pl. 53, fig. 2. Hanley rec. bivalves pl. 11, fig. 46. Philippi abbild. III, Taf. 2, Fig. 2. Delessert recueil pl. 5, fig. 4.

*Capsella elongata* Reeve fig. 4.

Ähnlich der violacea, aber hinten nicht so anschwellend, verhältnissmässig etwas länger, blass mit ziemlich zahlreichen violetten Strahlen. Länge 37, Höhe 17, Queerdurchmesser 12 Mill. Wirbel in  $\frac{1}{2}$  der Länge (Exempl. von Flores). Ein grösseres unbekannter Herkunft 57. 27. 16.  $\frac{2}{5}$ .

Flores, in Dunker's Sammlung. Aru-inseln, Beccari. Nach Lamarck im Rothen Meer. (Ob Verwechslung mit *Psammotellina rosea* Gmel.?).

### 4. *Psammotaea solida* Reeve.

*Capsella solida* Reeve fig. 5.

Verhältnissmässig höher, kürzer und weniger gewölbt, aussen weisslich mit violettblauen Strahlen und namentlich einem breiten violett-blauen Flecken gerade hinter der Mitte der Schale. Mantelbucht weiter nach vorn sich erstreckend als die Wirbel. Länge bis 54 Mill., Höhe 30. Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge.

Malakka, Cuming.

5. *Psammotaea tenuis* Reeve.

*Capsella tenuis* Reeve fig. 14.

Vorn langgestreckt, zungenförmig, hinten etwas höher, violett gestrahlt. Länge  $36\frac{1}{2}$ , Höhe 17, Queerdurchmesser  $11\frac{1}{2}$ , Wirbel in  $\frac{4}{9}$  der Länge.

Flores, Dunker'sche Sammlung.

**Psammobia** Lam.

Stärcker zusammengedrückt, meist mit zwei mehr oder weniger abgestumpften Ecken am hintern Ende. Zähne links 1, rechts 2, meist etwas zweilappig.

Mantelbucht fast ganz an die Mantelline angelegt, nur am vordern Ende kurz aufgebogen (hemisynapt).

4) Schale mit gleichmässiger Oberfläche:

PSAMMOCOLA Blainv.

a) Glatt.

1. *Psammobia occidens* Gm.

*Sol. occidens* Chemnitz Conch. Cab. VI, 1782, S. 74, Taf. 7, Fig.

61. — *Solen occidens* Gmelin Linne syst. nat. ed. XIII, p. 3228.

*Sanguinolaria occidens* Lam. h. n. an. s. vert. ed. 1. V nro 1; ed.

2 VI, p. 167. Encycl. meth., Vers pl. 226, fig. 2. Hanley rec. bivalves p. 55. Chenu illustr. conchyl. pl. 1, fig. 4.

*Soletellina occidens* Deshayes Dict. class.; XV, p. 489; Desmoulins Act. Soc. Linn. de Bordeaux V, 1832, p. 162.

*Psammobia occidens* Chenu illustr. conch. pl. 1, fig. 4; manuel de conch. II, p. 64, fig. 260. Reeve conch. icon. X, fig. 11.

De grösste Art des Archipels, bis 101 Mill. lang, 60 hoch, 27 im Queerdurchmesser, Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge.

Blass röthlich, mit weissen Strahlen und weissen Flecken. Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge.

Java, Oberst Winter in Dunker's Sammlung. Ceylon oder Nikobaren, Chemnitz. Ceylon, Reeve und in einer von Graf zu Eulenburg 1860 dort gekauften Sammlung.

Ps. nivosa Desh., Reeve fig. 21, von den Philippinen, scheint kaum davon verschieden.

## 2. *Psammobia grata* Desh.

Deshayes in Proc. Zool. Soc. 1854, p. 318. Reeve X, fig. 10.

Oval, ähnlich Ps. vespertina aus dem Mittelmeer, vorn und hinten abgerundet, weisslich mit fleckig-violetten, öfters weiss-getüpfelten Strahlen. 48 Mill. lang, 28 breit, Wirbel ein wenig vor der Mitte der Länge.

Amboina, Cuming's Sammlung.

Sollte diese Art vielleicht Solen castrensis Spengler, Chemnitz Conch. Cab. XI, S. 200 Fig. 1935, 1936 sein, welche übrigens aus Guinea angegeben ist; was Deshayes und Reeve Ps. castrensis nennen, Reeve fig. 32, ist weit schmaler und hinten stärker eckig, als die Originalfigur bei Chemnitz.

## 3. *Psammobia eburnea* Reeve.

Reeve conch. icon. X, fig. 40.

Klein, einfarbig weiss, mit einer deutlichen hinteren Kante, welche fast parallel dem hintern Rückenrande verläuft, 30 Mill. lang, 16 hoch. Wirbel hinter der Mitte der Länge, etwa in  $\frac{3}{5}$  derselben.

Malacca, Cuming.

## 4. *Psammobia tristis* Desh.

Deshayes Proc. Zool. Soc. 1854, p. 318. Reeve X, fig. 13.

Breit oval, in der Form ähnlich der striatella, schwach concentrisch gestreift, weisslichgrau, innen blassviolett, Hinterrand fast senkrecht abgeschnitten, 48 Mill. lang, 29 breit, Wirbel in der Mitte der Länge.

Amboina, Cuming's Sammlung.

Ps. vespertinoides Lesson Voy. Coquille, zool. II 1. p. 426, 1830, etwas gewölbt, goldroth, wie gefirnisst, Wirbel und Innenseite violett, 49 mill lang, 27 hoch, 16 im Queerdurchmesser, von Buru, leider nicht abgebildet, vielleicht eher zu Psammotaea gehörig.

## b) Mit schwacher Radialskulptur.

5. *Psammobia Denikei* n. Taf. X, fig. 25.

Länglich, glänzend gelblichweiss mit blassröthlichen Flecken und an der Innenseite mit zwei vom Wirbel divergirenden gelbrothen Strahlen, welche an der Aussenseite durchscheinen; vorderes und mittleres Feld mit unregelmässigen, zum Theil ziemlich starken Wachsthumslinien, hinteres Feld mit starken concentrischen Runzeln, die Zwischenräume schwach radialgestreift; an der linken Schale diese Radialstreifung deutlicher, die Runzeln durchsetzend. Vorderes Ende abgerundet, hinteres etwas abgestutzt; Wirbel in der Mitte der Länge der Schale. Mantelbucht dicht anliegend.

Länge 22 Mill., Höhe  $10\frac{1}{2}$  Queerdurchmesser 5.

Makassar, von Denicke gesammelt, aus der Sammlung des verstorbenen Hafenkapitäns Fokkes in Hamburg erhalten.

Trotz der anliegenden Mantelbucht dem ganzen Habitus nach nicht zu *Soletellina* zu bringen.

## c) Mit regelmässig concentrischer stärkerer Skulptur.

6. *Psammobia insignis* Desh.

Deshayes Proc. Zool. Soc. 1854 p. 322. Reeve X, fig. 15. Chenu manuel II, p. 64, fig. 257.

Mit concentrischen d. h. den Anwachsstreifen und dem Rande entsprechenden Rippenstreifen, einzelne doch auch etwas schief. Im hintern Felde sind dieselben stärker, einige werden knotig, andere fallen aus. Am hintern Ende drei Kiele, wovon der unterste am weitesten vorspringt, und vor diesem eine kleine Einbiegung des Unterendes. Röthlichgelb mit unterbrochenen violetten Strahlen, welche theilweise concentrische Bänder bilden, 63—66 mM. lang, 30—31 hoch,  $16\frac{1}{2}$  im Queerdurchmesser. Wirbel in der Mitte der Länge.

Molukken, Cuming bei Reeve, ohne Fundortsangabe bei Deshayes.

Nahe verwandt mit der philippinischen *Ps. elegans* Desh., Reeve fig. 35 und der ostafrikanischen *Ps. bicarinata* Desh., Reeve fig. 28 und 30, von Zanzibar, welche selbst wieder sehr untereinander übereinstimmen, aber durch ein schärfer zugespitztes Hinterende sich von *Ps. insignis* unterscheiden lassen, indem bei ihnen nicht der unterste, sondern der mittlere Kiel des hintern Endes am weitesten vorspringt.



7. *Psammobia radiata* Dkr.

Dunker in Philippi Abbild. neuer Conchylien I S. 194. Taf. 2, Fig. 5.  
? *Psammobia amethystea* Reeve conch. icon. X, fig. 19.

Concentrisch gefurcht, blass-violett mit hellbraunen Strahlen, Hinterrand eckig; 43 Mill. lang, 21 hoch 42—50 Mill. lang, 19—23 hoch,  $9\frac{1}{2}$ —10 im Querdurchmesser, Wirbel in  $\frac{1}{2}$  der Länge.

Java und Amboina, Dunker bei Philippi? Ceylon, Layard bei Reeve.

Ist mir im malayischen Archipel nicht vorgekommen.

## D) HETEROGLYPTA Marts. 1880.

Skulptur des mittlern (und meist auch vordern) Drittels der Schale von derjenigen der hintern auffällig verschieden, jene gedrängte, durch scharfe enge Furchen getrennte, den Anwachsstreifen und dem Rand nicht genau entsprechende Leisten bildend (Gari Schumacher, P. Fischer).

a) Hinteres Feld ziemlich glatt, nur concentrisch gestreift.

8. *Psammobia caerulescens* Lam.

Lamarck an. s. vert. ed. IV, 1818, nro. 6; ed. 2 VI, p. 174. Encycl. meth. Vers pl. 227, fig. 5. Sowerby genera of shells part 35 pl. 214, fig. 3. = Reeve conch. syst. I. pl. 53, fig. 3. Hanley rec. bivalv. p. 57.

*Tellina amethystea* z. Theil Chemnitz Conch. Cab. VI, S. 102. Taf. 10, Fig. 93.

*Psammobia tripartita* Deshayes Proc. Zool. Soc. 1854, p. 321. Reeve conch. icon. fig. 20.

Die Leisten im vordern Theil breiter und dem Rand parallel, im mittlern Theil durch Gabelung nach hinten oder Einschiebung neuer beinahe an Zahl verdoppelt, nicht mehr ganz dem Rande parallel, nach hinten schon ein Stück vor der stumpfen Anschwellung, welche von den Wirbeln zum hintern untern Ende herabläuft, verschwindend. Hinteres Feld glatt. Hinterrand schief, mit einer stumpferen obern und einer entschiedeneren untern Ecke. An der linken Schale ist die Sculptur des hintern Feldes fast ganz verwischt, an der rechten Schale dagegen deutlich. Blass violett mit blassbraunen Strahlen und

stellenweise kleinen weissen Flecken, Innenseite röthlich violett. Zähne rechts zwei, der vordere stärker, der hintere zuweilen ausgebrochen; links ein mittlerer zweispaltiger, zuweilen Spuren eines vordern und hintern sehr kleinen und schiefen. Länge 60 Mill., Höhe 28, Queerdurchmesser 11. Wirbel in  $\frac{9}{20}$  der Länge.

Java und Flores in Dunker's Sammlung, jetzt im Museum für Naturkunde in Berlin. Nikobaren, Chemnitz. Cebu, Philippinen, Cuming.

Lamarck citirt zwar sowohl Chemnitz fig. 92 als fig. 93 zu seiner *caerulescens*, aber die Worte „*rugis transversis furcatis anastomosantibus*“ entscheiden für die vorliegende Art.

Die Richtung der Leisten im mittlern Theil ist im Allgemeinen noch den Anwachslineen parallel, aber doch an einzelnen etwas schief, so dass einzelne am Rand oder den Wachstumsabsätzen auslaufen; bei einzelnen Exemplaren mehr als bei andern.

Anmerkung. Der Name Gari ist für eine Gattung oder Untergattung unannehmbar, da es der Genitiv von *Garum* (leckere Brühe), ist; Schumacher, *essai d'un syst. conchyl.* 1817 p. 131 erwähnt in seiner Diagnose gar nicht der eigenthümlichen Skulptur und citirt Chemnitz fig. 92 und 93 für sein „*Gari vulgaris*“, indem er gari vermuthlich als Malayischen Namen der Muschel betrachtet. Ich habe 1880 den Namen *Heteroglypta* für diese *Psammobiën* mit ungleichmässiger Figur vorgeschlagen, Möbius Beiträge z. Meeresfauna von Mauritius S. 331. P. Fischer will diesen Namen auf diejenigen mit runzligem Hinterfeld (*contraria*, *scabra*) beschränken und führt für die übrigen den Namen *Gari* wieder ein.

#### 9. *Psammobia truncata* L.

*Tellina truncata* Linne syst. nat. ed. XII p. 1118, ed. XIII (Gmelin) p. 3234. Hanley ipse Linn. conch. p. 40. E. Römer Programm d. höhern Realschule zu Cassel 1871 p. 13.

— *amethystea* Chemnitz. Conch. Cab. VI, 1782, S. 100, 101 zum Theil, Taf. 10 Fig. 92. — *Gari amethysteum* Mörch catal. coll. Yoldi 1853 p. 11.

*Psammobia bipartita* Philippi in Zeitschr. für Malakozool. 1848, S. 166.

— *pulchella* Lam. an. s. vert. ed. 1 V, nro 14; ed. 2 VI, p. 177, Hanley recent bivalv. 1842—56 p. 58.

— *coerulescens* (Lam.) Reeve fig. 60.

Im Ganzen der vorigen ähnlich, aber die Leisten im mittlern Theil

der Schale mehr nach hinten und unten herabsteigend, nicht zahlreicher als im vordern und in gleicher Stärke bis zu einer scharfgezogenen Kante fortgesetzt, welche von den Wirbeln nach dem hintern Theil des Unterrandes herabsteigt; an dieser Kante bilden sie einen deutlichen Winkel, werden plötzlich niedriger und laufen der hintersten Strecke des Unterrandes parallel bis zu einer leichten Anschwellung, welche ebenfalls von den Wirbeln nach der untern Ecke des Hinterrandes läuft und also der stumpfen Kante von *Ps. caeruleus* und von *Psammotaea* entspricht, hier biegen sie nochmals in einem Winkel um und verlaufen dem Hinterrande parallel nach oben. Hinterrand etwas schief abgestutzt, seine untere Ecke abgerundet rechtwinklig, die obere stumpfwinklig. Blassviolett, gegen die Wirbel zu lebhafter röthlich-violett, Wirbel weiss; Innenseite ziemlich hell violett. Rechts zwei ziemlich gleich starke Zähne, links ein mittlerer zweispaltiger und dahinter ein kleiner, sehr schiefer. Länge 45, Höhe 22, Queerdurchmesser 10 Mill. Wirbel in  $\frac{1}{2}$  der Länge. Nach Römer a. a. O. sogar bis 63 Mill. lang.

Java, Linne. Molukken, Chemnitz und Gust. Schneider. Amboina, gekauft, v. Martens. Manila, Largilliert bei Philippi. Ceylon, Reeve. In Ostafrika auf den Querimba-inseln zwischen Quiloa und Mossambique von Prof. Peters gesammelt.

Die auffallende kantenartige Linie im hintern Drittel der Schale, an welcher die absteigenden Rippen alle gleichmässig plötzlich abbrechen und sich in merklich niedrigere, dem Rand parallele fortsetzen, charakterisirt diese Art besonders und ist wohl von Linne mit den Worten *parte antica sutura distincta* gemeint; denn es sieht in der That so aus, als ob hier zwei ganz verschiedene Schalen aneinander gesetzt seien und zwar nicht einmal in derselben Ebene, das Hinterstück etwas tiefer liegend. (Linne nannte bekanntlich bei den Muscheln hinten, was nach der Lage des Mundes vorn ist).

#### 10. *Psammobia striatella* Phil.

*Psammobia striatella* Philippi in Zeitschr. f. Malakozool. 1849 S. 166.

— Lessoni (Blainv., Desh.) Reeve fig. 8.

Etwas kürzer und rundlicher als die vorige. Leisten des vordern und mittlern Theils in gleicher Anzahl und schief herabsteigend, die Anwachslienien schneidend, aber gleichmässig bis zu der Anschwellung fortgesetzt, welche von den Wirbeln zum untern Ende des Hinter-

randes läuft. Hinteres Feld der Schale (hinter dieser Anschwellung) etwas ausgehöhlt, mit schwacher und unregelmässiger, dem Hinterrand paralleler Streifung, fast glatt. Hinterrand nahezu senkrecht oder ein wenig schief, am obern und untern Ende fast gleichmässig abgerundet. Aussen nahe den Wirbeln lebhaft röthlich violett, dann durch ein sehr blasses Violett gegen den Rand zu in Isabellgelb übergehend, zuweilen haarfeine dunkelgraue, kürzere oder längere Farbenstriche, von oben nach unten verlaufend, unregelmässig vertheilt, einzelne sehr spitze Winkel mit einander bildend, an einzelnen Stellen auch mehrere zu einem grauen Flecken zusammenfliessend. Innenseite gleichmässig hell violett. Rechts zwei zweispaltige, ziemlich gleiche Zähne, links ein mittlerer zweispaltiger und ein hinterer sehr kleiner und schiefer.

Das grösste Stück des Berliner Museums (aus der Pätelschen Sammlung angeblich von Manila) 45 Mill. lang,  $25\frac{1}{2}$  hoch, 13 im Queerdurchmesser. Ein Stück von Amboina beziehungsweise 38, 20 und 10.

Amboina, gekauft, v. Martens. Molukken, Gust. Schneider (als pulchella). Samar, Philippinen, Cuming.

#### 11. *Psammobia Reevei* n.

*Psammobia pulchella* (Lamarck) Reeve conch. icon. X, fig. 23.

Etwas mehr gestreckt, annähernd oder völlig doppelt so lang als hoch; Wirbel in halber Länge der Schale; hintere obere Ecke am Ende des fast horizontalen Rückenrandes sehr deutlich und von da der Hinterrand sehr stark abfallend, etwa in einem Winkel von  $100^\circ$ . Unterrand schwach gebogen, in der Mitte fast geradlinig. Sculptur schwach, am Vorderrand noch concentrisch, aber bald beginnen tiefer eingeschnittene Linien, welche etwas nach hinten und unten herabsteigen und die Wachstumsabsätze in sehr spitzem Winkel kreuzen; dieselben hören eine kurze Strecke vor der Anschwellung auf, welche von den Wirbeln nach vorn und unten zum untem Ende des Hinterrandes zieht; das hintere Drittel der Schale mit schwachen concentrischen Streifen. Färbung blass, bläulich oder weisslich, mit blassbraunen oder röthlichen Strahlen; wenn diese breit werden, kann man auch sagen, blass röthlichbraun mit weissen Strahlen. Innenseite blass gelblich. Mantelbucht nach vorn bis zur halben Länge reichend. Rechts zwei Zähnchen, das vordere spitz, das hintere etwas stärker, zweigetheilt; links eines, stumpf viereckig. Länge 32—43, Höhe  $15\frac{1}{2}$ —21, Queerdurchmesser 8—9 Mill.

Flores, in der Dunkerschen Sammlung. Manila, Philippinen, Cuming.

Lamarcks *Ps. pulchella* kann diese Art nicht sein, da derselbe von ihr sagt: „un angle en ligne oblique sépare les stries transverses de celles du côté antérieur“ (postérieur nach jetziger Terminologie), während bei der vorliegenden die schiefen Streifen des Mittelfeldes nach hinten einfach auslaufen, ohne dass ihr Ende durch eine bestimmt gezogene scharfe Linie markirt würde; wohl aber ist das bei *Ps. truncata* L. der Fall und ich beziehe daher Lamarck's *pulchella* mit Hanley auf diese schon früheren Conchyliologen bekannte, aber von ihm sonst nicht erwähnte Art; auch seine Farbenangabe passt besser auf *truncata*.

b) Hinterfeld mit stärkern, dem Rand parallelen Runzeln.

12. *Psammobia scabra* Chemn.

? *Tellina gari* Linne syst. nat. ed. X, p. 674 E. Römer Programm d. höheren Bürgerschule zu Cassel 1871, S. 6.

*Tellina scabra* Chemnitz Conch. Cab. VI, 1782, S. 102, Taf. 10, Fig. 94.

*Psammobia maculosa* Lamarck hist. nat. d. an. s. vert. ed. 1 V, 1818, nro 5; ed. 2 VI, p. 174. Encycl. méthod. Vers pl. 228, fig.

2. Chenu illustr. conch. pl. 1b, fig. 3, 4. Hanley rec. bivalves p. 57, pl. 11, fig. 28. Cuvier regn. an. ed. illustrée pl. 113, fig. 3.

— *corrugata* Deshayes Proc. Zool. Soc. 1854, p. 324. Reeve X, fig. 9.

— *ornata* „ „ „ „ „ p. 323. „ „ fig. 26.

— *marmorea* „ „ „ „ „ p. 324. „ „ fig. 27.

Schiefe Leisten etwas unregelmässig wellig, gleich breit oder etwas schmaler als die Zwischenräume, im mittlern Theil deutlich herabsteigend, die Anwachslinien schneidend, nicht zahlreicher als im vordern, nach hinten gleichmässig bis zu der Anschwellung fortgesetzt, welche von den Wirbeln zum untere Ende des Hinterrandes geht, auf dieser in einem stumpfen Winkel oder kurzen Bogen sich nach oben umwendend und durch das ganze Hinterfeld als starke Runzeln aber öfters in geringerer Zahl verlaufend, indem einzelne, stellenweise jeder zweite, an der Umbiegungsstelle ausfallen; in der Mitte des Hinterfeldes öfters eine zweite vom Wirbel herablaufende Anschwellung, Hinterrand abgerundet oder von oben bis zum Ende dieser zweiten Anschwellung schief nach hinten, von da bis zum

untern Ende fast senkrecht und daher drei abgestumpfte Ecken bildend, eine obere, mitlere und untere, die obere ist die stärkste. Aussen isabellgelb oder blassviolett mit mehr oder weniger unregelmässigen, trüb braunen, zu Flecken unterbrochenen Strahlen. Wirbelgegend öfters mehr röthlich, Wirbel weisslich; Innenseite lebhafter orangegelblich, die braunen Flecken violett durchscheinend. Zähne rechts zwei ziemlich gleich starke, links einer, alle schwach zweispaltig. Länge 40—42—48, Höhe  $21\frac{1}{2}$ — $22\frac{1}{2}$ —25, Queerdurchmesser 11—12 Mill., zuweilen auch grösser (50 Mill. bei Chenu) Wirbel in  $\frac{3}{7}$  oder  $\frac{6}{13}$  der Länge.

Ostindische Gewässer, sehr rar, Chemnitz. Molukken und Neu-Holland, Reeve marmorea. Ticao und Cebu, Philippinen, Reeve corrugata und ornata.

In der Dunkerschen Sammlung ein Exemplar, bei welchem nahe dem Unterrand die schiefen Streifen spärlicher werden und dafür zahlreichere, dem Rand parallele auftreten, während normal nur 2—3 stärkere Wachstumsabsätze nahe dem Rand und ihm parallel verlaufen. Der Unterschied der Sculptur zwischen dem mittlern und hintern Theil ist überhaupt bei jungen Exemplaren am stärksten; bei den ältern werden gegen den Rand zu die schiefen Streifen immer weniger schief, mehr dem Rand parallel und die meisten gehen auf das hintere Feld über, nicht nur je die zweite, wie im obern Theil der Schale.

Diese Art hat Linne vermuthlich unter seiner *Tellina gari* gemeint, nach der Beschreibung im Museum Lud. Ulricae conchyl. p. 34, 35. Die von ihm citirte Figur bei Argenville ed. 1, pl. 25, ed. 2, pl. 22, fig. I scheint dagegen die europäische *Ps. vespertina* zu sein.

Deshayes hat theils nach der Färbung, theils nach Einzelheiten der Sculptur mehrere Arten unterschieden, seine marmorea hat nach Reeve's Abbildung die zweite Anschwellung im Hinterfeld deutlicher ausgeprägt und am Rand als kleine Ecke vortretend, wie auch Chenu's Figur 4; bei ornata (und rubicunda) erwähnt er, dass auf der linken Schale die schiefen Leisten nicht auf die Runzeln des Hinterfelds übergehen, sondern ein glatter Raum dazwischen bleibt, während bei marmorea sie (beiderseits) unterbrochen, bei corrugata (beiderseits) continuirlich seien. Ich finde an den Exemplaren im Berliner Museum, worunter mehrere unter den Deshayes'schen Namen aus Paetel's Sammlung, überhaupt die rechte Schale öfters etwas stärker gewölbt als die linke und am Hinterfeld auf der rechten die Runzeln etwas

stärker und breiter, auf der linken schmaler, daher scheinbar weniger und schwächer, aber nie eine völlige Lücke zwischen den schiefen Streifen und den Runzeln. Diese Ungleichheit beider Schalen erinnert schon an diejenige bei *Tellina*, mit welcher Gattung *Psammobia*, trotz des Unterschiedes in der Zahl der Kiemen, doch offenbar verwandt ist. Auch *Ps. rubicunda* Desh. p. 324, Reeve fig. 34, von den Philippinen, steht unserer Art noch nahe, scheint aber durch die feineren zahlreicheren schiefen Streifen und die rothe Färbung mit weissen Flecken sich unterscheiden zu lassen.

13. *Psammobia virgata* Lam.

*Psammobia virgata* Lamarck an. s. vert. ed. 1 V, nro 1; ed. 2 VI, p. 171. — Chenu illustr. conch. pl. 1b, fig. 2.

— *costata* Hanley recent Bivalves p. 59, pl. 11, fig. 12, 1846—52.

? — *intermedia* Deshayes Proc. Zool. Soc. 1854, p. 319; Reeve conch. icon. fig. 25.

Auf den ersten Anblick den vorigen ähnlich, aber keine regelmässig schief herabsteigenden Streifen, sondern nur concentrische (dem Rand parallele) grobe Runzeln, welche aber doch im mittlern Feld stellenweise etwas unregelmässig werden, ein wenig schief und in einander einmündend und beim Übergang auf das Hinterfeld sich steil aufbiegend, sodass sie dadurch sich immer noch an *Heteroglypta* anschliessen lässt, ähnlich wie *Ps. caerulescens*. Blass gelblich mit mehr oder weniger ausgesprochenen schmalen, ziemlich hellen, röthlich-violetten Strahlen. Untere Ecke des Hinterrandes spitz vorgezogen, obere sehr stumpf. Länge 47, Höhe 26, Queerdurchmesser 12 Mill. Wirbel ein wenig vor der Hälfte der Länge.

Indischer Ocean, Lamarck. Australien, Hanley. Dürfte also wohl auch in Niederländisch Indien noch zu finden sein. *P. intermedia* Desh. und Reeve, angeblich von Portugal, kann ich nicht bestimmt davon unterscheiden.

14. *Psammobia praestans* Desh.

Deshayes Proc. Zool. Soc. 1854, p. 322. Reeve fig. 16.

Mittlerer Theil mit sehr schief herablaufenden Furchen, welche aber verschwinden, ehe sie den Unterrand erreichen. Hinterer Theil mit starken concentrischen, dem Rand parallelen, runzelförmigen Leisten, ähnlich wie bei *Ps. scabra*. Gesammtfärbung röthlich violett, mit

einigen schmalen, bräunlich-röthlichen Strahlen und zerstreuten weissen Flecken; Innenseite blassviolett. Allgemeine Form höher und rundlicher als bei *Ps. coerulescens*. Hinterende weniger eckig. 47 Mill. lang, 23 hoch, 13 im Queerdurchmesser. Wirbel nur wenig vor der Hälfte der Länge.

Molukken, Cuming.

c) Hinterfeld mit viel gröberer, herabsteigender Sculptur.

15. *Psammobia squamosa* Lam.

Lamarck an. s. vert. ed. 1, V, 1818, Nro. 9; ed. 2, VI, p. 176.

Woodward manual p. 22, fig. 10. Hanley, rec. bivalv. pp. 57, pl. 11, fig. 47. Reeve conch. ic. X, fig. 50. Delessert recueil pl. 5, fi. 6 = Chenu illustr. pl. 1, fig. 6. Cuvier regn. anim. ed. illustrée, pl. 113, fig. 3.

Länger gestreckt, mit stark convexem Unterrand. Im vordern und mittlern Theil schiefe, gedrängte Streifen, nach hinten und unten herabsteigend und die Anwachslien schneidend; im hintern Theil gehen dieselben rasch in doppelt oder dreifach so starke, etwas knotige Rippen mit breiteren Zwischenräumen über, von denen 2—4 noch in den hinteren Theil des Unterrandes, die folgenden in den Hinterrand auslaufen und diesen gekerbt erscheinen lassen. Es ist ein wirklicher Übergang einer schwächeren Leiste in eine starke Rippe; die starken Rippen lassen sich nach vorn und oben in die schwächern Leisten verfolgen, und kommen als solche nicht von den Wirbeln selbst, sondern von vorn und unterhalb derselben herab. Hinterrand schief nach unten und hinten gerichtet, sein oberes und unteres Ende aber einfarbig dunkelviolett oder blass isabellgelb. Zähne rechts ein gut ausgebildeter und öfters ein kleiner vorderer, links nur einer, gut ausgebildet. Länge bis 32, Höhe 14, Queerdurchmesser 7 Mill. Wirbel in  $\frac{3}{7}$ — $\frac{4}{9}$  der Länge.

Man kann verschiedene Farbenvarietäten unterscheiden:

- 1) dunkelviolett, Delessert und Chenu am a. O.
- 2) weisslich, Wirbelgegend röthlich-violett bis scharlachroth, Reeve fig. 42b.
- 3) blassgelblich, ziemlich einfarbig, Reeve fig. 42a.

Batavia, in Dunker's Sammlung. Borneo, Woodward. Auch an den Küsten von China und Japan.



Nicht wesentlich davon verschieden scheinen:

- Ps. denticulata Adams und Reeve Zool. Voy. Samarang p. 80, pl. 24, fig. 2. Reeve fig. 49 Chinesisches Meer.  
 — rugulosa Adams und Reeve Zool. Voy. Samarang p. 81, pl. 24, fig. 4. Reeve fig. 51. Chinesisches Meer.  
 — palmula Reeve fig. 41. Sydney.  
 — Caledonica Crosse, Neu-Caledonien, Pätel'sche Sammlung, Farbenvarietät 2.

#### **Asaphis** Modeer.

Asaphis Modeer 1793. Capsa Bruguière 1797 z. Theil, Lamarck système d. an. s. vert. 1801, Capsula Hwass bei Schumacher 1817, Isarcha Gistel 1848.

Psammobiiden mit radial gerunzelter, etwas körniger und mehr oder weniger dichotomer Sculptur. Mantelbucht schief aufsteigend, von der Mantellinie sich ablösend.

Über die Weichtheile vgl. P. Fischer in Journ. de Conchyl. VI, 1857, p. 329 pl. 13, fig. 4.

#### 1. *Asaphis rugosa* Lam.

Chama diffusior etc. Lister. hist. conch. pl. 425, fig. 273, 1687.

Tellina arenosa Rumph amb. rar. S. 145 (deutsch S. 136) Taf. 45, Fig. C.

— inaequilatera Gualtieri ind. test. tab. 86, fig. B, C.

Venus versicolor Gmelin p. 3281.

Venus deflorata z. Theil Linne Syst. nat. ed. X, p. 687; V. defl. var.  $\beta$  Gmelin ed. XIII, p. 3274.

Tellina anomala Born test. mus. Caes. p. 31. Chemnitz Conch. Cab. VI, S. 92 und 94, fig. 83.

Capsa rugoso Lamarck Syst. d. an. s. vert. 1801. Reeve conch. icon. fig. 1b, 1d.

Sanguinolaria rugosa Lamarck, Hist. nat. d. an s. vert. V, 1818; ed. 2 VI, p. 170. Chenu illustr. conch. pl. 1, fig. 1—3, pl. 2, fig. 3—5. Cuvier regn. an., ed. illustrée pl. 113, fig. 1.

Psammobia rugosa Sowerby genera of shells pl. 214, fig. 1 = Reeve conch. syst. I, pl. 53, fig. 1. Hanley rec. bivalv. p. 56 z. Theil.

Asaphis deflorata Mörch cat. Yoldi II, 1853, p. 9; Journ. d. Conchyl. VII, 1858, p. 138.

*Capsa deflorata* Reeve conchol. icon. vol. X, fig. 1b.

*Asaphis rugosa* Chenu Manuel d. Conchyl. II, p. 63, fig. 256.

var. *dichotoma*.

*Sanguinolaria dichotoma* Anton Verzeichn Conchyl. 1839, p. 4 (citirt Rumph's Abbildung).

*Asaphis dichotoma* Mörch. cat. Yoldi II, p. 9; Journ. d. Conchyl. VII, p. 138.

*Sanguinolaria arenosa* Römer krit. Untersuchung d. Arten Venus 1851.

*Capsa deflorata* Reeve conch. icon. X, fig. 1a—1e.

Aussenseite weisslich oder blassockergelb oder ziemlich blassviolett mit concentrischen violetten Bändern oder blassziegelroth mit stärker rothen Wirbeln, ziemlich glanzlos, am hintern Rand fast immer dunkelviolett; innen glänzend, der violette Fleck nimmt den hinteren Theil jenseits der Mantellinie und auch noch die ganze Mantelbucht ein; selten fehlt derselbe.

Die var. *dichotoma* unterscheidet sich nur dadurch, dass die Rippen verhältnissmässig stärker und unter sich ungleich sind, ziemlich viele derselben nach unten sich in zwei gabeln, geht aber ohne bestimmte Abgrenzung in die typische Form über.

Obwohl Rumph sie *arenosa* nennt, sagt er doch, dass sie in hartem Schlammgrund lebe, eine Hand breit bis einen Schuh tief eingegraben, den Hinterrand in die Höhe gerichtet. Dufo (Ann. sc. nat. 2, XIV, 1840, p. 220) fand sie auf den Seychellen und Amiranten auf Schlammgrund mit Meerpflanzen, einige Zoll tief eingegraben. Tenison-Woods dagegen nennt sie unter den Muscheln der Korallenriffe.

Weit verbreitet im indischen Ocean vom Rothen Meer (*violascens* Forskal) an bis Tahite. In Niederländisch-Indien fand ich sie bei Anjer auf Java, ferner auf Ternate, Batjan, Halmaheira, Banda-Nera, Kupang auf Timor und erhielt sie auf Buru; var. *dichotoma* auf Amboina und Adonara; Beccari fand letztere auch auf den Aru-Inseln; Böttger erwähnt sie von Padang auf Sumatra und Pulo Pandjang bei Java. Das grösste mir bekannte Stück, von den Philippinen durch F. Jagor für das Berliner Museum erhalten, ist 95 Mill. lang, 64 hoch und 42 im Durchmesser. Ebenso gross die Abbildung bei Gualtieri fig. C. Mittlere Grösse etwa 50 lang, 35 hoch, 23 dick.

Folgende Farbenvarietäten sind die häufigsten:

1) Weisslich, an den Wirbeln violett.

2) Weisslich mit violetten concentrischen Bändern: Gualtieri 86, C. Chemnitz fig. 79. Reeve fig. 1*d*.

3) Weisslich und violett gestrahlt, bald die eine, bald die andere Farbe vorherrschend: Lister fig. 273 Knorr II, 20,5. Chemnitz p. 81. Reeve 1*e*.

4) Blassröthlich, zuweilen auch nur weisslich, mit lebhaft rothen Wirbeln: Knorr V, 9,3. Chemnitz p. 83. Reeve 1*c*.

5) Gelblich, die Wirbel lebhafter gelblich, zuweilen orange: Chemnitz p. 82. Reeve 1*d*.

Dieselbe Gattung findet sich auch häufig in Westindien (Cuba, Haiti, Barbados u. s. w.). Schon Lister gibt Mauritius und Barbados als Fundort bei seiner Figur an, Chemnitz (S. 94) betont die grosse Ähnlichkeit seiner Figuren 79—82 aus Westindien mit 83 aus Ostindien, sie seien „weder in der Form noch Bauart und Bildung im geringsten verschieden“, nur sei an den ostindischen „nichts Violettes, weder innerlich noch äusserlich zu sehen“.

Lamarck gibt als Fundort „les mers des Indes et celles de l’Amerique“. Mörch, catal. Yoldi II, 1853, p. 9 und im Journ. de Conch. VII, 1858, p. 138 unterscheidet mehrere Arten mit verschiedenem Herkommen, nämlich:

A. *dichotoma* Anton, Chemnitz fig. 83, ostindisch.

— *deflorata* L. (*rugosa* Lam.), auch ostindisch, aber mit dem Citat Chemnitz fig. 82, welche nach Chemnitz eigener Angabe westindisch ist.

— *deflorata* var. *violascens* Forsk. (Venus) vom Rothen Meer.

— *coccinea* Martyn (*Cardium*) univ. conch. pl. 135 (ed. Chenu pl. 44, fig. 2) und Chemnitz fig. 79—81, westindisch.

Nach wiederholter Vergleichung einer grössern Anzahl von Exemplaren verschiedener Fundorte aus Westindien, kann ich keinen konstanten Unterschied zwischen ostindischen und westindischen in der Form oder Färbung finden; einzelne Unterschiede, ob hinten mehr langgezogen oder steiler abgestutzt, finden sich ebenso innerhalb der westindischen als innerhalb der ostindischen; violette Färbung aussen auch bei vielen ostindischen, z. B. solchen von Java, Ternate, Batjan und Banda, innen fehlt sie nur wenigen Stücken. Betreffs der Skulptur sind aber die westindischen meist mit zahlreicheren feineren und minder erhabenen Runzeln versehen, sodass sie mehr eben anzu fühlen sind, doch ist das auch kein scharfer Unterschied, grössere

Exemplare von Cuba sind so rauh wie philippinische und Exemplare von Tahite so glatt wie viele westindische.

Das Exemplar von *Venus deflorata* in Linné's Sammlung entspricht nach Hanley der Figur 79 bei Chemnitz und diese ist westindisch.

Entschiedene *dichotoma*, bei denen viele Rippen gegabelt sind, kenne ich nur aus dem indischen Meer, sie sind meist kleiner und aussen einfarbig gelblich, aber es findet sich eine Reihe unmerklicher Übergänge von ihnen zur gewöhnlichen Form.

#### SOLENIDEN.

Die Soleniden schliessen sich nahe an die Psammobien an und sind an der Schale eigentlich nur durch das stärkere Klaffen am vorderen und hintern Ende zu unterscheiden. Für die Weichtheile ist allerdings der gerade nach vorn gestreckte, cylindrische, am freien Ende sich erweiternde Fuss charakteristisch, womit sie sich mehr oder weniger senkrecht in weichen Grund einbohren. Diese Form des Fusses dürfte, nach der allgemeinen Schalengestalt zu schliessen, bei *Siliqua* und *Cultellus* modificirt, mehr seitlich zusammengedrückt sein und sich dadurch näher an *Psammobia* anschliessen. Wie bei diesen leben einzelne Formen der Soleniden auch in schwachsalzigem Wasser an Flussmündungen, andere wirklich im Meere auf Sandboden; die ersteren sind an der glanzlosen, stark ausgebildeten Schalenhaut, die letztern an der glatten glänzenden Aussenseite der Schale im Allgemeinen zu erkennen. Aber da genauere Beobachtungen über das Vorkommen der einzelnen grossentheils noch fehlen, werde ich hier wie bei den Psammobien alle aus dem Gebiet von Niederländisch-Indien (einschliesslich des englischen Theils von Borneo und von Singapore) mir bekannt gewordenen Arten kurz aufführen.

Bei der Bestimmung von Muscheln aus dieser Familie ist noch mehr als bei den Psammobien davor zu warnen, nach der Zahl der auf den ersten Anblick sichtbaren Schlosszähne zu urtheilen; dieselben brechen nämlich sehr leicht ab, da sie oft sehr dünn und stark vorstehend sind, und die Bruchstelle ist nur bei genauer Betrachtung zu erkennen.

#### *Solecurtus* (Blainv.) Desh.

*Solecurtus* Blainville 1824 in zu weitem Sinne; enger begränzt von Deshayes in Lamarck hist. nat. d. an. s. vert. VI 1835, Sowerby bei

Reeve, Clessin. — Psammosolen Risso 1856. — Macha Oken allgem. Naturgeschichte 1835 <sup>1)</sup>, Dunker.

Mantelbucht gross, soweit nach vorn als das Schloss reichend, abgerundet, ihr unterer Rand in der vorderen Hälfte sich von der Mantellinie ablösend und aufsteigend. Vorn und hinten kurz abgerundet. Schlosszähne jederseits zwei, aber einer oder beide sehr klein oder verkümmert (abgebrochen?). Weichtheile: Fuss sehr dick, keulenförmig, am Ende etwas zugespitzt; beide Athemröhren im grössern Theil ihrer Länge vereinigt, nur am Ende getrennt, die eine etwas länger.

#### 4) MACHA (Oken).

Mit eingeritzten schiefen Linien, von oben und hinten nach vorn und unten verlaufend, auf der Aussenfläche rosenroth oder weiss, die einfarbig braune Schalenhaut meist nur in der Nähe des Randes erhalten.

##### 1. *Solecurtus Philippinarum* Dkr.

Solen strigilatus var. Chenu illustr. conchyl. pl. 6 fig. 3.

Macha Philippinarum Dunker Proc. Zool. Soc. 1861 p. 424.

Solecurtus Philippinarum Reeve conch. ic. XX fig. 12. Clessin Solen in der neuen Ausgabe von Chemnitz S. 90. Taf. 21 Fig. 8.

Rosenroth mit 2 weissen Strahlen; ungefähr halb so hoch als lang. Eingeritzte Linien den untern Theil des Vorderrandes erreichend, nur die 2—5 vordersten kurz, viel früher aufhörend; dieselben im hintersten Theil der Schale mehr gerade nach unten oder etwas zackig verlaufend. Länge 52 Mill., Höhe 24—25, Queerdurchmesser 16, so nach den philippinischen Exemplaren in Dunker's Sammlung (in Dunker's Text 57 lang); dasjenige von Java nur 38 lang, 19 hoch und 11 im Durchmesser. Wirbel in  $\frac{3}{7}$  der Länge.

Java, Oberst Winter in Dunker's Sammlung. Manila, Dunker ebenda.

---

1) Anmerkung. Dieser Name ist wahrscheinlich von Solen macha Molina hist. nat. d. Chile 1786 entnommen und drückt wie Mytilus chorus und Venus thaca bei demselben Molina den landesüblichen Namen der betreffende Muschel aus; die Übertragung von der Chilenischen Art, einem eigentlichen Solen, auf vorstehende Gattung durch Oken ist willkürlich.

Sehr ähnlich dem europäischen *S. strigilatus* L., dieser nur etwas grösser, verhältnissmässig etwas länger gegen die Höhe, keine der eingeritzten Linien auch nur das untere Ende des Vorderrandes erreichend, 9—12 oder mehr schon in grösserer Entfernung davon aufhörend. Dass aber bei *S. strigilatus* am hintern Theil die eingeritzten Linien fehlen, wie Clessin S. 85 angibt und seine Figuren zeigen, finde ich wohl bei Exemplaren aus Venedig, welche mein Vater dort gesammelt hat, bestätigt und zwar in noch grösserer Ausdehnung, als bei Clessin's Abbildung; dagegen bei den Exemplaren, welche ich in Neapel auf der Strasse gekauft, sind solche bis zum Hinterende gut ausgebildet vorhanden und zwar wie bei *S. Philippinarum* hier fast senkrecht und etwas zackig. Die absolute Zahl dieser eingeritzten Linien ist nicht bestimmt für die Arten festzustellen, da sich eben hinten beim Weiterwachsen stets neue bilden und da die vordersten, ganz kurzen, dicht hinter den Wirbeln befindlichen bei Abreibung leicht verschwinden, von ihnen aber nur eine Stufenreihe zu den längeren, den Unterrand erreichenden ist. Auf die Länge von 1 Centimeter kommen bei beiden, *S. strigilatus* und *Philippinarum*, 5—6 Linien in der Mitte der Schale.

*S. strigilatus* lebt im Mittelmeer auf Schlammgrund an tieferen Stellen, nach Olivi und Poli, und gilt als sehr wohlschmeckend. Ähnlich mag es sich mit den indischen Arten verhalten.

## 2. *Solecuretus rhombus* Spengl.

*Solen strigilatus* var. Chemnitz Conch. Cab. VI, P. 62. Fig. 44.

— *rhombus* Spengler in Skrivter af Naturhist. Selskabet III 2, Kopenhagen 1794, S. 102.

*Solecuretus Pacificus* Pease mscr.

*Macha Quoyi* (Desh.) v. Martens und Langkavel Donum Bismarckianum S. 61, Taf. 4, Fig. 6.

*Macha Cumingiana* (Dunker) Catalog Mus. Godeffroy IV. 1869 p. 107. Catalog. Mus. Godeffroy, V. p. 165.

Höhe die Hälfte der Länge oder selbst ein wenig mehr; die eingeritzten Streifen sehr zahlreich und nahe beieinander, auch den unteren Theil des vordern Schalenstückes einnehmend und nur vorn und oben fehlend, die meisten gerade von oben und hinten nach vorn und unten verlaufend, nur die hintersten eingebuchtet mit der Concavität nach hinten. Hinterrand etwas weniger gerundet als der Vorderrand

und etwas höher. Unterrand sehr schwach concav. Glänzend weiss, mit blass gelber, nur nahe den Rändern erhaltener Schalenhaut. Länge bis 45 Mill., Höhe bis 25, Wirbel in etwas weniger als  $\frac{1}{3}$  ( $\frac{3}{7}$ — $\frac{4}{9}$ ) der Länge.

Molukken, von G. Schneider erhalten. Ostindien, Chemnitz. Nikobaren, Spengler. Viti-inseln, Mus. Godeffroy. Kingsmill-inseln, Pease.

Die oben angegebenen Maasse nach den Exemplaren von den Molukken; diejenigen von den polynesischen Inseln sind kleiner, 39—40 Mill. lang und ebenso das von Chemnitz abgebildete.

Unterscheidet sich durch die Höhe der ganzen Schale im Verhältniss zur Länge und durch die relative Höhe und sehr geringe Rundung des Hinterrandes sowohl von dem europäischen *S. candidus* Ren. als von dem südpacifischen *S. albus* Quoy und Gaimard Voy. Astrol. Moll. III, p. 453, pl. 83, fig. 11, (non Blainv. = *candidus* Ren.) = *S. Quoyi* Desh. Lam. an. s. vert. ed. 2 VI, p. 63, 1835, welche beide im ganzen und namentlich hinten niedriger, hinten auch mehr verlängert und abgerundet sind, Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge; zu diesem *S. albus* oder Quoyi gehört auch wohl als etwas grössere Form *S. albus* (Martyn), Reeve fig. 16, copirt bei Clessin Taf. 24, Fig. 3, aber nicht *Tellina alba* Martyn univ. conch. X, pl. 157 (ed. Chenu pl. 56 fig. 1), angeblich vom Cap, vielleicht nur *strigilatus* selbst. *S. Cumingianus* Dunk. ist mir nur durch die Originalbeschreibung in Proc. Zool. Soc. 1861 p. 425 bekannt, wornach ihre Höhe nicht die Hälfte der Länge erreicht (17 und 41 Mill.) und sie von Westindien, den Antillen, stammen soll; in Dunker's eigener Sammlung, jetzt im Besitz des Berliner Museums, ist ein Exemplar von den Viti-inseln mit diesem Namen bezeichnet, das verhältnissmässig höher ist und ohne Zweifel zu *S. rhombus* gehört; es ist rein weiss, wie dieser und auch in Dunker's Originaldiagnose heisst es: *testa alba*. Clessin hat dagegen eine rosenrothe Art mit zwei weissen Strahlen als *S. Cumingianus* beschrieben und abgebildet, Solenaceen S. 87 Taf. 21 Fig. 3, obgleich er Dunker's Originaldiagnose anführt.

*Solecortus oblongus* Dunker von Luzon, Reeve fig. 2, Clessin Taf. 22 Fig. 4. mit eingeritzten Linien und einer seichten, von den Wirbeln gerade nach dem Unterrand hinziehenden Mittelfurche, verknüpft die erste Unterabtheilung mit der folgenden.

B) Ohne eingeritzte schiefe Linien, dagegen mit einer seichten

ziemlich breiten Furche, welche an der Aussenseite vom Wirbel senkrecht gegen den Unterrand herabläuft und an der Innenseite sich als schwacher Vorsprung bemerklich macht. Meist einfarbig. Azor Leach.

3. *Solecurtus Scheepmakeri* Dkr.

Macha Scheepmakeri Dunker Zeitschr. Mal. 1852, p. 56; novitat. conchol. II, S. 121, Taf. 39, Fig. 10, 11.

Solecurtus Scheepmakeri Dunk. Reeve conch. icon. XIX, fig. 14.

Clessin Solenaceen S. 88, Taf. 10, Fig. 1.

Mit grünlich-brauner Schalenhaut und schwacher Andeutung von Farbenstrahlen. Furche bis zum Unterrand reichend. Hinten etwas niedriger als vorn. Wirbel in  $\frac{3}{8}$ — $\frac{2}{3}$  der Länge. Bis 88 Mill. lang, 38 hoch und 22 im Queerdurchmesser.

Molukken, G. Schneider. Insel Guimaras, Philippinen, Cuming.

S. abbreviatus, A. Gould, Reeve fig. 5 von Malakka, ist sehr ähnlich, aber viel kleiner, nur 32 Mill. lang und 16 hoch; Wirbel in  $\frac{3}{7}$  der Länge; vorn und hinten gleich hoch.

Die Gattung *Novaculina* Bens. mit kürzerer Mantelbucht, etwa bis zur halben Entfernung zwischen dem hinteren Muskeleindruck und dem Wirbel reichend, mit derber, sich leicht ablösender, grauer Schalenhaut, im Schlamm der Mündungen grösserer Ströme, des Ganges, Irawaddy und Yangtsekiang häufig, ist meines Wissens innerhalb Niederländisch-Indien noch nicht gefunden.

**Siliqua** Meg. 1811.

Leguminaria Schumacher 1817. Aulus Oken 1821 z. Th. und 1835,

Dunker, nicht Oken 1815. Solecurtoides Desmoulins 1832. Ma-

chaera A. Gould 1841, Clessin, Solenaceen in d. neuen Ausgabe

v. Martini u. Chemnitz 1888, Cultellus z. Theil, Reeve conch. icon.

Schale länglich, zusammengedrückt, vorn und hinten abgerundet; an der Innenseite eine starke, vom Schloss bis nahe zum Unterrand verlaufende Leiste, nahezu senkrecht, aber ein wenig schief nach vorn. Mantelbucht mässig, abgerundet. Rechts zwei, links ein kleiner Schlosszahn und dahinter eine starke Ligamentleiste. Weichtheile nach dem europäischen S. legumen L. zu schliessen: Fuss verkehrt konisch, am dickern Ende flach oder etwas vertieft, Athemröhren ziemlich kurz, getrennt.



Weichtheile einer andern Art dieser Gattung, *S. Nuttalli*, beschrieben und abgebildet von Middendorff, Sibirische Reise, II, p. 270, 271; Beitr. z. Malacolog. Rossica Taf. 21, Fig. 4, 5.

A) Violett mit weissen Strahlen, dünn und glänzend.

1. *Siliqua radiata* L.

*Chama tenuis violacea* Lister hist. conch. pl. 422, fig. 266, 1687.

*Tellina violacea* Rumph amb. rar. p. 147 (deutsch S. 139), Taf. 45, Fig. E.

*Solen radiatus* Linne syst. nat. ed. X, p. 675, ed. XIII, p. 3225.

Chemnitz conch. cab. VI, fig. 38, 39 = Clessin Taf. 5, Fig. 9, 10.

Desmoulins Act. Soc. Linn. V; 1632, p. 108. Encycl. meth. pl. 225, fig. 2. Hanley ips. Linn. conch. p. 30. Lamarek an. s. vert. ed. IV, nro. 19. Chenu illustr. conchyl. pl. 4, fig. 2.

*Tellina rosea* Martyn univ. conch. IV, pl. 157, ed. Chenu pl. 56, fig. 1a.

*Siliqua radiata* Megerle von Mühlfeld 1811 in Magaz. d. Gesellsch. nat. Freunde, Berlin V, S. 44.

*Leguminaria costata* Schumacher essai p. 126, Taf. 7, Fig. 1. 1817.

*Aulus radiatus* Oken allg. naturgeschichte 297. V. S.

*Solenocurtus radiatus* Swains. treat. malacolog. 1840, p. 366.

*Cultellus radiatus* Reeve conchol. icon. XIX, fig. 12.

*Machaera radiata*, Chenu manuel de conch. II, p. 23, fig. 102. Clessin a. a. O. S. 59, Taf. 3, Fig. 9, 10. Copie von Chemnitz.

Altbekannte Art mit 4 weissen Strahlen auf dunkel-violetttem Grund. Oberrand fast gerade, Unterrand etwas aufgebogen. Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge. Das grösste Exemplar, das ich bisher gesehen, in der Dunkerschen Sammlung 113 Mill. lang, 38 hoch,  $17\frac{1}{2}$  im Durchmesser, das kleinste 31 Mill. lang, 14 hoch, Wirbel in  $\frac{2}{7}$  der Länge, also weiter vorn und Höhe relativ grösser.

Sumatra, Jay. Java, Winter in Dunker's Sammlung. Palabuan im südwestlichen Java und Makassar auf Celebes, v. Martens. In feinem Sand senkrecht eingegraben, am Rande der niedrigste Ebbe, Schlüsselloch-ähnliche Löcher bildend, Ostseite des Passes von Amboina im Sand, Rumph. Flores Dunker. Ferner Tranquebar (Tarangawari an der Ostküste von Vorderindien), Chemnitz. Golf v. Manaar, Thurston. Siam, Morelet. Alle Exemplare, welche ich gesehen, haben 4 weisse Strahlen in nahezu gleicher Stellung, doch verschiedenem Grad der Ausbildung, der zweite stets der auffälligste und oft

der breiteste, der vierte öfters fast verschwunden; Chemnitz bildet aber auch ein kleineres Exemplar mit nur 2 Strahlen ab, der vordere dem vordersten der vier entsprechend, der hintere zwischen den zweiten und dritten fallend (Chemn. VI, fig. 40 = Clessin Taf. 5, Fig. 11).

Reeve's kleinere Figur von *Cultellus japonicus*, fig. 15a, scheint mir eine junge *S. radiata* zu sein.

Neben dieser Art gibt es einige verwandte im weiteren Gebiet des indischen Oceans, von deren keiner mir aber ein sicherer Fundort in Niederländisch-Indien bekannt ist, so:

*Siliqua Japonica* Dunker (Aulus) Proc. Zool. Soc. 1861, p. 426. *Cultellus japonicus* Reeve fig. 15b. *Machaera Japonica* Clessin Taf. 18 Fig. 5. Oberrand vorn und hinten mehr herabsteigend, Unterrand gerade oder etwas eingebogen, Wirbel in  $\frac{1}{3}$  oder  $\frac{3}{8}$  der Länge. 4 oder 5 weisse Strahlen. 59 Mill. lang, 25 hoch. Ost-Afrika, Dunker'sche Sammlung. Eastern Seas, Sowerby bei Reeve. Japan, Cuming bei Dunker 1861, aber in Dunker's index mollusc maris Japonici 1882 nicht erwähnt. *Solen politus* Gray in Wood ind. test. suppl. 1828, fig. 6 ist sehr ähnlich.

*Siliqua Belcheri* Gray bei Reeve (*Cultellus*) fig. 19 = Cless. 18, 4, länger gestreckt, Ober- und Unterrand in der Mitte horizontal, 42 Mill. lang und nur 16 hoch, Wirbel in  $\frac{1}{4}$  der Länge; dieselben 4 Strahlen. Java? in Bülow's Sammlung.

*Siliqua Grayana* Dunk. (Aulus) Proc. Zool. Soc. 1861, p. 427. Reeve *Cultellus* fig. 17 = Clessin 20, 4. Kleiner und vorn kurz abgerundet, hinten länger ausgezogen, 32 $\frac{1}{2}$  Mill. lang, 15 hoch, Wirbel in  $\frac{1}{4}$  der Länge; dieselben 4 Strahlen, aber etwas breiter. Ceylon.

*Siliqua fasciata* Spengler (Solen) Skrivt. nat. selsk. Kjöbenhavn IV, 1794 nro. 12; Mörch Mal. Blätt. XVII, 1870, S. 109. Dunk. (Aulus) novitat mar. p. 118, Taf. 39, Fig. 5—7, Clessin 20, 4. Klein, längsoval, 16 Mill. lang, 8 hoch, Wirbel in  $\frac{2}{5}$  der Länge. Dieselben vier Strahlen, der hinterste schwach. Fundort unbekannt. Vielleicht nur Jugendzustand von *S. radiatus*.

*Siliqua pulchella* Dunk. (Aulus) Zeitschr. Mal. 1852, p. 58; novitat. mar. S. 20, Taf. 6, Fig. 4, Clessin 20, 6, Th.; langgezogen, sehr dünn, 31 Mill. lang, 11 hoch, Wirbel in  $\frac{2}{7}$  der Länge, nur 1 weisser Strahl, der innern Leiste entsprechend, in Japan häufig und zu allerlei Zierrat benützt; in der Dunker'schen Sammlung auch als aus Java von Madame Schnell erhalten angegeben, doch wahrscheinlich eine Verwechslung mit Japan.

B) Einfarbig, weiss mit bräunlichgelber Schalenhaut.

2. *Siliqua Winteriana* Dunk.

Aulus Winterianus Dunker Zeitschr. Mal. 1852, S. 57 und novitat. mar. S. 120, Taf. 39, Fig. 8, 9. v. Martens Journ. Linn. Soc. XXI, 1886, p. 218.

Cultellus Winterianus Reeve XIX, fig. 10b.

Machaera Winteriana Clessin S. 61, Taf. 10, Fig. 3, 4.

Leguminaria alba Rousseau in Voyage au pôle sud, mollusq. pl. 26, fig. 6.

Längs elliptisch, vorn etwas höher und kurz abgerundet, hinten schmaler und langgezogen, am Ende abgerundet, Oberrand hinter den Wirbeln geradlinig, schwach abfallend, Unterrand etwas eingebogen. Bis 87 Mill. lang und 34 hoch, 17 im Durchmesser, einzelne Exemplare verhältnissmässig etwas kürzer und höher, 72 lang und 31 hoch. Ein jüngeres Exemplar in Dunker's Sammlung 59 Mill. lang und 19 hoch. Wirbel in  $\frac{2}{7}$ — $\frac{3}{10}$  der Länge.

Java, Winter in Dunker's Sammlung; Sandstrecke an der Mündung des Tjimandiri bei Palabuan im südwestlichen Java, und Pulu-bai bei Benkulen an der Westküste von Sumatra, v. Martens. Samarang auf Java, von Wessel erhalten. Borneo, Rousseau, Sullivan- und King-insel bei Mergui an der Küste von Tenasserim, in 7—10 Faden Tiefe, J. Anderson.

Die innere Leiste markirt sich an der Aussenseite als weisser Strich.

3. *Siliqua minima* Gmel.

Minutissima Leguminum Chemn. conch. cab. VI S. 48, fig. 31.

Solen minimus Gmelin Linne syst. nat. ed. XIII, p. 3227.

Solen pellucidus Spengler Skrivt. naturh. Selsk. III 2, Kopenhagen 1794, nro 13.

Siliqua minima Mörch cat. Yoldi, II, p. 8.

Machaera minima Clessin a. a. O. S. 68, Taf. 5, Fig. 1, 2, cop. v. Chemnitz.

— albida Clessin, S. 65, Taf. 18, Fig. 3.

Klein, queer oval, Wirbel in  $\frac{2}{7}$  der Länge.

Es liegen mir zwei unter sich etwas verschiedene Formen vor;

1) etwas höher, Unterrand in der Mitte schwach eingebuchtet, vorn etwas höher als hinten, vorn derart abgerundet, dass der untere Theil

des Vorderrandes stärker aufsteigt, als der obere herab. 26 Mill. lang, 13 hoch,  $6\frac{1}{2}$  im Queerdurchmesser. In mehreren Beziehungen also der *S. Winteriana* ähnlich, kann aber doch nicht der Jugendzustand derselben sein; denn wenn man die Anwachsstreifen der *Winteriana* verfolgt, so erkennt man, dass sie bei ähnlicher absoluter Grösse verhältnissmässig bedeutend länger gestreckt war. Mit dieser Form stimmt im Allgemeinen Clessin's *albida*, Taf. 18, Fig. 3 überein, nur ist sie noch etwas höher und ohne Einbiegung des Unterrands.

Fundort der mir vorliegenden Stücke unsicher. Clessin gibt Malacca nach der Bülow'schen Sammlung an.

2) etwas niedriger, vorn und hinten gleich hoch, Ober- und Unterrand horizontal, letzterer ohne Einbiegung, Unterrand vorn etwas schwächer aufgebogen. 25 Mill. lang, 11 hoch, 6 im Queerdurchmesser. Diese passt in der Form besser zu der Originalabbildung von Chemnitz = Clessin 5, 1, 2. Chemnitz hatte sie von Tranquebar, ein Exemplar in Dunker's Sammlung angeblich aus China.

*Siliqua albida* Adams et Reeve moll. Zool. Samarang 1848, p. 84, pl. 23, fig. 15 aus dem Archipel von Korea ist noch etwas niedriger und der Unterrand stärker convex, Wirbel in  $\frac{1}{3}$  der Länge; zu ihr gehört wohl auch Dunker's *Aulus minimus*, ind. moll. Jap. p. 175 aus Japan.

#### **Cultellus** Schumacher.

Schale lang gezogen, zusammengedrückt, ohne innere Leiste; Mantelbucht sehr kurz, senkrecht zum hintern Muskeleindruck aufsteigend und in ihrer ganzen (geringen) Länge dicht an die Mantellinie angelegt. Rechts zwei bis drei, links 1—2 schwache Schlosszähne.

4) Weiss mit blassgelber oder blassbräunlicher Schalenhaut, am vordern Ende beide Schalen sich stärker von einander entfernend. Links und rechts 2 Zähne, links der hintere Zahn stärker zweigespalten. *Cultellus* im engeren Sinn. Von aussen der zweiten Gruppen von *Siliqua* ähnlich, aber von innen leicht zu unterscheiden.

##### 1. *Cultellus maximus* Chemn.

„*Leguminum maxima*“ Chemnitz Conch. Cab. VI, fig. 35. *Solen maximus* Gmel. Linn. syst. nat. ed. XIII, p. 3227. 1791.

*Solen lacteus* Spengler Skrivt. natur. hist. Selskab III, 2, Kopenhagen 1794, p. 94. Mörch Mal. Blätt. XVII, 1870, S. 109.

*Solen planus* Lamarck Encycl. meth. pl. 223 fig. 5; hist. nat. d. an. s. vert. ed. 1 VI, nro 9. Chenu illustr. conch. pl. 5, fig. 3. *Cultellus magnus* Schumacher essai p. 130, 1817, Taf. 7, Fig. 4. *Cultellus planus* Clessin Solenaceen S. 48, Taf. 5, Fig. 6 (fig. von Chemnitz).

*Cultellus maximus* Mörch catal. Yoldi II, p. 9. Adams gen. moll. II, p. 344, pl. 93, fig. 2. Dunker novitat. mar. S. 11, Taf. 3, Fig. 4. Reeve conch. icon. fig. 3. Clessin Solenaceen S. 47, Taf. 16, Fig. 4.

Wirbel in  $\frac{1}{5}$  bis  $\frac{2}{9}$  der Länge, Oberrand hinter den Wirbeln sehr schwach concav, Unterrand grossentheils gerade, vorderes Ende etwas lappig vorgezogen und auffällig auseinanderklaffend, hinteres Ende kurz abgerundet; 95—126 Mill. lang, 36—40 hoch, 12—15 im Queerdurchmesser. Junges Exemplar 60 lang, 20 hoch, 7 im Durchmesser, Wirbel in  $\frac{4}{17}$  der Länge.

Borneo, Sarawak, Beccari. Singapore, ein junges Exemplar von mir gefunden. Malacca. Cuming in Dunker's Sammlung. Nikobaren, Chemnitz und Spengler.

Clessin a. a. O. führt *C. maximus* und *planus* als zwei Arten neben einander auf, gibt aber für *planus* eben die Chemnitz'sche Figur, auf welcher der Artname *maximus* bei Chemnitz und Gmelin beruht; ferner gibt er für seinen *maximus* 137 Mill. Länge und 40 Mill. Breite (Höhe) an, wenn man aber seine Figur nachmisst, ergeben sich nur 126 Mill. Länge bei richtig 40 Höhe.

Der Ausdruck „*Leguminum maxima*“ bei Chemnitz soll heissen: unter den Schoten die grösste, wie er es auch deutsch übersetzt „die grösste Gattung der Hülsen“, mit Beziehung auf *Solen legumen*. *Leguminum* ist der Genetiv pluralis, und Clessin hat daher nicht ganz Recht, *Leguminum* als eine von Chemnitz aufgestellte Gattung aufzuführen; Chemnitz hält sich in diesem Bande seines Werkes an Linne und stellt sie in die Gattung *Solen*.

Eine nahe verwandte Art ist *C. orientalis* Dunk. Zeitschr. Mal. 1850, p. 31; novitat conch. p. 10, Taf. 3, Fig. 3, durch dickere Schale, schwächere Aufwärtskrümmung der untern Hälfte des Unterrandes und etwas geringere Höhe der hinteren Hälfte im Vergleich zur vordern verschieden. Dunker's Originalexemplar ist 107 Mill. lang, vorn 34, hinten 32 hoch, Wirbel in  $\frac{1}{4}$  der Länge.

Wahrscheinlich gehören zu derselben Art auch die erheblich grössern

Formen, welche in Chenu's illustr. conchyl. Solen pl. 5, fig. 7, (als *S. planus*) und manuel de conchyl. II, p. 23, fig. 100, als *C. planus* in Reeve's conch. icon. XIX, fig. 2 und bei Clessin S. 46, Taf. 18, Fig. 1 beschrieben und abgebildet sind, erstere Figur 148 Mill. lang, vorn 50, hinten 447 hoch, Wirbel in  $\frac{2}{9}$  der Länge, bei Reeve 152 lang, 50 hoch, Wirbel in  $\frac{3}{11}$ ; bei Clessin unter dem Namen *C. lacteus* Spengl., was aber nach Mörch, welcher Spengler's Exemplar vor sich hatte, ein einfaches Synonym von *C. maximus* ist; ein Exemplar in Pätel's Sammlung 138 Mill. lang, vorn 45, hinten 41 hoch, 20 im Durchmesser, Wirbel in  $\frac{4}{15}$ . Als Vaterland gibt Dunker nur unbestimmt Ostindien, Reeve Malakka, Clessin nach Bülow's Sammlung Ceylon an.

## 2. *Cultellus scalprum* A. Gould.

*Solen scalprum* A. Gould in Proc. Boston Soc. nat. hist. III, 1842—50, p. 214 oder Expedition shells p. 74; United States Explor. Exped. Mollusca p. 388, pl. 33, fig. 502.

*Cultellus subellipticus* Dunker Proc. Zool. Soc. 1861, p. 421. Reeve conch. icon. fig. 9. Clessin S. 43, Taf. 16, Fig. 3.

Wirbel in  $\frac{1}{4}$ — $\frac{4}{15}$  der Länge. Oberrand hinter den Wirbeln horizontal, Unterrand etwas convex, Vorderrand etwas schmaler vorgezogen, von unten länger aufsteigend als von oben absteigend. Rechts zwei Zähne, der vordere dünn, stark vorspringend, der hintere divergirend, aber leicht abbrechend; links zwei, der vordere gegabelt, leicht abbrechend. Vor den Wirbeln eine zahnartige Leiste unter und parallel dem Oberrand; eine ähnliche in dem hintern Drittel der Schale. Vorderer Muskeleindruck sehr nahe den Wirbeln und sein hinterer Rand merklich erhöht, auf dem ersten Anblick den Eindruck einer von den Wirbeln herabkommenden Leiste machend. Bis 87 Mill. lang, 29 hoch und 15 im Querdurchmesser. Das Original-Exemplar Dunkers nur 46 lang, 16 hoch und 7 im Durchmesser, ist vermuthlich ein jüngeres Exemplar; ebenso dasjenige von A. Gould.

Surabaya auf Java, auf den Strassen als Speise verkauft, in den Schlammbänken an oder nahe der Mündung des Kediri-flusses, v. Martens. Singapore, Unit. Stat. Exploring Expedition. Malacca, Cuming King-island bei Mergui, J. Anderson.

### 3. *Cultellus attenuatus* Dkr.

*Cultellus attenuatus* Dunker novitat. Taf. 24, Fig. 4, Reeve fig. 4 (jung), Clessin 11, 1.

Oberrand hinter den Wirbeln kaum etwas concav, Unterrand stark convex, vorn mässig breit abgerundet, im hinteren Drittel auffällig verschmälert, bis 110 Mill. lang und 30 hoch. Wirbel in  $\frac{2}{7}$  der Länge. Im Übrigen dem vorigen ähnlich. „Tsoken-head“, Sumatra, ein Exemplar aus die Sammlung des verstorbenen Hafen-kapitäns Fokkes in Hamburg, jetzt im Berliner Museum. Sonst nur von den Philippinen bekannt.

*Cultellus vitreus* Dunk. Reeve fig. 22 und Clessin 16, 2 von Singapore, nur 18 Mill. lang und 6 hoch, vielleicht etwas junges. Ein Pätelsches Exemplar 36 lang, 9 hoch, Wirbel ebenfalls  $\frac{1}{4}$ ; links 3 Zähne, der mittlere stark gegabelt, rechts zwei einfache Zähne, also weder zu *Ensis* noch zu *Solen* im engsten Sinn gehörig.

*Cultellus subcylindricus* Clessin *Solenaceen* S. 48, Taf. 4, Fig. 6, 7 von der Insel Salanga an der Wurzel der Halbinsel Malakka, unterscheidet sich von *subellipticus* durch nur etwas schlankere Form und geringere Grösse; Clessin's Original-Exemplar ist 61 Mill. lang, 20 hoch, 10 in Durchmesser; ein kleineres Exemplar, welches das Berliner Museum von Joh. Weber aus Salanga erhielt, nur 46 Mill. lang, 15 hoch, 6 im Durchmesser, Wirbel in  $\frac{1}{4}$  der Länge. Ein fast gleich grosses junges Exemplar von *subellipticus*, mit grösseren in Surabaya erhalten, ist bei nur  $43\frac{1}{2}$  Mill. Länge schon ebenso hoch (15 Mill.), 7 im Durchmesser, und die Wirbel stehen etwas mehr nach vorn, in  $\frac{1}{30}$  ( $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{3}$ ) der Länge.

### B) PHARELLA Gray.

Langgestreckt, glanzlos, gelbbraunlich, Wirbel in ungefähr  $\frac{1}{3}$  der Länge. Links 3, rechts 2 schwache Zähne; Weichteile mit kurzem dickem Fuss und kurzen Athemröhren.

### 4. *Cultellus olivaceus* Metc.

*Novaculina olivacea* Metcalfe in Proc. Zool. Soc. 1851, p. 74 und Ann. Mag. n. h. (2) XI, 1853, p. 71.

*Pharella Javanica* (Lam.) Adams gen. moll. pl. 93, fig. 1.

*Pharella acutidens* Chenu manuel de conchyliologie II, p. 22, fig. 90.

*Cultellus olivaceus* Issel moll. borneensi (Ann. Mus. civ. di Genova VI, 1874) p. 115. Reeve XIX, fig. 27.

*Pharella olivacea* Clessin S. 54, Fig. 7. Copie nach Reeve.

Höhe zur Breite wie  $1:3\frac{2}{3}$ , Unterrand meist gerade (selten in der Mitte kurz eingebogen), am hintern Ende stärker aufgebogen als am vordern. Wirbel ein wenig weiter nach vorn, Schale verhältnissmässig etwas stärker als bei der folgenden. Länge bis 98—103 Mill., Höhe 28, Queerdurchmesser 14—15, Wirbel in  $\frac{3}{10}$  der Länge. Kleinstes Exemplar 70 lang, 22 hoch, 12 im Durchmesser.

Borneo, im Gebiet von Sarawak, Metcalfe. Singapore, Novara-Expedition und von Martens. Fluss Manquindaya an seiner Mündung in die Bucht von Subig, Provinz Bataan, Westküste von Luzon, auf Schlammgrund, Jagor.

##### 5. *Cultellus Javanicus* Lam.

*Solen Javanicus* Lamarck hist. nat. an. s. v. V, 1818, Nro. 13; ed. 2, VI, p. 58. Delessert recueil de coq. pl. 2, fig. 4 nach dem Exemplar von Lamarck. Woodward in Ann. Mag. n. h. (2) XVI, 1885, p. 22, Fig.

*Solecirtus Javanicus* Desmoulin in Act. Soc. Linn. d. Bordeaux 1832.

*Solen acutidens* Broderip and Sowerby, Zoological Journal IV, 1828, p. 361; Zoology of Capt. Beechey's voy. 1839, pl. 43, fig. 2; Reeve conch. system. II, pl. 26, fig. 2. Hanley rec. bivalv. p. 17, pl. 11, fig. 36.

*Solen Michaudii* Cuilliaud in Magasin de Zoologie 1839, pl. 2.

*Pharella Javanica* Gray figures of moll. animals V, 1857, p. 30 Abbildung der Weichtheile; Chenu Manuel de conchyl. II, p. 22, fig. 97 und p. 23, fig. 99 unter d. Namen *cultellus* Gray's Figur ungenau kopirt.

*Solecirtus acutidens* Reeve conch. icon. XIX, fig. 25.

*Cultellus Javanicus* Reeve conch. icon. XIX, fig. 28.

*Pharella acutidens* und *Th. javanica* Clessin. S. 52, 53, Taf. 15, Fig. 4 und 5.

Höhe ungefähr  $\frac{1}{4}$  der Länge. Unterrand in der Mitte mehr oder weniger eingebogen, vorn und hinten ziemlich gleichmässig aufgebogen. Schlosszähne stark zusammengedrückt und säbelförmig aufwärts gebogen, rechts der mittlere halb so klein als der vordere und hintere, links beide gleich. Wirbel in  $\frac{1}{3}$  ( $\frac{7-8}{24}$ ) der Länge. Grösstes Stück in Dunker's Sammlung unbekannter Herkunft 81 Mill. lang,  $17\frac{1}{2}$  hoch,  $9\frac{1}{2}$  im Queerdurchmesser. Gewöhnliche Grösse 57—68 lang, 13—16



hoch, 8—9 im Durchmesser; das kleinste, vermuthlich erwachsene mit den andern zusammengefunden, 30 Mill. lang,  $11\frac{1}{2}$  hoch,  $6\frac{1}{2}$  im Durchmesser. Das kleinste Stück in der Dunker'schen Sammlung, wahrscheinlich jung, 40 lang,  $8\frac{1}{2}$  hoch, 5 im Durchmesser, diese kleinen also verhältnissmässig etwas niedriger als die grössern.

Pongoor bei Malacca, in brackischem Wasser, tief im Schlamm, F. Jagor. Singapore in schwarzgrauem Schlammgrund, zahlreich auf dem Fischmarkt zu kaufen, v. Martens. Sumatra, Cailliaud und Hanley. Java, Leschenault bei Lamarck und Winter bei Dunker. Batavia, Strubell. Borneo, Cuming in Dunker's Sammlung. Makassar, M. Weber. Manila, v. Besser im Berliner Museum; Manila, Basay auf Samar, Inseln Bohol und Negros, Cuming in Dunker's Sammlung. Liu-kiu-inseln, Exp. v. Beechey.

Der Fuss des lebenden Thieres, Taf. XII, fig. 12, wechselt sehr in seiner Gestalt: kurz beilförmig, wenn er eben aus der Schale hervorkommt, wird er bald länger und eichelförmig mit centripetal sich verschiebender Auschwellung, wenn das Thier sich im Schlamm fortbewegt, zuweilen selbst trichterartig, wenn er sich an einen fremden Gegenstand anlegt, um sich daran zu fixiren und die Schale nachzuziehen. Beide Athemröhren kurz und unter sich vereinigt.

Die frische Schale ist blass gelbgrau, glanzlos oder schwach seiden-glänzend, vor den Wirbeln und im hintern Theile meist mit einer schmutzig graubraunen, lamellös-schuppigen Schalenhaut bedeckt; die Innenseite bläulichweiss, gegen die Wirbel zu gelblich. Die Sculptur ist eigenthümlich: die ziemlich groben Anwachsstreifen werden nämlich von zahlreichen feineren und schärferen theilweise überdeckt und wie zusammengesetzt, theilweise durchbrochen, indem diese letzteren stellenweise sich aufbiegen und nach den Wirbeln zu gerichtete Winkel bilden, was an die Sculptur mancher nordamerikanischer Unionen erinnert. Diese Aufbiegungen kommen aber nicht an allen Individuen und nicht immer an derselben Stelle vor, am häufigsten im mittlern Theil der Schale. Eine sehr schwache oberflächliche Radialstreifung lässt sich ausserdem noch erkennen.

Die dünnen Schlosszähne brechen sehr leicht theilweise oder ganz ab, daher die verschiedenen Angaben über ihre Grösse und Zahl.

Ob Hanley's Solen Javanicus recent bivalv. p. 14, pl. 11, fig. 19 dieselbe Art, ist mir zweifelhaft, da die Abbildung ihn sehr schlank darstellt; die braunen unregelmässigen Streifen bilden kein Hinderniss,

da ähnliche, wie es scheint, von der Schalenhaut fester anhaftendem Schlamm gebildet, auch bei sichern Exemplaren von *Javanicus* vorkommen.

6. *Cultellus acuminatus* Hanl.

*Solen acuminatus* Hanley Proc. Zool. Soc. 1842, p. 122.

*Cultellus acuminatus* Reeve fig. 29.

*Pharella acuminata* Clessin *Solenaceen* S. 53, Taf. 15, fig. 1.

Dem vorhergehenden sehr ähnlich, nur nach hinten noch mehr verschmälert aber Wirbel in  $\frac{2}{7}$ — $\frac{3}{11}$  der Länge, Höhe zur Breite wie  $1:3\frac{3}{4}$ , Unterrand kaum merklich concav, weniger von unten aufsteigend. Grösseres Exemplar aus China  $76\frac{1}{2}$  Mill. lang, 19 hoch, grösster Queerdurchmesser beträchtlich hinter den Wirbeln 11 Mill.; kleineres aus Java 65, 17 und 9.

Java, von Cuming an Dunker gegeben. Sonst aus Hongkong bekannt.

7. *Cultellus ovalis* Dkr.

*Pharella ovalis* Dunker Proc. Zool. Soc. 1861, p. 423; novitat. mar.

S. 118, Taf. 39, Fig. 4. Clessin S. 56, Taf. 10, fig. 5.

*Cultellus ovalis* Reeve *conch. icon.* p. 24.

Höhe zur Länge wie 3:8. Ober- und Unterrand ziemlich gleichmässig schwach convex, hinteres Ende merklich mehr verschmälert als das vordere, Wirbel in etwas weniger als  $\frac{1}{3}$  der Länge. Jederseits nur 1 stark zusammengedrückter, säbelförmig vorstehender Schlosszahn, links vor ihm 2 kleinere stumpfe, rechts dahinter ein sehr schwacher, stumpfer, schief aufsitzend (an dem einzigen Original-Exemplar Dunker's, wenn nicht etwa an jeder Seite einer abgebrochen). 73 Mill. lang, 27 hoch,  $13\frac{1}{2}$  im Queerdurchmesser.

Singapore; Cuming bei Dunker. Vermuthlich auch noch in Niederlandisch-Indien anzutreffen. Diese Art erinnert in der mehr ovalen, stärker zusammengedrückten Form an die *Cultellus* in engem Sinn, namentlich *C. subellipticus*, gehört aber nach der matten, feingestreiften Schalenhaut, der Farbe der Aussen- und Innenseite und der Zahl der Zähne näher zu *C. olivaceus* und *Javanicus*.

C) *ENSICULUS* Ad. 1860.

Aussen und innen röthlich mit bräunlichen Flecken. Oberrand mehr oder weniger concav. Wirbel vorn. Links 3, rechts 2 Zähne, der hintere jederseits weiter zurück und dem Rande parallel ausgedehnt.

8. *Cultellus cultellus* L.

*Tellina cultriformis* Rumph amb. rar. S. 147 (deutsch 139) Taf. 45, Fig. F.

*Solen cultellus* Linne syst. nat. ed. X, p. 675. Gmelin ed. XIII, p. 3224. Chemnitz Conch. Cab. VI, fig. 36, 37. = Clessin Taf. 5, Fig. 7, 8. Lamarck Encycl. meth. pl. 223, fig. 4; hist. nat. an. s. vert. ed. 1, VI nro 8, ed. 2. Chenu illustr. conch. *Solen* pl. 2 fig. 6. Favanne in Argenville conch. ed. 3 pl. 35, fig. C. unten.

*Cultellus cultellus* Chenu manuel de conchyl. II, p. 23 fig. 98, nicht 99. Reeve conch. fig. 23, = Clessin Solenaceen S. 40, Taf. 3, Fig. 2.

*Ensiculus cultellus* H. Adams Proc. Zool. Soc. 1360. Taf. 14, Fig. 2.

Violett-röthlich mit zahlreichen unregelmässigen hellbraunen Flecken. Oberrand vorn stark concav, hinter dem Ligament nahezu horizontal, Unterrand stark convex, Vorderrand steil abfallend, Wirbel in  $\frac{1}{7}$  oder etwas weniger der Länge. Schale 64—73 Mill. lang, in der Mitte der Länge 17—21 hoch, Queerdurchmesser 8 Mill.

Amboina, an der Mündung des Flusses Weynitu in die Bai von Ambon, senkrecht im Sand steckend, beim Nachgraben rasch tiefer hinunterrückend, Rumph. Java, Winter in der Dunker'schen Sammlung. Manila, v. Besser im Berliner Museum. Philippinen, Cuming. Tranquebar in Vorderindien, Chemnitz. Macluer-Golf in Neu-Guinea, Exped. Gazelle. Thursday-island in der Torres-strasse Semon.

*C. aspersus* und *lividus* Dkr., Clessin Taf. 14, Fig. 3 und 4, jener von China, dieser von Luzon angegeben, sind sehr ähnlich, nur durch etwas mehr vorgezogenen Vordertheil verschieden und wohl nur Varietäten.

*C. concinnus* Dkr. Proc. Zool. Soc. 1861 p. 423 von der Insel Negros, Philippinen, dürfte nach den Original-Exemplaren in Dunker's Sammlung der Jugendzustand von *cultellus* L. sein. Länge 30, Höhe 10 Mill. Färbung wesentlich wie bei *cultellus*.

*Cultellus Cumingianus* Dunker Proc. Zool. Soc. 1861 p. 422. Reeve fig. 7a und b. Clessin S. 39, Taf. 14, Fig. 5; cop. nach Reeve.

Verhältnissmässig höher und kürzer, Oberrand kaum oder gar nicht concav, Unterrand nur mässig convex, vorn und hinten kurz abgerundet bis ganz nahe ans Hinterende gleich hoch bleibend. Flecken blasser braun, oft unter sich zu einem unregelmässigen Netzwerk verbunden, sodass die helleren Zwischenräume mehr oder weniger als

Flecken hervortreten, 63 Mill. lang, 17 hoch,  $10\frac{1}{2}$  im Durchmesser; Wirbel in  $\frac{1}{6}$  der Länge, Insel Cebu, Philippinen, Cuming.

Zwei Exemplare in der Dunkerschen Sammlung mit der Notiz „äusserst constant in Form und Zeichnung“. Das schiefe braune Feld, welches Clessin a. a. O. an der Cumingschen Figur hervorhebt und mit dem mancher ächter Solen vergleicht, dürfte doch wohl nur vom Erhaltenbleiben der Schalenhaut oder stärkeren Zusammenfliessen der Flecken herrühren; keines der Dunker'schen Exemplare zeigt etwas gleiches.

Var. *Dunkerianus*.

Ein drittes Stück der Dunkerschen Sammlung, ebenfalls von ihm als Cnmingianus bezeichnet, weicht einigermassen in Form und Farbe ab: Vorderrand etwas schmaler vorgezogen, die zwei hintern Drittel des Unterrandes gerade, ja ein wenig eingebogen. Färbung blass röthlichbraun mit zerstreuten kleinen weissen Flecken, 66 lang, 16 hoch, 10 im Durchmesser. Wirbel in  $\frac{1}{7}$  der Länge.

In der Färbung ähnlich dem *C. australis* Dkr. von Port Essington, aber in der Form des Unterrandes und Hinterendes verschieden.

Insel Flores.

9. *Cultellus marmoratus* Dunk.

Dunker Proc. Zool. Soc. 1861 p. 423, ind. moll. jap. p. 174, Taf. 7, Fig. 24, copirt bis Clessin S. 37, Taf. 4, Fig. 4.

Oberrand gleichmässig und ziemlich stark concav, Unterrand noch stärker, Vorder- und Hinterende kurz abgerundet, klein, dunkler röthlichbraun gefleckt mit zahlreichen kleinen weissen Flecken, 46 mm. lang, 11 hoch,  $6\frac{1}{2}$  im Durchmesser. Wirbel in  $\frac{1}{9}$  der Länge, also sehr weit vorn. Das einzige Exemplar der Dunker'schen Sammlung hat zwei Etiketten; auf der einen steht Japan, auf der andern Flores. Da Japan durch die Publikation von Dunker gesichert ist, dürfte Flores das unwahrscheinlichere sein.

**Solen.** L. restr.

Schale langgestreckt, Ober- und Unterrand unter sich parallel, Wirbel und Schloss ganz vorn, Vorder- und Hinterrand nahezu geradlinig abgeschnitten, gleichmässig klaffend. Fuss cylindrisch, nach dem freien Ende zu eichelförmig sich verdickend. Athemröhren mässig lang, unter sich verbunden.

Indem jede Anwachsline am hintern Ende unten sich plötzlich aufbiegt, entstehen bei weiterem Wachstum auf der Aussenfläche zwei bestimmte langgezogene Dreiecke mit verschiedener Richtung der Anwachsline, ein vorderes unteres nach hinten zugespitztes mit horizontalen, und ein oberes hinteres nach vorn zugespitztes mit senkrechten Wachstumslinien; die Gränze beider Dreiecke verbindet alle diejenigen Punkte, welche einmal im Laufe des Wachstums die untere Ecke gebildet haben. So ist es bei allen Arten beider Untergattungen, nicht nur bei der einen, *Ensis*, bei welcher P. Fischer es angibt, doch mehr oder weniger in die Augen fallend, je nachdem die Farbenbänder mehr oder weniger hervortreten.

Da die Artunterscheidung und Synonymie hier etwas schwierig ist, erwähne ich alle aus dem malayischen Archipel, einschliesslich Singapore und der Philippinen bekannten Arten.

#### A) SOLEN im engern Sinn.

Links und rechts vorn je 1 zusammengedrückter rechtwinkliger Zahn.

a) Rücken- und Unterrand geradlinig.

aa) Vorderrand merklich schief.

##### 1. *Solen curtus* Desmoul.

*Solen rectus brevis* Lister hist. conch. pl. 410 fig. 256, 1687.

*Solenes bivalves* Rumph. amb. rar. p. 149 (deutsch S. 142) Taf. 45, fig. M.

Manche de couteau Argenville conchyliologie id. 1 p. 343, pl. 27 (ed. 2 pl. 24) fig. K. = Favanne conchyliologie pl. 55, fig. B. 1 unten.

*Solen vagina* Linne syst. nat. ed. X. p. 674 zum Theil; Mus. Lud. Ulr. p. 472. Hanley ipsa Linn. conch. p. 29. — Chemnitz Conch.

Cab. VI, S. 43 z. Theil, fig. 26, copirt bei Clessin Solenaceen, Taf. 3, Fig. 4. — Encycl. meth., Vers pl. 222, fig. 1a 6c.

— *vagina* var. a. Spengler in Skrivter af Naturhist. Selskabet III 2, 1794, p. 84.

— — *vagina* var. *abbreviata* Lamarck hist. nat. an. s. vert. ed. 1. V, nro. 1, 2, 1818; ed. 2, VI p. 54.

— *curtus* Desmoulins in Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux V, 1832, p. 113.

— *abbreviatus* Philippi abbild. neuer Conchylien I, S. 1, Taf. 1,

Fig. 1, 1843. — Clessin Solenaceen S. 9, Taf. 2, Fig. 10 (und Taf. 4, Fig. 2?).

— Chemnitzii Chenu illustrations conchyliolog., Solen pl. 1 fig. 5, 5a und 7 (vor 1846) — Clessin Solenaceen S. 5, Taf. 1, Fig. 4.

— brevis (Gray??). Mörch cat. collect. Yoldi II, 1853, p. 6. Reeve conch. icon. XIX fig. 6.

Vorn schief abgeschnitten, ohne merkliche Furche aussen, aber innen mit wulstigem Rand; vorderes Ende der Mantellinie dem Vorderrande nahe und ihm parallel. Hinterende ein wenig niedriger, Hinterrand fast senkrecht, doch unten etwas abgerundet.

Grünlich-braun, heller oder dunkler, fast einfarbig, abgerieben matt-rosenroth  $4\frac{1}{2}$ —5 mal so lang als hoch, jüngere nur 4 mal. Mein Exemplar von Amboina 105 Mill. lang, 21 hoch, 15 im Durchmesser. Durchschnittliche Grösse aber nur etwa 76—83 lang, 13—17 hoch. Das kleinste anscheinend ausgewachsene 55 lang, 12 hoch.

Amboina, Rumph; ebenda von mir gefunden. Makassar, v. Martens. Java, Winter in Dunker's Sammlung. Manila, Valenciennes in derselben Sammlung. Philippinen, Cuming bei Reeve. Kei Bandan, Beccari. Tranquebar, Spengler.

Es kann kein Zweifel sein, dass diese Art die von Linne im Museum Ludovicae Ulricaе beschriebene ist, aber im Systema naturae hat er mit derselben auch den europäischen *S. marginatus* Donovan. (rotundatus Spengl., vagina vieler Autoren) vereinigt, da er als Vaterland das europäische und das indische Meer angibt und die Abbildung der europäischen Art bei Gualtieri citirt. Da desshalb in vielen Schriften, so noch neuerdings bei Jeffreys und Clessin, diese europäische Art *S. vagina* genannt wird, dürfte es vorzuziehen sein den zweideutigen Namen ganz fallen zu lassen und die eine Art *marginatus*, die andere *curtus* zu nennen, was zu keiner Verwechslung Anlass gibt.

*Solen brevis* Gray, im Britischen Museum, wird oft als identisch mit dieser indischen Art betrachtet; er ist meines Wissens zuerst in Hanley's recent Bivalves 1842—56, p. 12, pl. 13, fig. 42 publicirt, demnach später als der Name von Desmoulins, und scheint sich danach durch rechtwinklig abgeschnittenen Vorderrand, sowie durch die Färbung zu unterscheiden; auch soll er aus amerikanischen Meeren stammen. Die von Reeve für *brevis* gegebene Abbildung, fig. 6., (ob nach Gray's Original gezeichnet?) ist 117 Mill. lang und  $14\frac{1}{2}$  hoch,

also verhältnissmässig zu lang und schlanck für unsern *curtus* und gleicht eher einem jüngern *S. grandis* Dkr., nur ist er hinten etwas zu niedrig dafür.

*Solen Ceylonensis* Leach zool. miscell. I, p. 22, pl. 7, 1814. Knorr vergnüg. d. augen I, Taf. 28, Fig. 3, *S. vagina* (part.) Chemnitz Conch. Cab. VI, S. 43, Taf. 4, Fig. 28 = Clessin Solenaceen Taf. 3, Fig. 5, 6, Spengler Skrivter naturh. Selsk. III, 2, p. 83, *S. vagina* var. a major Lam. hist. nat. an. s. vert. V, not., ed. 2, VI, p. 64, *S. vagina* Schumacher essai p. 124, Taf. 6, Fig. 3, *S. truncatus* Sow. gen. part 32 pl. 194, Fig. 1, (1830) Reeve conch. ic. 1, *S. intermedius* Koch bei Philippi abbild. I, S. 36, Taf. 1, Fig. 5, 1843 (nicht Clessin) *S. Lamarcki* Chenu illustr. conchyl. *Solen* pl. 1, fig. 2, 2a; 5—6 mal so lang als hoch, mit deutlich ausgeprägten Purpurbändern, welche wie bei der Gattung überhaupt parallel den Anwachslinien im hintern oberen Dreieck senkrecht, im vordern untern horizontal verlaufen; am hintern Ende ebenso hoch oder auch etwas höher als am vordern. Ein vom Grafen zu Eulenburg auf Ceylon erhaltenes Stück 158 Mill. lang, 27 hoch,  $19\frac{1}{2}$  im Durchmesser, ein Stück der Dunker'schen Sammlung 138 lang,  $22\frac{1}{2}$  hoch, kleinere 120 lang und 20 hoch. Bis jetzt mir nur aus Ceylon bekannt, könnte aber wohl auch in Niederländisch-Indien noch gefunden werden.

*Solen grandis* Dunker Proc. Zool. Soc. 1861, p. 418; novitat. conch. II, S. 71, Taf. 24, Fig. 5, Clessin Solenaceen S. 18, Taf. 7, Fig. 1, nach dem Original-Exemplar in Dunker's Sammlung, nahezu so gross wie *S. Ceylonensis*, 125 Mill. lang und 25 hoch, also 1:5, bräunlich wie *S. curtus*, Hinterrand unten etwas mehr abgerundet als bei diesen beiden und ebenso hoch wie der Vorderrand. Soll von den Philippinen stammen, im Berliner Museum aber nur Exemplare aus dem nördlichen China und aus Japan mit bestimmten Fundortangaben, aus Japan auch von Lischke und Dunker ind. moll. jap. angeführt; das japanische Exemplar aus Dunker's Sammlung ist aber nur  $103\frac{1}{2}$  Mill. lang bei 25 Mill. Höhe, also Verhältniss nahezu 1:4, wie bei *S. curtus*, doch der Hinterrand unten charakteristisch abgerundet. Jedenfalls stehen diese Arten sich sehr nahe.

*Solen regularis* Dkr. Proc. Zool. Soc. 1861, p. 419; Reeve conch. ic. fig. 30. Clessin Solenaceen S. 22, Taf. 9, Fig. 2. Vorn schief abgeschnitten, ohne Furche wie *curtus*, einfarbig braun,  $4\frac{1}{2}$  bis etwas über 5 mal so lang als hoch, 59—68 Mill. lang, 12—15 hoch, 9 im

Durchmesser, von Madras angegeben, könnte nach den Exemplaren der Dunker'schen Sammlung wohl ein Jugendzustand oder kleinere Form von *curtus* sein.

2. *Solen Timorensis* Dkr.

Dunker Zeitschr. f. Malak. 1852, S. 56, novitat conchol. S. 9, Taf.

3, Fig. 2, Reeve fig. 27, Clessin Solenac. S. 18, Taf. 6, Fig. 1.

Vorn sehr schief abgestutzt, untere Ecke scharf, Vorderrand ohne Furche, Hinterrand umgekehrt von oben und vorn nach unten und hinten schief, auch hinten etwas höher als vorn, blass gelblich mit blass röthlichen Bändern, etwa 6 mal so lang als hoch. Unterrand 128, Oberrand 116 Mill., Höhe vorn 18, hinten 20 Mill.

Timor, Scheepmaker'sche Sammlung. Im Berliner Museum nicht vorhanden.

3. *Solen Becki* Phil.

Philippi Abbildungen neuer Conch. III, S. 43, Taf. 2, Fig. 1. 1847 copirt bei Clessin Solenac. S. 5, Taf. 1, Fig. 4, 5.

? *Solen Lamarekii* var. Chenu illustr. conch. pl. 1, Fig. 4.

Gross, dunkelbraun, Vorderrand wenig schief mit schwacher Furche; Hinterrand gleich hoch oder ein wenig niedriger, schwach abgerundet. Oft ein helleres kleines Dreieck, Basis nach unten, hinter dem Vorderrand. Grössere Stücke über 5, kleinere  $4\frac{1}{2}$  mal so lang als hoch. Philippi's Original 107 Mill. lang, vorn und hinten 20 hoch; zwei Stücke von Java heller gelblich, nur 89 Mill. lang,  $19\frac{1}{2}$  hoch, 12 im Durchmesser.

Java, Winter in Dunker's Sammlung. Philippi kannte das Vaterland seines Original-Exemplars nicht.

4. *Solen exiguus* Dkr.

Dunker Proc. Zool. 1861, p. 419 und novitat. conch. S. 117, Taf. 39, Fig. 1.

Mit schiefer, aber etwas gewölbtem Vorderrand, 4 mal so lang als breit, 38—40 Mill. lang, 8—9 hoch, 4—5 im Durchmesser.

Borneo, Cuming. Dürfte sich ähnlich zu *S. Becki* verhalten, wie *regularis* zu *curtus*.



5. *Solen corneus* Lamarck.

Lamarck hist. nat. d. an. s. vert. V, 1818 nro 2; ed. 2. VI, p. 54.

Delessert recueil des coquilles de Lamarck pl. 2, fig. 2. Hanley rec. Bivalves p. 11, pl. 10, fig. 42. Philippi abbild. neuer conch. III, S. 44, Taf. 2, Fig. 2. Reeve conch. icon. XIX, fig. 19, aber nicht pl. 7, fig. 18b. Clessin Solen. S. 9, Taf. 2 (nicht 3) Fig. 8, 9.

Etwa 6 mal so lang als hoch. Vorderrand schief, etwas gewölbt und dunkel gesäumt, Hinterrand ziemlich senkrecht. Glänzend gelbbraun, fast einfarbig. Delessert's Figur, die doch wohl ein Original-exemplar darstellt, 53½ Mill. lang, 9½ hoch, Philippi's Figur 60 lang und 10 hoch, diejenige bei Reeve 67 und 10, ein Stück aus Borneo in Dunker's Sammlung 61 Mill. lang, 9 hoch und 6½ im Queerdurchmesser.

Java, Leschenault (verschrieben Laichenau) bei Lamarck. Borneo und Philippinen von Cuming erhalten in Dunker's Sammlung. Tuticorin im Golf von Manaar bei Ceylon, Thurston. Rothes Meer, Philippi. Tschifu im Golf von Petscheli, durch v. Möllendorff erhalten. Japan, Dunker.

Vielleicht gehört hieher auch ein grösseres Stück, angeblich aus Java, 91 Mill. lang, 16 hoch, 12 im Queerdurchmesser.

Die Abbildung von *S. corneus* bei Chenu illustr. conch. pl. 1, fig. 8 ist beträchtlich weniger schlank, 51½ Mill. lang und 12 hoch, und passt besser zu *S. Schultzeanus* Dunker novitat. S. 8, Taf. 3, Fig. 1, welcher angeblich aus Portugal stammen soll, aber das Berliner Museum besitzt ein sehr gut damit übereinstimmendes Exemplar von Swatau in China, aus der Sammlung des verstorbenen Hafenkapitäns Fokkes in Hamburg.

Sehr ähnlich, aber bedeutend grösser und noch schlanker, 7 mal so lang als hoch, (121 Mill. lang, 17 hoch) mit schmaler Furche längs des Vorderrandes, ist *S. Gouldi* Conrad 1867, Dunker ind. moll. Jap. S. 173, Taf. 16, Fig. 11, von Reeve unrichtig als *S. gracilis* Philippi abgebildet, fig. 17.

*Solen Malaccensis* Dunker. Proc. Zool. Soc. 1861, p. 419; novitat. S. 72, Taf. 24, Fig. 6, Reeve fig. 20, Clessin Taf. 7, Fig. 6, ist diesem ähnlich, 115 Mill. lang, 17 hoch und 11 im Queerdurchmesser, bei Reeve 128 lang und 15 hoch, also 7—8 mal so lang als hoch, mit sehr deutlicher Furche am Vorderrand, hinten schmal und kaum abgerundet. Von Malakka, also wohl auch noch in Niederländisch-Indien zu finden.

*Solen gracilis* Philippi in Zeitschr. f. Malakozool. 1847, p. 72. Dunker novitat. conch. S. 71, Taf. 24, Fig. 3. (nicht Reeve und Clessin).

Sehr schlank, 7—8 mal so lang als hoch, glänzend hornbraun, mit schwacher Bänderung beider Felder. Vorderrand ein wenig gewölbt, doch ohne Furche, dunkel-gesäumt, ein wenig schief; Hinterrand ziemlich senkrecht, nur wenig abgerundet. Das grösste Stück in Dunker's Sammlung 111 Mill. lang, 14 hoch, 10 im Durchmesser, von der Philippinen-insel Negros; ein zweites 94, 12 und  $8\frac{1}{2}$ , das von ihm abgebildete nur 85, 12 und 8. Clessin's Abbildung Taf. 6, Fig. 4 weicht durch senkrechten Vorderrand ab; Reeve's *S. gracilis* von Japan ist *S. Gouldi* Conrad.

#### 6. *Solen linearis* Spengl.

Spengler in Skrivter naturhist. Selskab. Kopenhagen III, 1794, p. 87. Chemnitz Conch. Cab. XI, S. 95, Fig. 1931, 1932. Hanley recent bivalves p. 12. Reeve conch. icon. fig. 22. Clessin Solenaceen S. 23, Taf. 9, Fig. 4.

Dünn und sehr schmal, 7—11 mal so lang als hoch, weisslich, dicht violett-röthlich gebändert. Vorderrand etwas schief mit schwachem Einkniff, 42—61 Mill. lang, 6—7 hoch; Reeve's Figur 78 lang, 7 hoch.

„Borneo shoal, Java sea, off Borneo's East coast“ von unbekanntem Geber im Berliner Museum. Nikobaren, Spengler und Chemnitz. Philippinen, Reeve. In Japan zu verschiedenen Zierraten verwandt, v. Martens.

Ähnlich ist *S. cylindraceus* Hanly rec. bivalv. p. 337, pl. 12, fig. 41, Philippi abbild. III, Taf. 2, Fig. 5, Clessin Taf. 1, Fig. 6, 7, *S. corneus* var. Reeve conch. icon. pl. VII, fig. 18b, sechsmal so lang als hoch, blass gelblich, Vorderrand concav, schief mit deutlicher Furche, Hinterrand stumpf gerundet. Länge 60—65 Mill., Höhe,  $7\frac{1}{2}$ —9 hoch, 7 im Queerdurchmesser. Die früheren Autoren geben keinen Fundort an; im Berliner Museum ist er von den Querimba-inseln an der Ostküste von Afrika, von W. Peters gesammelt, vorhanden.

*Solen vitreus* Dunker Proc. Zool. Soc. 1861 p. 420. Reeve conch. icon. XIX, fig. 9. Clessin Solenaceen S. 23, Taf. 9, Fig. 5. Weiss und so durchsichtig, dass Mantellinie und Mantelbucht auch von aussen zu sehen sind, gerade,  $4-4\frac{1}{2}$  mal so lang als hoch, Vorderrand schief, gewölbt, mit deutlicher Furche; Hinterrand etwas schief ab-

gerundet. Zähne jederseits nur Einer. 41—42 Mill. lang, 9—10 hoch, 6 im Durchmesser. Malakka und Singapore (Pätel's Sammlung). Vielleicht nur Jugendzustand, aber von welcher Art?

b) Vorderrand senkrecht.

7. *Solen pictus* Chenu.

Manche de couteau Argenville conchyliologie ed. 1. 1742, pl. 27 (ed. 2, pl. 24) fig. M. = Favanne conch. pl. 55, fig. B 2.

*Solen vagina* var. c minor maculis variis picta Lamarck hist. nat. d. an. s. vert. ed. 1, V nro. 1; ed. 2, VI, p. 54.

*Solen pictus* Chenu illustr. conch. *Solen* pl. 1, fig. 6, (vor 1846, da in Engelmann's bibl. hist. nat. erwähnt).

*Solen versicolor* Philippi Abbild. neuer conch. III, S. 43, Taf. 2, Fig. 3. 1847 Clessin Solenaceen S. 8, Taf. 2, Fig. 6, 7.

Vorderrand aussen etwas eingekniffen, innen stark gewulstet; Hinterrand ziemlich senkrecht. Zeichnung weiss und violett-braun, mehr marmorirt und fleckig als gebändert. Schale verhältnissmässig dick, 5 mal so lang als hoch; 80—88 Mill. lang, 13—17 hoch, ein ungewöhnlich grosses Stück unbekannter Herkunft 98 Mill. lang und 18 hoch, also 1: 5½.

Molukken, Dunker'sche Sammlung und von G. Schneider in Basel. Manila, v. Besser im Berliner Museum.

Betreffs der Zähne finde ich an den vorliegenden Stücken auffallende Variationen: das eine von den Molukken zeigt sowohl den rechten als linken Zahn zweispaltig, aber am linken ist der vordere, am rechten der hintere Theil mehr vorstehend; an einem zweiten von den Molukken ist der rechte Zahn stark, aber sehr zusammengedrückt und einfach, der linke abgebrochen; an dem dritten von den Molukken beide abgebrochen (oder nicht ausgebildet?)

Recht ähnlich in der Färbung, aber merklich schlanker ist *S. Sloanei* Gray bei Hanley rec. bivalv. p. 12, pl. 11, fig. 18, Reeve fig. 10, Clessin S. 26, Taf. 9, Fig. 6, von Sydney in Australien, 78—80 Mill. lang, 11—13 hoch, 8—11 im Durchmesser, also 6—7 mal so lang als hoch.

*Solen pictus* Philippi Zeitschr. f. Mal. 1848 ist davon verschieden. *S. pictus* Spengler ist *Psammobia vespertina*.

8. *Solen Delesserti* Chenu.

*Solen Delesserti* Chenu, leçons élémentaires pl. 1, fig. 3; Reeve conch. icon. XIX, fig. 8, copirt bei Clessin S. 30, Taf. 12, Fig. 4. (nicht gut).

*Solen brevissimus* Martens in Ann. Mag. nat. hist. (3) XVI, Dec. 1865, p. 432.

— *exiguus* (Dunker) Reeve conch. icon. fig. 32.

? — *minus* Zelebor in Dunker's Sammlung.

— *Dunkerianus* Clessin Solenac. S. 35, Taf. 16, Fig. 1. (nicht Taf. 8, Fig. 5).

Auffallend kurz, nur  $3\frac{1}{2}$  mal länger als hoch, und stark gewölbt, hornfarbig, wenig glänzend, mit starken Wachstumsabsätzen. Vorderrand senkrecht etwas abgerundet, mit deutlichem Einkniff hinter dem Rande. Hinterrand etwas mehr abgerundet, 33—37 Mill. lang, 9—10 hoch,  $8\frac{1}{2}$  im Queerdurchmesser. Rechter und linker Zahn hinter dem Einkniff des Vorderrandes stehend. Innenseite auffallend röthlich, namentlich hinten. Athemröhren vereinigt, mit schwarzen Ringen wie eingeschnürt.

Singapore auf den Strassen verkauft, wahrscheinlich aus dem Schlamm der Flussmündung daselbst, v. Martens, Oct. 1861, auch von Zelebor in Singapore erhalten. Philippinen-insel Zebu, Cuming in der Dunkerschen Sammlung.

Die beiden folgenden sind zwar bis jetzt noch nicht aus Niederländisch-Indien bekannt, mögen aber doch als auffällige Formen aus der nächsten Nachbarschaft hier eine Stelle finden:

c) Rücken- und Unterrand etwas gebogen.

*Solen Woodwardi* Dkr.

Dunker Proc. Zool. Soc. 1861 p. 420; novitat. S. 70, Taf. 24, Fig.

3. Clessin Solenaceen S. 15, Taf. 6, Fig. 6.

*Solen Fonesii* Reeve conch. icon. XIX, fig. 29.

Oberrand etwas concav, Unterrand etwas stärker convex gekrümmt; Aussenseite glänzend hornbraun, fast einfarbig, die beiden Dreiecke kaum angedeutet. Vorderrand wenig schief, mit flacher, nach unten sich etwas erweiternder Furche. Kleine Stücke  $4\frac{1}{2}$  mal, grössere 5 mal so lang als hoch. Dunker's Exemplare 51—53 Mill. lang, 11—12 hoch, 7 im Durchmesser; Reeve's Figur 59 lang, 12 hoch.

Phillipinen, Insel Zebu, Cuming.

S. Fonesii Dunker Proc. Zool. Soc. 1861, p. 419 (vermuthlich Druckfehler für Jonesii) = Jonesii Reeve fig. 11 aus dem nördlichen Australien ist eine andere, nicht gekrümmte Art.

#### B) ENSIS Schumacher.

Links zwei zusammengedrückte Schlosszähne, senkrecht vom Schlossrand abstehend, nahe bei einander, den einen der rechten Seite zwischen sich nehmend. Dahinter links und rechts 1—2 schief zurückliegende Zähne. Manche Arten sichelförmig gebogen.

*Solen (Ensis) Luzonicus* Dkr.

Dunker Proc. Zool. Soc. 1861, p. 421.

Etwas gekrümmt, blass gelb, 82 Mill. lang, vorn 14, hinten 16 $\frac{1}{2}$  hoch, Queerdurchmesser 7 Mill. Links und rechts zwei schief liegende Zähnchen hinter den Hauptzähnen.

Philippinen, Insel Luzon.

Reeve's und Clessin's Abbildungen dieser Art, dort fig. 24 und pl. 7, fig. 20b, hier Taf. 12 (nicht 13) Fig. 7 passen nicht zu dem Exemplar in der Dunker'schen Sammlung, indem sie einen viel zu schiefen Vorderrand und eine mehr geradlinige Gestalt der ganzen Schale zeigen, auch bedeutend kleiner sind.

#### PHOLADIDAE.

Die grosse Mehrzahl der Arten von Pholas, Teredo und verwandten Gattungen sind ächt marin; manche finden sich allerdings gerne in treibendem Holz und werden dadurch weit verbreitet, so die meisten Teredo-Arten, Pholas (*Martesia*) *striata* L. = *clavata* Lam., Rumph's *Pholas lignorum* (amb. rar. S. 152 deutsch S. 147, Taf. 46, fig. H) und in Europa die Gattung *Xylophaga*. Die jungen Thiere dürften in der Regel im Meere selbst an das schon schwimmende Holz sich ansetzen. Doch sagt Rumph am angeführten Ort von *Ph. striata*, dass sie in vermoderten Pfählen wachse, welche in salzigem Wasser stehen, und von verschiedenen Hafenplätzen geht die Sage, dass die dort ankernden Schiffe leicht von Teredo inficirt werden. In Vorderindien sind auch zwei hieher gehörige Arten in ganz süssem Flusswasser

gefunden worden: *Pholas* (*Martesia*) *rivicola* Sow. im Flusse Pantai, 12 engl. Meilen oberhalb seiner Mündung in schwimmendem Holz und *Teredo* (*Nausitora*) *Dunlopei* P. Wright in einem Seitenarm des untern Ganges, Comer, oberhalb Mandarapore, 70 engl. Meilen oberhalb des Meeres, ohne nähere Angabe der Art des Vorkommens (*Transact. Linn. Soc.* XXIV 1864, p. 451); in beiden Fällen wird angegeben, dass das Wasser ganz süß war, obwohl der Einfluss von Fluth und Ebbe durch Stauung oder stärkern Abfluss des Wassers sich noch bemerklich macht. In Niederländisch-Indien ist meines Wissens etwas Ähnliches noch nicht beobachtet. Aber zwei Arten sind für die Mangle-gegenden so charakteristisch, dass sie hier angeführt werden müssen.

### **Pholas L.**

Untergattung *MARTESIA* (Leach) Blainv.

Jede Schale durch eine vom Wirbel herablaufende Furche in einen vordern und hintern Theil mit feilenartiger Skulptur getheilt, der hintere mit glatter zugespitzter Verlängerung, der vordere ebenfalls mit einem glatten, aber stark gewölbten Anhang, welcher die vordere Lücke völlig schliesst. Accessorische Schalenstücke ein breites über den Wirbeln, ein schmales über dem hintern Rückenrand und ein ebenfalls schmales über dem hintern Bauchrand. Alle Arten verhältnissmässig klein und bauchig, vorzugsweise in Holz bohrend.

#### **1. *Pholas* (*Martesia*) *striata* L.**

*Pholas lignorum* Rumph amb. rar. p. 152 (deutsch S. 147) Taf. 46, Fig. H (nicht gut). Gualtieri ind. test. tab. 105, fig. F.

— *striatus* Linne syst. nat. ed. X, p. 670. — *Ph. striata* Gmelin ed. XIII, p. 3215. *Encycl. meth.* pl. 170, fig. 1—3. Sowerby gen. of shells nro. 24 pl. 136, fig. 2 = Reeve conch. syst. pl. 24, fig. 2; thesaur. conch. II, fig. 40—42. Reeve conch. icon. XVIII, fig. 32.

— *pusillus* Linne syst. nat. ed. X, p. 671. — *Ph. pusilla* Gmelin ed. XIII, p. 3216. Chemnitz Conch. Cab. VIII. fig. 867—871.

— *clavata* Lamarck hist. nat. an. s. vert. ed. 1 nro. 9; ed. 2, VI, p. 46.

*Martesia striata* Gray in Ann. and Mag. n. h. (2) VIII, 384. Adams gen. moll. II, p. 330, pl. 90, fig. 5. Chenu manuel de conch. II, p. 9, fig. 48—50. Woodward manual p. 329, pl. 23, fig. 21.

Tryon Pholadacea p. 92. Clessin Pholadea in der neuen Ausgabe von Martini-Chemnitz S. 45, Taf. 10, Fig. 2, 3 und 7, 8.

Drei unpaare accessorische Schalenstücke, ein breites fast kreisförmiges über den Wirbeln, je ein schmales über dem hintern Rückenrand und dem hintern Bauchrand. Skulptur hinter der Furche ebenso dicht wie vor derselben.

(Molukken) in vermoderten Pfählen, welche in salzigem Wasser stehn, Rumph. Durch schwimmendes Holz weit verbreitet im indischen und atlantischen Ocean, zuweilen selbst bis zu den Küsten Englands gelangend, theils in der Holzwand von Schiffen, theils in treibenden Blöcken von Mahagoni—Holz. (Forbes-Hanley und Jeffreys).

## 2. *Pholas (Martesia) rivicola* Sow.

*Pholas rivicola* Sowerby thesaur. II, fig. 90, 91. Adams und Reeve Zool. Voy. Samarang, Mollusca p. 84, pl. 23, fig. 5; Reeve conch. icon. XVIII, fig. 22.

*Martesia rivicola* Gray loc. cit. p. 384. Tryon Pholadacea p. 91. Clessin Pholadea S. 44, Taf. 11, Fig. 5, 6.

*Parapholas fluminalis* Blanford in Journ. Asiat. Soc. (2) VI, 1867, p. 67, pl. 3, fig. 1, 3. Stoliczka Palaeontologia Indica III, p. 20, 24. Clessin c. a. O. S. 50, Taf. 13. Fig. 4, 5.

Vorderes accessorisches Schalenstück in zwei seitliche Hälften getheilt. Schale hinter der Furche viel glatter, nur mit entfernter stehenden, hauptsächlich von der Cuticula gebildeten concentrischen Lamellen. 27 Mill. lang und 11 hoch.

Ost-Borneo. Fluss Pantai bei Gunung Tabor, 12 engl. Meilen aufwärts von der Mündung, wo das Wasser schon süß ist, im schwimmenden Holz der Anlande, A. Adams. Petshaburi im Golf von Siam und im süd-chinesischen Meer unter 8° N. Br. in schwimmendem Holz, v. Martens, 8 Aug. 1860. Aus Port Canning, im Delta des Ganges, von Stoliczka eingesandt. Brackwasser von der Mündung des Irawaddi, Blanford.

Blanford's *Parapholas fluminalis*, von Stoliczka selbst erhalten, kann ich nicht wesentlich verschieden finden; wegen dem doppelten Schalenstück über dem Wirbel wurde sie zu *Parapholas* gestellt, aber im Übrigen gleicht die Schale viel mehr einer *Martesia* als einer *Parapholas*. Diese Art lebt also nicht nur in süßem, sondern auch in salzigem Wasser und kommt mit schwimmendem Holz bis ins offene Meer hinaus.

**Teredo L.**

Schale viel kleiner als das ganze Thier, von der Struktur und feilenartigen Skulptur einer Pholas, ungefähr so hoch wie lang, vorn und hinten stark klaffend, mit einer von den Wirbeln herablaufenden Furche aussen; innen jederseits ein langer gebogener Fortsatz. Körper in die Länge gezogen, nur ganz vorn von der Schale bedeckt, übrigens eine von der Schale getrennte röhrenförmige Kalkmasse absondernd und sich dadurch von der Umgebung isolierend. Athemröhren eine Strecke weit vereinigt, an ihrer Trennung mit einem Paar schalenartiger schaufelförmiger Kalkstücke (Paletten) versehen.

**4) FURCELLA LAM.**

Furcella Lam. 1801. Septaria Lamarck 1816. Clossonaria Ferussac 1821, corrigirt zu Clausaria von Menke 1828. Kuphus (Guettard) der neueren Autoren.

Röhre nach aussen nicht fest angewachsen, im Schlammgrund steckend, keulenförmig und ziemlich gerade, vorn dicker und durch ein dünneres Stück geschlossen, hinten zwei verhältnissmässig lange Gabelarme für die Athemröhren bildend, schon in der Mitte, bei äusserlicher Einheit, innen durch eine Scheidewand zweigetheilt. Paletten schaufelförmig, am freien breitem Ende concav mit Mittelrippe, der Stiel schlank und annähernd stielrund, etwas plattgedrückt und unregelmässig gebogen.

Seit Mörch wird diese Abtheilung von den meisten Autoren Kuphus oder Cuphus genannt, mit Berufung auf Guettards Werk von 1774; wenn man aber dieses selbst nachschlägt, S. 139 und 141, findet sich, dass er seine Gattung auf eine zweifelhafte Figur von Seba gegründet hat, thesaur. III, tab. 94, die Figur unterhalb der grossen Furcella, eine mehrfach gekrümmte etwas konische Röhre, aus deren breitem Ende ein keulenförmiger Weichkörper, aus dem schmalen ein schmalerer am Ende gegabelter Weichkörper hervorsticht. Guettard hat diese Figur als Typus seiner neuen Gattung in seinem Werk, Tafel 69, Figur 8 kopirt, und charakterisirt dieselbe als Meer-röhre (tuyau marin), deren Thier konisch und am hintern Ende gegabelt sei; dass die Röhre selbst sich gable, steht in der Gattungsdiagnose nicht und ist auch in der Figur nicht der Fall. Wenn diese überhaupt ge-



deutet werden kann, so liegt es am nächsten an eine eigentliche *Teredo* zu denken, deren Siphonen und Paletten das hintere gegabelte Ende bilden; auch die Grösse passt dazu. Nur ist die Röhre für *Teredo* zu vielfach gekrümmt. Die zweite Art Guettard's scheint eine *Vermetus*-röhre, ähnlich *lumbricalis*, locker spiralgewunden. Seine vierte und fünfte Art sind nun allerdings unsere *Teredo arenaria*, aber er stellt sie selbst nur mit Zweifel in diese Gattung und sie können also nicht den Ausschlag geben. Der Name *Kuphus* ist wohl das griechische Wort *κυφος*, gekrümmt, da Guettard öfters in seinen Namen das griechische Ypsilon dem Französischen entsprechend mit U wiedergibt.

1. *Teredo (Furcella) arenaria* L.

*Solen arenarius* Rumph amb. rar. p. 124 (deutsch S. 105) Taf. 41,

Fig. D. E., copirt bei Martini Conchylien-Cabinet I, Taf. 1, fig. 6.

*Serpula arenaria* Linne syst. nat. ed. X, p. 787 zum Theil, nicht ed. XII.

— *polythalamia* Linne syst. nat. ed. XII, p. 1266; Gmelin ed. XIII, p. 3742.

— sp. Schröter Einleitung in die Conchylien-kenntniss II, p. 557.

*Kuphus* nro. 4 und 5 Guettard memoires sur diverses parties de la physique III, 1774, p. 139, 140.

.... Griffiths in Philosophical Transactions, London 1806, p. 289, pl. 10, 11.

*Teredo gigantea* Home ebenda, pl. 12, fig. 4, 5; Oken, Lehrbuch der Naturgeschichte 1815 und allgemeine Naturgeschichte Thierreich II. S. 282.

*Septaria arenaria* Lamarck hist. nat. d. an. s. vert. ed. 1, V, 1818; ed. 2, VI, p. 331. Hanley recent bivalves p. 3; v. d. Hoeven Lehrbuch d. Zoologie I, S. 727.

*Furcella gigantea* Oken Naturgeschichte für Schulen 1821. Gray Proc.

Zool. Soc. 1857, p. 257, pl. 39, fig. 1—3, Paletten, und 1861, p. 313.

*Clossonaria* Ferussac tableaux syst. d. an. mollusques 1821, p. XLV, von Menke 1828 zu *Clausaria* corrigirt.

*Cuphus polythalamius* Gray list of genera (Proc. Zool. Soc. 1857) p. 189.

— *giganteus* H. und A. Adams genera mollusc. II, pl. 648. Reeve conch. icon. XX, fig. 1. Clessin Pholadeen in d. neuen Ausgabe von Martini und Chemnitz S. 79, Taf. 68.

*Septaria gigantea* Chenu manuel de conchyliologie II, p. 14, fig. 67, Röhre und Paletten.

*Kuphus arenarius* Percival Wright in Linnean Soc. Transact. XXV, 1866, p. 561 und 563.

*Cuphus-clausus* Reeve conch. icon. XX, fig. 2.

Einzelne Röhrenstücke sind abgebildet bei Lister hist. conch. III, 1692, pl. 1056, Seba thesaurus III, Tab. 94 (fig. 1, m, n, meist ohne Bezeichnung), Martini Conch. Cab. I, fig. 111, Klein descriptio tubulor. marin tab. 1, fig. 3, Favanne conch. pl. 5, fig. N, letztere von Lamarck syst. an. s. vert. 1801 als *Fistulana cornicula* und hist. nat. d. an. s. vert. 1816 als *F. corniformis* beschrieben, Chenu manuel II, p. 11, fig. 63.

Pulo-Batu (Tanah Massa und T. Balla) an der Westküste von Sumatra, Schlammgrund in 1—20 Fuss Tiefe, in verschiedenen Richtungen liegend, bis 1 Fuss aus dem Schlamm hervorragend, nach dem Erdbeben von 1797 gefunden, Griffiths. Insel Buru in der Einbucht von Kajeli auf sandigem, mit kleinen Steinchen vermischten Grund und Insel Ceram in der Bai von Amahai (Südküste) an den Wurzeln der Mangle-bäume, in schlammigem, knietiefem Morast, unter welchem harter Grund mit kleinen Steinchen, Rumph. Ich erhielt kleine Stücke nebst Paletten in Amboina und auch auf Singapore, in Holz.

Die ganze Länge gibt Rumph zu 2—3 Fuss, Griffiths bis 5 Fuss 4 Zoll an; im Museum für Naturkunde in Berlin ist ein Fragment von nahezu 1 Met. Länge, an welchem aber der ganze gegabelte Theil fehlt. Grösster Durchmesser der Röhre am vordern Ende nach Griffiths 9 Zoll, nach Rumph 2—3 Queerfinger, nach Woodward 2 engl. Zoll, an dem Berliner Stück 5 Cm., in einer Figur bei Reeve  $6\frac{1}{2}$  Cm. Dicke der Röhrenwand nach Griffiths bis  $\frac{1}{2}$  Zoll, nach Rumph wie ein Strohhalme oder selbst Federkiel, am Berliner Stück 8 Mill. Länge der Gabeltheile in Rumph's Abbildung 13 Cm.

Nach Rumph steckt die Röhre ziemlich senkrecht im Grund und die beiden Gabelenden ragen etwas über den Grund hervor, womit auch zusammenhängt, dass er letztere schmutzig und bewachsen, das eingegrabene Vorderende aber rein und weiss fand; was er von Aus- und Ein-ziehen sagt, bezieht sich wohl nur auf die fleischigen Athemröhren innerhalb der Gabelstücke der Kalkröhre. Griffiths fand die Röhren bis 1 Fuss aus dem Schlamm vorragend und in verschiede-

nen Richtungen liegend; da er aber ausdrücklich hervorhebt, dass er sie nach dem Erdbeben von 1797 gefunden habe, so ist es möglich, dass er sie nicht in normaler Lage fand.

Man hat zuweilen behauptet, *Kuphus* unterscheide sich dadurch, dass ihm die beiden eigentlichen Schalen am Vorderende fehlen, weil man sie eben in den leeren Röhren nicht gefunden hat. Aber schon Rumph sagt ausdrücklich, dass in der Mündung (dem dicksten Theile, also dem vordern Ende des Thiers entsprechend, während er die Kalkhülle der beiden Athemröhren als Wurzeln bezeichnet) zwei Beinchen, die wie eine Bischofsmütze zusammenstehen, im Fleische stecken, ohne an der Schale fest zu sein; das sind offenbar die beiden ächten Schalen, denen von *Teredo* und *Pholas* entsprechend. Das Vorhanden sein dieser Schalen ist dann auch von Home neuerdings bestätigt und Percival Wright hat eine in den Paletten ganz ähnliche Art mit Schalen als *Kuphus Manni* beschrieben. Auch erwähnen schon Rumph und Griffiths, dass die vordere Mündung der Röhre in der Regel offen, aber zuweilen auch geschlossen sei, wahrscheinlich verhält es sich damit wie bei *Martesia* und *Pholadidea*, wo die vordere Lücke zwischen den Schalen bei jungen Exemplaren, die noch weiter bohren, offen, bei erwachsenen durch eine Kalkplatte geschlossen ist; Reeve hat demnach Unrecht aus den geschlossenen eine eigene Art, *K. clausus*, zu machen. Immerhin ist es zu wünschen, dass wohlerhaltene Exemplare dieser Art und wo möglich auch ihre Jugendzustände von Naturforschern beobachtet würden und in die europäischen Museen kämen.

#### B) *HYPEROTUS GUETTARD.*

*Uperotis* Guettard 1778, von Hermannsen 1849 zu *Hyperotus* corrigirt, wahrscheinlich von ὕπερος, Mörserkeule. *Guetera* Gray 1846.

Röhre stark gekrümmt, am hintern Ende eng und einfach. Paletten schaufelförmig, in der Mitte der Aussenseite glänzend dunkelbraun, nach dem freien Ende zu glanzlos und divergirend gestreift. Gesellig.

#### 2. *Teredo (Uperotis) clava* Gm.

Herkules-keule Walch in d. Zeitschrift Naturforscher, Halle X, 1777, S. 38, Taf. 1, kopirt bei Oken allg. Naturgeschichte S. 284. Taf.

VI, Fig. 3, d, e. — Spengler ebenda XII, 1779, S. 53, Taf. 1, 2, copirt in der franz. Encycl. meth., Vers. pl. 167, fig. 6—16 und Oken a. a. O. fig. 3 a—c.

Uperotis nro. 2 Guettard mémoires sur diff. parties de la physique III, 1774, p. 126, pl. 70, fig. 8, 9.

Teredo sp. Schröter einleit. in die conch. II, S. 574, Taf. 6, Fig. 20.

— clava Gmelin Linne syst. nat. ed. XIII, 1791, p. 3748. — Clessin Pholadeen S. 78, Taf. 20, Fig. 4—8, v. Martens in Semon Forschungsreisen in Austr. und mal. Archip. V, S. 95, Taf. 4, Fig. 10 (Paletten).

— nucivora Spengler in Skrivter naturh. selsk. Kjöbenhavn II, 1792.

Deshayes in Cuvier regn. an. ed. illustrée, Moll. pl. 114, Fig. 4.

Fistulana gregata Lamarck syst. d. an. s. vert. p. 129, 1801; hist. nat. an. s. vert. ed. 1, 1818 nro. 3; ed. 2, VI, p. 31 und 29 (F. en paquet) Hanley recent bivalves p. 3.

Teredo clavata Oken Lehrbuch d. Naturgeschichte 1815.

Fistulana clavata Oken Naturgeschichte f. Schulen 1821; allgemeine Naturgeschichte, Thierreich II, S. 284, Taf. 19, Fig. 3. (nach Walch und Spengler). Deshayes traité element. pl. 2, fig. 15—18.

Guetera clava Gray list of genera of rec. mollusks (Proc. Zool. Soc. 1847) p. 188.

Uperotis cucurbita (Meuschen) Mörch catal. collect. Yoldi 1853, p. 2

Teredo corniformis (Lam.) Woodward manual 1856, p. 330.

— nuvicora (err. pro nucivora) Clessin Pholaden S. 72, Taf. 17, Fig. 15—18 (Copirt nach Reeve).

Molukken, speciell Amboina (Semon), gesellig eingebohrt in die dreieckigen, holzartig harten Fruchstücke von *Xylocarpus granatum* König = *Carapa moluccensis* Lam. (Miquel Flora van Nederlandsch-Indie I, p. 546, fam. Meliaceae, *Granatum litoreum* bei Rumph herbarium amboinense III, p. 92, tab. 61), ein Baum, der am Meeresstrande der Molukken und Timor's wächst; zwei ähnliche Arten von *Xylocarpus* an der Küste von Java. — Woodward sagt, diese Art lebe in Cocosnüssen und andern Früchten, P. Fischer nennt nur die Cocosnüsse. Kein Bruchstück einer Cocosnuss kann solche ebene Flächen zeigen, wie die Theilstücke von *Xylocarpus*, welche durch das Auseinanderfallen der Fruchtfächer entstehen und dadurch das Ansehen eines queer halbirten Schnitzes einer Apfelsine erhalten. Ich weis nicht, ob man annehmen darf, jene Autoren hätten solche Stücke für Fragmente einer Cocos-

nuss gehalten oder ob ein bestimmter Fall von ihrem Vorkommen in Cocosnüssen beobachtet ist.

Angegeben wird unsere Muschel ferner von Koromandel (Hanley) und dem Golf von Manaar bei Ceylon (Thurston). Guettard nannte die Art „quintivalve“ fünf-schalig, indem er zu den zwei regelmässigen Schalen noch die zwei Paletten und als fünftes Stück die Röhre zählt; das Fruchstück, in dem sie sitzen, hielt er für eine Art Schwamm.

Auch *Teredo* (*Calobates*) *thoracites* A. Gould mit eigenthümlich stelzen-oder krücken-förmigen Paletten, langgestielt mit kurzer tritt-förmiger Platte und darüber noch einem langen lattenförmigen Fortsatz (P. Wright Trans. Linn. Soc. XXV, 1866, p. 564, pl. 64, fig. 6—12 und v. Martens Journ. Linn. Soc. XXI, 1886, p. 174) lebt an der Küste von Mergui in alten Manglestämmen; da Paletten davon auch schon bei Singapore gefunden wurden, dürfte er auch noch in Niederländisch-Indien zu erwarten sein.

#### EINHEIMISCHE BENENNUNGEN.

Während für Landschnecken keine volks-üblichen Bezeichnungen innerhalb Niederländisch-Indiens mir weder auf meinen Reisen daselbst, noch in der Literatur vorgekommen sind <sup>1)</sup>, gibt es dagegen eine ganze Anzahl solcher für Süsswasser- und Brackwasser-Conchylien. Es rührt das wahrscheinlich daher, dass die letzteren durchschnittlich viel zahlreicher an Individuen vorhanden, desshalb leichter zu finden sind und von den Eingebornen vielfach als Speise benützt werden, und was der Mensch isst, das unterscheidet und benennt er auch. Über Essen von Landschnecken, in Süd-Europa so allgemein, ist mir dagegen aus Niederländisch-Indien nichts bekannt geworden.

Die Mehrzahl der im Folgenden aufgeführten Benennungen sind von Rumph angegeben, was durch R. bezeichnet wird; ob dieselben noch jetzt in den von ihm genannten Gegenden, meist Amboina oder Makassar, üblich sind, kann ich nicht angeben. Einige javanische sind nach Zollingers Mittheilungen bei Mousson genannt, meist aus dem westlichen Theil der Insel, also wohl in sundanesischer Sprache; die-

---

1) Eine Ausnahme bildet nur die grosse *Nanina Brookei*, welche auf Borneo als Schmuck verwendet wird und nach einer Mittheilung von Grabowsky von den Eingebornen in Mindai bu ai genannt wird.

selben sind mit Z. bezeichnet. Einige andere habe ich während meiner Reise gehört und notirt (M.).

*Ampullaria* malayisch *gondang* zu Pardana in Bantam Z.; ich notirte mir „*guntan*“ zu Palembang auf Sumatra, offenbar dasselbe Wort. Sundanesisch *tottan*, Z. Auf Celebes bei Makassar und Maros die grossen (A. *Celebensis*) *sisso salombe*, die mittlern *sisso kapeng*, die kleinen (junge oder A. *scutata*?) *sisso potir*; auf Tomboko *wonko* oder *wonke*, auf Bali *kakol*, R.

*Vivipara* bei den Eingebornen am Flusse Pramassan-alai im süd-östlichen Borneo *kaliting* oder *tambarukong* nach einer Mittheilung von Grabowsky.

*Melania diadema* und *setosa* auf Amboina holländisch-malayisch *papeytje*, die kleine bittere, daher der lateinische Name *amarula*; amboinesisch *laholum* oder *lahorum*, R. — *M. plicaria* malayisch auf Amboina *sipot* oder *sipot-ayer* (Wasser-s.), amboinesisch *sessu*, R. vgl. oben „*sisso*“ für *Ampullaria*.

*Faunus ater* auf Ternate malayisch *papatjo*, M., vermutlich dasselbe Wort wie das obige *papeytje*.

*Potamides palustris* malayisch auf Amboina *borangan*, amboinesisch *sipot ketjil* (kleiner s.), R.; (vergl. *Melania plicaria*), der Zusatz klein passt aber wenig für diese grössere Schnecke.

*Litorina pagodus* malayisch auf Amboina *kukussan-papuan*, R.

*Neritina pulligera* malayisch auf Amboina *bia-mattacu* (Rothaugen-schnecke), R., *N. brevispina* amboinesisch *hehul* R.

*Pythia scarabaeus* malayisch auf Amboina *bia ribut* (Regenschnecke) R., daher der Artname *imbrium* bei Montfort.

*Auricula Midae* holländisch auf den Molukken *slyk-rolle* (Schlamm-walze), was auf ihren Aufenthalt hindeutet, also in ihrer Heimat entstanden ist, während Midas-Ohr und Judas-Ohr von den holländischen Liebhabern in ihren Sammlungen ersonnen sind.

*Pseudodon tindgion-grogrò* malayisch <sup>1)</sup> in Sarawak, Issel.

*Unio productior* sundanesisch *kidjing*, Z.

*Cyrena coaxans* malayisch auf den Molukken *bia kodoq* (Frosch-muschel), daher bei den Holländern *quakker*, R. Vgl. S. 99.

---

1) In englischer Schreibweise.

*C. Buschi teccadjon-udgion* bei den Malayen in Sarawak, Issel.  
*Batissa Javanica* sundanesisch *toë*, Z.

*Corbicula* malayisch zu Palembang auf Sumatra *ramis*, M., zu  
 Tjikoya im westlichen Java *remis*, Z. Dasselbe Wort gilt nach  
 Rumph auf den Molukken für eine *Tellina*, daher der Artname  
*Tellina remies* bei Linne, der also mit unhörbarem zweitem *e*  
 zu sprechen ist. — *C. pullata* (Dayakorum Issel) bei den Malayen  
 in Sarawak *teccadjon-udgion*, Issel, derselbe Name wie für  
*Cyrena Buschi*.

*Ostrea mytiloides* malayisch auf Amboina *tiram basaar*  
 (grosse Auster) oder *tiram akkar*, holländisch *stok-oester*,  
 R. O. *folium sery-oester*, R. vgl. S. 222.

*Modiola* sp. *asusseng-bebek* (Enten-muschel) auf Amboina, R.  
*Psammotaea violacea* malayisch auf Amboina *bia bokassan*  
 (Brühen-muschel, vgl. S. 240) amboinesisch *blastol* oder *blas-*  
*tor*, R.

*Asaphis rugosa* malayisch auf Amboina *bia passir* oder *asus-*  
*sen passir* (Sand-muschel), R.

*Siliqua radiata* und *Cultellus cultellus* malayisch auf Amboina  
*bia pissou* (Messer-muschel) R.

*Solen* malayisch auf Amboina *bia butu*, *b. saron*, *b. kuku*  
 oder auch *krang sissu*, R.

*Teredo arenaria* malayisch *kappang besaar* R.

#### MEERES-KONCHYLIIEN VON PROF. WEBER GESAMMELT.

##### I. Von Sumatra,

in der Brandewijnsbaai, Padang, auf dem Korallenriff:

*Conus coronatus* Dillw.

*Purpura hippocastanum* (L.) var. *intermedia* Kien.

*Nassa olivacea* Brug. s. oben S. 217.

*Cypraea argus* L.

— *lynx* L.

*Turbo argyrostomus* L.

##### II. Von Java.

Insel Enkhuizen bei Batavia:

*Cypraea arabica* L. jung, die Mündungsränder schon gebildet, aber  
 auf der Rückenseite noch die Färbung des unerwachsenen Zustandes.

## III. Von Celebes.

## 1) bei Makassar.

*Murex capucinus* Chemn.*Nassa* sp. Fragment.*Cerithium corallinum* Defr.*Ostrea nigromarginata* Sow. flach an Holzstücke angewachsen.*Arca granosa* L. vgl. S. 228.*Cardium donaciforme* Spengl.*Mesodesma glabratum* (Lam.)*Donax faba* Chemn.*Cultellus javanicus* (Lam.)

## 2) Pare-Pare, nördlich von Makassar am Strand.

*Natica mamilla* (L.).*Arca* (*Barbatia*) *candida* Helbl.*Circe divaricata* (Chemn.)— *gibbia* (Lam.).*Cytherea meretrix* (L.)*Tapes* (*Hemitapes*) *striatus* (Gm.)*Macra antiquata* Spengl.

## 3) Mandhar, Westküste von Central-Celebes.

*Strombus canarium* L.

## IV. Von Flores

bei Maumerie.

*Oliva sanguinolenta* Lam.*Bulla ampulla* L.**ALLGEMEINE BEMERKUNGEN.**

Wenn wir die Süßwasser-Mollusken des malayischen Archipels im Ganzen überblicken, so finden wir zunächst eine Anzahl von Gattungen und Untergattungen, welche auch in Europa und überhaupt in verschiedenen Erdtheilen, namentlich auch Nord- und Südamerika, sich wiederfinden und der Süßwasserfauna den Eindruck einer relativen Gleichmässigkeit über die ganze Erde hin geben; hieher die Gattungen *Limnæa*, *Planorbis*, *Ancylus*, *Vivipara*, *Anodonta*, *Unio*, *Sphaerium* (*Cyclas*) und *Pisidium*, wie sich ja auch



unter den Süsswasser-Insekten und Süsswasser-Pflanzen manche, den europäischen sehr ähnliche Formen finden. Aber diese bilden doch eine Minderheit sowohl nach Zahl der Gattungen oder Untergattungen und Arten, als nach der Menge der Individuen und dem Volumen gegenüber den wesentlich den Tropenländern angehörigen Ampullarien, Melanien, Neritinen <sup>1)</sup> und Cyrenen (einschliesslich Corbicula). Diese sind so zu sagen circumtropisch, d. h. den tropischen Ländern der östlichen und westlichen Erdhälfte gemeinsam, doch zeigen sich unter ihnen auch schon einzelne bestimmte Gegensätze zwischen Amerika und der alten Welt: so haben die amerikanischen Ampullarien dünne hornige, die altweltlichen feste kalkige Deckel, die amerikanischen Cyrenen eine wenn auch kleine Mantelbucht, die altweltlichen keine und in diesen Beziehungen stimmen die Arten des malayischen Archipels ausnahmslos mit denen der Festländer von Asien und Afrika. Die Melanien und Neritinen sind im tropischen Amerika verhältnissmässig weniger zahlreich und manchfaltig als in Hinterindien und dem malayischen Archipel; die tropisch-amerikanischen Melanien bilden zwei eigene, der alten Welt fremde Abtheilungen, *Pachychilus* und *Doryssa*, die letztere von dem besten Melanienkenner A. Brot bereits als eigene Gattung betrachtet, *Pachychilus* desgleichen von P. Fischer. Die süd-amerikanische Süsswasserfauna unterscheidet sich ferner von der malayischen durch mehrere eigenthümliche Muschelgattungen wie *Hyria*, *Castalia*, und überhaupt die grössere Rolle, welche die Unioniden in Südamerika spielen, dann auch noch durch den Mangel der Gattung *Vivipara*, welche in Amerika südlich nicht über Cuba hinausreicht. In ähnlicher Weise unterscheidet sich die tropisch-afrikanische Süsswasserfauna von der malayischen ebenfalls durch die reichere Entwicklung der Unioniden mit mehreren eigenthümlichen Gattungen wie *Iridina*, *Spatha* und *Mutela* und namentlich *Aetheria*, sowie die viel geringere Zahl von Melanien und Neritinen, und den Mangel von *Cyrena* (abgesehen von *Corbicula*). Beide, sowohl die positiven als die negativen Unterschiede kennzeichnen die malayische Süsswasserfauna als die einer Inselwelt, die tropisch-amerikanische und tropisch-afrikanische als die grosser Festländer.

1) Ich rechne *Neritina* hier zu den tropischen und nicht zu den allgemein verbreiteten Gattungen, obwohl auch mehrere Arten in Europa leben, weil erstens sie sowohl in Nordamerika und Sibirien als dem aussertropischen Südamerika und Australien fehlen und die meisten und grössten Arten in den Tropengegenden leben und zweitens die Arten des malayischen Archipels andern Untergattungen als die europäischen angehören.

Um Ähnlichkeit und Unterschied der malayischen Süsswasserfauna von derjenigen der benachbarten geographischen Gebiete Vorder- und Hinter-Indien, Australien und Polynesien zu erkennen, müssen wir erst die hauptsächlichsten Familien besonders betrachten:

Die Limnaeiden oder luftathmenden Süsswasserschnecken sind von Hinterindien und Sumatra bis Celebes und Timor ziemlich gleichmässig verbreitet, aber in verhältnissmässig geringer Anzahl und in nicht sehr vom allgemeinen Typus differenzirten Formen; dieselben treten in Australien in theilweise reicherer Ausbildung, dagegen in Polynesien noch viel sparsamer auf; der malayische Archipel zeigt sich also auch hierin als insular gegenüber Australien. Die Gattung *Limnaea* speciell zeigt noch in Bengalen eine reichere Ausbildung, die Gruppe der *Limnaea acuminata* Lam., (siehe meine Conchologischen Mittheilungen I, Heft 5 u. 6, S. 75—87, Tafel 14 und 15), woran sich die hinterindischen und malayischen Arten zunächst anschliessen und dann wieder im äussersten Nordosten von Polynesien die eigenthümliche amphidrome, mehrfach verkannte Gruppe *Erinna*, (siehe meine Bemerkungen in Ann. Mag. nat. hist. (3), XVII, 1866, p. 207), wofern diese Artengruppe überhaupt noch zu *Limnaea* gehört. *Amphipeplea* ist im Gebiet des indischen Oceans sicher nur für die Philippinen nachgewiesen, bleibt noch zweifelhaft für Australien und ist aus Niederländisch-Indien noch nicht bekannt. *Physa* und *Isidora* müssen wir trotz wesentlicher Verschiedenheiten bei dieser Betrachtung noch zusammenfassen, da die Zugehörigkeit der nur nach Schalen bekannten Arten zu der einen oder andern zweifelhaft bleibt; sie fehlen merkwürdiger Weise bis jetzt in Vorder- und Hinter-Indien gänzlich, sind aber in Sumatra durch M. Weber's Sammlungen nachgewiesen, finden sich wieder, aber nicht zahlreich, in Celebes, den Molukken, Timor, Neu-Guinea und Polynesien bis zu den Sandwich-inseln, erreichen aber ihre reichste Entwicklung unter allen Ländern der Erde in Australien. *Planorbis* hat noch in Vorder- und Hinter-Indien sowie im nördlichen Theil von Sumatra eine grössere, dem europäischen *cornueus* nahe stehende Art, *Pl. Indicus*; im übrigen Theil von Niederländisch-Indien finden sich, wie auch in Australien und Polynesien (Viti-inseln) nur kleinere Arten aus der weitverbreiteten Gruppe des europäischen *Pl. albus* und ferner bis jetzt von Java bekannt ein Vertreter der in Europa und dem Festland von Asien weit verbreiteten Gruppe des *Pl. nitidus* (Segmentina). *Ancylus*, durch M. Weber für

Java und Celebes nachgewiesen, kommt auch in Vorderindien vor, ist aber bis jetzt noch nicht weder für Hinterindien, noch für Neuguinea und Polynesien aufgefunden. Wenn wir die erforderliche Rücksicht darauf nehmen, dass so kleine Süßwasserschnecken lange unbeachtet bleiben können, so dürfen wir wohl sagen, dass die Limnaeiden durch Niederländisch-Indien ziemlich gleichmässig, aber im Ganzen schwach vertreten sind, am schwächsten vielleicht auf den Molukken als den kleinern Inseln und im Ganzen gut mit denen des Festlandes von Indien stimmen, doch etwas ärmer vertreten sind, aber auch Eine auffallende Annäherung an Australien betrifft Isidora aufweisen.

Die Ampallarien sind in Vorder- und Hinter-Indien, Sumatra, Borneo, Java, Celebes und den Philippinen durch grosse, charakteristische Arten vertreten, fehlen aber weiter östlich völlig, sowohl den Molukken, Flores und Timor, als Neu-Guinea, Australien und Polynesien.

Vivipara verhält sich in den hier in Betracht kommenden Gebieten ähnlich wie Ampullaria, sie spielt eine ganz wesentliche Rolle unter den Süßwasser-Conchylien in Vorder- und Hinter-Indien, Sumatra, Borneo, Java, Celebes und den Philippinen, fehlt aber weiter östlich auf den Molukken (Ceram fraglich), Flores und Timor, sowie Polynesien, dagegen liegt ein wichtiger Unterschied darin, dass sie wieder in Neu-Guinea und Australien auftritt, und zwar in letzterem eigenthümliche, von den indischen abweichende Formen hat; hier ist also der Gegensatz nicht Indien und Australien, West und Ost, sondern Festland oder grössere Inseln gegenüber den kleineren.

Über die Melanien ist schon S. 29 das Nähere angegeben; im Allgemeinen kann man sagen, dass die charakteristischen Artengruppen derselben schon auf den Maskarenen und Vorder-Indien beginnen, reicher in Hinter-Indien ausgebildet sind und ziemlich gleichmässig durch Niederländisch-Indien bis Neu-Guinea und zu den Viti-inseln sich fortsetzen, während die entfernteren polynesischen Inseln und Australien viel ärmer an Melanien-formen sind; nur die Untergattung Brotia, für Bengalen, Hinterindien und die drei grossen Sunda-inseln sehr charakteristisch, schneidet scharf zwischen Borneo und Celebes ab, und auf Celebes tritt dafür eine eigene kleinere Artengruppe auf, diejenige von *M. perfecta* Mouss., welche übrigens auch noch auf Borneo und Timor Vertreter hat; die kleinen Artengruppen von *M. testudinaria* und *sulcospira* sind bis jetzt sicher nur von Java bekannt.

Die einzigen Süsswasser-Rhachiglossen *Clea* und *Canidia*, äusserlich den Melanien ähnlich, hat Hinterindien mit den drei grossen Sunda-inseln gemein, sie fehlen aber schon in Celebes und das Vorkommen von *Canidia* auf Timor bedarf noch der Bestätigung.

Die Neritinen und die ihnen nahe verwandten Navicellen sind ebenfalls ziemlich gleichmässig durch Niederländisch-Indien verbreitet, aber im Ganzen noch mehr insular als die Melanien, indem sie auf dem Festland von Vorder- und Hinter-Indien bedeutend schwächer vertreten sind, dagegen in vollem Formenreichthum noch über Neu-Guinea und die Viti hinaus bis zur Samoa-gruppe und Tahite reichen, und wieder im aussertropischen Australien fehlen. Durch den Besitz der grössten Art, der sehr eigenthümlichen *N. labiosa*, schliesst sich das nördliche Celebes besonders nahe an die Philippinen an.

Die Unioniden (vgl. S. 88) sind reich ausgebildet in China und Hinterindien, einige charakteristische grössere Formen von *Unio* finden sich auch auf der Halbinsel Malakka und in Sumatra (*U. delphinus*, *cucumoides*, *superbus*), die javanischen sind bescheidener und gleichen mehr den vorderindischen, die von Borneo sind wieder etwas mannichtiger. Auf Celebes, Flores, Timor und den Molukken fehlen die Unioniden, treten aber im östlichen Neuguinea und Australien wieder auf.

Von den Cyreniden ist die Gattung *Cyrena* ziemlich gleichmässig über Hinterindien und den malayischen Archipel bis Neuguinea verbreitet, *Batissa* ist auf dem Festland von Asien sehr spärlich (*B. triquetra* Desh. in Cochinchina), findet sich in verhältnissmässig grossen Arten auf den drei grossen Sunda-inseln, ferner auf Celebes, Neu-Guinea und noch auf den Viti-inseln, fehlt dagegen auf den Molukken, wo nur im Brackwasser grosse Cyrenen vorkommen, sowie auf Flores und Timor, soviel wir bis jetzt wissen. *Corbicula*, auf dem Festland von Asien weit verbreitet, lebt ebenfalls auf den drei grossen Sunda-inseln und auf Celebes, überspringt ebenfalls die kleineren östlichen Inseln, tritt aber wieder in Australien auf.

Im Ganzen können wir demnach sagen, dass betreffs der Süsswassermollusken der malayische Archipel am meisten mit dem Festland von Hinterindien übereinstimmt, in einigen Beziehungen ärmer ist, in andern aber reicher und nur in Einer Beziehung (*Isidora-Physa*) sich näher an Australien als an das Festland von Indien anschliesst. Ein Gegensatz zwischen der westlichen und östlichen Hälfte tritt nur darin hervor, dass die östlichen Inseln, wahrscheinlich weil sie

kleiner sind, im manchen Beziehungen ärmer sind und einzelner Formen ganz entbehren (Brotia, Unioniden). Dagegen treten in der östlichen Hälfte keine wesentlich neuen Typen auf, die in der westlichen fehlen würden; denn selbst die eben genannten Isidoren finden sich schon auf Sumatra; unter den Landthieren dagegen hat bekanntlich die östliche Hälfte auch ihre besonderen Formen (Beuteltiere, Kakatu, unter den Landschnecken Xesta und Planispira). Die Grenzlinie, welche Wallace zwischen Borneo und Celebes zieht, trifft nur für Brotia, Paludomus, Pachydrobia, Clea und die Familie der Unioniden zu, sie ist aber auch für diese wichtige Familie nicht eine Grenze zwischen Indien und Australien, sondern nur zwischen grossen und kleinen Inseln. Dagegen besteht keine Grenze zwischen Borneo und Celebes in Betreff der Limnaeiden, Ampullarien, der Gattungen Vivipara und Bithynia, von 7 unter 11 Untergattungen von Melania, 11 unter 14 Neritinen Gruppen und Navicella, ferner den Cyrenidengattungen Cyrena, Batissa und Corbicula, also entschieden bei der Mehrzahl der Süsswasserformen unter den Mollusken. Dabei ist noch besonders hervorzuheben, dass Celebes, wenn auch durch den Mangel der Unioniden der östlichen Hälfte d. h. den kleineren Inseln sich anschliessend, doch durch den Besitz von Ampullaria, Vivipara, Batissa, Corbicula, auch Bithynia, Planorbis und Ancyclus, die alle weiter östlich in Niederländisch-Indien fehlen, umgekehrt sich der westlichen Hälfte oder den grössern Inseln anschliesst. Es ist eben das Übergangsgebiet zwischen beiden.

Bei dem Interesse, welches gerade Celebes als Mittelglied zwischen Westen und Osten des Archipels hat, dürfte es von einigem Interesse sein näher anzugeben, wie sich nach unserer jetzigen, freilich noch sehr beschränkten Kenntniss die Arten der Süsswasser- und der Brackwasser-Mollusken auf dieser Insel zu den westlich und östlich davon gelegenen Inseln sowie unter sich zwischen dem Norden und Süden der Insel verhalten:

	Süsswasser-arten.	Brackwasser-arten.
Überhaupt auf Celebes	52	29
Eigenthümlich für die Insel	16	1
Gemeinsam nur mit Java, Borneo, Hinterindien oder den Philippinen		
(Asiatisch)	15	3

	Süsswasser-arten.	Brackwasser-arten.
Gemeinsam nur mit den östlicheren Inseln, Molukken und Flores (Australisch nach Wallace)	7	4
Gemeinsam mit beiden Gebieten	15	20
Gemeinsam zwischen Nord- und Süd-Celebes	15	7
Nur in Süd-Celebes	20	15
Nur in Nord-Celebes	17	7

So sehr diese Zahlen durch weiteres Sammeln sich verändern werden, so lässt sich doch schon Einiges daraus mit grosser Wahrscheinlichkeit erkennen. Zunächst die weit ausgedehntere Verbreitung der Brackwasser-bewohner (1 eigenthümliche, 20 dem Westen und Osten gemeinsame auf 29 überhaupt) als die der wirklichen Süsswasser-bewohner (16 eigenthümliche und nur 15 zugleich mit Ost und West gemeinsame auf 52 im Ganzen). Dann überschreiten gerade reichlich doppelt so viele die Wallace'sche Grenzlinie nach W. und N. ohne sich weiter nach Osten zu verbreiten, als die Grenzlinie einhalten und weiter im Osten, aber nicht im Westen vorkommen (15 zu 7). Es hängt das überhaupt damit zusammen, dass kleinere Inseln immer viel ärmer an echten Süsswasserthieren sind und die kleineren Inseln für Celebes eben im Osten liegen. Was den Unterschied zwischen Nord- und Süd-Celebes betrifft, so ist derselbe allerdings nicht so bedeutend als bei den Landschnecken, bei denen nach der im zweiten Band gegebenen Tabelle nur zwei beiden Theilen gemeinsame Arten auf 59 bis jetzt nur im nördlichen oder nur im südlichen Theil gefundene kamen, aber doch immerhin noch beträchtlich, 15 auf 37. Von grösseren charakteristischen Formen, die weniger leicht zu übersehen sind, lässt sich hervorheben, dass *Batissa* bis jetzt nur in Süd-Celebes, *Neritina labiosa* nur in Nord-Celebes gefunden ist. Allerdings kennen wir bis jetzt auch *Limnaea*, *Ancylus*, *Bithynia*, die Gruppe der *Melania perfecta* und *semicostata*, einzelne *Neritinen*-gruppen und *Corbicula* nur von Makassar, nicht von der Minahassa, aber da das meist kleine Formen sind, kann es auch darauf beruhen, dass eben in Süd-Celebes öfter und intensiver gesammelt wurde, namentlich auch jetzt durch Prof. Weber. Immerhin lässt sich aber daraus auch für die Süsswasser-Mollusken nachweisen, was schon bei den Landschnecken hervorgehoben wurde, dass Makassar sich näher an Java und

Flores, die Minahassa sich näher sowohl an die Philippinen als an die Molukken anschliesst, was auch nicht zu der Wallace'schen Grenzlinie stimmt, aber wohl mit der geographischen Lage. Hoffentlich erhalten wir bald durch die Sammlungen der beiden Sarasin nähere Kenntniss über die Mollusken von Nord- und Central-Celebes, ob und wo eine merkliche Naturgrenze innerhalb Celebes besteht.

Die Grenzlinie zwischen Bali und Lombok bleibt für die Süsswasser-Mollusken ganz imaginär, so lange wir fast nichts über die auf diesen Inseln lebenden Arten wissen; nur dass wir durch den alten Rumph von Ampullarien auf Bali hören, spricht dafür, dass Bali mehr mit Java als Flores übereinstimmt. Was durch Zollinger bei Mousson aus Sumbawa (Bima) erwähnt wird, schliesst sich genau an das Vorkommen in Flores an; für Flores im Vergleich zu Java aber zeigt sich dieselbe Übereinstimmung im Vorhandenen und in Verarmung in einzelnen Abtheilungen, wie überhaupt zwischen der östlichen- und westlichen-Hälfte des Archipels.

Unter den oben als vorzugsweise charakteristisch für den malayischen Archipel hervorgehobenen Familien der Ampullarien, Melanien, Nertinen und Cyrenen bilden nur die Ampullarien eine scharf umgränzte, ausschliesslich dem Süsswasser angehörige Familie. Die Melaniiden dagegen enthalten schon verschiedene Brackwasser-bewohner und sind durch kein einzelnes Kennzeichen scharf von den nächstverwandten Meerbewohnern z. B. Cerithien zu trennen. Die Neritinen enthalten selbst einige marine Arten und es ist kaum möglich eine bestimmte Grenze zwischen ihnen und den meerbewohnenden Neriten zu ziehen; sie sind auch im Allgemeinen auf Inseln und in Küstenländern viel reicher vorhanden als im Innern des Festlandes, wo sie schon in mässiger Höhe ihre Grenze finden, viel früher als die Limnaeiden (vgl. meine Monographie von Neritina S. 284 und 291). Die Cyrenen werden gewöhnlich mit Sphaerium und Pisidium zusammen als gut abgeschlossene Süsswasserfamilie betrachtet, enthalten aber doch mehrere Brackwasserformen, sowohl unter den lebenden Arten, (vgl. S. 230) als unter den fossilen (s. Sandberger Land- und Süsswasser-Conchylien der Vorwelt S. 9 und 19); auch gehören sie nach der allgemeinen Organisation von Weichtheilen und Schale in die grössere Abtheilung der Veneraceen, welche überwiegend marin ist. Es ergibt sich darauss der überraschende Schluss, dass die im malayischen Archipel vorherrschenden und für ihn charakteristi-

schen Süßwasser-Mollusken sowohl organisch als geographisch von den marinen weniger entfernt sind, als die für die kälteren Länder charakteristischen Süßwasser-Mollusken, nämlich die circumpolaren Limnaeiden, welche den Landschnecken näher stehen als den Meerschnecken, und die innerhalb der Bivalven scharf gesonderten Unioniden.

Es liegt daher um so näher an die Betrachtung der Mollusken des süßen Wassers gleich diejenige der Brackwasser-Mollusken anzuknüpfen, indem diese sich oft der Familie, nicht selten selbst der Gattung nach nicht von ihnen trennen lassen. Wenn wir die Brackwasser-Mollusken, für den malayischen Archipel speciell die Mollusken der Mangle sumpfe, im Ganzen dem Vorkommen nach dadurch von denen des Landes und der Süßwassers trennen können, dass sie nur in der Küstenzone, nicht im Binnenland und im Gebirg zu finden sind, so ist es dagegen schwer die Brackwasser-Mollusken von denen des Meeres überhaupt scharf zu trennen; die Mangle-Sümpfe bilden eben eine bestimmte Facies der Meeresküste und wo man nicht nähere Angaben über die Natur der Fundorte hat, kann man im Zweifel bleiben, ob eine Art noch zu den Brackwasser-Mollusken im obigen Sinn oder schon zu den eigentlichen Meeresbewohnern gehört. Ich habe daher in der Bearbeitung bei den Littorinen, den Psammobien und Soleniden etwas weiter gegriffen und alle mir bekannt gewordenen Arten aus Niederländisch-Indien genannt, obwohl einige wahrscheinlich oder sicher Bewohner flachen Sandstrandes oder auch (Littorinen) von Felsenküsten sind und so schon der eigentlichen Meeresfauna angehören.

Die Brackwasser-Mollusken in diesem Sinne sind noch mehr gleichmässig durch Niederländisch-Indien verbreitet, als die Süßwasser-Mollusken, viele gehen von Ost-Afrika bis tief nach Polynesien durch und ein irgend wie erheblicher Gegensatz zwischen der westlichen und östlichen Hälfte von Niederländisch-Indien, den grossen und den kleinen Inseln lässt sich hier gar nicht erkennen, wie die speciell für die Brackwasser-Mollusken entworfene Tabelle zeigt; wenn Vorderindien auf derselben verhältnissmässig arm erscheint, so rührt diess hauptsächlich daher, dass an dessen Meeresküsten verhältnissmässig selten Conchylien gesammelt wurden, wir eigentlich nur Ceylon und die anliegende Festlandküste, sowie Bengalen in dieser Beziehung näher kennen.

---



# I. ÜBERSICHT DER VERTHEILUNG DER ARTEN

## IN NIEDERLÄNDISCH-INDIEN.

### PULMONATA

#### AURICULIDAE

#### *Pythia*

#### *Cassidula*

#### *Plecotrema*

#### *Auricula*

#### *Auriculastra*

Sumatra <sup>1)</sup>	Java	Borneo <sup>2)</sup>	Celebes	Molukken	Bali <sup>4)</sup> bis Flores	Timor <sup>5)</sup>
pantherina, undata	pantherina (plicata) (undata)	trigona, plicata imperforata (scarabaeus) pantherina, Borneensis	imperfiorata (pantherina)	scarabaeus, pantherina, undata, pollex, striata semisulcata	undata	scarabaeus,
auris-felis (Bk.) multiplicata (Bk.) mustelina	auris-felis, mustelina, faba (triparietalis Bali)	auris-felis, mustelina, gruneri	.....	turgida, mustelina, triparietalis, sulculosa, lutescens, flaveola, bensoni	mustelina(Bk.) triparietalis sulculosa	
.....	(imperforatum Madura)	exaratum, punctigerum, punctatissimum	.....			
Midae, Judae (Scheepmakeri)	Midae, Judae (Mörchi)	Midae, subnodosa, Judae	Midae, Judae	Midae, Judae	Judae	Judae
.....	.....	Dunkeri Pfr.	.....	subula	subula	

1) Bk. nur auf Banka, (Bk.) auch auf Banka.

2) SO nur in Südost-Borneo, O nur an der Ostküste.

3) Sl. auf den Saleyer-Inseln.

4) (B.) Bali, Lk. Lombok Bm. Bima (Sumbawa) Sb. Sumba.

5) R. Rotti.

und zwar ohne Klammern wenn die Art nur auf der so bezeichneten Insel in dem betreffenden Gebiet vorkommt, in Klammern, wenn auch sonst in demselben Gebiet, also z B auf Sumatra selbst, Flores.

**PULMONATA****AURICULIDAE****Melampus****? Canefria****LIMNAEIDAE****Limnaea****Isidora****Planorbis****B) SEGMENTINA****Ancylus****ONCIDIIDAE****Oncidium****Oncis**

Sumatra	Java	Borneo	Celebes		Molukken	Bali	Timor
.....	granifer, fasciatus, luteus	Siamensis	Süd	Nord	fasciatus, nucleolus, sulculosus	bis Flores fasciatus, edentulus	fasciatus
.....	.....	splendens	.....	.....	.....	.....	.....
Javanica (Bk.) brevispira	Javanica	Javanica	Javanica	.....	.....	Javanica (Sb.)	Javanica, Timorensis, perlevis?
Sumatrana, stagnalis	.....	.....	ovalina	Minahassae, Celebensis	Moluccensis	.....	Timorensis
Indicus, Sumatranus, proclivis	compressus,	.....	compressus	Tondanensis	.....	.....	.....
.....	calathus	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Javanus	.....	Celebensis	.....	.....	.....	.....
.....	.....	nigrum	.....	.....	Amboinae, Paluense, verruculatum	.....	verruculatum
.....	coriacea	.....	coriacea, lata	.....	coeca, coriacea	.....	.....

## PROSOBRANCHIA

## AMPULLARIIDAE

## Ampullaria

## PALUDINIDAE

## Vivipara

## Bithynia

## Paludomus?

## Stenothyra

## Pachydrobia

## ASSIMINEIDAE

## Assimineae

## A) Ohne Kiel

## B) Cycloptropis

Sumatra	Java	Borneo	Celebes	Molukken	Bali bis Flores	Timor
ampullacea (Bk.) involuta Mouss. coll., scutata (Bk.)	ampullacea scutata, fuliginea?, polita, Borneensis?	ampullacea scutata, polita?, Borneensis	Süd ampullacea scutata	Nord ampullacea	.....	.....
grossicosta, Javanica, Su- matrensis, Hamiltoni? Ingallsiana??	costata, Java- nica, gratiosa, richthofeni?	costata var., Javanica, Su- matrensis Hamiltoni Sermelinki (S. O.)	costata var., Javanica var. (Sl.)	Javanica?	.....	.....
.....	truncata	.....	truncata	.....	.....	.....
olivacea	.....	lutea, Borne- ensis, Broti, Isseli, Everetti	.....	.....	.....	.....
.....	Moussoni	strigilata	Moussoni	ventricosa	.....	.....
lacustris	.....	parva	.....	.....	.....	.....
.....	.....	brevicula, cornea, Moussoni, Borneensis	brevicula, variegata	.....	.....	.....
.....	.....	carinata, ra- diata, lirata	.....	.....	.....	.....
carinata Banka, lirata Banka	.....	.....	.....	.....	.....	.....

LITTORINIDAE	Sumatra	Java	Borneo	Celebes		Molukken	Bali bis Flores	Timor
<b>Littorina</b>				Süd	Nord			
A) LITTORINOPSIS	scabra (Bk.) intermedia Bk. carinifera (Bk.) undulata	scabra, inter- media, carinifera, conica undulata	scabra, mela- nostoma <sup>1)</sup> carinifera albicans <sup>1)</sup> conica <sup>1)</sup>	scabra . . . . .	. . . . .	scabra, inter- media undulata	scabra undulata	undulata
B) TECTUS	. . . . .	pagodus	. . . . .	. . . . .	papillosa	pagodus	. . . . .	pagodus, papillosa
C) NODILITTORINA	vilis Bk.	vilis	. . . . .	. . . . .	. . . . .	ventricosa	. . . . .	
D) MELARRAPHE	ventricosa, var. Krak. subgranosa Krak. biangulata	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .			
MELANIIDAE								
<b>Melania</b>								
A) BALANOCHELIS	. . . . .	glans, pisum ?	. . . . .	. . . . .	. . . . .	glans	glans (Bm.)	
B) TESTUDINARIAE	. . . . .	testudinaria, foeda, anguli- fera	. . . . .	. . . . .	. . . . .	testudinaria ?		
C) SULCOSPIRA	. . . . .	sulcospira	. . . . .	. . . . .	. . . . .			
D) BROTHIA	Sumatrensis, episcopalis, curvicosta, subplicata, papillosa stricticosta zollingeri	infracostata (Mouss.) agrestis	episcopalis (brookei), sparsinodosa, agrestis, circumstriata, clavaeformis, torquata zollingeri ? hippocasta- num					

1) Diese drei Arten auch bei Pleyharie, Gebiet von Banjermassin, nach Schepman.

E) STENOMELANIA a) Normales	Sumatra	Java	Borneo	Celebes		Molukken	Bali bis Flores	Timor
	.....	plicaria?, acutissima	turris?	Sud	Nord	plicaria, funiculus, turris	plicaria (Bl. Bm.), sp. (aspirans Mss.) Bm. cincta, acutissima, funiculus turris, scipio rustica	constricta
	bisinuata	rustica, javanica, obesula	Tayloriana	.....	.....	Moluccensis Qg		
	.....	terebriformis, monile?	acicula,	amabilis	.....	monile?		monile
d) Spirisculptae	.....	crenulata, se miornata, semicancel- lata arcte- cava	Tayloriana	crenulata	uniformis crenulata	crenulata, mindorcensis, litigiosa Moluccensis artecava fulgurans?	semiornata, uniformis crenulata litigiosa	uniformis
	laevigata??	ornata	Labuanensis	.....	punctata		punctata, endeana clavus (Sb.)	laevigata, Timorensis clavus
f) Acuminatae	.....	tristis	distinguenda?	clavus	clavus	clavus Papueusis?		
g) Humerosae	.....	angulifera	.....	.....	cochlidium, costellaris		Tenkatei Sumba	pireniformis
F) MELANOIDES a) Instrictae	.....	.....	subsuturalis, disjuncta?	perfecta, robusta, wallacei, buginensis vincta	.....	.....	perfecta	wichmanni

	Sumatra	Java	Borneo	Celebes		Molukken	Bali bis Flores	Timor
				Süd	Nord			
b) Incisostriatae	crepidinata	inhonesta, crepidinata	crepidinata			sp.		
c) Elevatostratae	tuberculata, pulchella	tuberculata, cylindracea, unifasciata	tuberculata	tuberculata (Sl.) fontinalis	tuberculata	tuberculata	tuberculata adonarae	tuberculata
G) »Plonia»	scabra, gra- num, datura	Scabra, gra- num Savi- nieri, myuros	scabra	scabra (Sl.)	scabra	scabra, myuros, pagoda, rudicostis.	scabra (Bl. Bm. Sb.)	scabra, rudicostis
H) MELANIA s. str.	Cybele (am- ara) setosa?	setifera (Fruhst.)		setosa?		diadema, villosa?	setosa (Bl.)	
I) TIARORSIS	Bocki, Snelle- mani	Winteri, drilliiformis, Herklotsi	Herklotsi (SO)			rudis	armillata Sumba	
K) TAREBIA	spectabilis granifera (Banka) li- neata, flavida, dissimulans	granifera, crenifera margaritata coflea und asperula, lineata, flavida	lineata spectabilis (SO) coflea (SO)	celebensis (Sl.) granifera	lateritia, Ce- lebensis, obliterans granifera	lateritia, granifera, verrucosa	celebensis granifera (Bm.) granospira Bl.	granifera
L) SERMYIA	(Riqueti Banka) pinguicula	semicostata, subcancellata, Riqueti	semicostata, Riqueti	semicostata, Riqueti		semicostata		semicostata
Faunus (Pirena)		ater		ater	ater	ater		ater
PLANAXIDAE			decollata (O.)			decollata		
Quoyia								

CERITHIIDAE	Sumatra	Java	Borneo	Celebes		Molukken	Bali bis Flores	Timor
Potamides				Sud	Nord			
A) TEREBRALIA	palustris, sulcatus	palustris, sulcatus	palustris	palustris, sulcatus	palustris, sulcatus	palustris, sulcatus	sulcatus	sulcatus
B) TELESCOPIUM	.....	telescopium	telescopium	.....	.....	telescopium	.....	tenerimus R. telescopium
C) TYMPANOTONOS	cingulatus (fluvialis)	cingulatus	cingulatus micropterus	cingulatus	.....	cingulatus	.....	
D) CERITHIDEA	ornatus, char- bonnieri	ornatus	obtus, quadratus, decollatus, rhizophora- rum, charbon- nieri, corneus	quadratus	.....	quadratus, ornatus	ornatus (Sb.)	obtus, quadratus, ornatus. Tenkatei (R.)
NASSIDAE								
Canidia	.....	Helena, Temminkiana	Temminkiana	.....	.....	.....	.....	Helena
Clea	Bocki	.....	nigricans, costulata	.....	.....	.....	.....	
NERITIDAE								
Neritina	.....	.....	.....	.....	labiosa	.....	.....	
A) NERITONA	.....	.....	rubicunda	auriculata	auriculata	auriculata	auriculata	
B) AURICULATAE	auriculata	.....	crepidularia	crepidularia	crepidularia	.....	crepidularia	
C) MITRULA	crepidularia (Bk.)	crepidularia	.....	.....	Bl.	.....	.....	
D) HEMISPHAERICAE	iris, pennata	pulligera?, iris, Bruguierei	cryptospira, pennata	pulligera, iris	pulligera, iris, conglom- bata, Petiti	pulligera, iris, larga conglobata?, Petiti, asperulata	pulligera	iris
E) SULCULOSAE	guerini	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
F) ACULEATAE	aculeata	.....	aculeata	.....	.....	.....	sulculosa	

	Sumatra	Java	Borneo	Celebes		Molukken	Bali bis Flores	Timor
G) SERRATAE				Süd	Nord			
	gagates?, variegata, ziczac, communis?, turrata	variegata, ziczac, communis?, turrata	ziczac, turrata	variegata, ziczac, communis	variegata, ziczac, communis, turrata	variegata, ziczac, Roissiana communis, turrata	variegata, ziczac, communis, turrata (Bl. Sb.)	variegata, ziczac
H) NERITODRYAS								
I) CLITHON								
aa) Spinosae								
	cornea	dubia, cornea	dubia	cornea	cornea subsulcata	dubia, cornea, subsulcata	»dubia Bl.« cornea Bl.	
bb) Sculptae								
	brevispina (Bk.)	diadema, brevispina	.....	diadema, brevispina	brevispina,	souleyetana, diadema, brevispina	diadema, (Bl.) brevispina (Bm.)	brevispina
	.....	squarrosa	.....	angulosa	squarrosa	angulosa, squarrosa	angulosa, discors, squarrosa (Bl.)	squarrosa
cc) Calvae								
	subpunctata Bk., solum	faba, subpunctata, flavovirens, fuliginosa, subocellata	avellana, flavovirens	faba, flavovirens	subocellata	avellana? faba?, subpunctata, punctata, olivacea, Poucheti	faba (Bl.) subpunctata, confluens, flavovirens Bl.	
dd) Submarinae								
	Ualanensis (Bk.)	Ualanensis	Ualanensis	Ualanensis	Ualanensis	Ualanensis	.....	Ualanensis
K) NERITILIA								
Septaria								
A) SUBORBICULARES								
	sculpta, suborbicularis	Junghuhnii, suborbicularis	.....	.....	Luzonica, suborbicularis	Luzonica? Janellei? suborbicularis, parva	janellei, suborbicularis, parva Bm.	suborbicularis
B) TESSELLATAE								
Nerita								
	tessellata lineata Bk., planospira Bk.	tessellata planospira	.....	tessellata	tessellata planospira	tessellata planospira	tessellata	tessellata planospira



**RIVALVIA****OSTREIDAE****Ostrea****A) s. str.**

Sumatra	Java	Borneo	Celebes	Molukken	Bali	Timor
.....	.....	.....	Nord	mytiloides,	Bali	
cucullata	.....	.....	Süd	nigromar-	bis Flores	
.....	.....	.....	ginata	nata, echinata	mytiloides,	
.....	.....	.....	.....	folium,	echinata.	
.....	.....	.....	.....	cucullata,	.....	vitrea
.....	.....	.....	leucosticta	subramosa	.....	
granosa	granosa	granosa	granosa	granosa	.....	granosa
exilis Lea	nodifera					
vandembu-	exilis Lea (po-	walpolei, cras-				
schianus	lita Mouss)	sus, aeneolus,				
.....	vandembu-	insularis				
.....	schianus,	Velthuizeni				
.....	zollingeri,	Shepm.				
superbus Lea.	crispatus					
(macropterus	.....					
Dunk.)	.....					
Hageni Strub.	evanescens, Ja-	Semmelinki,				
(Sumatrensis	vanus, exilis,	prolongatus,				
Lea, 1859).	Mederianus,	lingulatus,				
Sumatrensis	mutatus,	Trompi				
Dkr. 1852.	orientalis, pro-					
Palembangen-	ductor, dimo-					
sis Strub.	tus, Sumatren-					
	sis Dkr.					

**B) ALECTRYONIA****AVICULIDAE****Perna****MYTILIDAE****Modiola****ARCIDAE****Arca****UNIONIDAE****Anodonta****Pseudodon****Unio****A) DELPHINOIDEI****B) BULLATI****C) MARGINALES**

	Sumatra	Java	Borneo	Celebes		Molukken	Bali bis Flores	Timor
<b>Unio</b>								
D) Plicatuli	.....	.....	Borneensis (plicatulus)					
E) Rotundati	.....	caudiculatus <sup>1)</sup> (lugens) sacculus						
F) Verrucosi	Verbecki, cu- cumoides	.....	radulosus					
<b>LUCINIDAE</b>								
<b>Lucina</b>								
A) Anodonta	Philippinarum	.....	.....	.....	.....	edentula	.....	Philippinarum
<b>CYRENIDAE</b>								
<b>Cyrena</b>								
A) Proclives	sumatrensis	impressa, Moussoni	triangularis, buschi					
B) Suborbiculares	.....	.....	laevis	suborbicu- laris	suborbicularis	.....	.....	sp.
C) Expansae	.....	expansa	.....	.....	.....	Moluccensis coaxans, cyprinoides		
D) Cyprinoideae	.....	eximia, sinuosa	.....	.....	coaxans			
<b>Batissa</b>								
A) Rotundatae	Jayensis	Jayensis, Java- nica	compressa					
B) Ellipticae	.....	.....	.....	violacea varr.				
<b>Corbicula</b>								
A) Transversae	Molkeana	Javanica	.....	subplanata				
B) Tumidae	tumida	.....	tumida	celebensis				

1) Anmerkung: Unio fulvaster Drouet und U. infrastratus Schepman dürften mit caudiculatus zusammenfallen.

CYRENIDAE	Sumatra	Java	Borneo	Celebes		Molukken	Bali bis Flores	Timor
<b>Corbicula</b>				Sud	Nord			
C) TRIANGULARES			Cumingi	ducalis				
	ducalis, tra- pezoidea, an- gulfifera, pullata, lacustris gibba	ducalis, sulcata, gracilis, pullata	pullata					
D) SUBAEQUILATERAE		rivalis, pulchella	Borneense Sow. Rv.					australe Lam.
E) TENUES								
<b>Sphaerium</b>								
<b>Pisidium</b>	sumatranum							
GLAUCOMYIDAE								
<b>Glaucomya</b>	Sumatrensis	virens?	virens					
PSAMMOBIDAE								
<b>Soletellina</b>		rostrata, diphos				atrata		
<b>Elizia</b>	orbicularis		orbicularis					
<b>Psammotellina</b>	pallens Bintang	fluvialilis				serotina		
<b>Psammotaea</b>		violacea	radiata			violacea	radiata, violacea, elongata tennis	radiata
<b>Psammobia</b>								
A) PSAMMOCOLA		occidens, radiata		Denikei		grata, tristis, insignis, radiata		
<b>B) HETEROGLYPTA</b>		caerulescens truncata (bi- partita), squamosa	striatella			striatella, truncata, scabra, praestans	caerulescens pulchella	

	Timor					
	Sumatra	Java	Borneo	Celebes	Molukken	Bali bis Flores
PSAMMOBIIDAE						
Asaphis						
SOLENIIDAE						
Solecurtus		Philippinarum				
Siliqua A)	rugosa	rugosa			rugosa	
	radiata	radiata Belcheri? pulchella?		radiata	radiata	
— B)	Winteriana	Winteriana	Winteriana			
Cultellus s. str.	attenuatus	scalprum	maximus			
— (PHARELLA)	Javanicus	Javanicus, acuminatus	olivaceus, Javanicus			
— (ENSICULUS)		cultellus			cultellus	Dunkerianus, ? marmoratus
Solen						
a)		curtus, Becki, corneus	corneus, linearis, (exiguus)	curtus	curtus	Timorensis
b)			Delesserti		pictus	
PHOLADIDAE						
Pholas						
MARTESIA			rivicola		striata	
Teredo						
(CUPHUS)	arenaria				arenaria	
— (UPEROTIS)					clava	

## 2. ÜBERSICHT DER VERBREITUNG DER GATTUNGEN UND UNTERGATTUNGEN.

### 1. SÜSSWASSEN MOLLUSKEN.

	Vorder-Indien	Hinter-Indien	Sumatra, Borneo, Java	Celebes	Philippinen	Molukken Flores Timor	Neu-Guinea bis Neu-Caledonien	Australien	Polynesien
<b>Pulmonata</b>									
Limnaea	+	+	+	+	+	+	?	+	
Amphipeplea	.....	.....	.....	.....	+	.....	??	?	
Isidora (Physa)	.....	.....	+	+	+	+	+	+	+
Physastra	.....	.....	.....	.....	.....	.....	+	+	
Planorbis	+	+	+	+	.....	.....	+	+	
Segmentina	+	+	+	.....	.....	.....	+	+	
Ancylus	+	.....	+	+	.....	.....	.....	+	
<b>Taenioglossa</b>									
Ampullaria	+	+	+	+	+				
Vivipara	+	+	+	+	+	?	+	+	
Bithynia	+	+	+	+	.....	.....	.....	+	
Paludomus?	+	+	+						
Lacunopsis	.....	+							
Jullienia	.....	+							
Pachydrobia	.....	+	+						
Tatea	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	+	
Melania									
Balanocochlis	+	+	+	.....	+	+	+		
Testudinaria	.....	.....	+	.....	.....	.....	.....	?	
Sulcospira	.....	.....	+						
Brotia	+	+	+						
Stenomelania	.....	.....	+	+	+	+	+	+	+
Melanoides	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plotia	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Plotiopsis	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	+	+
Melania s. str.	.....	+	+	.....	+	+	+	+	+
Tiaropsis	.....	.....	+	.....	+	+	+		
Tarebia	+	+	+	+	+	+	+		+
Sermyla	+	?	+	+	+	+	.....	+	
<b>Rhachiglossa</b>									
Canidia	.....	+	+	.....		+	+		
Clea	.....	.....	+						
<b>Rhipidoglossa</b>									
Neritina									
Neritaea	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Neritodryas	.....	.....	+	+	+	+	+	.....	+
Clithon	+	+	+	+	+	+	+		+
Navicella	+	+	+	+	+	+	+	?	+
<b>Bivalvea</b>									
Modiola	.....	+	.....	+					
Dreissena	.....	+							
Arca (Scaphula)	+								



	Vorder-Indien	Hinte-Indien	Sumatra, Borneo, Java	Celebes	Philippinen	Molukken Flores Timor	Neu-Guinea bis Neu-Caledonien	Australien	Polynesien
<b>Rhipidiglossa</b>									
Neritina	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Nerita	...	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Docoglossa</b>									
Acmaea	...	+							
<b>Bivalvia</b>									
Ostrea	+	+	+	+	+	+	+	...	+
Perna	...	...	+	...	...	+	+		
Mytilus	...	+		...	...				
Modiola	...	+		...	...	+	+	+	
Arca	...	+	+			+	+		
Scaphula	...	+							
Lucina	+	+	+						
Cyrena	+	+		...	...	+	+		
Glaucomya	...	+	+	...	+	...	?		
Soletellina	+	+	+	...	+	+	...	+	
Elizia	...	+	+						
Psammotellina	+	+		...	+	+			
Psammotaea	...	+	+	...	+	+	+		
Psammobia	+	...	+	+	+	+	+	+	
Asaphis	...	+	+	...	...	+	+		
Solecurtus	+	+	+	...	+				
Novaculina	+	+							
Siliqua	+	+	+	+					
Cultellus	+	+	+	+	+	+	...	+	
Solen	+	...	+	+	+	+	+	+	
Pholas									
Martesia	...	+	+						
Teredo									
Cuphus	...	+	+	...	+				
Uperotis	+	...		...	+				

## L I T E R A T U R.

Zu der schon Band II, S. 247—250 angeführten Literatur ist als Süss- und Brackwasser-Mollusken betreffend hinzuzufügen:

Für den malayischen Archipel überhaupt.

- E. von Martens. Land- und Strandschnecken der Molukken in Pfeiffer's Malakozoologischen Blättern 1863, S. 68—87 und 105—136, der Inseln östlich von Java, ebenda S. 169—180.
- Ueberblick der Najadeen (Unioniden) des indischen Archipels. Ebenda S. 10—17.
  - Ueber die ostasiatischen Limnaeaceen. Ebenda S. 211—227.
  - *Limnaea Javanica* in dessen Conchyliologische Mittheilungen Band I, Heft 5 und 6, 1881, S. 87—91, Taf. 16.
  - Uebersicht der während der Reise um die Erde in den Jahren 1874—76 auf S. M. Schiff *Gazelle* gesammelten Land- und Süsswasser-Mollusken, in den Monatsberichten der Kgl. Akademie der Wiss. in Berlin, Mai 1877, S. 261—291, Taf. 1, 2, Timor, Amboina und Lucipara betreffend, Sammler Dr. Theophil Studer.
  - Ueber die Süsswasser-Mollusken des malayischen Archipels, in den Sitzungsberichten d. Gesellsch. naturforschender Freunde in Berlin 1881, S. 109—111.
  - Mollusken in Semon Zoologische Forschungsreisen in Australien und dem malayischen Archipel Band V (Jenaische Denkschriften VIII) 1894, S. 83—96, Taf. IV. Java und Amboina betreffend.
- A. Brot. Note sur quelques espèces de *Melanies* nouvelles, in *Recueil zoologique Suisse* tome IV no. 1 1886, pag. 87—109, pl. 5—7: *Melania Verbeeki* Böttg. mscr. p. 90, pl. 4, fig. 9, Sumatra; *Mel. Savinieri* p. 93, pl. 5, fig. 9. Fluss Tanabang bei Batavia, Dr. de la Savinière; *Mel. Tayloriana* p. 104, pl. 7, fig. 2. Borneo.
- A. Böttger. Ad. Strubell's. Konchylien aus Java II und von den Molukken, im Bericht d. Senckenbergischen naturf. Gesellschaft in Frankfurt a. M. 1891, S. 241, 318, Taf. 3 und 4.

Sumatra und Java.

- M. Schepman. *Neritina* (*Clithon*) *subocellata*, Not. Leyd. Mus. VII, 1884, p. 49, pl. 4, fig. 3.
- On a collection of shells from the Moluccas in: Notes from the Leyden Museum XV, 1893, p. 147—159, pl. 3.



Br. Strubell. Neue Süsswasser-Conchylien aus Sumatra und Java, in Nach-  
richtsblatt d. deutsch. Malakolog. Gesellsch. 1897, S. 8—12. (Nach  
Ansicht der Original-Exemplare halte ich *Microcondylaea hagenii* für  
*Pseudodon zollingeri* var. *angulosus* Mouss., *Micr. gracilis* für identisch  
mit *Unio Palembangensis* desselben Autors, *Micr. bicristata* für eine  
jüngere Form der *hagenii*, *Unio hagenii* für *U. Sumatrensis* Lea, non  
Dkr., *Melania strigata* für *foeda* Lea und *Mel. Palembangensis* für eine  
Variation von *M. Sumatrensis* Brot.).

Für Borneo.

- M. Schepman. Malakologische Bijdragen, in Tijdschr. d. nederl. dierk. Ver-  
eeniging (2) I, 1885, *Clea costulata*.  
— *Paludina Semmelinki* in Tijdschrift der nederl. dierkundige Vereeniging 1888.  
E. von Martens. *Unio Semmelinki* in den Sitzungsberichten d. Gesellsch. naturf.  
Freunde in Berlin 1891, S. 121.  
Ausserdem konnte ich eine Anzahl von Conchylien, welche Dr. Sem-  
melink bei Heyhane in Südost-Borneo gesammelt hat, für die vorlie-  
gende Zusammenstellung benützen.  
H. Drouet. Unionidae in Chaper Voyage à Borneo vol. V, 1892, p. 145—154,  
zwei Tafeln, 8 Arten.  
— Description de deux Unionidae de Borneo in Revue Biologique du Nord de  
la France VI, 1893—94, 3 pp. mit zwei Holzschnitten: *Unio prolongatus*  
und *Pseudodon insularis*. Dieselben auch beschrieben im Journal de Con-  
chyliologie 1895, p. 36 und 37.  
M. Schepman. The Mollusca of the Dutch Scientific Borneo Expedition in  
Notes from the Leyden Museum vol. XVII, p. 145—162, pl. 2—4, 1895.  
— On *Unio infrarostratus*. Ebenda XVIII, p. 140 (= *caudiculatus* Marts).

Inseln östlich von Java:

- M. Schepman. Land- und freshwater-shells collected by Dr. H. ten Kate in  
Soemba, Timor and other East-Indian Islands. Notes from the Leyden  
Museum XV, 1892, p. 145—160, pl. 6.  
— A new *Potamides*. Not. Leyd. Mus. XVI, 1894, p. 133, pl. 6.  
v. Martens. Einige Land- und Süsswasser-Schnecken von den Inseln Lombok  
und Bonerate. Setzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde  
zu Berlin. 1896. Dec. S. 157—165.

Ausserdem sind wichtig für die nähere Kenntniss der Süsswasser-  
Mollusken des malayischen Archipels die in Küster's und Kobelt's neuer  
Ausgabe des systematischen Conchylien-Cabinet's von Martini und  
Chemnitz enthaltenen Monographien der Gattung *Neritina* 1879  
und *Navicella* 1881 von E. v. Martens, der Familie der *Mela-  
niaceen* von A. Brot und der *Cycladeen* (*Cyreniden*) von S. Clessin  
1874—79.

## TAFEL-ERKLÄRUNG.

### TAFEL I.

- Fig. 1. 2. *Limnaea brevispira* n., See von Manindjau, von oben und von der Mündungsseite, anderthalbfach vergrössert; 1b von oben in natürlicher Grösse.
- » 3. 4. *Limnaea Javanica* var. *costulata* n., Tjipanas.
- » 5. » » » *intumescens* Marts., mit weissen Flecken, Bonthain auf Celebes.
- » 6. *Limnaea Javanica* var. *turgidula* n., Ajer-tabit auf Sumatra.
- » 7. » » » *angustior* n., Pare-Pare auf Celebes.
- » 8—10. *Planorbis Sumatranus* n., Danau di bawah, Sumatra, von der Mündungsseite, von oben und von unten, 4 fach vergrössert; 9b von oben in natürlicher Grösse.
- » 11—13. *Planorbis proclivis* n., Ajer tabit, in denselben Stellungen, 3 fach vergrössert.
- » 14—16. *Planorbis proclivis* n., Ajer tabit, jung, in denselben Stellungen, 4 fach vergrössert.
- » 17—19. *Planorbis compressus* Hutt., Makassar, jung, in denselben Stellungen, 3 fach vergrössert.
- » 20—22. *Planorbis compressus* Hutt., Makassar, in denselben Stellungen, 6 fach vergrössert.
- » 23—25. *Planorbis Tondanensis* Q. G., See von Tondano, in denselben Stellungen, 6 fach vergrössert.
- » 26—29. *Isidora Sumatrana* n., Ajer tegenang, mehrere Variationen in der Form von demselben Fundort, Fig. 26 normale oder Mittelform.
- » 30. 31. *Isidora ovalina* n., Bonthain, zwei Variationen von demselben Fundort.
- » 32—34. » *stagnalis* n., See von Manindjau, doppelt vergrössert; Fig. 33 Spitze von der Seite, 34 von oben, beide 4 fach vergrössert.
- » 35—37. *Ancylus Javanus* n., Buitenzorg, 35, 36 von oben, 37 von der Seite. 5 fach vergrössert.
- » 38. 39. » *Celebensis* n., Pare-Pare, Celebes, von oben und unten, 6 fach vergrössert.

## TAFEL II.

- Fig. 1. 2. *Vivipara Javanica* var. *Moussoni* n., ganz jung, Buitenzorg, Mündungs- und Rückenseite, 3 fach vergrößert, daneben Umriss in natürlicher Grösse.
- » 3. *Vivipara Javanica* var. *Saleyrica* n., Saleyer-inseln.
- » 4. » » var. *Celebensis* n., Palopo
- » 5. 6. » *costata* Q. G. var. *laevior* n., See von Sidenreug, Celebes, Fig. 5 und See von Tempe, Fig. 6. Die Fig. 6b stellt ein Stück der Oberfläche desselben Stückes von der Schulterkante zur untern Kante in den Verlängerung der Naht in doppelter Grösse dar, um die Skulptur zu zeigen.
- » 7. 8. *Vivipara grossicosta* n., See von Singkarah, Sumatra. Fig. 7 erwachsen, 8 jünger.
- » 9. 10. *Melania foeda* Lea jung, Buitenzorg, in 2 Altersstufen, 3mal vergrößert, daneben Umriss in natürlicher Grösse.
- » 11—13. *Melania Sumatrensis* Brot var. *mitescens* Marts., Ajer-tabiet, Sumatra. Fig. 11 erwachsen, in natürl. Grösse; Fig. 12, 13 jung, 3-mal vergrößert.
- » 14. *Melania curvicosta* n., See von Manindjau.
- » 15. » *subplicata* Schepm., See von Manindjau, Sumatra.
- » 16—18. » *Verbecki* Böttg., See von Singkarah, drei in der Ausbildung der Skulptur verschiedene Stücke von demselben Fundort.
- » 19—20. *Melania Verbecki* var. *laevis* n., Fig. 19 erwachsen, in natürlicher Grösse, See von Singkarah; Fig. 20 jung, doppelt vergrößert, Ajer-tabiet.
- » 21. *Melania papillosa* n., See von Singkarah.
- » 22—26. *Melania stricticosta* n., See von Singkarah. Fig. 22—24 erwachsen in natürlicher Grösse, 25 jung,  $1\frac{1}{2}$  fach vergrößert, 26 noch jünger, doppelt vergrößert.

## TAFEL III.

- Fig. 1. *Melania acutissima* Busch, jüngeres Exemplar von Mbawa, Flores.
- » 2. » » Busch, älteres Exemplar, ebendaher.
- » 3. » *uniformis* Q. G. var. *crispulata* n., Koinino, Timor. 3b Skulptur doppelt vergrößert.
- » 4, 5. » *uniformis* var. *aequisulcata* n., Mbawa, Flores. 4b Skulptur doppelt vergrößert. 5 jüngeres Stück.
- » 6. » *uniformis* var. *plicatula* n., Saleyer.
- » 7. » *bisinuata* n., Donah, Flores.
- » 8. » *semiornata* Brot, Donah, Flores.
- » 9. 10. » *litigiosa* Brot, jung aus dem Fluss Donah, Flores.
- » 11. » *clavus* Lam., Fluss Donah, Flores.
- » 12. » *litigiosa* Brot, Bari, Flores. 12b Skulptur dreifach vergrößert.
- » 13. » *amabilis* Reeve, Tempe, Celebes. 13b Rückenseite.
- » 14. 15. » *laevigata* Lam., 14. Kupang, Timor. 15. inkrustirtes Exemplar von Rotte.
- » 16. 17. » *perfecta* Mouss., Celebes. 16. von Maros. 17. junges Exemplar von Bantimurong, Celebes.

- Fig. 18—20. » *robusta* n., Pare-pare, Celebes. 19, 20. jung.  
 » 21. » *Buginensis* n., Balang-nipa, Celebes.  
 » 22. » *Wallacei* Reeve, jung. Maros, Celebes.  
 » 23—25. » *vineta* n., Bantimurong, Celebes. 22. Rückenseite. 23. vorletz-  
 Windung doppelt vergrößert.  
 » 26. 27. » *Wichmanni* n., Kupang, Timor. 26. jung. 27. erwachsen.

## TAFEL IV.

- Fig. 1. *Melania tuberculata* Müll. var. *seminuda* n., Adonara. 1b Skulptur, dreimal vergrößert.  
 » 2. 3. » *tuberculata* Müll. var. *angularis* n., Kaju-tanam, Sumatra.  
 » 4. » *tuberculata* Müll. var. *truncatula* Lam., Passuruan, Java.  
 » 5. » *Adonarae* n., Adonara. 5b Spitze vierfach vergrößert.  
 » 6. » *scabra* Müll. var. *spinulosa* Lam., sehr gross. Mbawa, Flores.  
 » 7. » » *nodosocostata* Mouss., Adonara.  
 » 8. » » *angulifera* n., Kaju-tanam, Sumatra.  
 » 9—12. » » *mutica* n., verschiedene Abstufungen im Verschwinden der Knoten an den untern Windungen. 9 von Rotti. 10 und 11 von Bantimurong auf Celebes, 12 von Mbawa auf Flores.  
 » 13—16. » *Bocki* Brot, Seen auf Sumatra, 13—15 natürliche Grösse, 16 ein junges Exemplar dreifach vergrößert.  
 » 17—20 » *pinguicula* n., See von Singkarah, Sumatra, dreifach vergrößert.  
 » 21—22 » *pulchella* n., See von Singkarah, Sumatra. Mündungs- und Rückenansicht, beide dreifach vergrößert.  
 » 23. 24. Deckel von *Melania rustica* Mouss., 23. Aussenseite. 24. Innenseite. Typische Form des Melaniendeckels.  
 » 25. » *Melania* (Brotia) *Sumatrensis* Brot.  
 » 26. » » » *subplicata* Schepm.  
 » 27. » » » *curvicosta* n.  
 » 28. Junges Exemplar von *Melania Sumatrensis* Brot in natürlicher Grösse.  
 » 29. *Melania Celebensis* Q. G. var. *obsoleta* n., Minralang, Celebes.  
 » 30. » » » var. *minor* n., Palima, Celebes in Brackwasser.  
 » 31. » » » var. *annectens* n., Palopo, Celebes.  
 » 32. » *dissimulans* n, Deli, Sumatra.  
 » 33. *Potamides tenerrimus* Schepm., Salzsee Oemassapoka auf Rotti. 33<sup>b</sup> Mündung von der Seite.

## TAFEL V.

- Fig. 1. 2. *Unio Verbecki* Böttg., See von Singkarah, Sumatra. 1. rechte Schale von aussen. 2. von oben.  
 » 3. *Batissa violacea* Lam. var. *Celebensis* n., Tjenrana-Fluss, Celebes. Rechte Schale von innen, linke von aussen.  
 » 4. 5. *Unio Verbecki* Böttg., See von Singkarah. 4. linke Schale von innen. 5. ganz jung  
 » 6. *Batissa violacea* Lam., ganz jung. Maros, Celebes.  
 » 7. » » Lam. var. *extensa* n., Maros, Celebes. Rechte Schale von innen, linke von aussen, ebenso bei den Folgenden.

- Fig. 8. *Batissa violacea* Lam. var. *Macassarica* n., Makassar, Celebes.  
 » 9. » » » var. *discoidea* n., Maros, Celebes.

## TAFEL VI.

- Fig. 1. *Cyrena coaxans* Gm., Batjan. Rechte Schale von innen, linke von aussen; ebenso bei den Folgenden.  
 » 2. *Cyrena coaxans* Gm., jung. Ceram.  
 » 3. » » noch jünger. Ceram.  
 » 4. » *Moluccensis* n., Batjan.

## TAFEL VII.

- Fig. 1—6. *Corbicula Moltkeana* Prime, See von Manindjau, Sumatra, individuelle Form-verschiedenheiten, linke Schale von aussen. 3. rechte Schale von innen. 4. Ansicht von vorn.  
 » 7—10. » *subplanata* n., Fluss Minralang Celebes.  
 » 11—13. » *Celebensis* n., Makassar, Celebes.  
 » 14—19. » *trapezoidea* n., Danau di atas, Sumatra, Fig. 19 jung.  
 » 20—24. » *lacustris* n., See von Singkarak, Sumatra. Fig. 21. jung. 22. linke Schale von innen. 23. rechte Schale von innen.  
 » 25—27. » *gibba* n., Danau di atas, Sumatra.  
 » 28—31. » *angulifera* n., Danau di atas, Sumatra.  
 » 32, 33. » *rivalis* Busch, Java.

## TAFEL VIII.

- Fig. 1. *Pythia trigona* Troschel, Singapore. Kopf des lebenden Thiers.  
 » 2. *Cassidula multiplicata* Marts., Singapore. Kopf des lebenden Thiers.  
 » 3. » *Sowerbyana* Pfr., Singapore, lebendes Thier.  
 » 4. *Melampus fasciatus* Desh., Timor, lebendes Thier, natürliche Grösse.  
 » 5. » *Singaporensis* Pfr., Singapore, lebendes Thier, ein wenig vergrössert.  
 » 6. *Auricula Judae* L., Singapore, lebendes Thier, natürliche Grösse. b. Fühler von der Innenseite, c. Fühler von der Aussenseite, beide mit dem unter der Haut durchscheinenden Auge, beide vergrössert.  
 Diese Figuren, 1—6 nach von E. v. Martens 1861 und 1862 gemachten Skizzen.  
 » 7—11 *Auricula Judae* L., verschiedene Schalenformen, 10 von Singapore, 11 von Singkawang auf Borneo.  
 » 12—14 *Cassidula auris-felis* Brug., verschiedene Schalenformen von Bangkok in Siam.  
 » 15. » *mustelina* Desh., ungewöhnlich kleines Exemplar.  
 » 16. » *triparietalis* n., Batjan, ein klein wenig vergrössert.  
 » 17. » *sulculosa* Mouss., Amboina, grösstes Exemplar.  
 » 18. » *lutescens* Pfr., Dodinga, Halmahera. Vergrössert.  
 » 19. » *flaveola* Marts., Ceram. Vergrössert.  
 » 20. *Melampus sulculosus* Marts., Amboina. Etwas mehr als doppelt vergrössert.  
 » 21. » *nucleolus* Marts., Amboina. Ebenso vergrössert.  
 » 22. » *edentulus* Marts., Larentuka. Ebenso vergrössert.

- Fig. 23. *Melampus Singaporensis* Pfr., Singapore. Doppelt vergrößert.  
 » 24. » *Siamensis* Marts., Petshaburi, Siam. Doppelt vergrößert.

## TAFEL IX.

- Fig. 1. *Isidora Minahassae* n., See von Tondano; 1b von der Rückseite.  
 » 2. » *Celebensis* Marts., Celebes.  
 » 3. 4. » *Timorensis* (Sow.) Delhi, Timor.  
 » 5. *Melania perfecta* Mouss. Maros. Deckel.  
 » 6. » » » jung; 6b oberste Windungen dreimal vergrößert.  
 » 7. *Stenothyra Moussoni* n., Makassar. Lebendes Thier.  
 » 8. *Melania scabra* Müll., Bari, Flores, junge Schale, dreifach vergrößert.  
 » 9. » » » » » Deckel.  
 » 10. Deckel von *Melania acutissima* Busch, Flores.  
 » 11. *Bithynia truncata* Eyd. Soul., Luwu, Celebes. Doppelt vergrößert. 11b Spitze von oben, vierfach vergrößert.  
 » 12—15. *Pachydroma lacustris* n., See von Singkarak, Sumatra. 12 typisch, 13 var. *subglobosa*, 14 jung, 15 noch jünger; alle dreifach vergrößert.  
 » 16—18. *Pisidium Sumatranum* n., Sumatra. 16 größeres, 17 kleineres Exemplar, von der rechten Seite, 16b und 17b dieselben von oben, alle 5 fach vergrößert. 18a Schloss der linken. 18b Schloss der rechten Schale. 18c rechter Cardinalzahn, alle drei sehr vergrößert.  
 » 19. *Assiminea variegata* n., Luwu, Celebes, 19b Rückseite. Beide dreifach vergrößert.  
 » 20. *Assiminea carinata* Lea, Siam, 20b von unten. Natürliche Größe.  
 » 21. » *brevicula* var. *miniata* Marts., Singapore, dreifach vergrößert.  
 » 22. *Potamides (Cerithidea) obtusus* Lam., Singapore. 22b Rückseite.  
 » 23. » » *quadratus* Sow., Singapore. 23b Rückseite.  
 » 24. » (*Pyrasus*) *palustris* L., aufgeschnitten um die Falten an der Columella, an den Scheidewänden und an der Innenseite der Aussenwand zu zeigen.  
 » 25. *Potamides (Pyrasus) palustris* L., unausgewachsen, solche Falten an der Mündung zeigend.  
 » 26. *Littorina biangulata* n., Benkulen, Sumatra. 26b Rückseite.  
 » 27. *Potamides (Pyrasus) sulcatus* Born, aufgeschnitten um die Falte an der Columella zu zeigen.

## TAFEL X.

- Fig. 1. 2. *Vivipara Sumatrensis* Dkr., Solok, Sumatra.  
 » 3. *Assiminea brevicula* var. *miniata* Marts., Singapore, lebendes Thier, 3 von oben, 3b von unten.  
 » 4. *Potamides (Cerithidea) quadratus* Sow., Singapore, Kopf von oben.  
 » 5. » » *obtusius* Lam., Singapore, Kopf von oben.  
 » 6. *Assiminea carinata* Lea, Siam, lebendes Thier von oben.  
 » 7. *Potamides (Cerithidea) quadratus* Sow., Singapore, Kopf von unten.  
 » 8. *Melania plicaria* var. *cincta* Lea, Flores, 8b Rückseite, 8c Skulptur doppelt vergrößert.


- Fig. 9. *Neritina confluens* n., Sikka, Flores, 9b Deckel von aussen, 9c im Profil, 9d von innen, 9e Rückseite der Schale, natürliche Grösse, 9fg junge Exemplare von Donah, Flores, 2 u. 3 fach vergrössert.
- » 10. *Neritina iris* var. *Wichmanni* n., Koinino, Timor, mit Deckel, 10b Schale von oben.
- » 11. *Neritina faba* Sow., Maros, Celebes, doppelt vergrössert. 11b Rückseite, 11c Deckel von aussen, 11d Deckel von innen, ebenfalls doppelt vergrössert., 11e Schale in natürlicher Grösse.
- » 12. *Neritina flavovirens* Busch, Balanga-Nipa, Celebes, jung mit Stacheln, 12b von oben, beide dreifach vergrössert.
- » 13. *Septaria Janellei* Recluz, Reo, Flores, von oben, 13b von unten, 13c von der Seite.
- » 13. *Neritina variegata* Less., jung, Maros, Celebes. 14b Rückseite, beide doppelt vergrössert, 14c natürl. Grösse.
- » 15. *Neritina flavovirens* Busch, jung, Balang-Nipa, Celebes, einfarbig, zweimal vergrössert.
- » 16. *Neritina flavovirens* Busch, jung, Balang-Nipa, Celebes, bunt, zwei- und einhalbmals vergrössert.
- » 17. *Neritina (Neritilia) consimilis* n., Luwu, Celebes, 17b Rückseite, beide vierfach vergrössert, 17c natürliche Grösse, 17d Deckel von aussen, 17e Deckel von innen, beide vierfach vergrössert.
- » 18—21. *Modiola leucosticta* n., Fluss bei Maros, Celebes, 4 verschiedene Exemplare, doppelt vergrössert.
- » 22. *Psammotellina connectens* Marts., Banka. 22b von innen, 22c von oben.
- » 23. » *Semmelinki* n., Bezuki, Java, 23b von innen, 23c von oben.
- » 24. *Psammotellina Semmelinki* n., kleinere Form von Tanah-lant, Borneo, 24b von innen, 24c von oben.
- » 25. *Psammobia Denikei* n., Makassar, 25b von innen.

## TAFEL XI.

- Fig. 1. *Lucina edentula* L., Molukken. 1b von oben.
- » 2. » » jung.
- » 3. » *Philippinarum* Hanl., jung, Timor. 3b von oben, Wirbel stark abgerieben.
- » 4. *Lucina Philippinarum* Hanl., erwachsen. 4b von oben.

## TAFEL XII.

- Fig. 1. Zungenzähne von *Limnaea brevispira* n., Sumatra. 300 fach vergrössert. Die einzelnen Zahlen bezeichnen, der wievielte Zahn von dem mittelsten (m) an nach aussen gezählt der betreffende ist. Ebenso bei den folgenden Figuren.
- » 2. Zungenzähne von *Limnaea Javanica* Mouss. var. *angustior*, Rotti, 300 fach vergrössert.
- » 3. Kiefer von *Limnaea brevispira* n., 25 fach vergrössert.
- » 4. » » » *Javanica* Mouss. var. *angustior*, 25 fach vergrössert.





E. Duval del.

A. J. J. Wendel lith.

P. W. M. Trap impr.








E. Duval del.

A. J. J. Wendel lith.

P. W. M. Trap impr.






E. Duval del.


AJJ. Wendel lith.

PWN. Trap impr.

















E. Duval del.

A.J.J. Wendel lith

P.W.M. Trap impr.















E. Duval del.

A. J. V. endel lith.


P. W. M. Trap impr.














1b.



2.




4b




1.



3b.



3.




4.

E Duval del.

A.J.J. Wendell lith.

P.W.M. Trap impr.





Protz del.

A.J.J. Wendel lith.

P.W.M. Trap impr.



- Fig. 5. Zungenzähne von *Isidora ovalina* n., Celebes. 300 fach vergrößert.  
 » 6. » » *Planorbis Sumatranus* n., Sumatra. 300 fach vergrößert.  
 » 7. Zungenzähne von *Planorbis compressus* Hutt., Celebes. 300 fach vergrößert.  
 » 8. Zungenzähne von *Ancylus Celebensis* n., Celebes. 300 fach vergrößert.  
 » 9. Stilet des *Planorbis Sumatranus* n., 50 fach vergrößert.  
 » 10. Penis » » *compressus* Hutt., 14 fach vergrößert.  
 » 11. Zungenzähne von *Vivipara Javanica* var. *Celebensis* Mouss. 300 fach vergrößert.  
 » 12. Verschiedene Formen des Fusses am lebenden *Cultellus Javanicus* Lam., Singapore, nach dem Leben vom Verfasser gezeichnet.

Alle Figuren dieser Tafel, mit Ausnahme der letzten, von Hrn. Protz nach Untersuchung an Spiritus-Exemplaren gezeichnet.



## ALPHABETISCHES NAMENREGISTER.

---

Alle Namen von Gattungen und Untergattungen sind mit grossen, alle Artnamen mit kleinen Anfangsbuchstaben geschrieben. Wenn derselbe Artname in mehreren Gattungen vorkommt, ist der Name der Gattung abgekürzt beigesetzt. Wenn derselbe Name auf mehreren Seiten vorkommt, ist diejenige zuerst erwähnt, auf welcher er näher besprochen wird.

### A.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p> <i>abbreviata</i> Polyd. 139.<br/> <i>abbreviatus</i> Solecurt. 259.<br/>                 — Solen 272.<br/> <i>aberrans</i> 127.<br/> <i>Acamptostylae</i> 40.<br/> <i>acanthica</i> 62. 63.<br/> <i>acicula</i> Hel. 56.<br/>                 — Mel. 40.<br/> <i>aculeatum</i> 66.<br/> <i>acuminata</i> Mel. 50.<br/>                 — Phar. 269.<br/> <i>acuminatus</i> Sol. Cult. 269.<br/> <i>acus</i> 50.<br/> <i>acutidens</i> 266. 267.<br/> <i>acutirostris</i> 225.<br/> <i>acutissima</i> 40. 42.<br/> <i>adonarae</i> 51. 59.<br/> <i>aequisulcata</i> 48.<br/> <i>affinis</i> 57.<br/> <i>alatum</i>, -us 185.<br/> <i>alba</i> Legum. 262.<br/>                 — Tell. 258.<br/> <i>albescens</i> 49.<br/> <i>albicans</i> 199. 304.<br/> <i>albida</i> 262. 263.<br/> <i>albovaricosa</i> 138.<br/> <i>albus</i> 258.         </p> | <p> <i>Alectryonia</i> 222.<br/> <i>amabilis</i> 40. 45.<br/> <i>amara</i> 68.<br/> <i>Amarula</i> 66.<br/> <i>amarula</i> 67. 68.<br/> <i>ambigua</i> Litt. 196.<br/>                 — Psamm. 234.<br/> <i>amboinae</i> 126.<br/> <i>amethystea</i> 244. 245.<br/> <i>amphibia</i> 218.<br/> <i>ampullacea</i> 17.<br/> <i>Ampullaria</i> 16. 29. 289.<br/> <i>anatarius</i> 226.<br/> <i>Ancylus</i> 15. 293.<br/> <i>angularis</i> Mel. 59.<br/>                 — Ner. 219.<br/>                 — Pal. Viv. 20. 21. 22.<br/> <i>angulifera</i> Corb. 109. 116.<br/>                 — Litt. 194.<br/>                 — Mel. 64.<br/>                 — Phas. 194.<br/> <i>angulosa</i> Mel. 41.<br/>                 — Ner. 80.<br/> <i>angustior</i> 4.<br/> <i>annectens</i> 70.<br/> <i>anomala</i> 252.<br/> <i>arborea</i> 220.<br/> <i>arboricola</i> 197.<br/> <i>Arca</i> 228.         </p> | <p> <i>arctecava</i> 40. 43.<br/> <i>arenaria</i>, -us 284. 285. 290.<br/> <i>arenosa</i> 252. 253.<br/> <i>Asaphis</i> 252. 290.<br/> <i>asper</i> 173.<br/> <i>aspera</i> 62.<br/> <i>aspersus</i> 270.<br/> <i>Assimineae</i> 124. 212.<br/> <i>ater</i> 191.<br/> <i>atra</i> 191.<br/> <i>atrata</i> 109.<br/> <i>atropurpurea</i> 119.<br/> <i>atrum</i> 191.<br/> <i>attenuatus</i> 266.<br/> <i>Aulus</i> 259.<br/> <i>Auricula</i> 149. 289.<br/> <i>Auriculastra</i> 158.<br/> <i>auriculata</i> 76.<br/> <i>Auriculiden</i> 124. 129.<br/> <i>Auriculus</i> 149.<br/> <i>auris-felis</i> 141.<br/>                 — judae 153. 155.<br/>                 — malchi 153.<br/>                 — midae 151. 154.<br/> <i>australiana</i> 157.<br/> <i>avellana</i> 139.<br/> <i>Azor</i> 259.         </p> |
|---|--|---|

**B.**

Balanocochlis 30.  
 Batissa 131. 290.  
 baudoni 109.  
 Baum-Austern 124.  
 becki 275.  
 belcheri Cult. Sil. 261.  
 — Ostr. 220  
 bengalensis 91. 230.  
 bensoni 142. 144.  
 bernardiana 91.  
 biangulata 209.  
 bicarinata 243.  
 bicolor 201.  
 bicristata 211. 316.  
 bifasciatum 171.  
 bilineata 221.  
 bipartita 245.  
 bisinuata 40. 43.  
 Bithynia 25.  
 bocki 69.  
 bocourti 109.  
 boeana 34.  
 borealis 110.  
 borneensis Amn. Ass. 215.  
 — Pyth. Scar. 140.  
 borni 173.  
 Brachyodontes 225.  
 brevicula Ass. Hydr. 213.  
 breviculum Cer. 174.  
 brevis 273.  
 brevispina 79. 289.  
 brevispira 2.  
 brevissimus 279.  
 brookei 36.  
 Brotia 33.  
 buginensis 51. 53.  
 bullata, -us 202.  
 bullioides 60.  
 burroughiana 20.  
 buschi 90. 93. 96. 290.

**C.**

caerulescens 244. 245.  
 caeruleum 174.  
 calathus 15.  
 caledonica Cyr. 91. 92.  
 — Psamm. 252.  
 Calobates 288.  
 canalis 60.  
 Canidia 75. 295.

Capsa 252.  
 Capsella 238.  
 Capsula 252.  
 carinata Ass. 215.  
 — Polyd. 130.  
 carinifera 198.  
 carolinensis 92.  
 cashmiriensis 110.  
 Cassidula 140.  
 Cassidulus 140.  
 castanea 110.  
 castaneus 165.  
 castrensis 242.  
 celebensis Ampull. 17.  
 — Ancyl. 16.  
 — Batiss. 104.  
 — Corbic. 109. 113.  
 — Isid. 10.  
 — Mel. 69. 193.  
 — Pal. 23.  
 — Phys. 10.  
 — Vivip. 23. 24.  
 celox 228.  
 Cerithidea 185.  
 Cerithium 168.  
 ceylonensis Sol. 274.  
 ceylonica Cyr. 91. 92. 94. 96.  
 charbonnieri 190.  
 chemnitzii Cass. 141.  
 — Sol. 273.  
 cincta 42.  
 cingulatus 183.  
 Clausaria 283.  
 clausus 285.  
 clava 286. 287.  
 clavata Phol. 280. 281.  
 — Ter. 287.  
 clavus 50. 40.  
 Clea 76. 295.  
 Clithon 79.  
 Clossonaria 283. 284.  
 Clypeolum 77.  
 clypeolum Sept. 86.  
 coacta 68.  
 coarctata 43.  
 coxans 91. 98. 101. 230. 289.  
 coccinea 254.  
 cochlidium 40.  
 coeca 128.  
 coerulescens v. caerulescens.  
 coffea 141. 142. 144.  
 colonialis 114.  
 communis 79. 218.  
 compacta 19.  
 compressa Bat. 104.  
 — Corb. Cyr. 120.  
 — Nav. Sept. 84.  
 compressus Plan. 13.  
 concinnus 270.  
 concisum 172.  
 confluens 81.  
 conica Amp. Hel. 18.  
 — Litt. 198. 304.  
 connectens 237.  
 Conovulus 160.  
 consimilis 83.  
 constricta Mel. 40. 52.  
 coralium } 169.  
 corallinum }  
 Corbicula 108. 290.  
 coriaceum 127.  
 cornea Ass. Hydr. 215.  
 — Cerith. 190.  
 — Ner. 218.  
 corneus Pot. 190.  
 — Sol. 276.  
 corniculum 285.  
 corniformis 285. 287.  
 coromandelianus 12.  
 corona 79.  
 — australis 79.  
 coronaria 203.  
 corrugata 248. 249.  
 costata Legum. 260.  
 — Mel. 41.  
 — Pal. 20.  
 — Psamm. 250.  
 — Viv. 20.  
 costellaris 40.  
 costulata 3.  
 crassidens 138.  
 crassilabrum 27.  
 crassula 110.  
 cratium 222.  
 crenularis 68.  
 crenulata 40. 45.  
 crepidinata 51. 56.  
 crepidularia 124. 218.  
 crispulata 47.  
 cucullata 223.  
 cucurbita 287.  
 Cultellus 259. 263.  
 cultellus 270. 290.  
 cultriformis 270.  
 cumingi Corb. 110. 117.  
 — Echin. 203.

cumingi Glauc. 23.  
 — Litt. 203.  
 cumingiana Mach. 257.  
 — Soletell. 233.  
 cumingianus Cult. 270.  
 — Sol. 258.

Cuphus 284.  
 curtus 272.  
 curvicosta 36.  
 cyanostomus 27.  
 cybele 68.  
 Cyclotropis 215.  
 cylindracea Mel. 51. 60.  
 cylindraceus Sol. 277.  
 cyprinaeformis 91.  
 cyprinoides 91. 96. 100. 101.  
 Cyrena 90. 124. 230. 289.  
 Cyreniden 29. 292. 295.

## D.

dactylus 157. 158.  
 dayakorum 117.  
 debrixiana 109.  
 decollata Cerith. 188.  
 — Quoyia 192.  
 decollatum Cer. 188.  
 decollatus Mur. 188.  
 — Planax. 192.  
 decussata 147.  
 deflorata 252. 254.  
 delesserti 279.  
 deltae Nem. Stenoth. 212.  
 — Scaph. 227.  
 Dendrostrea 221.  
 denikei 243.  
 denticulata 252.  
 diadema 66. 68. 289.  
 dichotoma 253. 254. 255.  
 diphos 232.  
 discoidea 106.  
 disjuncta 51. 54.  
 dissimulans 73.  
 distans 145.  
 distinguenda 41.  
 divaricata 91. 98.  
 Dreissena 87.  
 dubia 217.  
 ducalis 109. 114.  
 ducliosiana 217.  
 dunkeri Auric. 160.  
 dunkerianus Cult. 271.  
 — Sol. 279.  
 dunlopei 281.

## E.

Ebena 191.  
 eburnea 242.  
 echinata 221.  
 Echinella 203.  
 edentula Luc. Ven. 229.  
 edentulus Melamp. 167.  
 elegans Litt. 203.  
 — Psamm. 243.  
 Elizia 233.  
 Ellobium 149.  
 elongata 240.  
 emarginata 227.  
 Engina 217.  
 Ensiculus 269.  
 Ensis 280.  
 episcopalis 36.  
 erosa 120.  
 erucella 222.  
 essingtonensis 91.  
 eurypterus 185.  
 exaratum 149.  
 excavata 96.  
 exigua Litt. 206.  
 exiguus Sol. 275. 279.  
 eximia 91. 97. 101.  
 expansa 91. 95. 97.  
 extensa 106.  
 exustus 12.

## F.

faba Cass. 147.  
 — Ner. 80.  
 fallax 92.  
 fasciata Auric. 161.  
 — Clea 76.  
 — Sil. 261.  
 — Tralia 162.  
 fasciatus Aul. Sol. 261.  
 — Melamp. 161.  
 fasciolata Hydr. 215.  
 — Mel. 56.  
 Faunus 191. 124. 289.  
 felis 141.  
 fenouilliana 109.  
 filosa 198.  
 Fistulana 285. 287.  
 flaveola 147.  
 flavida 72.  
 flavovirens 81.  
 fluminalis 282.  
 fluminea 110. 114. 115.

fluviatile Cer. 183. 185.  
 fluviatilis Mod. 87.  
 — Stromb. 41.  
 — Vol. 66.

foeda 32.  
 foliorum 194.  
 folium 222. 290.  
 fonesii 279. 280.  
 fontinalis 51. 61.  
 fulgurans 41.  
 fulvaster Un. 309.  
 fulvida 215.  
 furcato-radiata 84.  
 Furcella 283.  
 fusca Auric. 141.  
 fuscata Corb. 110.  
 — Mel. Hel. 42.  
 fuscum Telesc. 181.  
 fuscus Mur. 178.

## G.

galathea 91. 98. 101.  
 Gari 240. 244.  
 gari 239. 240. 248.  
 gemmulatum 170.  
 gibba 110. 121.  
 gibberulum 170.  
 gigantea, -us 284.  
 glaberrima 87.  
 glans 30.  
 Glaucomya }  
 Glauconome } 230.  
 goniomphala 25.  
 gouldi 276.  
 gracilis Corb. 117. 119.  
 — Microc 316.  
 — Sol. 277.  
 grandinata, -us 203.  
 grandis 274.  
 granifer Melamp. 166.  
 granifera Auric. Tral. 166.  
 — Mel. 71.  
 granosa Arc. 228.  
 — Auric. 166.  
 granularis 206.  
 granulata Mel. 72.  
 — Valv. 219.  
 granum 65.  
 grata 242.  
 gravis Corb. 110.  
 — Cyr. 96.  
 grayana, -us 261.  
 gregata 287.

griseofusca 128.  
grossicosta 25.  
gruneri 149.  
Guetera 286.

**H.**

hagenii Microc. 316.  
— Un. 316.  
hastula 41.  
heleni 75.  
Heteroglypta 244. 245.  
Hiatula 232.  
Hyperotus 286.

**I.**

imbrium 133.  
imperfiorata Pyth. 133.  
imperfioratum Plec. 149.  
imperfioratus Scar. 133.  
impressa 93. 91.  
incisum 183.  
indicator 181.  
indicus 12.  
induta 229.  
inermis 30.  
inflammata 141.  
inflata Pyth. 132.  
inflatum Cer. 174.  
infralineatus 14.  
infrarostratus 309. 316.  
inhonesta 51.  
insignis 243.  
insularis 316.  
intermedia Litt. 197.  
— Psamm. 250.  
intermedius Sol. 274.  
intumescens 3.  
iris 77.  
Isarcha 252.  
Isidora 6.

**J.**

janellei Cer. 171.  
— Nav. Sept. 85.  
japonica Corb. 109.  
— Mach. Sil. 261.  
japonicus Cult. 261.  
javana Corb. 118.  
javanica Amp. 19.  
— Bat. Cyr. 103. 290.  
— Corb. Cyr. 111.  
— Limn. 3.  
— Mel. 43. 40.

javanica Pal. 21.  
— Phar. 266. 267.  
— Viv. 21.  
javanicus Cult. 267.  
— Plan. 14.  
— Solec. Sol. 267.  
javanus Anc. 15.  
jayana 103.  
jayensis 102.  
jonesii 280.  
judae 154.  
jukesii 91.

**K.**

kennerii 188.  
keraudreni 108.  
kieneri 188.  
kraussi 148.  
Kuphus 283. 284.

**L.**

labrella 148.  
lacteus 263. 265.  
lacustris Corb. 110. 118.  
— Mod. 87.  
— Pach. 26.  
laevigata 41. 49.  
laevior 21.  
laevis Cyr. 91. 95.  
— Mel. 38.  
lamareki Sol. 274. 275.  
lamarckiana Corb. 109.  
largillierti 109.  
lata 128.  
lateritia 69.  
layardi 56. 57.  
Leguminaria 259.  
lemeslei 87.  
lenticularis 103.  
lessoni 246.  
leucodon 165.  
leucosticta 86.  
lignorum Ostr. 220.  
— Phol. 281.  
Limnaea 2. 293.  
Limnaeiden 1. 293.  
Limnaeus s. Limnaea.  
linearis 277.  
lineata Mel. Hel. 71.  
— Ner. 219.  
lineolata 24.  
lirata Ass. Hydr. 216.  
— Mel. 72.

lirata Omph. 216.  
litigiosa 48. 40.  
Littorina 194. 289.  
Littoriniden 193.  
Littorinopsis 124. 194.  
lividus 270.  
longaevus 201.  
Lopha 221.  
Lucina 228.  
lugubris 62.  
lutaria Cham. 98.  
— Coch. 17. 18.  
lutarius Cyl. 150.  
lutea Auric. 163.  
lutescens 147.  
luteum Onc. 127.  
luteus Melamp. 163.  
luzonicus 280.

**M.**

macassarica Bat. 105.  
— Viv. 23.  
Macha 256.  
maculata 215.  
maculosa 248.  
magnus 264.  
malaccana Litt. 204.  
malaccensis Psamm. 236.  
— Sol. 276.  
malayana 55.  
malchi 152.  
mangiorum 178.  
Marinula 158.  
marmoratus 271.  
marmorea 248. 249.  
Marsyas 149.  
martensi 109.  
Martesia 281.  
mauritiana Litt. 210.  
— Per. 126.  
maxima Clea 76.  
maximus Cult. Sol. 263.  
Melacantha 66.  
Melampus 125. 160.  
Melanella 30.  
Melania 27. 289. 292. 294.  
— s. str. 40. 66.  
Melaniiden 27.  
Melanoides 33. 50.  
melanostoma Litt. 199. 304.  
— Ner. 218.  
melanus 68.



Plecotrema 125. 149.  
 plicaria 40. 41. 289.  
 plicata Hel. 41.  
   — Pyth. Scar. 131.  
 plicatula 48.  
 Plotia 62.  
 polita Amp. 17.  
   — Auric. 157. 158.  
   — Stenoth. 211.  
 politus Sol. 261.  
 pollex 138.  
 Polydonta 130.  
 polygramma 25.  
 polythalamia, -us 284.  
 ponderosa Auric. 157.  
   — Cyr. 91.  
 porcata 45.  
 porcellana 84.  
 porrecta 5.  
 Potamides 124. 175. 289.  
 praestans 250.  
 proclivis 12.  
 producta 102.  
 prolongatus 316.  
 provisoria 35.  
 Psammobia 241.  
 Psammobiiden 231.  
 Psammocola 241.  
 Psammosolen 256.  
 Psammotaea 238. 290.  
 Psammotella 234.  
 Psammotellina 122. 234.  
 Pseudodon 289.  
 pulchella Corb. 110. 120.  
   — Mel. 51. 61.  
   — Ner. 82.  
   — Psamm. 245. 247. 248.  
   — Sil. 261.  
 pulchellus Aul. 261.  
 pulchra 45.  
 pullata 110. 117.  
 pulligera 77. 289.  
 punctata 41. 49.  
 punctato-striatum 149.  
 punctigerum 149.  
 punctulata 57.  
 Purpura 216.  
 purpurascens 173.  
 purpurea 131.  
 pusillus 281.  
 pyramidalis 204. 205.  
 pyramidatus 136.  
 Pyrazus 175.

Pythia 130. 289.  
 pythia 133

## Q.

quadrasi 143.  
 quadrata Cerith. 187.  
   — Pal. Viv. 21.  
 quadratus Pot. 187.  
 quadricingulata 203.  
 quoyi Cer. 187.  
   — Mach. Solec. 257. 258.  
 Quoyia 192.

## R.

radiata Ass. 206.  
   — Caps. 238.  
   — Hydr. 206.  
   — Mach. 260.  
   — Nav. 86.  
   — Psammobia 244.  
   — Psammotaea 238.  
   — Sil. 260. 290.  
   — Soletell. 232.  
 radiatus Sol. Aul. 260.  
 radicum 220.  
 ramosa Litt. 199.  
   — Mod. 226.  
 reeveana Pyth. 138.  
 reevei Psamm. 247.  
 regularis Corb. 109.  
   — Sol. 274.  
 reticulata 155. 157. 158.  
 retifer 183.  
 rhizophorarum Cer. 189.  
   — Ostr. 221.  
 rhodostoma 144.  
 rhombus 257.  
 rictans 134.  
 riqueti 73. 74. 193.  
 rivalis 110. 120.  
 rivicola 281. 282.  
 robusta 52. 51.  
 rosea 260.  
 rostrata, -us 232.  
 rotundata 102. 104.  
 rubella 214.  
 rubicunda 249. 250.  
 rubus 169.  
 rugosa Asaph. etc. 252.  
 rugosum Cer. 170.  
 rugulosa Cyr. 91.  
   — Psamm. 252.

ruida 80.  
 rustica Litt. 203.  
   — Mel. 44. 40.

## S.

saleyerica 24.  
 sandai 110.  
 savinieri 315.  
 saxatile 223.  
 sayana 109.  
 scabra Litt. Hel. 194.  
   — Mel. 62.  
   — Psamm. Tell. 248.  
 scabrum Bucc. 62.  
 scalprum 264.  
 Scaphula 228.  
 scaphula 227.  
 scarabaeus 131. 133. 136. 289.  
 Scarabus 130.  
 scheepmakeri Auric. 154.  
   — Mach. Solec. 258.  
 schroeteri 173.  
 schultzeanus 276.  
 scipio 40.  
 scutata 18.  
 scutulata 41. 42.  
 Segmentina 15.  
 seleciana 110.  
 semicancellata 40.  
 semicostata 73. 193.  
 semigranosa 72.  
 seminuda 58. 60.  
 semiplicata 160.  
 semistriatum, -us 177.  
 semisulcata, -us 138.  
 semitrisulcatus 177.  
 semmelinki Pal. 316.  
   — Psamm. 236.  
   — Un. 316.  
 semperi 165.  
 Septaria 83. 218. 283.  
 Sermyla 73.  
 serotina 234. 235.  
 setifera 67.  
 setosa 66. 289.  
 siamensis Melamp. 165.  
   — Mod. 87.  
 siamica Cyr. 91.  
 siccata 30.  
 Signia 166.  
 Siliqua 259. 290.  
 Singaporensis 165.

sinuosa 91. 100. 101.  
 sloanei 278.  
 smaragdinus 225.  
 snellemanni 79.  
 sobria 41.  
 Solecurtus 255.  
 Solen 271. 272. 290.  
 Soleniden 255.  
 Soletellina 232.  
 solida 240.  
 soricina 162.  
 sowerbyana 147.  
 sparsinodosa 36.  
 spectabilis 69.  
 sphaericula 103.  
 Sphaerium 291.  
 spinosa 221.  
 spinulosa 62. 63.  
 squamosa Ner. 80.  
 — Psamm. 251.  
 squarrosa 80.  
 stagnalis 11.  
 Stenomelania 40.  
 Stenothyra 210.  
 striata Phol. Mart. 281.  
 — Pyth. 138.  
 Striatella 50.  
 striatella 246.  
 striatula 225. 226.  
 striatus Scar. 138.  
 stricticosta 39.  
 strigata 316.  
 strigilata Stenoth. 211.  
 strigilatus Solec. 256. 257.  
 Strigula 130.  
 strubelli Litt. 208.  
 — Psamm. 236.  
 subcornea 215.  
 subcylindricus 266.  
 subellipticus 265.  
 subglobosa 26.  
 subgranosa Litt. 208.  
 — Mel. 72.  
 subinermis 203.  
 sublobata 92.  
 subnodosa Auric. 152.  
 — Litt. 205.  
 suborbicularis Bat. 103.  
 — Cyr. 91. 94. 95.  
 — Nav. Sept. 84.  
 subplanata 112. 109.  
 subplicata 37.  
 subradiata 234.

subramosa 87. 226.  
 subsuturalis 51. 54.  
 subteres 4.  
 subula 158.  
 succinea 3.  
 sulcata Aur. 160.  
 sulcatina 110. 117.  
 sulcatum Cer. 178. 177.  
 sulcatus Mur. Pot. 178.  
 Sulcospira 31.  
 sulcospira 33.  
 sulculosa Aur. Cass. 146.  
 sulculosus Melamp. 167.  
 sumatrana Isid. 6.  
 sumatranum Pis. 121.  
 sumatranus Plan. 12.  
 sumatrensis Amp. 17.  
 — Cyr. 92. 91.  
 — Glauc. 231.  
 — Mel. 34. 35.  
 — Ner. 78.  
 — Pal. Viv. 24.  
 — Un. 316.  
 suturalis 58.

## T.

taenia 217.  
 tapparonei 54.  
 Tarebia 69.  
 tayloriana 316.  
 Tectarius 201.  
 tectum-persicum 213.  
 Tectus 201.  
 Telescopium 180.  
 telescopium 180.  
 temmincki 76.  
 tenerrimus 180.  
 tenkatei Cerith. Pot. 190.  
 — Mel. 41.  
 tenuis 110.  
 Terebralia 176.  
 terebralis 191.  
 terebriformis 40.  
 Teredo 283.  
 tessellata 86. 218.  
 testudinaria 31.  
 thiarella 68.  
 thoracites 288.  
 Tiara 66.  
 Tiaropsis 68.  
 timorensis Isid. 9.  
 — Limn. 10.  
 — Mel. 41.

timorensis Sol. 275.  
 tondanensis 13. 14.  
 tonganum 126.  
 tonkiniana 110.  
 torquata 36.  
 trailli 168.  
 Tralia 160. 161.  
 transversa 109.  
 trapezoidea 109. 115. 121.  
 triangula 93.  
 triangularis Cyr. 91. 93.  
 — Scar. 131.  
 tridentata 154. 155.  
 trigona, -us 130.  
 triparietalis 145.  
 tripartita Psamm. 244.  
 — Pyth. 136.  
 tristis Mel. 41.  
 — Psamm. 242.  
 trochoides 205.  
 truncata Bith. 25.  
 — Psamm. 244.  
 — Soletell. 233.  
 — Tell. 244.

truncatula 59.  
 tuberculata Mel. 51. 57.  
 tuberculatum Cer. 170. 172.  
 173. 174.  
 tumida Corb. 109. 113. 117.  
 tumidum Onc. 126.  
 turgida 143.  
 turris 40.  
 turritum 169.  
 Tympanotonos 183.  
 typica 33.

## U.

ualanensis 82. 218.  
 undata, -us 139.  
 undulata 199.  
 unicarinatum 190.  
 unifasciata 51. 60. 61.  
 uniformis 46. 40.  
 Unio 89. 289.  
 Unioniden 88. 292. 295.  
 Uperotis 286. 287.  
 ustum 169.

## V.

vagina 272. 273. 274. 278.  
 variabilis Mel. 36.  
 — Scar. 139.  
 varicosa 36.

*variegata* Ass. 214.  
— Ner. 78.  
*variegatum* Cer. 171.  
*ventricosa* Cyr. 91.  
— Litt. 207.  
— Pal. Stenoth. 211.  
214.  
*ventrosa* 4.  
*venustula* 109.  
*verbecki* Mel. 38.  
— Un. 89.  
*verruculatum* 126.  
*versicolor* Sol. 278.  
— Ven. 252.  
*respertinoides* 242.  
*Vibex* 175. 183.

vilis 204.  
 vineta 51. 54.  
 violacea Bat. 102. 104.  
     — Capsell. 239.  
     — Cyr. 103.  
     — Psammobia 233.  
     — Psammotaea 239. 290.  
     — Soletell. 233.  
 violaceus Sol. 233.  
 violascens 254.  
 virens 230.  
 virescens 23.  
 virgata 250.  
 viridis 225.  
 vitiensis 209.  
 vitrea Pern. 224.

vitreus Cult. 266.  
— Sol. 277.  
Vivipara 19. 289. 294.

**W.**

wallacei 51. 52. 54.  
wichmanni Mel. 51. 55. 59.  
— Ner. 78.  
wilkei 160.  
woodiana 110.  
woodwardi 279.

**Z.**

ziezac Litt. 197.  
— Ner. 79.  
zonale 171.



# HIRUDINÉES DES INDES NÉERLANDAISES

PAR

**RAPHAËL BLANCHARD.**



M. le professeur Max Weber m'a fait l'amitié de me confier l'étude des Hirudinées recueillies au cours de son beau voyage d'exploration zoologique aux Indes néerlandaises. Son importante collection ne renferme que des Sangsues d'eau douce ou terrestres; elle comprend six genres et huit espèces, dont quatre nouvelles.

## **GLOSSOSIPHONIDAE.**

A cette famille se rapportent deux espèces nouvelles; l'une d'elles rentre dans le genre *Helobdella*, dont j'ai donné récemment la diagnose <sup>1)</sup>.

**Glossosiphonia** JOHNSON, 1816.

1. *Glossosiphonia Weberi*, nova species.

Animal épais, cordiforme, long de 9 mm., large de 4 mm. 5 (fig. 1). Corps grisâtre, le dos étant parsemé de tubercules irréguliers: quelques-uns semblent être en série linéaire et se répéter de trois en trois anneaux. Ventouse postérieure large de 1 mm. 5, petite, circulaire ou légèrement oblongue, presque entièrement cachée sous le ventre.

Quatre anneaux préoculaires, le second étant le plus long. Trois paires d'yeux, placées sur trois anneaux consécutifs: les deux antérieurs sont plus petits et plus rapprochés l'un de l'autre; ceux des

---

1) R. Blanchard, Viaggio del dott. A. Borelli nella Repubblica Argentina e nel Paraguay. XXI. Hirudinées. *Bollettino dei Musei di zool. ed anat. comp. della r. Università di Torino*, XI, n° 263, 1896; voir p. 4. — R. Blanchard, Hirudineen Ost-Afrikas. *Die Thierwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete*, Berlin, in 8°. 1897; voir p. 4.

deuxième et troisième paires sont plus gros, plus écartés et assez étroitement juxtaposés l'un à l'autre. Le quatrième anneau appartient




Fig. 1.

aussi à l'extrémité céphalique: celle-ci se trouve délimitée par un sillon assez profond, qui passe en arrière de lui et qui se distingue avec une égale facilité au dos et au ventre. En attribuant, comme d'habitude, le numéro 1 au premier anneau oculifère, on constate que le pore génital mâle est percé sur le milieu de l'anneau 23, c'est-à-dire sur le dernier anneau du somite X. La vulve n'est pas visible.

Le nombre total des anneaux est de 65: l'an us s'ouvre entre le dernier et l'avant-dernier; les anneaux 60 et 62, qui représentent respectivement le deuxième et dernier anneau des somites XXIII et XXIV, sont plus courts que les autres. Les somites III—V sont constitués par un total de six anneaux; les somites VI—XXI sont complets, c'est-à-dire formés chacun de trois anneaux; les somites XXII—XXIV comprennent chacun deux anneaux; les somites XXV—XXVI sont représentés par les trois derniers anneaux.

Cinq exemplaires, du lac de Manindjau (Sumatra). L'un d'eux présente une anomalie consistant en ce que le deuxième et le troisième anneau du somite XVIII sont fusionnés dans leur moitié gauche, à la face dorsale.

Cette espèce a une certaine ressemblance avec la *Glossosiphonia heteroclita* (Linné), à cause de la disposition de ses yeux; mais cette

dernière est toujours lisse et a les yeux des deux premières paires séparés par un, parfois même par deux anneaux; de plus, le pore génital mâle s'ouvre entre les anneaux 25 et 26, et non sur l'anneau 23.

***Helobdella* R. BLANCHARD, 1896.**

1. *Helobdella gracilis*, nova species.

Animal fusiforme, effilé, grisâtre, concolore, sans taches ni bandes, long de 6 mm., large de 1 mm. (fig. 2). Corps élargi en arrière,




Fig. 2.

puis se rétrécissant pour s'insérer sur la ventouse postérieure par une sorte de pédoncule. Deux yeux bien distincts, comme dans tous les représentants du genre *Helobdella*; pas de „glande cervicale”. Extrémité céphalique coralloïde, élargie, comprenant trois anneaux préoculaires et les huit premiers anneaux, ceux-ci représentant les somites I—IV.

Le nombre total des anneaux est de 69. Les somites I—III sont constitués par les cinq premiers anneaux; les somites IV—XXII sont complets, c'est-à-dire formés chacun de trois anneaux; les somites XXIII—XXVI sont représentés par les sept

derniers anneaux. Le dernier anneau des somites V—XXII est limité en avant et en arrière par un sillon plus accentué que celui qui sépare les anneaux 1 et 2 de chaque somite; il en résulte que le troisième anneau est, à première vue, plus apparent que les deux autres. Les papilles segmentaires ne sont pas visibles.

de la trompe à son sommet; un peu plus large que le cou, elle est limitée en arrière par l'anneau 7. La ventouse postérieure, un peu moins large que le corps, est circulaire et cupuliforme. Le pore génital mâle est percé entre les anneaux 26 et 27, c'est-à-dire entre les somites X et XI; la vulve s'ouvre entre les anneaux 28 et 29, c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième anneau du somite XI. L'anus est situé entre le dernier et l'avant-dernier anneau. On voit par transparence, à travers le tégument ventral, sept paires de caecums intestinaux, développés dans les somites XII à XVIII; ceux de la dernière paire s'infléchissent en arrière et se prolongent jusqu'à la partie postérieure du somite XXI.

Vingt-six exemplaires, trouvés à Buitenzorg (Java) dans la cavité branchiale de *Paratelphusa* sp.?

#### GNATHOBDELLIDAE.

Dans un mémoire récent, cité plus haut, j'ai démontré la nécessité de diviser cette famille en trois tribus distinctes: *Haemadipsinae*, *Hirudininae* et *Semiscolecinae*. Ce dernier groupe n'est connu, jusqu'à présent, que d'Amérique; les deux autres habitent aussi bien l'ancien que le nouveau monde; ils sont représentés l'un et l'autre dans les récoltes de M. Max Weber.

#### HAEMADIPSINAE.

Cette tribu est constituée par les Gnathobdellides terrestres: elle comprend actuellement les six genres *Mesobdella* R. Bl., *Philaemon* R. Bl., *Haemadipsa* Tennent, *Phytobdella* R. Bl., *Planobdella* R. Bl. et *Xerobdella* Frauenfeld. Le premier de ces genres est spécial au Chili, le dernier se rencontre dans les Alpes d'Autriche; les quatre autres genres sont très répandus dans la région indo-malaise <sup>1)</sup>. Les récoltes de M. Max Weber ne renferment que deux espèces, appartenant l'une et l'autre au genre *Haemadipsa*.

#### *Haemadipsa* TENNENT, 1861.

1. *Haemadipsa zeylanica* (Moquin-Tandon, 1826) R. Bl., 1894.

Synonymie: *Hirudo zeylanica* Moquin-Tandon, 1826.

*Hirudo flava* Schmarda, 1861.

---

<sup>1)</sup> R. Blanchard, Révision des Hirudinées du Musée de Dresde. *Abhandlungen und Berichte des kön. zool. und anthrop.-ethnograph. Museums zu Dresden* 1892—'93, n° 4 (1894).

Un exemplaire de la forêt de Paninggahan (Sumatra). — Neuf exemplaires pris en forêt, sur le mont Singalang (Sumatra).

Cette espèce, dont la coloration peut varier considérablement, a des caractères morphologiques extrêmement fixes. Elle est très répandue dans toute la région indo-malaise, aux Philippines, au Japon et dans toute la presqu'île indo-chinoise. Je n'ai rien à changer à la diagnose que j'en ai donnée en 1894.

2. *Haemadipsa sylvestris* R. Blanchard, 1894.

Un exemplaire de la forêt de Kaju-tanam (Sumatra). — Six exemplaires de la forêt de Manindjau (Sumatra).

Cette espèce est déjà connue de Birmanie <sup>1)</sup>. Elle ne diffère de la précédente que par l'existence de deux anneaux au somite III, la troisième et la quatrième paire d'yeux étant séparées par un anneau.

## HIRUDININAE.

Ce groupe comprend les Gnathobdellides d'eau douce. Ainsi que je l'ai établi dans le mémoire déjà cité, il se divise naturellement en deux séries, suivant que les mâchoires portent une ou deux rangées de dents: la première série est celle des *Monostichodonta*; la seconde, celle des *Distichodonta*. Toutes deux sont représentées, chacune par un genre, dans la collection de M. Max Weber.

*Limnatis* MOQUIN-TANDON, 1826.

Synonymie: *Bdella* Savigny, 1817 (non Latreille, 1795).

Ce genre a pour type la *Limnatis nilotica* (Savigny), du nord de l'Afrique ou, plus exactement, de toute la région circumméditerranéenne. Méconnue par Moquin-Tandon et les autres zoologistes, cette espèce a été restaurée par nous et est devenue le type d'un genre qui comprend d'assez nombreuses espèces: celles-ci sont répandues dans les zones tropicales et tempérées de l'ancien monde; elles ont été classées jusqu'à présent dans le genre *Hirudo*, mais méritent d'en être distraites et d'être rapprochées de la *Limnatis nilotica*, avec laquelle elles présentent d'évidentes affinités. En effet, toutes ces Sangsues

---

1) R. Blanchard, Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. LVII. Hirudinee. *Annali del Museo civico di storia naturale di Genova*, (2), XIV, p. 113—118, 1894.

répondent à la diagnose suivante, par laquelle, en 1894, nous avons caractérisé la genre *Limnatis* <sup>1)</sup>:

„Mâchoires ornées de papilles et armées d'une rangée de plus de 100 dents très aiguës. Lèvre antérieure creusée d'un sillon en dessous.”

SOUS-GENRE *Pæcilobdella* R. BLANCHARD, 1893.

En 1893, nous avons établi ce groupe pour une division du genre *Limnatis* <sup>2)</sup>, dont tous les représentants répondent à la diagnose suivante:

„Le dos est orné d'une ligne noire médiane, continue ou interrompue; dans ce dernier cas, elle se poursuit sans interruption sur les cinquième, premier et deuxième anneaux de deux somites successifs. Le troisième et le quatrième anneau près de la ligne médiane, le second et le cinquième près du bord latéral, portent de chaque côté une tache noire quadrangulaire. Le premier anneau est dépourvu de ces taches.”

Admettons que les unes ou les autres de ces taches puissent faire défaut ou même que toutes puissent manquer à la fois; que, dans chacun de ces cas, la bande noire médio-dorsale puisse être ou non continue, et l'on concevra quelle diversité d'aspect peuvent présenter les Hirudinées en question. Cette diversité est surtout frappante, quand on examine des animaux vivants: chez les uns, le dos est de couleur verte; chez les autres, il tire davantage sur le fauve ou le jaunâtre; de même, le ventre est rouge brique, avec une bande noire latérale plus ou moins marquée, ou jaune plus ou moins clair et sans bandes latérales. De telles différences semblent avoir l'importance de caractères spécifiques: aussi a-t-on multiplié les espèces et peut-on aisément en citer une quinzaine appartenant à ce groupe, mais une révision sévère en réduira notablement le nombre.

Ce sous-genre n'est encore connu, à l'état indigène, que des régions baignées par l'Océan Indien; l'une des espèces qui le composent a été transportée jusqu'aux Antilles, apparemment par l'Homme, ainsi que nous le dirons plus loin.

Nous ne méconnaissons pas que l'établissement des sous-genres com-

1) R. Blanchard, Hirudinées de l'Italie continentale et insulaire. *Bollettino dei Musei di zool. ed anat. comp. della r. Università di Torino*, IX, n° 192, 1894; voir p. 42.

2) R. Blanchard, Révision des Hirudinées du Musée de Turin. *Bollettino dei Musei di zool. ed anat. comp. . . di Torino*, VIII, n° 145, 1893; voir p. 28.

plique le plus souvent la nomenclature, sans aucun avantage réel; aussi avons-nous songé un instant à élever au rang de genre la série des *Pæcilobdella*. Nous avons cependant renoncé à cette idée, en considérant combien les caractères tirés de la coloration sont fugaces et inconstants. Observe-t-on des *Pæcilobdella* vivantes ou conservées depuis peu dans l'alcool, la diagnose ci-dessus permet de les reconnaître au premier coup d'œil; examine-t-on des individus ayant séjourné longtemps dans l'alcool, le pigment noir lui-même a été dissous, la décoloration est complète, et ces animaux ne se distinguent plus en aucune façon des autres *Limnatis*.

1. *Limnatis* (*Pæcilobdella*) *granulosa* (Savigny, 1820) R. Bl., 1893.

Synonymie: *Sanguisuga granulosa* Savigny, 1820.

*Hirudo manillensis* Lesson, 1842.

*Sanguisuga hypochloros* Wahlberg, 1842.

*Sanguisuga hypochlora* Wahlberg, 1842.

*Hirudo amboinensis* Quoy et Gaimard, 1859.

*Hirudo smaragdina* Quoy et Gaimard, 1859.

*Hirudo batavica* Diesing, 1859.

*Hirudo multistriata* Schmarda, 1861.

*Hirudo chinensis* Kinberg, 1866.

*Hirudo Luzoniae* Kinberg, 1866.

*Hirudo maculosa* Grube, 1866.

*Hirudo Loweii* Baird, 1869.

*Hirudo Belcheri* Baird, 1869.

*Hirudo maculata* Baird, 1869.

*Hirudo inconcinna* Baird, 1869.

*Hirudo assimilis* Baird, 1869.

*Hirudo saigonensis* Whitman, 1886.

Un exemplaire capturé dans une rivière à Pajakombo (Sumatra). — Un exemplaire du lac de Singkarah (Sumatra). — Un jeune exemplaire des marais de Singkarah. — Un exemplaire du lac Tabeh di Aripa, près Singkarah. — Trois exemplaires du lac Telagă pabilă, près Singkarah. — Un exemplaire de Buitenzorg (Java). — Trois exemplaires de même provenance. — Un exemplaire de Tjibodas (Java), recueilli par le Dr. Went. — Un exemplaire capturé dans une rivière, près Tete adjî (Celebes). — Au total treize exemplaires, dont sept provenant de Sumatra, cinq de Java et un de Celebes. Tous ces in-

dividus ont le ventre jaune clair, sans bande noire latérale; ils se rapportent à l'*Hirudo maculosa* Grube, dont ils ont tous les caractères.

Cinq exemplaires, dont trois jeunes, pris dans une rivière à Lūwū (Celebes); le ventre est jaune foncé, avec bandes latérales noires. Ces cinq spécimens appartiennent à la *Sanguisuga granulosa* Savigny.

Neuf exemplaires, recueillis dans un étang, à Macassar (Celebes); le ventre est orangé et bordé d'une large bande noire. Ces exemplaires correspondent à l'*Hirudo multistriata* Schmarda.

A côté des trois espèces nominales que nous venons d'énumérer, nous pourrions citer tels autres spécimens à ventre jaune clair avec bandes noires, qui devraient être attribués à l'*Hirudo maculata* Baird; et d'autres encore à ventre vert sombre, qu'il faudrait désigner sous le nom de *Sanguisuga hypochlora* Wahlberg.

La validité de toutes ces espèces peut paraître acceptable à ceux qui attachent à la coloration et à l'aspect plus ou moins chagriné du tégument une importance primordiale; au contraire, elle semblera reposer sur une base bien fragile, à ceux qui savent combien sont décevants de semblables caractères. Depuis plusieurs années, nous avons examiné un nombre considérable d'Hirudinées de la région indo-malaise, répondant à l'un ou l'autre des types énumérés ci-dessus; nous avons cherché tout d'abord à les répartir entre les diverses espèces dont il vient d'être question, mais nous avons dû bientôt y renoncer, en constatant que, à part les différences de coloration, tous ces individus présentaient entre eux la plus parfaite ressemblance anatomique et morphologique.

Nous sommes donc convaincu de l'identité des différentes espèces nominales énoncées en synonymie; elles constituent tout au plus des variétés ou des races, comme certaines espèces mieux connues (*Hirudo medicinalis*, *Hirudo troctina*, *Limnatis nilotica*, *Haemopsis sanguisuga*) nous en offrent d'irrécusables exemples. Des faits du même ordre s'observent aussi chez les Hémadipsines, comme nous l'avons indiqué plus haut: par exemple, l'*Haemadipsa zeylanica* revêt les aspects les plus variés et les plus disparates, tout en conservant intacts ses caractères morphologiques. Nous allons bientôt observer aussi les mêmes faits chez la *Limnatis javanica*.

La liste synonymique qui est placée en tête de ce chapitre atteint une longueur inusitée; elle nous amène à supprimer d'un seul coup quinze espèces nominales. Nous avouons avoir hésité longtemps à faire



une telle hécatombe; mais celle-ci est absolument nécessaire et résulte de ce que, le plus souvent, il nous a été possible d'examiner les types laissés par les différents auteurs.

Quoy et Gaimard ont recueilli à Amboine, au cours de l'expédition de Dumont d'Urville, des Hirudinées dont ils donnèrent de courtes diagnoses à de Blainville; mais celles-ci restèrent inédites jusqu'en 1859, époque à laquelle Gervais et Van Beneden les firent connaître <sup>1)</sup>. Nous les transcrivons ci-après :

„*Hirudo amboinensis* Quoy et Gaim., *msc.* — D'un beau vert en dessus, avec un trait noir médio-dorsal interrompu; fauve orange en dessous, avec les bords noirs. Dimensions de notre Sangsue médicinale.

„Vit à Amboine (îles Moluques).

„*Hirudo smaragdina* Quoy et Gaimard, *msc.* — Une belle bande d'un bleu émeraude entre deux bandes noires bordées de fauve, en dessus; le dessous marbré de brun et de bleuâtre.

„Vit à Java.”

On conserve au Muséum de Paris (nos 186 et 187) deux Hirudinées rapportées d'Amboine par les naturalistes de l'*Astrolabe*; l'un d'eux (n° 187) présente une anomalie des anneaux des somites XVII et XIX. Ce sont, sans aucun doute, les types de l'*Hirudo amboinensis*; on y retrouve sans peine les caractères de la *Limnatis granulosa*.

Cette même collection renferme plusieurs autres Sangsues récoltées aussi par Quoy et Gaimard, mais aucune de Ceylan; le type de l'*Hirudo smaragdina* reste donc inconnu. Néanmoins, nous croyons pouvoir assimiler aussi cette espèce nominale à la *Limnatis granulosa*, dont elle rappelle évidemment la variété *hypochlora*.

Le Muséum de Paris ne possède pas les types de l'*Hirudo manillensis* Lesson <sup>2)</sup>. La très courte description qui en a été donnée est déjà suffisante pour faire reconnaître la *Limnatis granulosa*. Cette assimilation paraîtra rationnelle, si l'on sait que la *Limnatis granulosa* est effectivement répandue aux Philippines et en Chine. Le Musée de Madrid en possède trois spécimens provenant des Philippines, deux de Gubat Albaz, l'autre de Sibul; ce dernier a le ventre brun verdâtre et est, par conséquent, conforme à la description de Lesson.

1) P. Gervais et P. J. Van Beneden, *Zoologie médicale*. Paris, 1859; voir II, p. 176 et 177.

2) J. P. Lesson, Description d'une nouvelle espèce de Sangsue. *Revue zoologique*, p. 8, 1842.

Le Musée de Stockholm, qui possède les espèces décrites par Wahlberg, ne renferme plus le type de la *Sanguisuga hypochlora*; comme nous l'écrivait M. le Dr. H. Théel, voilà plusieurs années qu'il est perdu. Bien que très imparfaite, la description que Wahlberg a donnée de l'espèce nominale en question est néanmoins suffisante pour nous donner la certitude que celle-ci n'est qu'une simple forme de la *Limnatis granulosa*. Tout au plus peut-on se demander si Wahlberg n'a pas eu plutôt affaire à la *Limnatis javanica*, dont certains individus ont aussi le ventre vert, comme nous le verrons plus loin. En effet, les trois exemplaires vivants sur lesquels il basait son espèce lui avaient été rapportés de Java.

Diesing cite, sous le nom d'*Hirudo batavica*, une Hirudinée qu'Ebrard <sup>1)</sup> décrivait en ces termes: „Elle ressemble beaucoup aux Sangsues dragons de l'Algérie, mais elle porte sous le ventre une espèce de plastron couvert d'une multitude de taches couleur brique foncée.” Cette Hirudinée, qu'Ebrard appelait simplement „Sangsue de Batavia”, n'est autre chose que la *Limnatis granulosa*.

Les Hirudinées décrites par Schmarda <sup>2)</sup> sont conservées au Musée zoologique de l'Université de Vienne; M. le professeur Grobben a eu l'amabilité de nous les envoyer en communication. Quatre flacons renferment les types de l'*Hirudo multistriata*, de Ceylan: le n° 219 contient quatre individus, dont deux jeunes (de Trincomalie), le n° 220 deux individus (de Belligan), le n° 221 un individu (de Ratnapura), le n° 222 treize individus (de Belligan). Aucun de ces animaux ne diffère de la véritable *Limnatis granulosa*; ils doivent être considérés comme lui étant identiques <sup>3)</sup>. On remarquera du reste que l'*Hirudo granulosa* Savigny ne figure pas sur la liste des espèces recueillies par Schmarda.

Le Musée de Stockholm possède les types de deux espèces établies par Kinberg, en 1866: *Hirudo chinensis*, de Chine, et *Hirudo Luzoniae*, de Manille; les descriptions sont très insuffisantes et d'ailleurs inexactes. L'étude des spécimens typiques nous a permis, malgré leur

1) Ebrard, *Nouvelle monographie des Sangsues médicinales*. Paris, in-8°, 1857; voir p. 53—54.

2) L. K. Schmarda, *Neue wirbellose Thiere*. Leipzig, in-4°, 1861; voir 2. Hälfte, p. 2.

3) Schmarda attribue 100 dents à son *Hirudo multistriata*; par l'examen direct des types, nous avons reconnu que les dents étaient beaucoup plus nombreuses et qu'il n'y avait, à cet égard, aucune différence avec la *Limnatis granulosa*.

décoloration et l'absence totale de bandes ou de taches noires, d'identifier ces deux formes avec la *Limnatis granulosa*.

On remarquera que Baird figure à lui tout seul pour cinq espèces dans la liste synonymique qui précède. Nous avons examiné de près, au British Museum où ils sont conservés, les types de quatre de ces espèces et leur étude nous a donné la conviction qu'aucune d'elles n'est valable. Elles avaient d'ailleurs été établies avec une évidente légèreté, sans le moindre souci de critique ou de comparaison anatomique et morphologique avec les espèces voisines.

L'*Hirudo Loweii* est originaire de Sarawak (Bornéo). L'unique exemplaire (n° 39) est très contracté, long de 75 mm., large de 19 mm.; il est concolore, d'un gris jaunâtre, et montre encore des traces de la ligne noire médio-dorsale; l'anus débouche derrière l'anneau 101; on ne voit pas trace de l'anneau 102. L'animal est d'ailleurs entièrement conforme à la *Limnatis granulosa*, tant par sa morphologie extérieure que par la structure de ses mâchoires et le nombre de ses dents. Les seules différences appréciables tiennent, d'une part à ce que la ventouse postérieure est de taille particulièrement grande et creusée en forme de coupe à orifice rétréci, et d'autre part à ce que les tubercules de la peau, qui se montrent fréquemment mucronés chez les *Limnatis granulosa* très contractées, présentent ici une exagération de ce caractère; en effet, on voit jusqu'à deux, trois et même quatre pointes à leur surface. Mais on ne saurait attribuer la moindre importance spécifique à un tel aspect, ainsi que nous l'expliquerons plus loin.

L'*Hirudo Belcheri* est aussi de Bornéo. Le type (n° 65) est incontestablement identique à la *Limnatis granulosa*; ses tubercules cutanés sont également hérissés de deux ou trois pointes.

L'*Hirudo maculata* est représentée par un spécimen provenant de Siam (n° 36), long de 65 mm., large de 14 mm. et dans lequel il est impossible de ne pas reconnaître une jeune *Limnatis granulosa*.

L'*Hirudo inconcinna* est encore identique à cette dernière. L'unique exemplaire (n° 34), rapporté de Ceylan par le Dr. A. Smith, en 1852, est long de 10 cm. et large de 2 cm. Le ventre est concolore, sans doute par suite de la dissolution des pigments; la face dorsale, également concolore, d'un brun foncé, montre encore les traces d'une bande médiane noire. On compte 101 anneaux; l'anus s'ouvre en arrière du dernier. Les anneaux 95 et 96 sont entièrement dédoublés à la face dorsale;

les anneaux 96 et 97 se fusionnent dans leur portion médio-ventrale.

L'*Hirudo assimilis* Baird, qui est originaire de Hong-Kong, n'existe plus au British Museum, mais la description sommaire qui en a été donnée, jointe aux considérations tirées de l'habitat, légitime notre manière de voir quant à son identité avec la *Limnatis granulosa*.

Cette dernière est partout employée pour la phlébotomie, dans les pays qu'elle habite. Aussi est-il vraisemblable que c'est elle encore que Whitman<sup>1)</sup> a signalée sous les noms de „large Medicinal Leech of Saigon” et d'*Hirudo saigonensis*: comme il est dit plus loin, l'espèce qui nous occupe est très commune en Cochinchine et nous savons de source certaine qu'elle y est employée en médecine.

Ainsi comprise, la *Limnatis granulosa* est une espèce très répandue. On l'observe dans tout l'Hindoustan; le Muséum de Paris en possède des exemplaires du Bengale (flacons nos 66 à 73), de Bombay (n° 75), de la côte de Malabar (nos 79, 82) et de la côte de Coromandel (nos 83, 93, 215, 247, 248); le British Museum en a aussi quelques exemplaires provenant du sud de l'Hindoustan (nos 37, 38, 41, 42). L'espèce s'étend vers l'est tout le long des côtes et remonte assez loin à l'intérieur des terres: on trouve à Londres des individus de Perak (n° 33) et de Siam (n° 36, *Hirudo maculata* Baird); à Paris, des individus de Bangkok (nos 89, 90), du Cambodge (n° 81) et de Cochinchine (nos 76, 84, 85, 87, 98). L'espèce a encore été signalée à Singapore par Grube (*Hirudo maculosa*).

Grâce à l'amabilité de M. le Dr. Kermorgant, directeur du Service de santé des colonies, nous possédons dix-neuf exemplaires, pris à Campot (Cambodge) sur l'Eléphant; la plupart d'entre eux sont de très grande taille et mesurent jusqu'à 180 mm.; les uns ont le ventre olivâtre ou ardoisé, concolore et sans bandes noires latérales, les autres l'ont jaune orangé avec deux bandes noires. Nous devons aussi à l'amabilité de M. le Dr. Treille, inspecteur général du Service de santé des colonies, vingt-quatre exemplaires de cette même espèce provenant de Quan-Yen (Tonkin). D'ailleurs, l'espèce en question remonte encore plus loin vers le nord; elle passe en Chine, d'où Baird l'a décrite sous le nom d'*Hirudo assimilis*, et atteint Hong-Kong, comme en fait foi

---

1) C. O. Whitman, The Leeches of Japan. *Quarterly Journal of micr. science*, (2), XXVI, 1886; voir p. 73 et 78 du tiré à part.

l'exemplaire du Musée de Stockholm que Kinberg a décrit sous le nom d'*Hirudo chinensis*.

Voilà pour la répartition de la *Limnatis granulosa* sur le continent. Cette même espèce se retrouve dans les îles voisines. De l'Hindoustan, elle passe à Ceylan, où Schmarda l'a observée (*Hirudo multistriata*); le Muséum de Paris (nos 74, 249) et le British Museum (n° 34, *Hirudo inconcinna* Baird; n° 40) en possèdent aussi plusieurs exemplaires ayant semblable origine. Grâce à l'amabilité de M. A. Kaznakov, officier de la marine russe, nous en possédons nous-même plusieurs spécimens de cette même île: l'un d'eux provient de Matara, l'autre de Tissamaharama, près Colombo.

La *Limnatis granulosa* est très répandue dans l'archipel malais (Sumatra, Java, Bornéo): la plupart des Musées en possèdent des exemplaires venant de l'une ou l'autre de ces îles. Elle existe aussi à Poulo-Condor, d'où le Muséum de Paris en possède un exemplaire de taille colossale (n° 88). Elle vit également à Celebes et aux Moluques: un exemplaire, recueilli à Amboine par Quoy et Gaimard, pendant l'exploration de l'*Astrolabe*, figure au Muséum de Paris (n° 186); c'est probablement le type de l'*Hirudo amboinensis*. Un autre exemplaire (n° 187) a encore été recueilli à Amboine par Hombron et Jacquinot, pendant l'expédition de Dumont d'Urville; il présente quelques anomalies des anneaux. Le Musée de Copenhague renferme aussi deux exemplaires provenant d'Amboine (n° 18).

L'espèce se rencontre également aux Philippines, où Lesson l'a indiquée sous le nom d'*Hirudo manillensis* et Kinberg sous celui d'*Hirudo Luzoniae*. Le Muséum de Paris possède deux spécimens de cette provenance: l'un rapporté de Luçon par Marche en 1880 (n° 251), l'autre capturé par Montano en 1881, dans le rio Agusan, dans le nord-est de Mindanao (n° 188). Au Musée de Madrid figurent deux exemplaires de Gubat Albaz (n° 13) et un exemplaire de Sibul (n° 14). Le Musée de l'Université de Vienne contient aussi trois spécimens provenant du même archipel (n° 226).

Enfin, l'espèce qui nous occupe s'étend jusqu'aux îles Mariannes: trois spécimens du Muséum de Paris, un adulte (n° 189) et deux jeunes (n° 190), ont été rapportés de Guam par Quoy et Gaimard.

On peut donc définir l'habitat de la *Limnatis (Pacilobdella) granulosa* en disant qu'elle se rencontre dans toute cette portion du continent asiatique qui est située à l'est de la mer d'Oman et au sud

du tropique du Cancer. De là, elle se répand dans les îles et archipels situés jusqu'au 10<sup>e</sup> degré de latitude sud et au 150<sup>e</sup> de longitude est. Il est donc vraisemblable qu'on la rencontrera aux Carolines, aux Palaos et en Nouvelle-Guinée. Rien ne démontre sa présence en Australie, mais il n'est pas impossible qu'elle se trouve dans le nord, dont la faune est encore peu connue. En somme, on peut donc dire que cette espèce est particulière à la région indo-malaise.

Aussi est-il très intéressant de la retrouver aux Antilles, où elle a été, sans aucun doute, transportée par l'Homme, dans un but médicinal; jetée dans les ruisseaux, elle s'y est acclimatée. On la trouve en effet en abondance à la Martinique, où elle est très prospère: le Musée de Copenhague en possède trois exemplaires de cette provenance (n<sup>o</sup> 21). Nous en avons reçu nous-même, à deux reprises, de nombreux exemplaires vivants. Le premier envoi, comprenant une trentaine d'individus, nous a été fait gracieusement en 1891 par le P. Vanhaecke, supérieur du séminaire-collège de Fort-de-France; c'était vraiment un beau spectacle, que ces animaux ornés des couleurs les plus vives. En 1893, nous recevions d'une autre source un nouvel envoi; il s'y trouvait un individu de taille gigantesque qui, fixé en demi-extension, mesure exactement 245 mm. de longueur. Nous ne saurions dire si l'espèce se retrouve aux Antilles ailleurs qu'à la Martinique.

Dans toutes les régions qu'elle habite, la *Limnatis granulosa* se présente sous des aspects variés (fig. 3) et avec des colorations diverses; néanmoins, aux points de vue anatomique et morphologique, elle reste toujours identique à elle-même, sauf de légères variations que nous allons indiquer. Elle atteint communément une longueur de 150 à 180 mm. et dépasse très souvent 200 mm.; sa taille est donc bien supérieure à celle des *Hirudininae* réputées les plus grandes, comme *Hirudo medicinalis* et *Limnatis nilotica*.

Nous n'insisterons pas sur les colorations diverses que peut présenter la *Limnatis granulosa*; nous les avons indiquées maintes fois, au cours des discussions qui précèdent. La ligne noire médio-dorsale se détache le plus souvent sur la couleur fondamentale (fig. 3, A); d'autres fois, elle repose sur une bande noirâtre plus ou moins large et ininterrompue d'un bout à l'autre du corps (B). Dans d'autres cas encore, cette bande foncée fait défaut et l'on trouve à sa place quatre taches carrées symétriques, siégeant sur le troisième et le quatrième anneau de chaque somite (fig. 3, C).

La partie latérale du dos est occupée de chaque côté par quatre




Fig. 3.

lignes brunes, sinueuses, continues chez certains individus, fréquemment interrompues et très réduites chez d'autres (I—L). Ces lignes sont accouplées; dans chaque couple, elles se rapprochent et s'écartent alternativement: rapprochées et parallèles sur le cinquième, le premier et le second anneau de deux somites consécutifs, elles s'écartent l'une de l'autre sur le troisième et le quatrième anneau d'un même somite. Elles forment ainsi un élégant dessin. Les papilles segmentaires de la rangée intermédiaire sont situées entre les deux lignes du couple externe.

L'aspect de l'animal varie beaucoup, suivant que son tégument est lisse ou granuleux: il est lisse pendant l'extension, mais devient granuleux quand il se contracte. L'état granuleux de la peau est d'ailleurs entièrement soumis à sa volonté; quand il est très accentué, chaque tubercule cutané se hérissé d'une ou plusieurs petites saillies acuminées, qu'on prendrait pour autant de mucrons (fig. 4). On conçoit donc que certains naturalistes, attachant à l'aspect du tégument une importance excessive, aient établi des espèces d'après ce seul caractère. La même erreur a été commise pour d'autres Hirudinées, par exemple pour la *Pontobdella muricata* (Linné), à laquelle sont strictement identiques la *Pontobdella spinulosa* Leach et la *Pontobdella laevis* de Blainville.




Fig. 4.

La partie antérieure du corps (fig. 5, A et B) est constituée exactement comme chez *Hirudo medicinalis*; pourtant, il n'est pas rare de constater le dédoublement soit du dernier, soit des deux derniers anneaux du somite VI, dans la plus grande partie de leur face dorsale; les taches noires latérales siègent alors exclusivement sur la moitié postérieure du dernier anneau (fig. 5, A). Cette disposition est fréquente chez les individus de la Martinique; chez quelques-uns, on observe même le dédoublement de l'anneau 10 ou dernier anneau du somite V, à sa face dorsale. Le dédoublement des deux




Fig. 5.

derniers anneaux du somite VI se constate encore chez deux individus provenant du district de Madras (British Museum, n° 38), chez divers individus de Pondichéry (Muséum de Paris, n° 93), chez des individus de Campot (Cambodge) et du Tonkin faisant partie de ma collection, etc. C'est donc une particularité qu'on ne peut aucunement invoquer comme caractère spécifique.



Les somites VII à XXII inclusivement sont entiers, c'est-à-dire formés de cinq anneaux distincts. Le somite XXIII (fig. 6) comprend




Fig. 6.

normalement trois anneaux, chacun des deux derniers équivalant à deux anneaux fusionnés. Cette coalescence bien connue est mise ici en évidence par la disposition des taches noires marginales: les taches correspondant à celles qui siègent sur le deuxième anneau du somite complet n'occupent, en effet, que la moitié antérieure du deuxième anneau du somite XXIII; les taches représentant celles qui siègent sur le cinquième anneau du somite complet n'occupent que la moitié postérieure du dernier anneau du

somite XXIII. Il est à remarquer que les deux derniers anneaux de ce même somite sont plus longs que le premier, ce qui résulte encore de leur coalescence primitive; souvent même, ces deux anneaux se montrent plus ou moins dédoublés, suivant les individus: parfois ils le sont d'une façon inappréciable, parfois au contraire ils le sont en entier; un seul d'entre eux peut subir ce dédoublement.

Le somite XXIII est donc formé, suivant les cas, de trois, de quatre ou de cinq anneaux plus ou moins nettement délimités. Cette variation s'observe encore chez des exemplaires de toute provenance: elle semble être particulièrement fréquente à la Martinique, mais se voit aussi chez des individus de Pondichéry (Muséum de Paris, nos 93 et 248), de Ceylan (collection Schmarda, n° 222; British Museum, n° 34, *Hirudo inconcinna* Baird), de Saïgon (Muséum de Paris, n° 84), de Celebes (collection Max Weber), ainsi que chez plusieurs individus du Cambodge et du Tonkin faisant partie de ma collection. Ce caractère n'est d'ailleurs pas spécial à la *Limnatis granulosa*; on l'observe au moins aussi fréquemment chez une *Limnatis* du Sénégal dont nous possédons de nombreux exemplaires.

Les somites XXIV et XXV sont formés chacun de deux anneaux: pour la raison que nous venons de dire, la moitié antérieure du second anneau porte les taches noires latérales correspondant à celles qui siègent sur le deuxième anneau du somite complet; quant aux anneaux postérieurs du somite pentamère primitif, ils ont disparu d'une façon si complète qu'il ne reste pas trace de leurs taches noires. Le somite XXVI est généralement constitué par un seul anneau, derrière

lequel s'ouvre l'anūs; parfois pourtant, on voit sur le côté de celui-ci une et même deux moitiés d'un second anneau, le 102<sup>e</sup>.

Les mâchoires sont volumineuses, ornées de grosses papilles. La mâchoire médiane porte environ 150 dents, les mâchoires latérales en ont environ 160; les dents les plus grandes mesurent 26  $\mu$  de hauteur.

2. *Limnatis* (*Pæcilobdella*) *javanica* (Wahlberg, 1855) R. Bl., 1897.

Synonymie: *Hirudo javanica* Wahlberg, 1855.

*Hirudinaria javanica* (Wahlberg, 1855) Whitman, 1886.

Un exemplaire de Buitenzorg (Java).

Cette espèce n'est pas particulière à Java; on la rencontre aussi à Bornéo, à Sumatra, au Bengale, en Birmanie, etc. Les pores sexuels sont séparés l'un de l'autre par sept anneaux (fig. 7): l'orifice mâle est percé entre le deuxième et le troisième anneau du somite X, la vulve s'ouvre entre le quatrième et le cinquième anneau du somite XI; caractère morphologique qui rend l'espèce aisément reconnaissable. Celle-ci a d'ailleurs la plus étroite ressemblance avec la *Limnatis granulosa*, à quelque point de vue qu'on l'envisage: l'aspect général, la taille, la coloration, la disposition des bandes et des taches sont identiques.




Fig. 7.

L'animal est de grande taille: d'après Sluiter, il mesure jusqu'à 175 mm. de longueur. Le dos est verruqueux, exactement comme chez *Limnatis granulosa*. La ventouse antérieure est large, les mâchoires sont volumineuses et donnent à l'extrémité céphalique un aspect renflé tout spécial; elles portent des papilles et sont armées chacune d'environ 150 dents; chez un même individu, les trois mâchoires portaient respectivement 142, 148 et 154 dents. Les derniers somites sont constitués comme suit: le somite XXIII comprend trois anneaux, les somites XXIV et XXV chacun deux anneaux, le somite XXVI un seul anneau, en arrière duquel débouche l'anūs.

Wahlberg a établi cette espèce <sup>1)</sup> d'après des spécimens que Pihlgren avait rapportés vivants de Samarang (Java). Ils avaient la face dorsale d'un gris clair, tirant sur le vert olive, avec une bande noire

<sup>1)</sup> P. Wahlberg, Nya Blodiglar. Öfversigt af k. Vetensk. Akad. Förhandl., XII, p. 233, 1855. — Neue Blutegel. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., VIII, p. 271, 1856.

médiane ininterrompue; les flancs étaient d'un jaune clair, avec des taches noires carrées, de grosseur inégale et disposées transversalement; la face ventrale était d'un rouge brun unicolore, et présentait de chaque côté une bande latérale noire, partout également large. Cette espèce est employée à Java pour l'usage médical. Le type n'est plus représenté dans les collections du Musée de Stockholm que par un seul exemplaire, étiqueté faussement „*Hirudo hypochlora* Wahlb.?” Ce spécimen est totalement décoloré à l'heure actuelle; ses pores sexuels occupent bien la situation caractéristique.

Sluiter a observé lui-même cette espèce à Java; dans une note communiquée à Whitman<sup>1)</sup>, il en décrit deux variétés.

L'une d'elles a le dos d'un vert olive sombre, tirant parfois vers le vert d'herbe et parfois vers le brunâtre; la ligne médiane est occupée par une bande noire interrompue, dont chaque fragment s'étend sur trois anneaux, dans les régions moyenne et postérieure; de grandes taches noires irrégulières sont dispersées le long des flancs. La ligne latérale est d'un jaune clair dans sa portion dorsale et d'un jaune rougeâtre dans sa portion ventrale. La face ventrale est rouge brique, bordée de chaque côté par une large bande vert sombre, entremêlée de taches noires dans sa portion interne.

L'autre variété a le dos orné des mêmes taches et des mêmes bandes que la précédente, mais la teinte générale est d'un vert plus foncé. La face ventrale n'est plus rouge brique, mais présente la même couleur verte que la face dorsale; les bandes latérales foncées sont plus larges et plus mélangées de noir.

Ces deux variétés vivent ensemble dans les rizières, où elles abondent; on les trouve communément dans les terrains bas avoisinant Batavia et dans d'autres localités de la côté septentrionale de Java; elles sont indifféremment utilisées en médecine.

En outre de l'exemplaire rapporté de Buitenzorg par M. Max Weber, nous avons eu l'occasion d'examiner de nombreux spécimens de la *Limnatis javanica* et cet examen nous a démontré la grande variabilité de sa coloration. Par exemple, des spécimens de belle taille, envoyés de Sumatra par M. M.-C. Piepers, alors conseiller à la Haute-Cour de justice des Indes néerlandaises, ont le dos orné des taches

---

1) C. O. Whitman, The Leeches of Japan. *Quarterly journal of micr. science*, (2), XXVI, p. 58—60 du tirage à part, 1886.

noires latérales caractéristiques; la ligne médiane est occupée par une bande noire ininterrompue, siégeant sur trois anneaux seulement; le ventre est rouge brique et présente de chaque côté une large bande noire. Trois exemplaires appartenant au Musée de Vienne et recueillis à Buitenzorg (Java) par le Dr. Adensamer, en 1895, ont le dos comme les précédents, mais le ventre est d'un jaune plus clair et les bandes latérales noires, nettement délimitées en dehors, se dégradent en dedans. Chez deux exemplaires appartenant au Musée civique de Gênes et recueillis à Bhamo (Birmanie) par L. Fea, en 1885, les taches latérales existent bien à la face dorsale, mais on ne voit aucune trace de la bande noire médiane; la face ventrale est d'un jaune verdâtre concolore, avec une bande noire bordant la bande jaune latérale.

Toutes ces variations, chez une même espèce dont les caractères morphologiques sont particulièrement bien définis, confirment l'opinion que nous avons émise plus haut quant à l'identité des nombreuses espèces nominales que nous avons cru devoir réunir à la *Limnatis granulosa*: elles permettent d'apprécier à leur juste valeur les variations de couleur et l'importance systématique qu'on leur a attribuée bien à tort.

Sans tenir suffisamment compte de l'évidente parenté qui existe entre cette espèce et la *Limnatis granulosa*, Whitman a créé pour elle, en 1886, le genre *Hirudinaria*, exclusivement basé sur la disposition particulière des orifices sexuels. Il admettait alors que, dans le groupe des Hirudinides, la situation des pores génitaux entre le deuxième et le troisième anneau des somites X et XI est très fixe et que toute variation de ce caractère doit acquérir une grande valeur systématique. Cette même interprétation avait conduit jadis Grube à distraire du genre *Haemadipsa* les Hirudinées terrestre d'Australie et à instituer pour elle un nouveau genre *Chthonobdella*.

J'ai longtemps partagé moi-même une semblable opinion. Mais la suite de mes études m'a démontré que certains types présentaient une situation très variée des orifices sexuels et que leur position, variable dans un même genre mais fixe dans les limites d'une même espèce, constituait un excellent caractère spécifique. Tel est le cas chez les *Macrobdella* Verrill (non Philippi) parmi les Hirudinines; tel est surtout le cas dans toute la tribu des Hémadipsines; on peut même dire qu'il s'agit là d'un caractère général, puisque pareille variation s'observe encore chez les Glossosiphonides et les Herpobdellides.

Le genre *Hirudinaria* Whitman ne mérite donc pas d'être conservé;

*Hirudo javanica* Wahlberg doit simplement prendre place dans le sous-genre *Pæcilobdella*, à côté de la *Limnatis granulosa*.

**Haemopsis** SAVIGNY, 1820.

Ce genre est le type des Hirudinines distichodontes. L'espèce la mieux connue, *Haemopsis sanguisuga* (Linné), est répandue dans toute l'Europe, aux Etats-Unis, en Sibérie, en un mot dans les régions froides et tempérées de l'hémisphère septentrional. Aussi est-il intéressant de retrouver un représentant authentique de ce groupe dans des contrées aussi tropicales que l'archipel malais.

Nous avons décrit en 1894 une *Haemopsis birmanica*, rapportée par L. Fea de Birmanie. Depuis lors, notre conception du genre *Haemopsis* s'est notablement modifiée et nous nous proposons de soumettre cette espèce à une revision.

1. *Haemopsis Weberi*, nova species.

Cinq exemplaires, de la rivière de Kaju tanam (Sumatra).

Animal contracté, très aplati, long de 53 mm., large de 10 mm.,




Fig. 8.

trale, sont séparés sur presque toute la largeur de la face dorsale. Les anneaux 10 et 13 sont dédoublés sur presque toute la largeur de

d'une teinte grise uniforme, sans taches ni bandes (fig. 8). Yeux non apparents; on voit à grand peine ceux des deux premières paires. Papilles segmentaires non visibles, ce qui rend difficile l'interprétation métamérique de l'extrémité postérieure. Les pores génitaux et les pores néphridiaux occupent leur situation habituelle.

Le nombre total des anneaux est de 103. Les anneaux 7 et 8, fusionnés à la face ven-

la face ventrale. Les somites VII—XXII sont complets, c'est-à-dire pentamères. Les somites XXIII—XXVI sont représentés par un total de dix anneaux.

La ventouse antérieure est très petite; elle est limitée en arrière par l'anneau 6. Les mâchoires sont elles-mêmes très petites et portent chacune deux rangées de dents très peu nombreuses, au nombre de quatre à six dans chaque rangée (fig. 9): ces dents sont blanches, de taille et de forme irrégulières et inégalement espacées. La ventouse postérieure est grande, en forme d'écuelle et large de 6 mm. 5 à 8 mm. L'anus s'ouvre derrière le dernier anneau.




Fig. 9.

#### HERPOBDELLIDAE.

On n'a encore signalé aucune Herpobdellide dans la région indomalaise, exception faite de la *Nephelis quadrilineata* Grube, des îles Nicobar; les Hirudinées de ce type y sont pourtant répandues et nous en ferons connaître plusieurs formes très remarquables dans un prochain mémoire. L'espèce que nous décrivons ci-dessous, d'après les récoltes de M. le professeur Max Weber, mérite à plus d'un titre de fixer l'attention: c'est la seconde espèce du genre *Dina*, connu jusqu'à présent des régions tempérées de l'hémisphère septentrional; elle présente d'ailleurs d'intéressantes particularités anatomiques.

**Dina** R. BLANCHARD, 1892.

1. *Dina Weberi*, nova species.

Un exemplaire de Buitenzorg (Java). — Sept exemplaires du lac de Manindjau (Sumatra). — Deux exemplaires recueillis dans la rivière de Loka, à Bonthain (Bontaeng) (Celebes).

Animal de petite taille, le plus grand des exemplaires examinés ayant 23 mm. de long sur 2 mm. à 2 mm. 5 de large (fig. 10). Teinte grisâtre uniforme, sans apparence de taches ni de bandes. Comme chez *Dina quadristriata* (Grube), type du genre, le troisième anneau des somites VI—XXII est dédoublé sur toute son étendue. Quant au reste, notre nouvelle espèce diffère du type par des caractères très remarquables.

Le premier anneau oculifère ne porte jamais qu'une seule paire




Fig. 10.

d'yeux, par suite de l'avortement des yeux latéraux; tel était du moins le cas chez tous les individus que nous avons étudiés. Les yeux des deux paires postérieures sont portés par l'anneau 5. L'anneau 9 est dédoublé à la face dorsale. Les somites I—V sont représentés collectivement par les anneaux 1—11. Les somites VI—XXII sont complets, c'est-à-dire formés chacun de cinq anneaux, dont le troisième est dédoublé; ils comprennent les anneaux 12—96. En arrière du somite XXII débouchent les derniers pores néphridiaux; au-delà on compte encore onze anneaux: le nombre total des anneaux est donc de 107. L'anus s'ouvre entre les anneaux 104 et 105.

Comme c'est la règle chez les Herpobdellides, le clitellum embrasse les quatre derniers anneaux du somite IX, les somites X et XI tout entiers et le premier anneau du somite XII. L'orifice génital mâle est percé sur le quatrième anneau du somite X; la vulve s'ouvre soit sur le quatrième anneau du somite XI, soit entre le troisième et le quatrième anneau de ce même somite.

En outre de ces deux orifices normaux, on observe encore sur le clitellum deux autres pertuis dont l'existence semble être constante: l'un (fig. 10, *a*) deux débouche derrière le troisième anneau du somite IX, l'autre (fig. 10, *b*) débouche derrière le troisième anneau du somite XII. Nous nous proposons de rechercher ultérieurement avec quels organes sont en rapport ces deux orifices sexuels supplémentaires. On doit les rapprocher de ceux que nous avons fait connaître précédemment chez la

*Xerobdella Lecomtei*, et de ceux que présentent aussi les *Macrobdella*.

En outre des Hirudinées décrites plus haut, la collection de M. Max Weber renfermait un seul exemplaire, apparemment très jeune, d'une Sangsue provenant du lac de Situ bagendit, près Garut (Java). Il s'agissait d'un animal long de 7 mm. 5, large de 1 mm. 25, fusiforme, lisse, arrondi, ayant l'aspect des *Herpobdellides* (fig. 11). Nous pensons qu'il appartient effectivement à cette famille.

Les anneaux sont au nombre de 103, non compris deux anneaux préoculaires. L'anus s'ouvre en avant du pénultième anneau. La lèvre postérieure de la ventouse buccale est constituée par l'anneau 2. Le pore génital mâle est percé entre les somites X et XI, c'est-à-dire entre les




Fig. 11.

anneaux 34 et 35. La vulve s'ouvre trois anneaux plus loin, entre les anneaux 37 et 38. Les deux derniers anneaux de chaque somite pentamère sont plus intimement unis que les autres; par endroits, ils ont le même aspect que l'anneau 3 dédoublé des *Dina*. Deux yeux seulement sont apparents. On aperçoit quelques papilles sur les derniers anneaux, mais sans qu'on puisse déterminer sûrement leur nombre et leur situation.

Cette Hirudinée appartient apparemment à une espèce nouvelle, dont il est très désirable de pouvoir achever l'étude. Ses caractères génériques ne sont pas assez nettement indiqués pour que nous puissions la classer et la dénommer.



## EXPLICATION DES FIGURES.

---

- Fig. 1. — *Glossosiphonia Weberi*. A, face dorsale; B, face ventrale; C, indication de la grandeur naturelle.
- » 2. — *Helobdella gracilis*. A, face dorsale; B, face ventrale; C, indication de la grandeur naturelle.
- » 3. — *Limnatis (Pæcilobdella) granulosa*. Douze dessins représentant les divers aspects que peut présenter la face dorsale.
- » 4. — *Limnatis granulosa*. Premier anneau d'un somite de la région moyenne du corps, pour montrer les tubercules cutanés; une moitié seulement a été figurée. D, face dorsale; V, face ventrale; n, pore néphridial; XY, ligne médiane.
- » 5. — *Limnatis granulosa*. Extrémité antérieure. A, face dorsale; B, profil gauche.
- » 6. — *Limnatis granulosa*. Extrémité postérieure vue par la face dorsale.
- » 7. — *Limnatis (Pæcilobdella) javanica*. Partie moyenne du corps, vue par la face ventrale, pour montrer les orifices génitaux.
- » 8. — *Haemopsis Weberi*. A, extrémité antérieure, vue par la face dorsale; B, la même, vue par la face ventrale; C, extrémité postérieure, vue par la face dorsale; D, indication de la grandeur naturelle.
- » 9. — *Haemopsis Weberi*. Mâchoire vue par la face latérale (A) et par la tranche (B).
- » 10. — *Dina Weberi*. A, extrémité antérieure, vue par la face dorsale; B, la même, vue par la face ventrale; C, extrémité postérieure, vue par la face dorsale; D, indication de la grandeur naturelle.
- » 11. — Herpobdellide indéterminée, de Java. A, extrémité antérieure, vue par la face dorsale; B, la même, vue par la face ventrale; C, extrémité postérieure, vue par la face dorsale; D, trois somites de la partie moyenne du corps; E, indication de la grandeur naturelle.
-

# ISOPODES TERRESTRES DES INDES NÉERLANDAISES

RECUEILLIS PAR

M. le Professeur MAX WEBER

ET PAR

MM. les Docteurs FRITZ et PAUL SARASIN (de Bâle)

DÉTERMINÉS PAR

**A. DOLLFUS.**

---

Le nombre des espèces d'Isopodes terrestres recueillis en Malaisie par MM. le professeur Max Weber et les Docteurs Fritz et Paul Sarasin (de Bâle) est de 32, dont 29 sont nouvelles. C'est un chiffre considérable qui s'explique par des recherches faites en des localités encore inexplorées et dans des habitats spéciaux, sous la mousse, dans des troncs pourris, dans l'humus, etc.; plusieurs des espèces ont été trouvées sur les montagnes.

Nous avons ici encore une fois à signaler l'extrême localisation de la plupart des formes tropicales d'Isopodes terrestres; le genre *Armadillo*, qui paraît si répandu dans les pays chauds, est représenté par dix espèces, dont une seule *A. murinus* se trouve généralement dans tous les pays tropicaux; les autres ont une dispersion très restreinte.

Le genre *Toradja* (nouveau) présente des caractères morphologiques curieux.

Les genres *Mesarmadillo* (3 espèces), *Periscyphus* (1 espèce) et *Alloniscus* (3 espèces) sont d'autant plus intéressants à signaler dans

les Indes Néerlandaises, que leur aire de dispersion s'en trouve singulièrement accrue.

Les genres *Porcellio* et *Philoscia* qui ont de nombreux représentants en Europe (où les *Porcellio* atteignent leur maximum de développement) comprennent respectivement trois et sept espèces. — Si à ce dernier chiffre nous ajoutons une espèce de *Philoscia* (*Ph. angusticauda* BL.) précédemment signalée à Bornéo, nous voyons que ce dernier genre doit être très-répanu dans l'Archipel Indien.

### ARMADILLO.

§ 1. Parties coxales du premier segment pereial peu distinctes et ne formant qu'un petit repli dentiforme, situé sur la face inférieure, assez loin du bord latéral.

#### 1. *Armadillo Sarasinorum*, nova species.

Corps ovale-oblong, assez convexe, lisse et finement ponctué.



Fig. 1a.




Fig. 1b.

Cephalon assez court, à bord frontal presque rectiligne; prosépistome presque plan, ne dépassant pas le front, mais formant seulement un rebord un peu épaissi de chaque côté. — Yeux moyens, environ 16 ocelles. — Antennes courtes, premier article du fouet trois fois plus court que le second. Pereion: premier segment à bords latéraux faiblement relevés antérieurement; coxopodite ne formant qu'un très-petit repli dentiforme sur la face inférieure du segment. — Deuxième segment à repli coxal encore moins apparent. — Dernier segment à bord postérieur faiblement incurvé. Pleon, Telson: premier segment du pleon entièrement

caché sous le dernier segment pereial. — Pleotelson un peu plus large que long, à incurvation latérale médiocre, à sommet presque droit et d'un tiers moins large que la base. — Uropodes: endopodite bien développé atteignant les  $\frac{2}{3}$  du pleotelson; exopodite très-petit, inséré sur la face supérieure, tout près de l'angle postéro-interne du processus basilaire.

Couleur: brun rougeâtre, avec une large tache claire de chaque côté des segments; uropodes présentant une tache claire.

Dimensions: Longueur, 6 millimètres; largeur, 2,6 millimètres.

Celebes, Un exemplaire ♀ et un exemplaire jeune. Aus Baum Moos am Masarang (Dr. Sarasin).

2. *Armadillo albipes*, nova species.

Corps ovale-oblong, convexe, lisse et finement ponctué.

Cephalon: bord antérieur du prosépistome dépassant un peu le front sur toute sa largeur; prosépistome presque plan, avec une très-faible dépression médiane. Yeux petits, environ 12 ocelles. Antennes courtes, premier article du fouet au moins deux fois plus court que le second.

Pereion: premier segment à relief antérieur peu marqué, à bords latéraux relevés; coxopodite formant sur la face inférieure du segment un repli dentiforme. — Deuxième segment à repli coxal très-développé, visible même sur la face dorsale, et garni ainsi que l'article suivant des pattes de petits poils courts.




Fig. 2a.



Fig. 2b.

Pleon, Telson: Pleotelson aussi long que large, incurvé sur les côtés et à sommet égalant environ les  $\frac{2}{3}$  de la base. — Uropodes: endopodite bien développé, poilu, atteignant presque les  $\frac{2}{3}$  du pleotelson; exopodite petit mais très-distinct sur la face supérieure, inséré près de l'angle postéro-interne du processus basilaire.

Couleur: blanc, avec une large bande médiane gris-foncé, interrompue de part et d'autre de la ligne médiane par des linéoles claires; cephalon foncé, taché de blanc; côtés du pleon munis d'une tache foncée; pleotelson foncé; pattes blanches.

Dimensions: longueur, 10 millimètres, largeur, 4,5 millimètres.

Sumatra, Bajang près Singkarak et Singkarak. Plusieurs exemplaires (Prof. Max Weber).

3. *Armadillo murinus*, Brandt (Cubaris).

Java, Buitenzorg Plusieurs exemplaires (Prof. M. Weber).

Flores, Maumerie " " " " "

Sumatra, Singkarak " " " " "

Celebes, Gegend von Duri, 400—650 mètres (Drs. Sarasin). Deux exemplaires. Kema 400—650 mètres (Drs. Sarasin). Quatre exemplaires.

Cette espèce est commune dans tous les pays tropicaux.

4. *Armadillo arcuatus*, nova species.

Corps large, assez convexe, un peu déprimé sur les côtés, finement ponctué, presque lisse.



Fig. 3a.



Fig. 3b.

Cephalon: prosépistome présentant une convexité triangulaire un peu déprimé au centre; le bord antérieur du prosépistome est un peu concave et dépasse le front surtout sur les côtés qui sont très-développés et presque lobulés. Yeux grands, 20 ocelles. Antennes moyennes; premier article du fouet près de trois fois plus court que le second.

Pereion: le mamelon antérieur du premier segment est apparent, quoique le relief soit peu accusé; il est triangulaire postérieurement; bord latéral un peu déprimé mais non relevé; coxopodite dentiforme; celui du deuxième segment est plus développé.

Pleon, Telson. — Premier segment pléonal visible mais très-court. Pleotelson aussi long que large, à côtés fortement arqués, à sommet au moins aussi large que la base. Uropodes: endopodite atteignant au moins la moitié du pleotelson, exopodite assez développé, inséré sur le côté interne et vers les  $\frac{2}{3}$  de la base; visible par conséquent sur la face inférieure aussi bien que sur la face supérieure.

Couleur: gris-clair, linéolé de blanc, parties latérales blanches.

Dimensions: longueur 11 millimètres, largeur 5 millimètres.

Sumatra, Manindjau. Plusieurs exemplaires ♂♀. (M. Weber).

§. 2. — Parties coxales du premier segment pereial distinctes postérieurement et formant en dessous du bord latéral un processus divergent.

5. *Armadillo rectifrons*, nova species.

Corps peu convexe, très-finement ponctué sétacé.

Cephalon court, à bord frontal tout à fait rectiligne; prosépistome ne dépassant pas le front, à relief presque nul. — Yeux grands, environ 18 ocelles. Antennes assez longues, premier article du fouet trois fois plus court que le second.

Pereion: premier segment à bord latéral faiblement relevé antérieurement; coxopodite distinct seulement sur le quart postérieur et nettement divergent. Deuxième segment à coxopodite formant un faible repli.

Pleon, Telson: Premier segment du pleon entièrement caché sous le dernier segment pereial. Pleotelson un peu plus large que long, à incurvation latérale peu profonde, à sommet d'un tiers moins large que la base. Uropodes: endopodite bien développé et atteignant les  $\frac{2}{3}$  du pleotelson; exopodite très-petit, inséré sur la face supérieure, près de l'angle postéro-interne du processus basilaire.

Couleur: marbré de brun rougeâtre sur fond clair ambré, avec une bande médiane foncée dédoublée; pleon muni de petites taches claires sur fond foncé; uropodes rougeâtres.

Dimensions: Longueur 9 millimètres, largeur 4 millimètres.

Celebes, Macassar. Deux exemplaires ♂, deux exempl. ♀ (Drs. Sarasin).

Ussu. Un exemplaire ♀.

Kema. Deux exemplaires ♀, un exempl. ♂. " "

Loka, près Bonthain. Un exempl. ♀ (jeune) (Prof. M. Weber).




Fig. 4a.



Fig. 4b.

§ 3. — Parties coxales du premier segment pereial distinctes sur toute la longueur du bord latéral, séparées de celui-ci par un sillon, et plus ou moins divergentes postérieurement.

6. *Armadillo Floresianus*, nova species.

Corps convexe, finement ponctué.

Cephalon court; prosépistome appliqué contre le front, un peu con-

vexe avec une faible dépression médiane. Yeux moyens, environ 15 ocelles. Antennes courtes, premier article du fouet deux fois plus court que le second.




Fig. 5a.




Fig. 5b.

Pereion: Premier segment muni d'un mamelon antérieur peu apparent; duplicature coxale distincte sur toute la longueur du bord latéral, mais divergente seulement dans son quart postérieur. Deuxième segment à duplicature coxale très distincte, égalant la longueur du bord latéral.

Pleon Telson: premier segment du pleon très-réduit, mais cependant apparent sur la face supérieure. Pleotelson aussi long que large, à côtés peu incurvés vers l'extrémité postérieure, à sommet d'un tiers environ moins large que la base. Uropodes: endopodite petit, atteignant à peine la moitié du pleotelson; exopodite presque imperceptible, inséré à l'angle postéro-interne du processus basilaire (face supérieure).

Couleur: blanchâtre, avec une double bande médiane grise.

Dimensions: longueur 7,8 millimètres, largeur 2,9 millimètres.

Flores, Sikka. Un exemplaire ♀: (Prof. M. Weber).

#### 7. *Armadillo coecus*, nova species.

Corps étroit, très-convexe, finement ponctué-sétacé.




Fig. 6a.



Fig. 6b.

Cephalon: prosépistome plan, appliqué contre le front. — Yeux nuls. — Antennes courtes, premier article du fouet trois fois plus court que le second.

Pereion: premier segment à duplicature coxale distincte sur toute la longueur du bord latéral, mais à peine divergente. Deuxième segment à duplicature coxale dentiforme, peu développée.

Pleon, Telson: processus latéraux du pleon peu courts. Pleotelson presque aussi long que large, à côtés peu incurvés, à sommet dépassant à peine la moitié de la largeur de la base. Uropodes: endopodite allongé, dépassant la moitié du pleotelson; exopodite complètement atrophié.

Couleur: blanche uniforme.

Dimensions: longueur, 6 millimètres, largeur, 2 millimètres.

Java, Buitenzorg. Un exemplaire ♀. — (prof. M. Weber).

8. *Armadillo velutinus*, nova species.

Corps convexe, très-finement et densément ponctué-sétacé, excepté sur les linéoles du pereion. Cephalon: Prosépistome ne dépassant pas le front, présentant un relief en écusson triangulaire et déprimé au centre. — Yeux moyens, formés de 10 ocelles. — Antennes courtes, premier article du fouet deux fois plus court que le second.




Fig. 7a.

Pereion: premier segment à bords latéraux faiblement relevés; duplication coxale distincte sur toute la longueur du bord latéral et un peu divergente postérieurement. Deuxième segment à coxopodite moyen.




Fig. 7b.

Pleon, Telson: premier segment du pleon très-réduit, mais visible sur la face supérieure. Pleotelson à peu près aussi long que large, à côtés bien incurvés, et à bord apical




Fig. 7c.

un peu arrondi, d'un quart moins large que la base. Uropodes: endopodite allongé, dépassant les  $\frac{2}{3}$  du pleotelson; exopodite très-petit, situé sur la face supérieure de l'article basilaire.

Couleur: gris-brunâtre, avec une ligne médiane et des linéoles latérales claires. Antennes à extrémités blanches.

Dimensions: longueur, 8 millimètres, largeur, 3,5 millimètres.

Sumatra, Singalang, (Sommet, sous les pierres). Trois exemplaires jeunes (Prof. M. Weber).

Celebes, Macassar, dans le feuillage. Deux exemplaires ♀ (Drs. Sarasin).

Loewoe (Prof. M. Weber). Un exemplaire ♀.



9. *Armadillo Weberi*, nova species.

Corps ovale allongé, assez convexe, lisse et glabre.

Cephalon: prosépistome, un peu convexe, appliqué contre le front.

Antennes courtes; premier article du fouet trois fois plus court que le second. Yeux assez grands, environ 16 ocelles.

Pereion: Premier segment sans mamelon médian. — Duplicature coxale distincte sur toute la longueur du segment, mais divergent seulement à partir du tiers postérieur.

Pleon, Telson. Premier segment pleonal presque entièrement caché sous le dernier segment pereial. Pleotelson aussi long que large, à côtés incurvés, à bord postérieur d'un tiers moins large que la base. Uropodes: endopodite atteignant aux deux tiers du pleotelson; exopodite

petit, inséré dans une logette, sur la face supérieure de l'article basilaire, près du bord interne.

Couleur: Gris, avec de petites linéoles claires sur le pereion.

Dimensions: longueur 6 millimètres, largeur 2,3 millimètres.

Sumatra, Caverne Ngalau, près Pajakomboh. (Prof. M. Weber).  
Trois exemplaires ♂♀.

10. *Armadillo brevicauda*, nova species.

Corps ovale allongé, très-convexe, finement ponctué sétacé, surtout postérieurement.

Cephalon: bord frontal un peu infléchi vers le milieu et dépassé par le prosépistome qui est séparé du front par un sillon assez grand de chaque côté; prosépistome avec une faible dépression médiane. — Yeux moyens, environ 12 ocelles. — Antennes courtes; premier article du fouet trois fois plus court que le second.

Pereion: premier segment muni d'un mamelon




Fig. 8a.




Fig. 8b.




Fig. 9a.

antérieur large et peu accentué; duplicature coxale distincte sur tout le bord latéral du segment, mais peu divergente postérieurement. Deuxième segment à duplicature coxale égalant aussi la longueur du côté du segment.



Fig. 9b.

Pleon, Telson. Pleotelson de moitié plus court que long, à côtés faiblement incurvés. Uropodes: l'article basilaire très-court et large; endopodite très-petit; exopodite inséré non loin de l'extrémité apicale de l'article basilaire, du côté interne.

Couleur: Clair, avec des marbrures et taches brunes formant une double zone foncée de part et d'autre de la ligne médiane et une tache latérale.

Dimensions: Longueur, 7 millimètres; largeur, 3 millimètres.

Flores, Maumerie. Plusieurs exemplaires (M. Weber).

### **TORADJIA**, novum genus <sup>1)</sup>.

Corps ovale, convexe, se roulant en boule (armadilliforme). Cephalon à prosépistome caréné, très-développé, et repoussant les parties tergaes qui ne forment plus de part et d'autre du cephalon qu'une aire circum-oculaire, limitée du côté interne par un rebord très-accusé. Antennes à fouet bi-articulé. Pereion à premier segment présentant des reliefs très-apparents et une duplicature coxale distincte. Pleotelson plus ou moins triangulaire-arrondi. Pleopodes bi-trachéates. Uropodes munis d'appendices bien développés; l'exopodite, plus petit que l'endopodite, est inséré vers l'angle postéro-interne de la base.

#### 1. *Toradjia Celebensis*, nova species.

Corps ovale, convexe, à reliefs tuberculeux, très-accusés sur le premier segment pereial, lisse postérieurement.

Cephalon: Prosépistome muni sur toute sa longueur d'une carène aiguë qui se termine postérieurement (sur la face tergale) par un élargissement. Les aires circum-oculaires sont limitées antérieurement par un très-fort relief tuberculiforme à contour presque quadran-




Fig. 10a.

1) Nous nommons ce genre nouveau, très-remarquable par la disposition singulière du cephalon, d'après la peuplade indigène de Celebes = *Toradja* et prenons pour type du genre *Toradjia Celebensis*.

gulaire, et postérieurement par un angle moins accentué. Yeux grands, 20 ocelles. Antennes courtes, premier article du fouet plus de deux fois plus court que le second.



Fig. 10b.



Fig. 10c.

Pereion: premier segment présentant un mamelon antérieur à contour sinueux et un pli postéro-latéral; duplicature coxale marginale, divergente postérieurement. Deuxième segment présentant en dessous un très-petit repli coxal dentiforme.

Pleon, Telson: premier segment du pleon très-développé; segments 3 à 5 à processus postéro-latéraux, assez étroits et fortement dirigés en arrière, ceux du 5<sup>e</sup> segment presque parallèles. Pleotelson triangulaire à sommet arrondi. Uropodes: base peu oblique, presque quadrangulaire, égalant en longueur le pleotelson; endopodite étroit, dépassant le pleotelson; exopodite petit, étroitement lancéolé-aigu, inséré près de l'angle postéro-interne de la base (face inférieure) et dépassant le pleotelson.

Couleur: Gris, avec de petites linéoles claires de part et d'autre de la ligne médiane. Pleotelson et uropodes roux.

Dimensions: longueur, 5 millimètres; largeur, 2 millimètres.

Celebes, Soputan 1200<sup>m</sup> dans l'humus. Deux exemplaires ♀ (Dr. Sarasin).

## 2. *Toradjia Gorgona*, nova species.

Corps ovale, convexe, fortement granulé-tuberculé sur la partie antérieure, plus finement granulé latéralement et postérieurement.




Fig. 11a.

Cephalon: Prosépistome à carène très-accentuée et très-aiguë, limitée postérieurement (face tergale) par un élargissement triangulaire scutiforme. Aires circum-oculaires, bordées antérieurement par un fort rebord à contour arrondi et postérieurement par un repli assez large. Yeux moyens,

environ 12 ocelles. Antennes courtes, premier article du fouet plus court que le second.

Pereion: premier segment présentant un relief médian limité par un repli épais, sinueux, interrompu au milieu. Duplicature coxale peu divergente limitée postérieurement par une fissure presque marginale et visible sur la face supérieure. Deuxième segment avec un petit pli coxal dentiforme sur la face inférieure.




Fig. 11b.

Pleon, Telson: Pleon à processus latéraux bien développés, ceux du cinquième segment presque parallèles. Pleotelson triangulaire, à sommet arrondi. Uropodes: base droite, arrondie extérieurement, dépassant le pleotelson. Endopodite et exopodite dépassant le pleotelson, l'exopodite est inséré près de l'angle postéro-interne de la base.




Fig. 11c.

Couleur: Gris, avec de petites linéoles claires.

Dimensions: longueur, 6 millimètres; largeur, 2,2 millimètres.

Deux exemplaires, sans localité indiquée (Prof. M. Weber).

### 3. *Toradjia cephalica*, nova species.

Corps très-convexe, faiblement tuberculé antérieurement, lisse postérieurement.

Cephalon: Prosépistome à carène bien accentuée et aboutissant postérieurement (face tergale) à un fort élargissement scutiforme triangulaire. Aires oculaires à rebord moins fort que dans les espèces précédentes. Yeux moyens, environ 14 ocelles. Antennes courtes, premier article du fouet plus court que le second.



Fig. 12a.

Pereion: premier segment à mamelon antérieur limité par un fin repli sinueux. Repli postéro-latéral très-bien formé et servant à emboîter la partie antérieure du deuxième segment. Duplicature coxale peu divergente postérieurement. Deuxième segment paraissant dépourvu de duplicature coxale.

Pleon, Telson: Pleon à processus latéraux assez courts, ceux du cinquième segment non parallèles. Pleotelson semi-circulaire. Uropodes: base grande, droite, arrondie du côté externe et dépassant le pleotelson; endopodite et exopodite plus courts que dans les espèces précédentes, ne dépassant pas sensiblement la base.

Couleur: Gris-brun, avec des linéoles claires de part et d'autre de

la ligne médiane, deux taches blanches sur le premier segment pereial, et une large tache confluyente sur les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> segments. Uropodes clairs, Dimensions: longueur 4 millimètres; largeur 1,5 millimètres.

Java, Tjibodas. Un exemplaire, (Prof. M. Weber).

### MESARMADILLO <sup>1)</sup>.

#### 1. *Mesarmadillo orientalis*, nova species.

Corps convexe, un peu rétréci postérieurement, finement poilu.




Fig. 13a.




Fig. 13b.

Cephalon: ligne frontale un peu proéminente au milieu, processus latéraux courts, quadrangulaires arrondis, Prosépistome légèrement convexe, ne dépassant pas le front. Le cephalon présente un sillon circulaire oblique. Yeux grands, environ 20 ocelles. Antennes assez longues, premier article du fouet un peu plus court que le second.

Pereion. — Coxopodite distinct sur tout le bord latéral du segment et formant antérieurement un large bourrelet; la partie postérieure est cachée sous l'angle postéro-latéral du segment. — Segments 2 et 3 à côtés obtusément quadrangulaires.

Pleon, Telson. — Cinquième segment pleonal à processus latéraux

1) Ce genre paraît voisin du *G. Periscyphis*, Gerstaecker (Die Gliederthier-Fauna des Sansibar-Gebietes 1873 = *Cercocytonus* Budde-Lund = *Periscyphus* Budde-Lund. — Il s'en distingue par la disposition du premier segment pereial: „epimeris integris” d'après Budde-Lund (Crustacea Isopoda terrestria), c'est-à-dire sans parties coxales distinctes. — A cet égard *Periscyphus leucocephalus* Budde-Lund, de Rangoon (Viaggio di L. Fea in Birmania, LXIV, Isopodi terrestri (in Mus. Civ. Genova, 1894) qui présente une lamina coxale doit probablement être rattaché au *G. Mesarmadillo*.

Voici l'observation dont nous avons fait suivre la description des espèces du *G. Mesarmadillo* provenant des Antilles (On West-Indian terrestrial Isopod. Crustaceans, in Proc-Zool. Soc., 1896): „This genus was considered until lately to be African; its range seems wide, and extends from Madagascar to the coast of Guinea and the Antilles. No Asiatic species has yet been mentioned”. On voit qu'il faut étendre encore considérablement l'aire géographique de ce genre, et y comprendre les Indes orientales.

presque parallèles. Pleopodes munis de 4 (ou 5?) paires de trachées.



Fig. 13c.




Fig. 13d.




Fig. 13e.

Pleotelson triangulaire, à côtés fortement incurvés, terminé par une pointe obtuse. Uropodes à base très-développée, atteignant presque le sommet du pleotelson et terminée du côté interne par une dent obtuse; endopodite très-long, dépassant sensiblement le pleotelson; exopodite petit, inséré à l'extrémité apicale de la base.

Couleur: Gris-brun, avec des taches blanches formant des lignes longitudinales, et des linéoles claires.

Dimensions: longueur, 12 millimètres; largeur  $5\frac{1}{2}$  millimètres.

Celebes, Sommet du Masarang (♂). — Sommet du Sudara (♂). — Sommet du Lokon (♂ ♀). — Sopotan, dans l'humus (jeune) (Dr. Sarasin).

## 2. *Mesarmadillo elegans*, nova species.

Corps convexe, peu large, très-finement poilu.

Cephalon: ligne frontale un peu proéminente au milieu, processus latéraux presque nuls. Prosépistome un peu convexe, ne dépassant pas le front. Sillon oculaire court. Antennes assez longues; premier article du fouet deux fois plus court que le second. Yeux moyens, environ 16 ocelles.

Pereion: premier segment présentant une légère saillie antéro-médiane; coxopodites distincts et formant un large et épais bourrelet sillonné sur toute la longueur du bord latéral (face supé-




Fig. 13f.

Fig. 13g.




Fig. 14a.



Fig. 14b.

rière). Segments 2 et 3 à angle postéro-latéral un peu arrondi.



Fig. 14c.




Fig. 14d.

Pleon, Telson. — Cinquième segment pleonal à côtés incurvés, et terminé par une pointe subarrondie. Uropodes à base très-développé, large, atteignant le sommet du pleotelson; endopodite allongé, dépassant un peu le pleotelson; exopodite petit lanciolé, apical.

Couleur: Gris-brun avec des rangées longitudinales de taches claires et des linéoles claires. Uropodes roux.

Dimensions: longueur, 9 millimètres; largeur, 3,5 millimètres.

Celebes, Kema, sous du bois pourri Plusieurs exemplaires ♀ (Sarasin).

### 3. *Mesarmadillo guttatus*, nova species.

Corps convexe, glabre, finement ponctué.




Fig. 15a.




Fig. 15b.



Fig. 15c.

Cephalon: ligne frontale un peu proéminente au milieu; processus latéraux courts, quadrangulaires arrondis. Sillon oculaire assez court. Prosépiostome presque plan, ne dépassant pas le front. Antennes assez longues; premier article du fouet un peu plus court que le second. Yeux moyens, environ 14 ocelles.

Pereion: premier segment à coxopodite formant un bourrelet distinct sur toute la longueur du bord latéral et plus large antérieurement que postérieurement.



Fig. 15d.

Pleon, Telson. — Cinquième segment pleonal à processus latéraux presque parallèles. Pleotelson triangulaire, à côtés incurvés, à pointe obtuse. Uropodes à base n'atteignant pas tout-à-fait le sommet du pleotelson; endopodite le dépassant, exopodite apical, lancéolé, assez grand.

Couleur: Gris-brun, avec une large tache blanche de chaque côté des segments péreiaux, et une double rangée longitudinale de taches et de linéoles claires de part et d'autre de la ligne médiane. Pleon ne présentant que deux taches claires sur le troisième segment.

Dimensions: longueur, 6 millimètres; largeur 2,6 millimètres.

Sumatra(?). — Un exemplaire ♀, sans localité (Prof. M. Weber).

### PERISCYPHUS.

#### 1. *Periscyphus Weberi*, nova species.

Corps ovale, assez convexe, lisse et glabre.

Cephalon: Prosépistome faiblement convexe, dépassant le front dont il est séparé par un sillon et formant au devant de lui un rebord sinueux à processus médian, peu accentué et à lobes latéraux subaigus. Yeux assez grands, environ 24 ocelles. Antennes moyennes, à fouet bi-articulé; premier article d'un tiers plus court que le second.

Pereion: premier segment à bord postérieur un peu sinueux; pas de parties coxales distinctes.

Pleon, Telson. — Pleon à processus latéraux élargis vers l'extrémité. Pleotelson triangulaire arrondi, plus court que long. Uropodes à base très-développée, droite, obtusément quadrangulaire, dépassant le pleotelson, et présentant à l'angle interne une forte encoche où s'insère l'endopodite, celui-ci égale à peu près la moitié de la longueur de l'exopodite; tous deux dépassant notablement le pleotelson.

Couleur: Gris, avec une série de taches latérales et linéoles claires de part et d'autre de la ligne médiane.

Dimensions: longueur 12 millimètres; largeur 5,2 millimètres.

Sumatra, Kajoe tanam. Plusieurs exemplaires ♂ ♀, (Prof. M. Weber).

Manindjau	"	"	"	"	"
Padang, Apenberg	"	"	"	"	"



Fig. 16a.



Fig. 16b.



Fig. 16c.



Fig. 16d.



## PORCELLIO.

1. *Porcellio Sundaicus*, nova species.

Corps ovale, peu convexe, assez fortement granulé antérieurement, et des lignes de granulations plus faibles sur les segments pereiiaux postérieurs.




Fig. 17a.

Cephalon: bord frontal à processus médian largement triangulaire, lobes latéraux arrondis; prosépistome un peu convexe mais sans granulation centrale. Yeux petits, environ 12 ocelles. Antennes courtes, premier article du fouet deux fois plus court que le second.



Fig. 17b.

Pereion: premier segment à bord postérieur presque droit et non sinueux.

Pleon, Telson: Pleotelson plan, aussi long que large, incurvé sur les côtés et prolongé en pointe subaiguë. Pleopodes de la première paire (♂) courts et largement tronqués. Uropodes à base un peu plus courte que le pleotelson; endopodite dépassant un peu le pleotelson, exopodite court, lancéolé.

Couleur: Gris avec une tache claire diffuse sur les segments pereiiaux et des linéoles claires de part et d'autre de la ligne médiane, parfois les linéoles sont absentes.

Dimensions: Longueur, 5 millimètres; largeur, 2 millimètres.

Sumatra, Singkarak. Plusieurs exemplaires ♂ ♀ (M. Weber).

Java, Buitenzorg. " " " " "

Celebes, Makassar. Un exemplaire " " "

2. *Porcellio pallidipennis*, nova species.

Corps ovale, peu convexe, finement granulé, surtout antérieurement.




Fig. 18a.

Cephalon: Bord frontal à processus médian peu accentué, largement triangulaire arrondi; lobes latéraux un peu obliques, arrondis du côté interne; prosépistome muni d'un relief sinueux transversalement.

Yeux petits. Antennes courtes, premier article du fouet trois fois plus court que le second.

Pereion: premier segment à bord postérieur non sinueux.

Pleon, Telson: Processus latéraux du pleon bien développés, un peu divergents. Pleopodes de la première paire chez le ♂ à exopodite court, arrondi du côté interne. Pleotelson plan, triangulaire, à sommet aigu. Uropodes à base n'atteignant pas tout à fait l'extrémité du pleotelson; endopodite court, n'atteignant que le moitié du pleotelson; exopodite lancéolé.



Fig. 18b.



Fig. 18c.

Couleur: Gris, avec des linéoles claires de part et d'autre de la ligne médiane. Antennes claires.

Dimensions: longueur, 4,8 millimètres; largeur, 2 millimètres.

Flores, Maumerie. Plusieurs exemplaires ♂♀. (M. Weber).

### 3. *Porcellio modestus*, nova species.

Corps ovale, peu convexe, un peu déprimé sur les côtés, granulé surtout antérieurement, sur le cephalon et les premiers segments pereiaux. Marge frontale fine et sinueuse; processus frontal médian petit, triangulaire, un peu entaillé, lobes latéraux assez grands, très-obliques, arrondis du côté interne. Yeux moyens. Antennes?



Fig. 19a.



Fig. 19b.

Pereion: Premier et deuxième segments à côtés relevés; bord postérieur du premier segment très-peu sinueux.

Pleon, Telson. — Pleon à processus latéraux des segments 3 à 5 bien développés et peu divergents. Pleopodes de la première paire à exopodite se terminant en une pointe subaiguë. Pleotelson plus long que large, à peine incurvé sur les côtés et à sommet subobtus. Uropodes à bas égalant presque le pleotelson; endopodite étroit, allongé et dépassant sensiblement le pleotelson; exopodite?

Couleur: Gris-brun avec des linéoles claires de part et d'autre de la ligne médiane du pereion et une zone latérale un peu moins foncée. Partie postérieure gris-uniforme.

Dimensions: longueur, 6 millimètres; largeur, 2,8 millimètres.

Saley. Un exemplaire incomplet ♂. (M. Weber).

4. *Porcellio* sp.? (exemplaires jeunes?)

Espèce de couleur blanche très-finement granulée, à lobes frontaux très-obliques, bord postérieur du premier segment presque droit, et pleotelson triangulaire à sommet arrondi.

Sumatra, Singkarah. Deux exemplaires (M. Weber).

**METOPONORTHUS.**1. *Metoponorthus pruinosus*, Brandt (*Porcellio*).

Plusieurs exemplaires:

Java,	Buitenzorg	(Prof. M. Weber).
Sumatra,	Caverne (Ngalau), près Pajakombo	" " "
Flores,	Mauernerie	" " "
"	Endeh	" " "

**ALLONISCUS.**1. *Alloniscus Floresianus*, nova species.

Corps ovale, finement granulé.

Cephalon: processus frontal médian largement triangulaire et lobes latéraux obtusément quadrangulaires. Prosépistome un peu convexe. Yeux grands, environ 18 ocelles. Antennes moyennes, fouet tri-articulé, à articles égaux.



Fig. 20a.



Fig. 20b.



Fig. 20c.

Pereion: premier segment à bord postérieur non sinueux. Segments 2 à 5 (chez la ♀) présentant une région coxale distincte et limitée sur la face dorsale par un sillon longitudinal.

Pleon, Telson. — Processus latéraux des segments pleonaux bien développés et subaigus. Exopodite des pleopodes de la première paire (chez le ♂) arrondi, avec un petit processus subaigu, et un relief semi-lunaire. Pleopodes suivants fortement ciliés. Pleotelson triangulaire presque rectangulaire. Uropodes: base droite, atteignant presque la longueur du pleotelson à côté externe un peu caréné; endopodite dépassant le pleotelson; exopodite lancéolé.

Couleur: jaunâtre clair, marbré, taché et linéolé de gris; parties latérales claires.

Dimensions: longueur, 8,5 millimètres; largeur, 4 millimètres.

Flores, Sikka. Plusieurs exemplaires, ♂♀: (Prof. M. Weber).

2. *Alloniscus albus*, nova species.

Corps ovale allongé, peu convexe, couvert de granulations qui deviennent presque spinescentes sur le cephalon et le premier segment pereial.

Cephalon: ligne frontale apicale presque droite et sans processus ni lobes. Prosépistome convexe. Yeux petits, noirs, formés de 4 ocelles. Antennes moyennes: fouet tri-articulé, les deux premier articles subégaux égalant ensemble le troisième qui se termine par un poil apical.

Pereion: Bords latéraux des deux premiers segments un peu relevés; bord postérieur presque droit.

Pleon, Telson. Processus latéraux des segments pleonaux 3—5 un peu divergents, étroits, subaigus. Pleopodes de la première paire (chez le ♂), à exopodite court muni d'un petit processus obtus. Pleotelson un peu plus court que large, triangulaire à sommet subobtus. Uropodes à base égalant le pleotelson; endopodite linéaire dépassant le pleotelson; exopodite court, lancéolé.

Couleur: Blanc.

Dimensions: longueur, 5 millimètres; largeur, 2 millimètres.

Sumatra, Manindjau. Deux exemplaires ♂♀ (Prof. M. Weber).

3. *Alloniscus coecus*, nova species <sup>1)</sup>.

Corps largement ovale, peu convexe, un peu déprimé, couvert de fines granulations, plus accentuées antérieurement.

Cephalon: ligne frontale sinueuse, avec un faible processus médian et des lobes latéraux très-obliques et subaigus. Prosépistome plan. Yeux nuls. Antennes courtes, fouet tri-articulé, à articles subégaux.



Fig. 21a.



Fig. 21b.



Fig. 22a.

1) Dans les deux espèces précédentes, les ♀ ne présentent pas de région coxale distincte. Peut-être y aura-t-il lieu de faire dans le genre *Alloniscus* deux sections (ou coupes génériques nouvelles) basées sur ce caractère.

Pereion: Premier segment à bord postérieur droit.



Pleon, Telson. — Processus latéraux des segments 3—5 assez larges, déprimés. Pleotelson triangulaire à sommet subobtus, à côtés un peu sinueux.

Uropodes: base égalant la longueur du pleotelson, endopodites petits mais dépassant le pleotelson. Exopodites? Couleur: Blanc.

Java, Buitenzorg. Trois exemplaires ♂ ♀. (Prof. M. Weber).

Sumatra, Kaju tanam. Deux exemplaires ♀. " " "

### PHILOSCIA.

#### 1. *Philoscia truncata*, nova species.

Corps lisse, brillant, avec des poils épars, surtout postérieurement.



Fig. 23a.

Pleon en retrait très-accusé.



Fig. 23b.

Cephalon: Ligne frontale non sinueuse, visible seulement sur la face inférieure<sup>1)</sup>. La partie céphalique ainsi repliée présente une dépression transversale. Lobes latéraux infléchis étroits, à bord supérieur sinueux. Prosépistome développé. Yeux grands, environ 20 ocelles. Antennes longues, les trois articles du fouet subégaux.

Pereion. — Premier segment à bord postérieur régulièrement courbé et non sinueux. Septième segment à angles postérieurs fortement tronqués; toutefois, dans certains exemplaires, ce caractère est moins fortement marqué que dans d'autres.

Pleon en retrait très-marqué, les segments pleonaux atteignant à peine la moitié de la largeur des segments pereiaux; processus latéraux des segments 3 à 5 à peine indiqués. Pleotelson triangulaire, à peu près aussi long que large, à sommet subobtus. Uropodes à base très-développée, très-allongée et dépassant de beaucoup le pleotelson, le côté externe est canaliculé. Endopodite étroitement lancéolé; exopodite à peu près deux fois plus long que l'endopodite.

Couleur: brun-foncé, avec de nombreuses petites taches et linéoles

1) Toutes les espèces du genre *Philoscia* décrites ci-dessous appartiennent au groupe (de beaucoup le plus nombreux), où la partie céphalique tergale est coudée antérieurement et refoule le prosépistome sur la face inférieure, de sorte que le rebord frontal est visible seulement sur cette face, au lieu d'être apical.

claires; parties postéro-latérales du dernier segment d'un roux clair. Pattes marbrées de brun.

Parfois, les taches claires des segments 2 et 4 se fondent en larges plages qui occupent presque tout le segment (variété *zonata*). Dans les exemplaires de Flores, les petites taches claires sont plus nettement limitées que dans ceux de Célèbes.

Dimensions: longueur, 8 millimètres; largeur, 3,3 millimètres.

Celebes, Plusieurs exemplaires ♂♀. Masarang dans la mousse d'arbres (Dr. Sarasin).

„ Soputan, 1200 mètres, dans l'humus. Plusieurs exemplaires (type et var. *zonata*). (Dr. Sarasin).

„ Un exemplaire. Sommet du Lokou (Dr. Sarasin).

Flores, Wukur, près Sikka. Quatre exemplaires (var. *zonata*) ♂♀. (Prof. M. Weber).

## 2. *Philoscia variegata*, nova species<sup>1)</sup>.

Corps lisse, glabre, pleon fortement rétréci.

Cephalon: ligne frontale non sinueuse, visible seulement sur la face inférieure. Lobes latéraux infléchis étroits. Yeux moyens, environ 18 ocelles. Antennes moins longues que dans l'espèce précédente, fouet à articles subégaux, avec un long poil apical.



Fig. 24a.

Pereion: Deux premiers segments très-faiblement sinueux postérieurement. — Septième segment à bord postérieur sinueux, à angle postéro-latéral aigu.



Fig. 24b.

Pleon en retrait sensible (moins accusé que dans l'espèce précédente); processus des segments 3 à 5 petits, presque appliqués. Pleotelson triangulaire un peu plus large que long, à côtés un peu incurvés et à sommet arrondi. Uropodes à base égalant le pleotelson, à côté externe canaliculé; endopodite linéaire, dépassant de beaucoup le pleotelson, à côté externe canaliculé, exopodite près de deux fois plus long que l'endopodite.

Couleur: fond clair, avec de larges plages, taches et linéoles brunes;

1) *Philoscia truncata* et *Ph. variegata* sont toutes deux voisines de *Ph. angusticauda*, Budde-Lund, espèce de Bornéo. — Elles en diffèrent entre autres par la forme du pleotelson qui est deux fois plus large que long dans l'espèce de Bornéo.

le quatrième segment est ponctué de brun sur fond clair. Pattes claires.  
Dimensions: longueur, 6 millimètres; largeur 2,8 millimètres.

Celebes, Masarang, Cratère. Un exemplaire ♂. (Dr. Sarasin).

„ Soputan, 1200 mètres, humus. Deux exemplaires ♂.  
(Dr. Sarasin).

### 3. *Philoscia cinctella*, nova species.

Corps lisse, glabre; pleon en retrait sensible.

Cephalon: ligne frontale peu sinueuse, visible seulement sur la face inférieure; le prosépistome est très-réduit. Lobes latéraux infléchis très-étroits. Antennes moyennes, les deux premiers articles du fouet égalent ensemble le troisième qui est muni d'un long poil apical. Yeux moyens, ocelles au nombre d'environ 20, peu distincts.



Fig. 25a.




Fig. 25b.

Pereion: Bord postérieur du premier segment presque droit. Septième segment à bord postérieur peu sinueux, à angle postéro-latéral aigu.

Pleon, Telson. — Pleon en retrait assez sensible; processus latéraux des segments 3—5 petits, mais non appliqués. Pleotelson triangulaire un peu plus large que long, à sommet obtus. Uropodes à base égalant le pleotelson, à côté externe canaliculé; endopodite linéaire dépassant de beaucoup le pleotelson; exopodite d'un tiers environ plus long que l'endopodite.

Couleur: claire, avec une double bande transversale brune sur chaque segment et une tache allongée transversale de chaque côté, entre les bandes. Pleon et pleotelson bruns, avec trois petites taches claires sur le pleotelson. Pattes claires.

Dimensions: longueur, 6,5 millimètres; largeur 2,9 millimètres.

Celebes, Masarang, mousse des arbres. Un exemplaire ♀. (Dr. Sarasin).

### 4. *Philoscia Weberi*, nova species.

Corps lisse, pleon en retrait sensible.

Cephalon: ligne frontale un peu sinueuse, visible seulement sur la face inférieure. Lobes latéraux infléchis très-courts, presque nuls. Pro-

sépistome peu développé. Yeux grands, environ 16 ocelles. Antennes

Pereion: Premier segment à bord postérieur un peu sinueux. Septième segment à angles postérieurs aigus.

Pleon, Telson. — Pleon en retrait marqué; processus latéraux des segments 3 à 5 très-petits, presque nuls. Pleotelson un peu plus court que large, sommet obtus. Uropodes à base très-allongée, dépassant le pleotelson, à côté externe canaliculé; endopodites linéaires, dépassant la moitié de l'exopodite qui est étroitement lancéolé.



Fig. 26a.



Fig. 26b.

Couleur: claire, avec des taches latérales et des linéoles gris-foncé sur les trois premiers et les trois derniers segments, presque nulles sur le quatrième, pleon présentant de larges taches foncées; extrémité des exopodites foncée.

Dimensions: longueur, 5,5 millimètres; largeur 2,4 millimètres.

Sumatra, Manindjau. Un exemplaire ♀, (Prof. M. Weber).

##### 5. *Philoscia Sundaica*, nova species.

Corps lisse. — Pleon en retrait sensible.

Cephalon: ligne frontale peu sinueuse, visible seulement sur la face inférieure; lobes latéraux infléchis courts. Prosépistome peu développé. Yeux grands, au moins 20 ocelles. Antennes assez longues; fouet à articles subégaux.

Pereion: Premier segment à bord postérieur non sinueux. Septième segment à incurvation forte et un peu sinueuse.

Pleon, Telson: Les côtés du deuxième segment ne sont pas cachés sous le dernier segment pereial. Segments 3—5 à processus très-petits, à peine distincts, à côtés finement rebordés. Pleotelson de moitié plus court que large, triangulaire à sommet subaigu. Uropodes: base dépassant un peu le pleotelson, à côté externe canaliculé; endopodite linéaire dépassant de beaucoup le pleotelson, mais n'atteignant pas à la moitié de l'exopodite qui est longuement lancéolé-linéaire.



Fig. 27a.



Fig. 27b.

Couleur: Gris-brun, avec une série de taches claires de chaque côté des segments pereiaux et des linéoles claires de part et d'autre de la



ligne médiane; pleon gris uniforme; pleotelson plus clair. La pigmentation peut diminuer d'étendue et parfois disparaître (exemplaires presque albinos du Singalang).

Dimensions: longueur, 5 millimètres; largeur, 2,2 millimètres.

Sumatra, Mont Singalang, sommet, sous les pierres. Plusieurs exemplaires. (Prof. M. Weber).

"	Manindjau.	Un exemplaire ♀.	(Prof. M. Weber).
Java,	Tjibodas	" " " " " "	"
"	Buitenzorg	" " " " " "	"

#### 6. *Philoscia pallida*, nova species.

Corps allongé, presque lisse, très-finement et presque imperceptiblement granulé sur les côtés, avec quelques poils épars postérieurement. Pleon en retrait sensible.



Fig. 28a.



Fig. 28b.

Cephalon: L'angle frontal est plus obtus que dans les autres espèces signalées ici; ligne frontale un peu sinueuse, visible seulement sur la face inférieure, lobes latéraux infléchis étroits, courts. Prosépistome peu développé. Yeux petits, environ 6 ocelles. Antennes longues, glabres; premier article du fouet égalant les deux autres réunis.

Pereion: premier segment à bord postérieur non sinueux; septième segment à incurvation régulière, non sinueuse.







Pleon, Telson. — Les côtés des deux premiers segments sont dégagés; segments 3—5 à processus petits et peu apparents, à côtés finement rebordés.

Pleotelson de moitié plus court que large, triangulaire à sommet subobtus. Uropodes à base atteignant ou dépassant à peine le sommet du pleotelson, à côté externe canaliculé; endopodite linéaire dépassant la moitié de la longueur de l'exopodite qui est grêle et linéaire.

Couleur: Blanc ou faiblement pigmenté de gris.

Dimensions: longueur, 7 millimètres; largeur 2,2 millimètres.

Java, Tjibodas. Plusieurs exemplaires, (Prof. M. Weber).




A. Dollfus del.

A. J. J. Wendel lith

P. W. M. Trap impr.






A.Dollfus del.

A.J.J.Wendel lith.

P.W.M.Trap impr.





A. Dollfus del.

A. J. J. Wendel lith.

P. W. M. Trap impr.



7. *Philoscia alba*, nova species.

Corps assez étroit, lisse, avec quelques poils épars; pleon en retrait sensible.

Cephalon: ligne frontale visible seulement sur la face inférieure. Lobes latéraux inflechis très-courts, presque nuls. Prosépistome réduit. Yeux très-petits, formés de 4 ocelles. Antennes longues, très-poilues, fouet à premier article plus long que ceux des deux autres.

Pereion: Premier segment à bord postérieur non sinueux. Septième segment fortement et régulièrement incurvé.

Pleon, Telson. — Segments du pleon sans processus latéraux. Pleo telson triangulaire, trois fois plus court que large. Uropodes à bas dépassant de beaucoup le pleotelson, à côté externe canaliculé; endopodite et exopodite linéaires, très-longs.

Couleur: Blanchâtre.

Celebes, Tomohon dans des palmiers (Arenga) pourris. Quatre exemplaires ♂ ♀. (Dr. Sarasin).

**LIGIA.**

1. *Ligia exotica*, Roux.

Celebes, Badjowa. Plusieurs exemplaires (Prof. M. Weber).



Fig. 29a.



Fig. 29b.



## EXPLICATION DES FIGURES

INSÉRÉES DANS LE TEXTE ET DES PLANCHES XIII, XIV, XV.

- 
- Fig. 1.** — *Armadillo Sarasinorum*. — *a.* Partie antérieure, cephalon et deux premiers segments pereiaux, montrant les parties coxales (face inférieure).  
*b.* Pleotelson et uropodes (face inférieure).
- Fig. 2.** — *Armadillo albipes*. — Lettres comme ci-dessus.
- Fig. 3.** — *Armadillo arcuatus*.       »       »       »
- Fig. 4.** — *Armadillo rectifrons*.       »       »       »
- Fig. 5.** — *Armadillo Floresianus*.       »       »       »
- Fig. 6.** — *Armadillo coecus*.       »       »       »
- Fig. 7.** — *Armadillo velutinus*.       »       »       »       *c.* Cinquième segment pleonal, pleotelson et uropodes avec l'exopodite, vus en dessus).
- Fig. 8.** — *Armadillo Weberi*. — Lettres comme ci-dessus (fig. 7).
- Fig. 9.** — *Armadillo brevicauda*.       »       »       »       »
- Fig. 10.** — *Toradjia Celebensis*. — *a.* Partie antérieure, cephalon et premier segment pereial (face supérieure). — *b.* Id., (face inférieure). — *c.* Uropodes (face inférieure).
- Fig. 11.** — *Toradjia Gorgona*.
- Fig. 12.** — *Toradjia cephalica*. — *a.* Partie antérieure, cephalon et deux premiers segments pereiaux, face inférieure.
- Fig. 13.** — *Mesarmadillo orientalis*. — *a.* Partie antérieure, cephalon et premier segment pereial, face supérieure. — *b.* Cephalon, face inférieure. — *c.* Côté du premier segment pereial, parties coxales. — *d.* Premier pleopode (♂). — *e.* Partie postérieure, cinquième segment pleonale pleotelson et uropodes, face supérieure. — *f.* Uropodes, face inférieure. — *g.* Maxillipède, extrémité apicale.
- Fig. 14.** — *Mesarmadillo elegans*. — Lettres comme ci-dessus (fig. 13).
- Fig. 15.** — *Mesarmadillo guttatus*.       »       »       »       »
- Fig. 16.** — *Periscyphus Weberi*. — *a.* Cephalon, vu en dessous. — *b.* Côté du premier segment pereial, face supérieure. — *c.* Premier pleopode (♂). — *d.* Uropode (face inférieure).
- Fig. 17.** — *Porcellio Sundaicus*. — *a.* Cephalon, vu en dessous. — *b.* Premier pleopode (♂).
- Fig. 18.** — *Porcellio pallidipennis*. — Lettres comme ci-dessus (fig. 17). — *c.* Uropode, face inférieure.
- Fig. 19.** — *Porcellio modestus*. — Lettres comme ci-dessus (fig. 17).
- Fig. 20.** — *Alloniscus Floresianus*. — Lettres comme ci-dessus
- Fig. 21.** —       »       *albus*.       »       »       »
- Fig. 22.** —       »       *coecus*       »       »       »
-

# AMPHIBIEN DES INDISCHEN ARCHIPELS,

VON

**Dr. P. N. VAN KAMPEN.**

Mit Tafel XVI.



Die von Prof. Weber heimgebrachte Amphibiensammlung bereichert unsere Kenntnis mit einigen neuen Arten und neuen Fundorten andrer, ist aber auch durch ihren Reichtum an Larven interessant. Die Larven der Batrachier des Archipels sind noch sehr wenig bekannt, so dass viele Arten der Sammlung noch nicht beschrieben waren. So weit ich dieselben mit Sicherheit oder doch Wahrscheinlichkeit auf eine bestimmte Art zurückführen konnte, habe ich sie beschrieben in der Weise, wie Boulenger und Flower es schon für einige Indischen Arten gethan haben. Inwieweit diese Diagnosen genügend sind, die Larven nahverwandter Arten aus einander zu halten, wird sich erst später herausstellen müssen; vielleicht sind dazu bisweilen ausführlichere Beschreibungen notwendig. Auch muss bemerkt werden, dass viele Charaktere sehr variabel sind und dass ausserdem durch die Conservierung (in Alkohol) Schrumpfung eintreten, namentlich der Flossmembranen. Die Diagnosen der Larven sind daher in mancher Hinsicht nur noch vorläufige, und nur ein grösseres Material wird ausweisen können, was die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale sind.

Ausser der Sammlung von Prof. Weber aus dem Jahre 1888—89 und wenigen Exemplaren, die er im Januar 1899 in Buitenzorg sammelte, sind im folgenden Verzeichnis noch einige kleinere Amphibien-Sammlungen aus dem Indischen Archipel aufgenommen. An erster Stelle gehören hierzu die Amphibien, welche durch die Niederländische Siboga-Expedition (1899—1900) auf verschiedenen, zoologisch oft noch wenig oder nicht erforschten Inseln gelegentlich erbeutet worden sind;

dann einige von Herrn Prof. K. Kraepelin (Hamburg) im Jahre 1904 in der Nähe von Buitenzorg gesammelte Exemplare, welche er mir zur Bestimmung überlassen hat, und endlich noch einige im Zoologischen Museum zu Amsterdam befindliche Exemplare verschiedener Herkunft. Die Exemplare, bei welchen nicht das Gegenteil hervorgehoben ist, sind sämtlich von Prof. Weber gesammelt worden.

Für Hilfe bei dieser Arbeit bin ich Herrn Boulenger, der einige meiner Bestimmungen kontrollierte, Dank verschuldet; ferner auch den Herren Prof. Boettger, Prof. Möbius, Dr. van Lidth de Jeude und Dr. Roux, die mir Exemplare zur Vergleichung überliessen.

#### RANIDAE.

##### 1. *Oxyglossus lima* Tschudi.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., 1882, p. 5.

Java: Situ Bagendit bei Garut, 1 Ex. — Buitenzorg, 4 Larven (Prof. K. Kraepelin leg.).

Beschreibung der Larve (Taf. XVI, Fig. 1). — Den Beweis, dass die erwähnten Larven zu dieser Art gehören, liefern die schon gutentwickelten hintern Extremitäten, welche in jeder Hinsicht, so namentlich durch den Besitz eines Tarsalhöckers, mit denen vom erwachsenen *O. lima* übereinstimmen. Ausserdem ähneln sie den von Boulenger (Proc. Zool. Soc. London 1897, p. 228) beschriebenen Larven von *O. laevis* Gthr. Bei einem Exemplare sind auch die Vorderbeine durchgebrochen. Nachfolgende Beschreibung gilt nur für die drei jüngeren.

Schwanzlänge  $\pm 2\frac{1}{2}$  mal die Körperlänge und  $\pm 4$  mal die Schwanzhöhe. Körperlänge  $1\frac{1}{3} - 1\frac{2}{3}$  mal die Körperbreite. Nasenloch von Schnauzenspitze und Auge gleich weit entfernt. Entfernung zwischen Auge und Schnauzenspitze kleiner als die zwischen Auge und Spiraculum. Abstand zwischen den Augen 3—4 mal die zwischen den Nasenlöchern. Spiraculum von der Basis der Hinterbeine weniger entfernt als von der Schnauzenspitze und sogar etwas weniger als vom Auge.

Die Larven haben eine sehr auffallende Gestalt, indem der Körper durch eine schwache, aber deutliche transversale Einschürung in zwei etwa gleich lange Abschnitte geteilt ist; der hintere Abschnitt ist breiter als der vordere, welcher nach vorn zugespitzt ist. Die Nasenlöcher sind einander sehr genähert. Die Augen liegen auf der Ober-

seite. Das Spiraculum liegt weit nach hinten, linksseitig, lateral, am Ende einer nach hinten und etwas nach oben gerichteten Röhre. Der Anus liegt median, wie bei *O. laevis*. Schwanz zugespitzt; untere Flosse niedrig, obere hoch, wenig niedriger als die Basis des muskulösen Teiles, nach vorn bis zur Schwanzwurzel reichend.

Der Mund ist klein und steht ganz vorn am Körper. Die Lippen bilden zusammen eine kurze Röhre mit sehr enger Öffnung. Die Kiefer sind schwarz gerandet, der untere breiter als der obere. Hornzähne fehlen.

Weisslich mit brauner Zeichnung; nur der Bauch ganz ungefleckt. Kehle mit vier braunen Längsbinden, von welchen die beiden äusseren durch eine vertikale Binde mit den Augen verbunden sind. Schwanzflossen mit dunkeln Flecken, welche sich bis auf die Ober- und Unterseite des muskulösen Teiles fortsetzen; dieser hat ausserdem eine braune Seitenlinie an der Basis.

Körperlänge 11 mm.; Schwanzlänge 28 mm.; Körperbreite 7 mm.; Körperhöhe 6 mm.; Schwanzhöhe 7 mm.

## 2. *Rana kuhli* Schleg.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 20.

Java: Tjibodas, viele Ex., juv.

## 3. *Rana macrodon* Kuhl.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 24, Taf. I, Fig. 4.

Sumatra: Umgebung von Solok und Singkarah, viele Ex., juv.;

Matua, 2 Ex., juv.

Flores: Maumeri, viele Ex., juv.; Kotting, 1 Ex., juv.

Es liegen mir grösstenteils nur sehr junge Tiere vor, welche ich nicht immer mit Sicherheit von jungen *R. modesta* unterscheiden kann, so dass die Exemplare von Flores auch zu dieser Art gehören könnten.

## 4. *Rana modesta* Blgr.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 25, Taf. I, Fig. 3; Proc. Zool. Soc. London 1897, p. 228.

Müller, Verhandl. Naturf. Ges. Basel, Bd. X, H. 3, 1895, p. 867.

Celebes: Kwandang, 1 Ex., juv. (Siboga-Exped.).

Saleyer: 1 Ex., juv.

Talaut-Inseln, 6 Ex., ♂ und ♀ (Siboga-Exp.).

Nusa Laut, 1 Ex., ♀ (Siboga-Exp.).

Diese Fundorte sind interessant, weil *R. modesta* bis jetzt nur von Celebes bekannt war. Die Unterscheidung zwischen *R. modesta* und *macrodon* ist, wie Müller hervorhebt, oft schwierig; die Zugehörigkeit der Exemplare der Talaut-Inseln zu *R. modesta* ist aber durch die Stimmsäcke der Männchen sichergestellt. Ausserdem ist das Vorkommen dieser Art auf den Talaut-Inseln nicht befremdend, wegen der bekannten Übereinstimmung der Fauna dieser Inseln mit der von Celebes. Dasselbe gilt für Saleyer; das hier von Prof. Weber gefundene jugendliche Tier könnte aber auch zu *R. macrodon* gehören. Weniger zu erwarten war *R. modesta* auf Nusa Laut (östlich von Ambon); das weibliche Exemplar von dieser Insel lässt sich aber kaum von denen der Talaut-Inseln unterscheiden und zeigt alle Merkmale von *R. modesta*: der Interorbitalraum ist ein wenig schmaler als das obere Augenlid; die Gaumenzähne fangen in der Höhe des Hinterrandes der Choanen an; zwischen den Augen befindet sich eine Hautfalte; die Kopfrumpflänge beträgt 66 mm.

##### 5. *Rana microtympaum* n. sp. (Taf. XVI, Fig. 2).

Celebes: Loka bei Bonthain, 6 ausgebildete Ex. und 8 Larven.

Vomerzähne in zwei kurzen, schrägstehenden Reihen, welche zwischen den Hinterrändern der Choanen anfangen und nach hinten über dieselben hinausragen. Unterkiefer vorn mit zwei kurzen, stumpfen Zahnfortsätzen. Kopf so lang wie breit; Schnauze ziemlich spitz, kürzer als die Orbita; Canthus rostralis winklig, gerade; Lorealgegend wenig schief, konkav; Nasenloch gleich weit entfernt von Schnauzenspitze und Orbita; oberes Augenlid so breit wie der Interorbitalraum oder ein wenig breiter. Trommelfell sehr klein,  $\frac{1}{3}$  Augengrösse. Finger mit etwas geschwollenen Spitzen; der erste Finger gleich lang oder etwas kürzer als der zweite. Zehen mit kleinen, aber deutlichen Scheiben; die Schwimmhaut erreicht alle Scheiben; ein Hautsaum längs der Aussenseite der fünften Zehe; eine Tarsalfalte; Subartikartuberkel mittelmässig; innerer Metatarsalhöcker länglich, so lang wie oder etwas länger als die Hälfte der ersten Zehe; kein äusserer Metatarsaltuberkel. Das Tibiotarsalgelenk reicht bis zwischen Auge und Schnauzenspitze.

Haut des Rückens warzig; eine ziemlich starke Falte über dem Trommelfell; keine Seitenfalte; obere Augenlider hinten mit kleinen

Warzen; eine Falte zwischen deren Hinterrändern. Unterseite glatt.

Die Farbe der Oberseite (in Alkohol) ist braun mit verwaschenen dunkeln Flecken; eine dunkle, vorn hell gerandete Querbinde zwischen den Augen; Lippen dunkel gewürfelt; Extremitäten mit dunkler Querbänderung. Unterseite hellgelblich, mit oder ohne brauner Marmorierung der Kehle.

Die Kopfrumpflänge des grössten Exemplares beträgt 32 mm. Die Tiere haben aber wenig entwickelte Geschlechtsorgane und sind wahrscheinlich noch jung.

Auf Anraten von Herrn Boulenger habe ich für diese Tiere, welche jungen *Rana modesta* Blgr. sehr ähnlich sind, eine neue Art aufgestellt. Von der genannten Art unterscheiden sie sich durch das Längenverhältnis der ersten Finger und namentlich durch das kleine Trommelfell.

Beschreibung der Larve. — Die Larven sind durch Übergänge mit den entwickelten Tieren verbunden. Alle besitzen schon Anlagen der hintern Extremitäten.

Schwanzlänge etwas weniger als 2 mal die Körperlänge und 4—5 mal die Schwanzhöhe. Körperlänge etwa  $1\frac{1}{2}$  mal die Körperbreite oder etwas kürzer. Nasenloch vom Auge etwa so weit entfernt wie der horizontale Durchmesser der Augen beträgt, etwas weiter von der Schnauzenspitze. Auge gleich weit von der Schnauzenspitze wie vom Spiraculum entfernt. Entfernung zwischen den Nasenlöchern wenig kleiner als die zwischen den Augen und etwa so gross wie die Mundbreite. Spiraculum gleich weit entfernt von der Schnauzenspitze wie von der Basis der Hinterbeine.

Schnauze nach unten umgebogen und dadurch, von oben gesehen, sehr kurz. Augen auf der Oberseite. Spiraculum linksseitig, nach oben und hinten gerichtet. Anus rechtsseitig nahe dem Unterrande der Schwanzflosse. Schwanz an der Spitze abgerundet; die Flossen niedrig, die untere mit ziemlich geradem Rande, die obere bis zur Schwanzwurzel reichend, an der Basis des Schwanzes sehr niedrig, weiterhin etwas höher als die untere Flosse, mit konvexem Rande.

Rand der Unterlippe und Seitenrand den Oberlippe mit wenig zahlreichen Papillen. Kiefer schmal schwarz gerandet. Zahnreihen:  $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ ; die Zähne sind sehr schwach und bei den meisten Larven ganz undeutlich.

Oberseite, muskulöser Teil des Schwanzes und bisweilen ein Teil der Flossen braun; sonst farblos.

Körperlänge 13 mm.; Schwanzlänge 25 mm.; Körperbreite 10 mm.; Körperhöhe 7 mm.

6. *Rana microdisca* Bttgr.

Boettger, Ber. Offenbacher Ver., 1892, p. 137; Semon's Zool. Forschungsreisen, Bd. V, Lief. 1, 1894, p. 113, Taf. V, Fig. 2 *a-d*.

Müller, Verh. Naturf. Ges. Basel, Bd. X, H. 3, 1895, p. 839.

Boulenger, Proc. Zool. Soc. London 1897, p. 230.

Celebes: Loka bei Bonthain, 1 Ex.

Das Trommelfell ist sehr undeutlich.

7. *Rana tigrina* Daud.

Boulenger, Cat. Batr. Sal, p. 26.

Java: Buitenzorg (1899), viele Ex.; Situ Bagendit bei Garut, 1 Ex.

Lombok: bei der Pidjot-Bai, 2 Ex. (Siboga-Exp.); bei Labuan Tring, 1 Ex. (Siboga-Exp.).

Rotti, 5 Ex., juv. (Prof. A. Wichmann leg., 1889).

Flores: Reo, 5 Ex.

Celebes: Makassar, 1 Ex.; Luwu, 3 Ex.; Pare-Pare, 1 Ex.

Allen Stücken fehlt der Zahnfortsatz des Unterkiefers fast ganz. Daneben besitzen sie noch einige andere Merkmale, durch welche sie sich konstant von den Exemplaren aus Vorder-Indien, die ich habe vergleichen können, unterscheiden. So ist z. B. die Schwimmhaut weniger vollständig: es bleibt immer wenigstens das letzte Glied der 4. Zehe und die Innenseite der Endphalange der 2. und 3. Zehe frei (vergl. Taf. XVI, Fig. 3 *a, b*). Auch der Hautsaum der 5. Zehe ist meistens etwas weniger entwickelt und die Schnauze ist stumpfer.

7a. *Rana tigrina* Daud. var. *angustopalmata* nova (Taf. XVI, Fig. 3 *c*).

Sumba: Fluss bei Waingapu, 3 Ex. (Siboga-Exp.).

Celebes: Tempe, 1 Ex.; Fluss La-Palupa bei Tempe, 7 Ex.;

Pampanua, 1 Ex.; Katjang, 2 Ex.; Maros, 1 Ex.;

Pare-Pare, 2 Ex. — Makassar, 1 erwachsenes Ex. (Siboga-Exp.), zahlreiche junge Ex. und Larven.

Salayer: 2 Ex.

Diese Varietät bildet einen Übergang zu *R. limnocharis*. Sie unterscheidet sich nämlich durch die Schwimmhäute der Zehen, welche nicht oder fast nicht länger sind als bei *R. limnocharis*: von der

vierten Zehe sind die 3 oder  $2\frac{1}{2}$  letzten Glieder, von den übrigen Zehen ist die Endphalange und von der zweiten und dritten Zehe ausserdem die Innenseite des vorletzten Gliedes frei, oder zum Teil durch einen schmalen Hautsaum eingefasst. Auch der Hautsaum an der Aussenseite der fünften Zehe ist nicht mehr entwickelt als bei *R. limnocharis*. Dagegen fehlt ein äusserer Metatarsaltuberkel (sieh p. 390, unter *R. limnocharis*). Weil dieser aber nach Boulenger auch bei *R. limnocharis* nicht immer vorhanden ist, würde ich die Tiere gewiss zu dieser Art gebracht haben, von welcher einzelne Stücke sonst fast gar nicht zu unterscheiden sein, wenn nicht zwei derselben (beide Weibchen) für *R. limnocharis* viel zu gross wären: das eine (von Pampanua) erreicht 80, das andere (von Tempe) sogar 92 mm. Körperlänge.

Beschreibung der Larve. — Die Larven von Makassar, welche durch Übergänge mit den ausgebildeten Exemplaren verbunden sind, sind merkwürdigerweise sehr verschieden von der Beschreibung, welche Flower (Proc. Zool. Soc. London 1899, p. 892) von der Larve von *R. tigrina* giebt.

Schwanzlänge meistens etwas mehr als  $1\frac{1}{2}$  mal die Körperlänge, welche  $\pm 1\frac{1}{2}$  mal die Körperbreite beträgt. Nasenloch von der Schnauzenspitze etwas weniger entfernt als vom Auge; dieses von Schnauzenspitze und Spiraculum etwa gleich weit entfernt. Abstand zwischen den Augen  $\pm 2\frac{1}{2}$  mal der Abstand zwischen den Nasenlöchern und grösser als die Breite des Mundes. Spiraculum etwa in der Mitte der Körperlänge.

Augen auf der Oberseite. Spiraculum linksseitig, lateral, nach oben und hinten gerichtet. Anus an der rechten Seite, nahe dem Unterande der Schwanzflosse. Schwanz am Ende abgerundet; die Flossen niedrig, die obere im frischen Zustande wahrscheinlich etwas höher als die untere, bis zur Schwanzwurzel reichend.

Der Mund stimmt fast ganz mit dem der Larve von *R. macrodon* nach der Beschreibung von Flower (l. c., p. 889) überein. Seiten und unterer Rand mit Papillen. Kiefer schwarz gerandet. Zähne  $\frac{1}{3}1$ ; die äussere der unteren Reihen kürzer als die beiden andern, die innere nicht unterbrochen.

Körper grau, oben mehr bräunlich, mit undeutlicher Marmorierung; Unterseite weiss. Schwanz mit den Flossen braun gefleckt. Helle



Vertebrallinie und dunkle Binde zwischen den Augen bei älteren Larven oft schon vorhanden.

Körperlänge 15,5 mm.; Schwanzlänge 26 mm.

8. *Rana limnocharis* Wiegman.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 28 (*R. gracilis*); Fauna Brit. India, Rept. and Batr., 1890, p. 540.

Werner, Verhandl. Ges. Wien, Bd. XLVI, 1896, p. 22.

Sumatra: Pajakomboh, 4 Ex.; Telago apabilo, viele Ex.; Ajer tegenang, 2 Ex.; Umgebung von Solok und Singkarah, viele Ex.

Java: Buitenzorg (1899), viele Ex.

Lombok: bei der Pidjot-Bai, 3 Ex. (Siboga-Exp.).

Wie Werner finde ich bei allen Exemplaren einen kleinen Metatarsaltuberkel. Dagegen besteht in der Breite des gelben Rückenstreifens kein Unterschied mit *R. tigrina*, da er bei beiden Arten sowohl schmal wie breit sein kann. Wenn bei *R. limnocharis* eine breite Vertebrallbinde vorhanden ist, findet man in der Mittellinie derselben gewöhnlich noch eine schmalere und noch hellere Linie; es scheint also, als ob die schmale und die breite Linie zwei von einander unabhängige Merkmale wären.

9. *Rana erythraea* Schleg.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 65.

Sumatra: Ajer tegenang, 1 Ex.; Padang-Pandjang und Kaju tanam, 2 Ex. und 1 juv.; Solok und Singkarah, mehrere erwachsene und junge Ex. und 8 Larven.

Java: Buitenzorg, 1 Ex.; Tjitajam, 2 Larven (K. Kraepelin leg.).

Bei einem der Exemplare von Padang-Pandjang ist die Kehle dunkel gefleckt.

Beschreibung der Larve. — Von den beiden von Herrn Prof. Kraepelin gesammelten Larven besitzt die eine schon vollständig entwickelte hintere Extremitäten und gehört deutlich zu *R. erythraea*; das junge Tier von Kaju tanam bildet ausserdem einen Übergang zu den erwachsenen Tieren. Da meines Wissens die Larve dieser so verbreiteten Art noch nicht bekannt ist, gebe ich hier eine Beschreibung derselben, hauptsächlich nach den (besser conservierten) von Java.

Schwanzlänge etwa 2 mal die Körperlänge und  $3\frac{1}{2}$ —4 mal die Schwanzhöhe. Körperlänge etwa  $1\frac{3}{4}$  Körperbreite. Nasenloch der Schnauzenspitze näher als dem Auge; dieses von der Schnauzenspitze und vom Spiraculum gleich weit entfernt. Der Abstand zwischen den Augen beträgt etwa zwei Drittel der Körperbreite und mehr als zweimal die Entfernung zwischen den Nasenlöchern; letztere ist etwas kleiner als die Breite des Mundes. Spiraculum der Basis der Hinterbeine näher als der Schnauzenspitze.

Augen auf der Oberseite, später aber auch von unten her sichtbar. Spiraculum linksseitig, lateral, nach oben und hinten gerichtet. Anus rechtsseitig, dem unteren Rande des Schwanzes genähert. Schwanz von der Wurzel an bis etwa halbweg etwas in Höhe zunehmend, dann niedriger und in eine Spitze endend; der muskulöse Teil nimmt jedoch schon von der Wurzel an in Höhe ab; die untere Flosse ist etwas niedriger als die obere und hat im höchsten Teil etwa die Hälfte der Höhe des muskulösen Teiles an der Basis; die obere Flosse reicht bis zur Schwanzwurzel.

Unterlippe und Seiten der Oberlippe mit Papillen. Kiefer schmal schwarz gerandet. Zähne  $\frac{1}{1,1}$ , die äussere untere Reihe am kürzesten, die innere fast ununterbrochen.

Weiss; Rücken und Körperseiten graubraun, mehr oder weniger deutlich marmoriert; auch der Schwanz mit den Flossen ist marmoriert, aber heller. Charakteristisch sind (wenigstens bei älteren Larven) drei weisse Linien: eine Vertebrallinie von der Oberseite des Kopfes bis zur Schwanzflosse und zwei an der Stelle der späteren Seitenfalten; die zwei letzteren sind anfänglich so schmal wie die Vertebrallinie, später aber breiter und wie beim erwachsenen Tiere unten dunkel eingefasst; auch beim jungen Tiere von Kaju tanam sind die drei Linien noch vorhanden. Eine dunkle Längsbinde jederseits an der Basis des Schwanzes. Auf Schwanz und Unterseite des Körpers wenige zerstreute, dunkle Tüpfel.

Maasse der beiden Exemplare von Java:

Körperlänge:	18 mm.	15 mm.
Schwanzlänge:	40 "	29 "
Körperbreite:	10 "	8,5 "
Körperhöhe:	9 "	7,5 "
Schwanzhöhe:	10 "	8 "

10. *Rana javanica* Horst.

Horst, Notes Leyden Mus., Vol. V, 1883, p. 243 (*R. macularia* var. *javanica*).

Java: Tjibodas, 1 Ex.

Das mir vorliegende Tier, ein Weibchen, stimmt genau mit den von Horst als *R. macularia* var. *javanica* beschriebenen Exemplaren, die ich im Museum zu Leiden vergleichen konnte, überein. Nur ragen die Vomerzähne nicht hinter die Choanen hinaus, ein Unterschied, der aber wenig wichtig ist, weil viele andere *Rana*-Arten in derselben Weise variiren (cf. *R. chalconota*). Die Nasenlöcher sind der Schnauzenspitze nur wenig mehr genähert als der Orbita. Die Scheiben der Finger und Zehen sind klein, aber deutlich. Die Tibia ist etwas länger als die halbe Kopfrumpflänge. Der Rücken ist nicht ganz glatt, sondern sehr feinkörnig; dies trifft aber auch für einen Teil der Originalexemplare zu. Seitliche Drüsenfalte schmal, heller gefärbt als der Rücken; unter ihr an den Körperseiten einige zerstreute Drüsen. Körperlänge 42 mm. Die Männchen der Originalexemplare haben ausser der Armdrüse auch einen subgularen Schallsack.

Boulenger (Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. VIII, 1891, p. 291) hat diese Art mit *R. nicobariensis* Stol. identifiziert. Die Originalexemplare unterscheiden sich von dieser aber durch die weiter von der Schnauzenspitze entfernten Nasenlöcher, den breiteren Interorbitalraum (etwa  $1\frac{1}{2}$  mal so breit wie das obere Augenlid) und die kürzere Schwimmhaut: dieselbe lässt die Phalangen der ersten und zweiten und die Innenseite der Phalangen der dritten Zehe fast ganz frei, an der Aussenseite der dritten und der Innenseite der fünften Zehe erreicht sie das Ende der ersten Phalange, von der vierten Zehe ist nur das erste Glied halb behütet. Einige Übereinstimmung besteht auch mit *R. gracilis* Grav., aber auch von dieser weicht *R. javanica* in mehreren Punkten ab (Lage der Nasenlöcher, Längenverhältnis der Finger u. s. w.). Hingegen scheint es, mir nach der Beschreibung zu urteilen, sehr wohl möglich, dass *R. lemniscata* Bttgr. (Boettger, Zool. Anz. 1893, p. 337) mit *R. javanica* identisch ist.

11. *Rana chalconota* Schleg.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 66.

Boettger, Ber. Offenb. Ver. 1892, p. 141.

Sumatra: Kaju tanam, mehrere Larven.

Java: Buitenzorg (1899), 1 Ex.; Tjibodas, mehrere Ex.

Celebes: Loka bei Bonthain, 5 Ex.

Bei den meisten, namentlich den älteren Tieren springen die Vomerzähne über das Niveau der Choanen nach hinten vor; diese schon von Boettger und Werner (Verh. Zool. bot. Ges. Wien XLVI, 1896, p. 22) erwähnte Eigentümlichkeit ist also gewiss keine Ausnahme. Ein kleiner, bisweilen undeutlicher, äusserer Metatarsaltuberkel ist immer vorhanden. Die Kehle ist bei mehreren Exemplaren mehr oder weniger dicht dunkel marmoriert. Die Breite der Drüsenfalte ist sehr variabel.

Boulenger erwähnt *R. chalconota* nicht in seiner Liste der Amphibien von Celebes (Proc. Zool. Soc. 1897); die von Peters von dieser Insel erwähnten Exemplare identifiziert er mit *R. everetti* Blgr. Das Exemplar, welches Peters in dem Monatsber. Akad. Berlin 1872 (p. 585) erwähnt, habe ich durch das freundliche Entgegenkommen von Herrn Prof. Möbius vergleichen können; es besitzt breite Drüsenfalten und es ist mir nicht möglich es von *R. chalconota* zu unterscheiden. Auch die in der obenstehenden Liste erwähnten Exemplare von Loka stimmen ganz mit aus Java stammenden Individuen von *R. chalconota* überein; es sind jedoch alle noch junge Tiere (sieh auch unten, bei *R. everetti*, p. 395).

Das Original Exemplar von *Polypedates Junghuhnii* Blkr. (Bleeker, Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indië, Dl. XI, 1856, p. 469) befindet sich im Museum zu Leiden und ist nicht von *R. chalconota* verschieden.

Beschreibung der Larve. — Die meisten der erwähnten Larven von Kaju tanam besitzen schon wohl entwickelte Extremitäten und sind hieran mit ziemlich grosser Sicherheit als *R. chalconota* zu bestimmen. Sonst wäre nur noch an *R. labialis* Blgr. zu denken, aber mit den von Flower (Proc. Zool. Soc. 1896, p. 903) beschriebenen Larven dieser Art haben sie wenig Ähnlichkeit. Die folgende Beschreibung gilt für die Larven, bei denen die Vorderextremitäten noch verborgen sind.

Länge des Schwanzes etwa  $1\frac{3}{4}$  mal die des Körpers und mehr als 5 mal so gross wie die Schwanzhöhe. Körper etwa  $1\frac{1}{2}$  mal so lang wie breit. Nasenloch von Schnauzenspitze und Auge gleich weit entfernt. Auge ungefähr ebenso fern von der Schnauzenspitze wie vom Spiraculum. Die Entfernung zwischen den Augen ist  $\pm 2$  mal die zwischen den Nasenlöchern,  $\pm 1\frac{1}{2}$  mal die Breite des Mundes und

ungefähr die Hälfte der Körperbreite. Das Spiraculum ist der Basis der Hinterbeine näher als der Schnauzenspitze.

Augen auf der Oberseite. Spiraculum linksseitig, ganz lateral, nach oben und hinten gerichtet. Anus rechtsseitig, nahe dem Unterrande des Schwanzes. Schwanz gleichmässig verschmälert, mit spitzem Ende; die Flossen gleich hoch, sehr niedrig (vielleicht aber im Alkohol geschrumpft), viel niedriger als der muskulöse Teil; die obere Flosse reicht bis zur Schwanzwurzel.

Rand der Unterlippe und Seitenrand den Oberlippe mit Papillen. Kiefer schmal schwarz gerandet. Zähne  $\frac{2}{1}\frac{1}{2}$ ; die innere der oberen Reihen sehr klein, bisweilen fehlend; die unteren Reihen wenig verschieden in der Länge, aber die äussere am kürzesten, die innere kaum merklich unterbrochen.

Weiss; Rückenseite braun gefleckt oder marmoriert; muskulöser Teil des Schwanzes hellbraun.

Maasse eines der grössten Exemplare: Körperlänge 16 mm.; Schwanzlänge 27 mm.; Körperbreite 10 mm.; Körperhöhe 8 mm.

## 12. *Rana everetti* Blgr.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 72, Taf. VI; Proc. Zool. Soc. London 1897, p. 232.

Celebes: Loka bei Bonthain, 4 ausgebildete Ex. und zahlreiche Larven.

Diese Art steht *R. chalconota* gewiss sehr nahe. Ich bringe zu ihr vier Stücke, zwei erwachsene und zwei junge, die sich hauptsächlich nur durch die kürzere und mehr abgerundete Schnauze, welche nur wenig über den Unterkiefer vorragt, von *R. chalconota* unterscheiden. Der Rücken ist sehr fein gekörnelt. Die Zehen sind nicht, wie Boulenger angibt, ganz behäutet, sondern die beiden letzten Glieder der vierten Zehe ragen frei vor. Die übrigen Unterschiede mit *R. chalconota*, welche Boulenger in seiner Diagnose angibt (Lage der Vomerzähne, Besitz eines äusseren Metatarsaltuberkels, schmale Drüsenfalte u. s. w.) sind jetzt fast alle hinfällig geworden (sieh oben bei *R. chalconota*). Herr Boulenger, dem ich diese Stücke und die oben erwähnten aus Celebes stammenden Exemplare von *R. chalconota* sandte, teilte mir denn auch mit, dass er weitere Untersuchungen notwendig urteilt, um die Unterscheidung zwischen *R. chalconota* und *everetti* aufrecht zu erhalten.

Beschreibung der Larve. — Die von Prof. Weber in Loka gesammelten Larven, welche, wie Übergänge zeigen, sicher zu *R. chalconota* oder *everetti* gehören, weichen sehr ab (namentlich in den Merkmalen des Mundes und in der Färbung) von den oben als wahrscheinlich zu *R. chalconota* gehörig beschriebenen, während sie ziemlich gut mit Boulenger's Beschreibung der Larven von *R. everetti* übereinstimmen. Es scheint dies daher doch auf einen Unterschied zwischen den beiden Arten hinzudeuten. Die obere Schwanzflosse ist etwas höher als die untere; die Länge des Schwanzes  $3\frac{1}{2}$ —5 mal so gross wie die Höhe. Der Mund ist etwas schmaler als der Interocularraum. Zähne  $\frac{4}{1} \frac{4}{2}$ , die innere untere Reihe kaum unterbrochen. Die Farbe ist wie Boulenger angibt; nur ist die obere Schwanzflosse meistens nicht oder schwach gefärbt. Die Larven sind sehr gross; bei einer der grössten ist die Körperlänge 20 mm., die Schwanzlänge 44 mm., die Schwanzhöhe 9 mm.

### 13. *Rana celebensis* Ptrs.

Peters, Monatsber. Akad. Berlin, 1872, p. 585 (nec Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 70; Proc. Zool. Soc. London 1897, p. 232).

? Celebes: Gorontalo (gesammelt von Herrn Kimmel) <sup>1)</sup>.

Diese Art wurde von Peters beschrieben nach einem Exemplare von Menado, das er aus dem Museum zu Leiden empfangen hatte, und welches von Schlegel den Namen „*celebensis*“ bekommen hatte. In Leiden fand ich jetzt noch eine Flasche mit einem erwachsenen und mehreren jungen Tieren, gesammelt von Forsten in Menado, und mit dem Namen „*Rana celebensis*“ versehen. Die Tiere stimmten ziemlich gut mit Peters' Beschreibung überein, nicht aber mit der später von Boulenger gegebenen Diagnose: sie gehören aber offenbar zu *R. varians* Blgr. Durch die Güte von Herrn Prof. Möbius konnte ich auch das Original Exemplar von Peters vergleichen und fand, dass es sich in einigen Hinsichten von den jetzt noch in Leiden vorhandenen unterscheidet, ohne aber mit *R. celebensis* von Boulenger identisch zu sein. Die Beschreibung dieses Original Exemplares lautet wie folgt.

Vomerzähne in zwei kurzen Reihen, welche bis etwas hinter das

---

1) Der Finder gab seinem Gedächtnisse nach als Fundort Kahajan, Mittel-Borneo, an; weil er aber auch in Gorontalo gesammelt hat, ist hiermit das Vorkommen der Art auf Borneo noch nicht sichergestellt.

Niveau der Choanen reichen. Kopf länger als breit; Schnauze gerundet, über den Unterkiefer vorragend, so lange wie die Orbita. Canthus rostralis gerade, winklig; Lorealgegend fast vertikal, konkav; Nasenloch näher der Schnauzenspitze als dem Auge. Interorbitalraum so breit wie das obere Augenlid. Trommelfell deutlich, horizontal-oval, fast so gross wie das Auge. Erster Finger deutlich länger als der zweite, so lang wie der vierte. Zehen fast ganz behäutet, die zwei letzten Phalangen der vierten Zehe frei. Scheiben an Fingern und Zehen sehr deutlich. Subartikultuberkel wohl entwickelt; zwei Metatarsaltuberkel, der innere oval, stumpf, der äussere rund, wenig kleiner als der innere; keine Tarsalfalte. Das Tibiotarsalgelenk erreicht das Nasenloch; Tibia etwas kürzer als die vordere Extremität, länger als die halbe Kopfrumpflänge.

Haut des Rückens feinkörnig; eine deutliche, breite (etwa wie bei *R. erythraea*) Drüsenfalte an jeder Seite des Rückens; ausserdem zwischen diesen Falten zwei Längsreihen von grossen, flachen Warzen und zerstreute kleinere Warzen an den Seiten des Körpers; kleine Warzen auch auf der Oberseite der Ober- und Unterschenkel; Unterseite glatt.

Oberseite braun; Lorealgegend, Temporalfleck, Falten und Warzen des Rückens und Querbänder auf den Extremitäten dunkler; eine weisse Binde längs der Oberlippe; Unterseite hell gefärbt.

Kopfrumpflänge 46 mm.

Von Boulenger's Beschreibung von *R. celebensis* weicht das Original-exemplar demnach namentlich durch das Längenverhältnis der ersten Finger ab, von *R. varians* durch die breitere Drüsenfalte und die Drüsen des Rückens; auch sind die Fingerscheiben etwas grösser als bei den in Leiden vorhandenen Exemplaren.

Das oben verzeichnete, von Herrn Kimmel gesammelte Exemplar, welches in der Breite der Drüsenfalten mit dem Original-exemplar von *R. celebensis* übereinstimmt, zeigt aber durch kleinere Fingerscheiben und Fehlen der grossen Rückendrüsen Annäherung an *R. varians*; auch ist die Schnauze etwas länger als die Orbita und stehen die Vomerzähne ganz zwischen den Choanen. Es scheint mir nicht unmöglich, dass *R. celebensis* und *varians* identisch sind.

Boulenger hat seine Diagnose von „*R. celebensis*“ gegeben nach einem Exemplare von unbekannter Herkunft und andere Exemplare scheinen

von dieser Art nicht bekannt zu sein. Diese Art stammt also wahrscheinlich gar nicht aus Celebes.

14. *Rana jerboa* Gthr.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 67; Ann. Mag. Nat. Hist. (5), Vol. XIII, 1884, p. 397 (*R. masonii*); Ann. Mus. Genova (2a), Vol. XIII, 1893, p. 335).

Boettger, Ber. Offenbacher Ver. 1892, p. 138 (*R. masoni*).

Sumatra: Paninggahan, 1 Ex.

Java: Tjibodas, 2 erwachsene Ex. und 4 Larven.

Bei den drei ausgebildeten Tieren stehen die Vomerzähne zwischen den Choanen, welche keine auffallende Grösse haben. Die Tiere von Tjibodas sind ein ♂ von 42, und ein ♀ von 68 mm. Kopfrumpflänge. Die Rückenhaut des Männchens ist dicht körnig mit zerstreuten Warzen.

Das Exemplar von Sumatra, ein ♂ von 30 mm. Kopfrumpflänge, ist deshalb interessant, weil *Rana jerboa* von dieser Insel noch nicht nachgewiesen war, obgleich sie in Hinter-Indien, Borneo und Java aufgefunden ist. Das Tier weicht ab durch die sehr deutliche Bänderung der Extremitäten, hat aber übrigens alle Merkmale von *R. jerboa*. Im Museum zu Leiden befindet sich übrigens ein typisches Exemplar dieser Art von Sumatra.

Beschreibung der Larve. — Über die Larven von Tjibodas hat schon Max Weber eine kurze Mitteilung mit Abbildung veröffentlicht (Ann. Jardin Bot. Buitenzorg, Suppl. II, 1898, p. 10); er fand sie in einem schnellfliessenden Bache, wo sie sich an Steinen festsaugten. Ich schreibe sie nur mit Zweifel *R. jerboa* zu, weil sie mit den Larven, welche Boulenger als zu dieser Art gehörig betrachtet (Cat. Batr. Sal., p. 89; Proc. Zool. Soc. 1893, p. 526 sq.) namentlich in der Zahnformel nicht übereinstimmen. Da aber auch von diesen die Zugehörigkeit zu *R. jerboa* nicht feststeht, können die von Prof. Weber gesammelten Larven doch sehr wohl zu dieser Species gehören, namentlich auch mit Rücksicht auf die an demselben Ort gefundenen erwachsenen Exemplare. Jedenfalls weist die Tatsache, dass jetzt zwei verschiedene Larven mit Saugnäpfen von Java bekannt sind, darauf hin, dass auf dieser Insel ausser *R. jerboa* noch eine mit ihr verwandte *Rana*-Art lebt, welche dort noch nicht aufgefunden worden ist.



Die Beschreibung der Larven lautet:

Körper fast anderthalb mal so lang wie breit (die Breite etwa gleich dem Abstände vom vordern Körperende bis zum hintern Ende der Saugscheibe). Schwanz etwa  $1\frac{3}{4}$  Körperlänge. Nasenlöcher den Augen mehr genähert als der Schnauzenspitze. Augen auf der Oberseite, dem Spiraculum etwas näher als der Schnauzenspitze, weiter von einander entfernt als die Nasenlöcher. Mund mit den Lippen zwei mal breiter als die Entfernung zwischen den Augen. Spiraculum lateral, auf der linken Seite, nach hinten und oben gerichtet, dem hintern Körperende weit mehr genähert als dem vordern. Analtube, infolge des Fehlens einer deutlichen Flosse an der Schwanzbasis, median. Die Schwanzflossen niedrig, reichen nach vorn nicht bis zur Schwanzwurzel, die untere setzt sich aber als eine schwache Leiste so weit fort. Schwanzlänge ungefähr  $4\frac{1}{2}$  mal die Höhe an der Basis,  $3\frac{1}{2}$  mal die grösste Höhe, die Flossen mit einbegriffen. Spitze des Schwanzes abgerundet, nicht zugespitzt wie bei den von Boulenger beschriebenen Larven.

Ober- und Unterkiefer mit schwarzem, schwach gezähneltem Rande, nicht gerippt, beide aus einem Stücke. Untere, und Seiten der oberen Lippe mit niedrigen Papillen. Zahnformel konstant  $\frac{4}{1} \frac{4}{8}$ , die äusseren Reihen in beiden Lippen sehr zart und zuweilen unvollständig. Hinter dem Munde eine grosse Saugscheibe, deren hinteres Ende in derselben Vertikallinie liegt, wie die vordere Spitze der Spiraculartube; sie wird seitlich und hinten durch einen hohen freien Hautsaum, vorn durch die Unterlippe eingefasst.

Farbe (in Alkohol): Oberseite des Körpers graubraun, Unterseite farblos; Schwanz braun mit helleren Flecken; Flosse farblos, nur mit einzelnen braunen Tüpfeln längs der Basis.

Die vier Larven sind alle fast gleich gross, mit wenig entwickelten hinteren Extremitäten; beim am meisten geförderten Exemplare sind noch keine Haftscheiben, wohl aber eine Schwimnhaut zu erkennen. Die Maasse dieses Tieres sind: Körperlänge 16 mm.; Schwanzlänge 28 mm.; Körperbreite 11 mm.

#### 15. *Rana hosii* Blgr.

Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol VIII, 1891, p. 290.

Sumatra: Umgebung von Singkarah, 2 Ex.

Diese Art was bis jetzt nur von Borneo bekannt.

Das grösste Exemplar (85 mm. Kopfrumpflänge) stimmt ganz mit

Boulenger's Beschreibung überein; das kleinere (48 mm.) weicht ab durch den Interorbitalraum, welcher etwas schmaler ist als das obere Augenlid und durch die geringere Grösse der äusseren Fingerscheiben, deren Mittellinie nur etwas mehr als der halbe Trommelfelddurchmesser beträgt. Von *R. jerboa* Gthr. sind beide Tiere übrigens durch den stark körnigen Rücken ohne Warzen und durch die der Schnauzenspitze genäherten Nasenlöcher deutlich verschieden.

16. *Rana baramica* Bttgr.

Boettger, Abh. Senckenb. Naturf. Ges., Bd. 25, H. 2, 1901, p. 391.

Banka (Coll. Bleeker), 1 Ex.

Diese Art war bis jetzt nur von Borneo bekannt. Das Exemplar von Banka, ein Männchen, weicht von Boettger's Beschreibung nur ab durch die Vomerzähne, welche nicht in ovalen Häufchen, sondern in kurzen schiefen Reihen stehen, durch den Interorbitalraum, welcher ein wenig schmaler ist als das obere Augenlid und durch das Trommelfell, welches nur  $\frac{2}{3}$  des Augendurchmessers erreicht. Auch scheint der Kopf etwas länger zu sein: die Schnauze ist so lang wie die Orbita. Oberseite und Seiten sind hellbraun mit deutlichen dunkelbraunen Flecken, welche auf den Hinterbeinen Querbänder bilden; einige Flecken auf den Lippen und eine Binde vor und unter den Trommelfell gelblich weis; Trommelfell braun. Unterseits nur auf Kehle und Brust dunkel marmoriert. Maasse: Kopfrumpflänge 62 mm.; Kopflänge (Schnauzenspitze bis Hinterrand des Trommelfells) 23 mm.; Kopfbreite 20 mm.; Trommelfell 5 mm.; Auge 7,5 mm.; Unterschenkel 30 mm.

17. *Rhacophorus leucomystax* Gravenh.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 83 (*Rh. maculatus* p. p.); Proc. Zool. Soc. London 1889, p. 29; Fauna Brit. India, Rept. and Batr., 1890, p. 474.

Boettger, Semon's Zool. Forschungsreisen, Bd. V, Lf. 1, 1894, p. 113.

Flower, Proc. Zool. Soc. London 1896, p. 905, Taf. XLIV, Fig. 2 (Larve); id. 1899, p. 898, Taf. LIX, Fig. 3 (Larve).

Sumatra: Matua, 1 Ex. (*quadrilineata*-Form); Paninggahan, mehrere Larven.

Java: Buitenzorg (1899), 2 Ex. (von denen eins die *quadrilineata*-Form).

Timor: Kupang, 1 Ex. (*quadrilineata*; A. Wichmann leg.).

Celebes: Bantimurong, 1 Ex.

Saley, 5 Ex.

Die Tiere von Saleyer und Timor unterscheiden sich durch den Besitz eines kleinen äusseren Metatarsaltuberkels. Das Exemplar von Bantimurong hat sehr lange Hinterbeine, wie Boettger auch bei Exemplaren von Buitenzorg fand: das Tibiotarsalgelenk ragt weit über die Schnauzenspitze hinaus, der Unterschenkel erreicht fast zwei Drittel der Kopfrumpflänge (39 bzw. 66 mm.); andere Unterschiede mit dem typischen *Rh. leucomystax* bestehen aber nicht; die Kopfhaut ist mit dem Schädel verwachsen und nicht frei wie bei *Rh. colletti* Blgr.

Die Larven, von denen die meisten noch keine Extremitäten besitzen, stimmen ganz gut mit den Beschreibungen und Abbildungen Flower's überein; nur erreicht der Schwanz nicht die zweifache Körperlänge (z. B.: Körper 17 mm., Schwanz, vom Hinterende des Körpers ab, 27 mm.) und ist der Körper etwa 2 mal so lang wie breit. Oberlippe mit 4 Zahnreihen.

18. *Rhacophorus anodon* n. sp. (Taf. XVI, Fig. 4).

Sumatra: Schlucht bei Ajer Mantjur (Kaju tanam), 1 Ex., ♀.

Vomerzähne fehlen. Choanen kleiner als die Tubenöffnungen. Zunge ohne Papille. Kopf länger als breit, die Breite beträgt ungefähr  $\frac{1}{3}$  Kopfrumpflänge. Schnauze stark über den Unterkiefer vorragend, abgestutzt; ihr Vorderrand, welcher die Nasenlöcher vereinigt, bildet eine gerade Linie, so dass die Nasenlöcher ganz vorn liegen. Canthus rostralis scharf, gerade, so lange wie die Orbita; Lorealgegend fast senkrecht, ausgehöhlt. Interorbitalraum zwei mal so breit wie das obere Augenlid. Trommelfell dem Auge sehr nahe und so gross wie dieses. Finger und Zehen schlank; die Spitzen der Finger zu grossen, die der Zehen zu etwas kleineren Haftscheiben verbreitert; Scheibe des dritten Fingers grösser als der halbe Durchmesser des Trommelfells; Endphalangen T-förmig; eine knorplige intercaläre Phalange. Erster Finger kürzer als der zweite, dieser kürzer als der vierte. Spannhaut rudimentär, an den Händen fehlend, an den Füssen etwas deutlicher, aber bei den drei inneren Zehen nur die Metatarsalia vereinigend und an den äusseren nicht über die Hälfte des ersten Gliedes hinausreichend. Subartikularhöcker klein. Metatarsaltuberkel fehlen. Keine Tarsalfalte. Das Tibiotarsalgelenk reicht an der Schnauzenspitze vorüber; Tibia fast  $\frac{2}{3}$  der Kopfrumpflänge.

Haut oben und unten ganz glatt, die des Kopfes mit den Fronto-parietalia verwachsen.

Die Farbe (in Alkohol) ist hell rötlich graubraun, oberseits dunkler als unten. Oben und unten mehrere weisse Fleckchen; eine Reihe derselben längs dem Canthus rostralis und dem äusseren Rande des oberen Augenlides, andere längs den beiden Lippen; auf den Extremitäten stehen sie in mehr oder weniger deutlichen Querreihen; die Finger und Zehen haben einen weissen Fleck auf der Oberseite jedes Gelenkes und zwei nebeneinander auf jeder Haftscheibe; nur die Scheiben der beiden ersten Finger und Zehen sind ganz weiss; übrigens stehen die Fleckchen zerstreut auf Rücken und Bauch, ein grösserer, dunkel umsäumter, jederseits hinter dem Trommelfelle.

Kopfrumpflänge: 24 mm.

Weingleich diese neue Art wegen des Fehlens den Vomerzähne eigentlich zu dem Genus *Ixalus* zu bringen wäre, so betrachte ich sie doch als einen *Rhacophorus*, erstens weil auch bei einer anderen Art von *Rhacophorus* (*Rh. edentulus* F. Müll.) die Vomerzähne gelegentlich fehlen können und dann namentlich wegen der Gestalt der Endphalangen. Dazu kommt die Verknöcherung der Kopfhaut, welche m. W. bei keiner *Ixalus*-Art beobachtet ist. Falls sich herausstellen sollt, dass bei *Rh. anodon* die Vomerzähne immer fehlen und das beschriebene Exemplar keine Ausnahme bildet, ist kein einziges durchgreifendes Merkmal zwischen *Rhacophorus* und *Ixalus* mehr vorhanden und werden diese Genera demnach vereinigt werden müssen. Übrigens deutet die Verkümmerung der Vomerzähne bei zwei Arten von *Rhacophorus*, die sonst keine Beziehungen zu einander aufweisen, auf die Möglichkeit hin, dass die Arten des Genus *Ixalus* polyphyletisch entstanden sind und wäre auch aus diesem Grunde seine Vereinigung mit *Rhacophorus* wünschenswert.

Das Fehlen der Vomerzähne, das grosse Trommelfell und die rudimentäre Schwimmhaut der Zehen sind alles Merkmale, wodurch sich *Rh. anodon* von fast allen anderen *Rhacophorus*-Arten unterscheidet. Die Verknöcherung der Kopfhaut deutet auf ein Verwandtschaft mit der *maculatus*-Gruppe hin. Eine grössere Annäherung besteht aber in mehreren Hinsichten zu *Ixalus pictus* Ptrs. und namentlich zu *I. flavosignatus* Bttgr. von Java.

19. *Rhacophorus javanus* Bttg.

Boettger, Zool. Anz. XVI, 1893, p. 338.

Java: Tjibodas, 1 erwachsenes und 1 junges Ex.

Vomerzähne in kurzen, wenig schiefen Reihen, die an der vorderen inneren Ecke der Choanen anfangen und von einander etwas mehr getrennt sind als die Länge einer Zahnreihe beträgt. Zunge hinten mässig tief ausgerandet; die Lappen nicht länger als breit. Kopf etwa so lang wie breit. Schnauze zugespitzt. Schnauzenkante winklig, auch vor den Nasenlöchern deutlich. Lorealgegend etwas schief, konkav. Nasenloch der Schnauzenspitze viel näher als dem Auge. Interorbitalraum ein wenig breiter als das obere Augenlid. Trommelfell  $\frac{2}{5}$  Augen- grösse. Die drei äusseren Finger mit  $\frac{2}{3}$ , der innere mit sehr kurzer Spannhaut: diese reicht am vierten Finger und an der Aussenseite des dritten etwas an dem letzten Subartikularknötchen vorüber, an der Aussenseite des zweiten Fingers noch etwas weiter; an der inneren Seite des dritten Fingers reicht sie bis halbwegs zwischen die zwei letzten Subartikularhöcker, an der inneren Seite des zweiten und an der äusseren des ersten Fingers erreicht sie die Basis des letzten Höckers. Die Spannhaut der Füsse erreicht alle Scheiben, nur nicht an der vierten Zehe, von welcher die zwei Endglieder frei bleiben. Subartikularhöcker klein, einfach; ein sehr kleiner innerer, kein äusserer Metatarsaltuberkel. Scheiben der drei äusseren Finger grösser als das halbe Auge, die der inneren Finger und der Zehen kleiner als das Trommelfell. Das Tibiotarsalgelenk reicht etwas über die Schnauzenspitze hinaus.

Haut oben glatt; Kinnwinkel, Bauch und proximaler Teil der Oberschenkel körnig. Falten über dem After und längs der Aussenseite von Vorderarm und Tarsus als schwache, aber deutliche Leisten angedeutet; diejenige des Tarsus setzt sich längs dem äusseren Rande der fünften Zehe fort, ist aber getrennt von dem kleinen dreieckigen Hautzipfel am Tibiotarsalgelenk; eine Falte vom Auge über dem Trommelfell nach hinten unten ziehend.

Das ganze Tier ist gelblichweiss, wahrscheinlich aber im Alkohol sehr gebleicht. Der Bauch ist heller und auch die Hautsäume sind durch weissliche Färbung markiert.

Körperlänge 45 mm.

Wenngleich dieses Tier in einigen Hinsichten vom Originalexemplar der Art, welches ich durch die Güte der Herrn Prof. Boettger und

Dr. Römer vergleichen konnte, abweicht (namentlich durch die längere Schwimmhaut der Finger, die grösseren Fingerscheiben und das kleinere Trommelfell), so glaube ich doch nicht, dass diese Unterschiede genügend sind, um eine neue Art aufzustellen.

Das junge Tier besitzt noch den Schwanz, der Mund hat aber die Larvencharaktere schon verloren, so dass ich von diesen nichts näheres mitteilen kan.

20. *Rhacophorus (monticola* Blgr.?)

Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), vol. XVII, 1896, p. 395; Proc. Zool. Soc. London 1897, p. 234, Taf. XVI, Fig. 3.

Celebes: Loka (Bonthain), 3 Larven.

In der Ausdehnung der Schwimmhaut zwischen den Fingern der bei einer der Larven schon wohl entwickelten, wiewohl noch bedekten, vorderen Extremitäten stimmen diese Larven von den vier von Celebes bekannten *Rhacophorus*-Arten am meisten mit *Rh. monticola* überein. Die Zugehörigkeit zu dieser Art ist umso wahrscheinlicher, als sie schon von Loka bekannt ist.

Schwanzlänge  $1\frac{1}{2}$  bis 2 mal die Körperlänge. Diese etwa  $1\frac{1}{2}$  mal die Körperbreite. Nasenloch gleich weit entfernt von Schnauzenspitze und Auge, dieses ungefähr ebenso weit von der Schnauzenspitze wie vom Spiraculum. Die Entfernung der Augen ist ungefähr gleich der Breite des Mundes (mit den Lippen), viel breiter als die Entfernung der Nasenlöcher und ungefähr die Hälfte der Körperbreite. Der Abstand von Spiraculum bis zur Schnauzenspitze gleich dem vom Spiraculum bis zum Anus.

Augen auf der Oberseite (in Abweichung von den Larven anderer *Rhacophorus*-Arten). Spiraculum linksseitig, lateral, nach oben und hinten gerichtet. Anus rechtsseitig, höher als der Unterrand der Schwanzflosse. Schwanz zugespitzt, die Flossen niedrig (vielleicht im Alkohol geschrumpft), die obere Flosse reicht bis zur Schwanzbasis.

Unter- und Seitenrand der Lippen mit Papillen; der Unterrand ohne den bei *Rh. leucomystax* vorhandenen medianen Einschnitt. Zähne:  $\frac{5}{1}\frac{1}{2}\frac{5}{1}$  oder  $\frac{6}{1}\frac{1}{2}\frac{6}{1}$ , die zweite obere und die dritte untere Reihe sehr schmal unterbrochen, die drei unteren etwa gleich lang.

Oberseite des Körpers braun, Unterseite und ganzer Schwanz gelblich weiss; bei den ältern Larven eine glänzende Querbinde zwischen den Augen.

Körperlänge 15,5 mm.; Schwanzlänge 28,5 mm.; Körperbreite 10 mm.

21. *Rhacophorus reinwardti* Boie.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 88.

Boettger, Ber. Offenbacher Ver. 1892, p. 141.

Java: Buitenzorg oder Tjibodas, 1 Ex. (Prof. Stahl leg.).

Interorbitalraum breiter als das obere Augenlid.

22. *Ixalus aurifasciatus* Schleg.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 100.

Boettger, Ber. Offenbacher Ver., 1892, p. 142.

Java: Tjibodas, 1 Ex. ;

Das mir vorliegende Tier stimmt mit der von Boulenger gegebenen Diagnose nicht ganz überein, viel besser aber mit derjenigen Boettgers. Die Schnauze ist zugespitzt, das Nasenloch gleich weit entfernt vom Auge wie von der Schnauzenspitze, der Interorbitalraum viel breiter als das Augenlid, das Trommelfell nicht sehr deutlich, von fast halber Augengrösse; das Tibiotarsalgelenk reicht bis zum Nasenloch. Eine dunkle Binde zwischen den Augen; vor derselben ist die Oberseite des Kopfes zwischen den Canthi rostrales hell gefärbt.

ENGYSTOMATIDAE.

23. *Microhyla achatina* Boie.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 166.

Java: Tjibodas, 1 Ex.

Die Endphalangen (wenigstens die der vierten Zehe) sind nicht, wie Boulenger für *Microhyla* angibt, einfach, sondern sehr deutlich T-förmig.

24. *Microhyla annectens* Blgr.

Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), Vol. VI, 1900, p. 188.

Java, Tjibodas, 1 Ex. (Prof. K. Kraepelin leg.).

Diese Art ist bis jetzt nur aus Hinter-Indien bekannt. Aus Java (Pengalongan, 4000 Fuss) hat aber Boulenger (Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. XIX, 1897, p. 108) eine nahe verwandte Art, *M. palmipes*, beschrieben. Das mir vorliegende Exemplar stimmt in fast allen Hinsichten, worin sich die beiden Arten unterscheiden, mit der Diagnose

von *M. annectens* überein: die Scheiben der Finger und Zehen sind gross, die Zehen sind halb behäutet, das Fersengelenk reicht über die Schnauzenspitze hinaus; dagegen sind zwei deutliche Metatarsalhöcker vorhanden. Oberseite graubraun mit einem dunklen Flecken auf dem Rücken und davon getrennt eine sehr undeutliche Querbinde zwischen den Augen; eine schwarze, nach oben scharf begrenzte Binde an der Seite, von der Schnauzenspitze bis zur Mitte des Rumpfes. Extremitäten mit mehreren schwarzen Querbinden; die proximalste Querbinde des Oberschenkels ist durch einen Längsstreifen verbunden mit einem schwarzen Flecken neben dem After. Unterseite dunkel marmoriert. Kopfrumpflänge 15 mm., Unterschenkel 10 mm.

Auch bei diesem Tiere ist die Endphalange T-förmig, der Querbalken aber kürzer als bei *M. achatina*.

## 25. *Microhyla* spp.

Sumatra: Paninggahan, mehrere Larven; Umgebung von Singkarah, mehrere Larven.

Die Larven von Paninggahan, zum Teil ohne, zum Teil mit Anlage der hintern Extremitäten, weichen nur in Nebensachen von den von Flower (Proc. Zool. Soc. 1899, p. 903) beschriebenen Larven ab, von welchen er vermutet, dass sie einer *Microhyla*-Art angehören. Sie sind aber kleiner (höchstens 21 mm. Totallänge) und die Schwanzflossen sind farblos. Der Hautlappen, welcher das Spiraculum nach unten begrenzt, ist jederseits in einen abgerundeten Zipfel ausgezogen.

Die anderen Larven von Sumatra stimmen zwar in den Hauptsachen (Lage von Augen, Spiraculum und Anus, Fehlen von Hornkiefern und -zähnen) mit den erstgenannten überein, gehören aber gewiss einer andern Art an. Die Mundöffnung ist klein und nur die untere Lippe wohl entwickelt. Auch das Spiraculum ist klein und wird nach unten nur durch einen einfachen Hautlappen begrenzt. Sie unterscheiden sich auch von den erstgenannten Larven durch ihren Silberglanz. Totallänge 20 mm. Zu welcher Art sie gehören ist auch an diesen Larven leider nicht zu entscheiden; eine von ihnen hat schon entwickelte Extremitäten, welche denen der *Microhyla*-Arten ähnlich sind, mit kleinen Haftscheiben und fast vollständiger Schwimmhaut zwischen den Zehen; dies gibt aber keine Andeutung für die Artbestimmung, weil nach Flower (l. c.) die Larven von *M. ornata* D. & B. anfänglich vollständige Schwimmhäute besitzen, die später verschwinden.



26. *Callula pulchra* Gray.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 170.

Celebes: Makassar, 2 Ex.

## BUFONIDAE.

27. *Bufo cruentatus* Schleg.Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 286 (*B. borbonicus* p. p.).

Horst, Notes Leyden Museum, Vol. V, 1883, p. 236.

Java: Tjibodas, 6 Ex.

Die Tiere weichen nur in der Länge der Hinterbeine von der Beschreibung, welche Horst nach Untersuchung der Original-Exemplare gegeben hat, ab: das Tibiotarsalgelenk erreicht nur bei den drei kleineren Exemplaren (21—26 mm. Kopfrumpflänge) die Schnauzenspitze, bei einem andern Tier von 26 mm. den Vorderrand und bei den zwei grössten (35 mm.) nur den Hinterrand des Auges. Werner (Zool. Anz., 1897, p. 265) hat nach diesem Merkmal eine neue Art, *B. montanus*, aufgestellt, welche aber wohl ohne Zweifel mit *B. cruentatus* synonym ist.

28. *Bufo melanostictus* Schneid.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 306.

Java: Buitenzorg, 2 Ex.

29. *Bufo biporcatus* Schleg.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 311.

Java: Tjibodas, 2 Ex.

Celebes: Makassar, 4 Ex.; Luwu, 1 Ex.; Tete adj., 2 Ex.

30. *Bufo asper* Gravenh.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 313.

Sumatra: Pajakomboh, 4 Ex.; Solok und Singkarak, 3 Ex.;  
Padang Pandjang oder Kaju Tanam, 2 Ex.; Schlucht  
bei Ajer Mantjur (Kaju Tanam), 1 Ex., juv.

Java: Buitenzorg, 1 Ex.; Tjibodas, 2 Ex.

Das Exemplar von Buitenzorg, ein Weibchen, wurde in Copula mit *B. melanostictus* angetroffen (im März).

31. *Bufo celebensis* Schleg.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 313.

Celebes: Makassar, 6 Ex.; Loka, bei Bonthain, 1 Ex.

## HYLIDAE.

32. *Hyla dolichopsis* Cope.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 384.

Boettger, Ber. Offenbacher Ver. 1892, p. 155; Semon's Zoolog. Forschungsreisen, Bd. V, Lf. 1, 1894, p. 111; Abhandl. Senckenb. Ges., Bd. XXV, H. 2, 1901, p. 372.

Werner, Verhandl. Ges. Wien, Bd. XLVI, 1896, p. 23.

v. Kampen, Nova Guinea, V. Zoologie, Bd. I, p. 171.

Ambon, 1 Ex. ♂.

Talaut-Inseln: Beo, Insel Karakelang, 1 Ex. ♀; Lirung, Insel Salibabu, 3 Ex. ♀♀.

Kei-Inseln: Tual, 2 Ex., ♂ und ♀.

(alle Exemplare gesammelt durch die Siboga-Expedition).

Wie bei den von mir beschriebenen Exemplaren aus Neu-Guinea, ist auch bei diesen die Grösse der Haftscheiben sehr variabel; sie ist namentlich bei den Tieren von Lirung geringer als die des Trommelfelles (bei einem der Exemplare z. B. 3 gegen 4 mm.)

Auch die andren Eigentümlichkeiten haben sie mit den genannten Exemplaren aus Neu-Guinea gemeinsam: alle haben ein mehr oder weniger deutlich granulirte Oberseite (var. *tenuigranulata* Bttgr.); die Schnauze ist etwa anderthalbmals so lang wie der Augendurchmesser; die Kopulationsbürste der Männchen ist gelappt, nicht geteilt.

Das Vorkommen der Art auf den Talaut-Inseln ist wichtig, namentlich weil sie hier mit der celebensischen *Rana modesta* zusammen lebt (sieh oben, p. 386). Auf den Kei-Inseln war meines Wissens bis jetzt noch kein einziger Batrachier nachgewiesen worden.

33. *Hyla everetti* Blgr.

Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), Vol. XIX, 1897, p. 509.

Savu: bei Seba, 1 Ex. (Siboga-Exp.).

Das vorliegende Tier weicht nur darin von Boulenger's Beschreibung ab, dass der Interorbitalraum breiter ist als das obere Augenlid, und die Schwimmhaut das vorletzte Glied der 4. Zehe frei lässt. Kopfrumpflänge 27 mm.

## PELOBATIDAE.

34. *Leptobrachium hasselti* Tschudi?

Boulenger, Cat. Batr. Sal., p. 441.

Sumatra: Paninggahan, 1 Larve.

Diese Larve zeigt in den Charakteren des Mundes eine solche Übereinstimmung mit der Larve von *Pelobates fuscus*, dass ich trotz der lateralen Stellung des Afters an ihre Zugehörigkeit zu der Familie der *Pelobatidae* nicht zweifle. Von den von Sumatra bekannten Arten dieser Familie (*Megalophrys montana* und *nasuta*, *Leptobrachium hasselti*) besitzen die Arten von *Megalophrys* ganz andere Larven, so dass nur *L. hasselti* übrig bleibt. Hiermit sind auch die schon ziemlich weit entwickelten hintern Extremitäten der Larve in Übereinstimmung. Ausserdem stimmt sie der Hauptsache nach überein mit den kurzen Angaben Boulenger's (Proc. Zool. Soc. 1890, p. 37). Es ist bemerkenswert, dass die beiden nahverwandten Genera *Leptobrachium* und *Megalophrys* ganz verschiedene Larven besitzen.

Schwanzlänge fast zweimal die Körperlänge und mehr als viermal die Schwanzhöhe. Körperlänge fast zweimal die Körperbreite. Nasenlöcher dem Auge etwas näher als der Schnauzenspitze. Der Abstand zwischen Auge und Schnauzenspitze etwas kleiner als der zwischen Auge und Spiraculum. Die Entfernung zwischen den Augen ist zweimal die zwischen den Nasenlöchern; letztere ein wenig kleiner als die Breite des Mundes. Spiraculum gleich weit von der Schnauzenspitze wie vom Anus. Augen auf der Oberseite. Nasenlöcher oval. Spiraculum linksseitig, von oben und unten sichtbar, nach oben und hinten gerichtet. Der Anus liegt rechtsseitig, etwas vom Unterrande der Schwanzflosse entfernt. Schwanzende ziemlich spitz; die Flossen niedriger als bei *Pelobates fuscus*, die obere höher als die untere, mit konvexem Rande, sich nicht auf den Rücken erstreckend; die Höhe des muskulösen Teiles an der Basis ist  $\frac{2}{3}$  der ganzen Höhe.

Mund auf der Unterseite. Sein ganzer Rand mit Papillen, ausser einer kleinen Strecke in der Mitte des oberen Randes; die Papillen stehen längs dem oberen Rande in einer, längs den Seiten und dem Unterrande in zwei Reihen. Kiefer fast ganz schwarz. Zähne  $\frac{5}{4} \frac{1}{4}$ ; die äussere obere Reihe sehr kurz und ganz wie bei *Pelobates* (Boulenger, Proc. Zool. Soc. 1891, Taf. XLVI, Fig. 7a), die folgenden von aussen nach

innen in Breite abnehmend, die innere aber noch sehr deutlich; die äussere der unteren Reihen kurz, die zweite schmal unterbrochen, die übrigen deutlich geteilt mit einigen kurzen abgesprengten Teilen an den Seiten.

Oberseite (ausser der Schnauze), Seiten und muskulöser Teil des Schwanzes braun mit dunkler braunen (nach Boulenger schwarzen) Flecken und Marmorierung; übrigens weiss, mit kleinen braunen Flecken auf den Schwanzflossen.

Körperlänge 25,5 mm.; Schwanzlänge 48 mm.; Körperbreite 13,5 mm.; Schwanzhöhe 11 mm.

35. *Megalophrys montana* Kuhl.

Boulenger, Cat. Batr. Sal, p. 442.

M. Weber, Ann. Jardin Bot. Buitenzorg, Suppl. II, 1898, p. 5 (Larven).

Sumatra: Singalang, 1 Ex.

Java: Tjibodas, 1 junges Ex. und mehrere Larven.

Die Larven sind schon von Weber beschrieben worden. Der Anus liegt bei denselben median.

Die nachfolgende Liste enthält eine Aufzählung der in der Literatur bis jetzt aus dem Indischen Archipel erwähnten Amphibien, nebst ihrer Verbreitung über die verschiedenen Inseln. Ausserdem habe ich von den betreffenden Arten immer angegeben, ob sie auch ausser dieser Inselgruppe vorkommen und in welchen Gegenden (Festland Asiens; Philippinen, einschl. den Palawan- und Sulu-Inseln; Polynesien; Festland Australiens).

Ich habe versucht die Liste so vollständig wie möglich zu machen, Angaben aber, namentlich älterer Autoren, welche mir zweifelhaft erschienen, fortgelassen oder nur in den Noten am Ende der Liste erwähnt. Es ist selbstredend, dass die Liste dennoch noch viele Fehler und Unvollständigkeiten enthalten muss. Namentlich die Amphibienfauna der meisten kleineren Inseln, unter welchen gerade das so wichtige Übergangsgebiet der Kleinen Sunda-Inseln und Molukken, ist noch sehr wenig erforscht.

TABELLE DER VERBREITUNG DER AMPHIBIEN ÜBER DIE INSELN  
DES INDISCHEN ARCHIPELS.

[illegible]













a) *Rana tigrina*: für Banka, Riouw und Bali nur durch Bleeker erwähnt.

b) *Rana erythraea*: für Banka nur durch Bleeker angegeben.

c) *Rhacophorus leucomystax* wird von Meyer (Abhandl. Mus. Dresden 1887) auch für Ternate erwähnt.

d) *Rhacophorus reinwardti*: Peters (Ann. Mus. Genova, Vol. III, 1872) nennt als Fundstelle auch Borneo; Boulenger hat dies aber in seinem „Catalogue“ nicht übernommen.

e) *Callula pulchra*: für diese Art gilt dasselbe wie für *Rhac. reinwardti*.

f) *Bufo cruentatus*: auch diese Art gibt Peters (l. c.), nicht aber Boulenger, für Borneo an. Peters trennte sie aber nicht von *B. borbonicus*, so dass nicht ersichtlich ist, welche der beiden Arten er meint.

g) *Bufo melanostictus*: von Bleeker (Nat. Tijdschr. Ned. Indië, dl. XIV, 1857) als „*B. scaber*“ auch für Celebes erwähnt.

h) *Bufo biporcatus*: von Bali nur durch Bleeker bekannt.

i) *Hyla dolichopsis*: Ceram wird nur von Bleeker als Fundort angegeben.

j) *Hyla genimaculata*: Horst (Notes Leyden Mus., V, 1883) gibt als Fundstelle des einzigen Exemplares an: Gebee (Gagie?).

---

## ERKLÄRUNG VON TAFEL XVI.

---


Fig. 1. — Larve von *Oxyglossus lima*,  $\times 2\frac{1}{2}$  sp. Spiraculum.

Fig. 2. — Kopf von *Rana microtypanum*, etwa  $\times 2$ .

Fig. 3. — Unterseite des rechten Fusses von *Rana tigrina*: a. von Calcutta; b. von Buitenzorg; c. von *R. tigrina* var. *angustopalmata* von Tempe (Celebes).  $\times 1$ .

Fig. 4. — *Rhacophorus anodon*,  $\times 2$ .


---



3a.




3b.



3c.



1.



2.



4.



Nach Drucklegung vorstehender Arbeit brachte Dr. P. N. van Kampen in Erfahrung, dass *Hyla dolichopsis* auch im westlichen Teil des Archipels (Sumatra, Java, Banka) vorkommt; vergl. Bulletin du Département de l'agriculture des Indes néerlandaises N<sup>o</sup>. VIII. (Zoologie II) 1907).

MAX WEBER.

## REGISTER

### zu „Amphibien des Indischen Archipels“.

- 
- achatina, *Microhyla*, 404.  
 Amphibien, 383 sqq.  
 annectens, *Microhyla*, 404.  
 anodon, *Rhacophorus*, 400.  
 asper, *Bufo*, 406.  
 aurifasciatus, *Ixalus*, 404.  
 baramica, *Rana*, 399.  
 biporcatus, *Bufo*, 406.  
 borbonicus, *Bufo* 406.  
*Bufo*, 406.  
 — asper, 406.  
 — biporcatus, 406.  
 — borbonicus, 406.  
 — celebensis, 406.  
 — cruentatus, 406.  
 — melanostictus, 406.  
 — montanus, 406.  
*Buфонidae*, 406.  
*Callula*, 406.  
 — pulchra, 406.  
 celebensis, *Bufo*, 407.  
 — *Rana*, 395.  
 chalconota, *Rana*, 392, 394, 395.  
 cruentatus, *Bufo*, 406.  
 dolichopsis, *Hyla*, 407.  
 dolichopsis, *Hyla*, var. *tenuigranulata*, 407.  
 edentulus, *Rhacophorus* 401.  
*Engystomatidae*, 404.  
 erythraea, *Rana*, 390.  
 everetti, *Hyla*, 407.  
 — *Rana*, 393, 394.  
 flavosignatus, *Ixalus* 401.  
 gracilis, *Rana* 390, 392.  
 hasselti, *Leptobrachium*, 408.  
*Hyla*, 407.  
 — dolichopsis, 407.  
 —, — var. *tenuigranulata*, 407.  
 — everetti, 407.  
*Hylidae*, 407.  
*Ixalus*, 401, 404.  
 — aurifasciatus, 404.  
 — flavosignatus, 401.  
 — pictus, 401.  
 javanica, *Rana*, 392.  
 javanus, *Rhacophorus*, 402.  
 jerboa, *Rana*, 397.  
 Junghuhnii, *Polypedates*, 393.  
 kuhli, *Rana*, 385.  
 labialis, *Rana*, 393.  
 lemniscata, *Rana*, 392.  
*Leptobrachium*, 408.  
 — hasselti, 408.  
 leucomystax, *Rhacophorus*, 399.  
 leucomystax, *Rhacophorus*, *quadrilineata*,  
 Form. 399.  
 lima, *Oxyglossus*, 384.  
 limnocharis, *Rana*, 388, 389, 390.  
 Losii, *Rana*, 398.  
 macrodon, *Rana*, 385, 386.  
 macularia, *Rana*, var. *javanica*, 392.  
 maculatus, *Rhacophorus*, 399.  
 masoni, *Rana* 397.  
 Megalophrys, 408, 409.  
 — montana, 408, 409.  
 — nasuta, 408.  
 melanostictus, *Bufo*, 406.  
 microdisca, *Rana*, 388.  
*Microhyla*, 404.  
 — achatina, 404.  
 — annectens, 404.  
 — palmipes, 404.  
 — spp., 405.  
 microtympnum, *Rana*, 386.  
 modesta, *Rana*, 385, 407.  
 montana, *Megalophrys* 408, 409.  
 montanus, *Bufo*, 406.

- monticola, Rhacophorus, 403.  
 nasuta, Megalophrys 408.  
 nicobariensis, Rana, 392.  
 Oxyglossus, 384.  
 ——— lima, 384.  
 palmipes, Microhyla, 404.  
 Pelobatidae, 408.  
 pictus, Ixalus 401.  
 Polypedates, 393.  
 ——— Junghuhnii, 393.  
 pulchra, Callula, 406.  
 Rhacophorus, 399.  
 ——— anodon, 400.  
 ——— edentulus, 401.  
 ——— javanus, 402.  
 ——— leucomystax, 399.  
 ——— leucomystax quadrilineata Form. 399.  
 ——— maculatus, 399.  
 ——— monticola, 403.  
 ——— reinwardti, 404.  
 Rana, 385.  
 ——— baramica, 385.  
 ——— celebensis, 395.  
 ——— chalconota, 392, 394, 395.
- Rana, erythraea, 390.  
 ——— everetti, 393, 394.  
 ——— gracilis, 390, 392.  
 ——— javanica, 392.  
 ——— jerboa, 397.  
 ——— Kuhli, 385.  
 ——— labialis, 393.  
 ——— lemniscata, 392.  
 ——— limnocharis, 388, 389, 390.  
 ——— Losii, 398.  
 ——— macrodon, 385, 386.  
 ——— macularia, var. javanica, 392.  
 ——— masoni, 397.  
 ——— microtympanum, 386.  
 ——— modesta, 385, 407.  
 ——— nicobariensis, 392.  
 ——— tigrina, 388.  
 ——— tigrina, var. angustopalmata, 388.  
 ——— varians, 395, 396.
- Ranidae, 384.  
 reinwardti, Racophorus, 404.  
 tigrina, Rana, 388.  
 tigrina, Rana. var. angustopalmata, 388.  
 varians, Rana, 395, 396.

# GESAMTREGISTER

## zu den vier Bänden der „Zoologischen Ergebnisse“.

(Der jedesmalige Band ist durch die erste römische Zahl angedeutet).

### A

- aberrans, *Oncidium* IV, 127.  
*Ablepharus boutoni* v. *furcata*, I, 174.  
*abramus*, *Vesperugo*, I, 128.  
*Acanthion javanicum*, I, 121; III, 267.  
*Acanthopsis choerorhynchus*, III, 425.  
*achatina*, *Microhyla*, IV, 404.  
*achatinacea*, *Stenogyra*, II, 243, 261.  
*Achorutes armatus*, I, 89.  
 — *crassus*, I, 90.  
*Acmorhynchus Annae*, III, 301.  
*Acridotheres cinereus*, III, 280.  
*Acrobunus bifasciatus*, III, 19.  
*Acrocephalus orientalis*, III, 277.  
*Acrochordonichthys rugosus*, III, 420.  
*acuminatus*, *Cultellus*, IV, 269.  
*acutissima*, *Melania*, IV, 42.  
 —, *Stenogyra*, II, 243.  
*adamsi*, *Amphidromus*, II, 241, 261; III, 191.  
*Adolfi*, *Helicarion*, II, 223; III, 114.  
*adonarae*, *Melania*, IV, 59.  
*aemula*, *Argiope*, I, 196.  
*aenea*, *Carpophaga*, III, 305.  
*aequidens*, *Platyrrhynchus*, III, 357.  
*aetherea*, *Argiope*, I, 195.  
*affinis*, *Caprimulgus*, III, 292.  
 —, *Milvus*, III, 271.  
 —, *Nothippus*, III, 22.  
*agilis*, *Hylobates*, I, 99.  
*Ajer tabit*, I, IV.  
*Ajer tegenang* I, IV.  
*alatus*, *Potamides*, IV, 185.  
*alba*, *Philoscia*, IV, 381.  
*albicans*, *Littorina*, IV, 199.  
*albicollis*, *Streptocitta*, III, 280.  
*albicornis*, *Glomeris*, III, 323.  
*albicoxa*, *Gagrella*, III, 10.  
*albipes*, *Armadillo*, IV, 359.  
 —, *Henicops*, III, 309.  
*alvocinctus*, *Dolomedes*, I, 207.  
*albovaricosa*, *Pythia*, IV, 138.  
*albus*, *Alloniscus*, IV, 375.  
 — *Siphonjulus*, III, 341.  
*Alcedo bengalensis*, III, 286.  
 — *floresiana*, III, 292.  
*alecto*, *Pteropus*, I, 125.  
*Alectryonia*, IV, 222.  
*alexandrinus*, *Mus*, I, 119.  
*Alloniscus albus*, IV, 375.  
 — *coecus*, IV, 375.  
 — *floresianus* IV, 374.  
*Alona Sarsi*, II, 124.  
*Alycaeus celebensis*, II, 217.  
 — *jagori*, II, 262.  
 — *hochstetteri*, II, 262.  
*amabilis*, *Melania*, IV, 45.  
*Ambassis buroënsis*, III, 408.  
 — *urotaenia*, III, 408.  
*ambiguum*, *Oncidium*, IV, 127.  
*Ambon*, Süßwasserfische, III, 439.  
*Amboinae*, *Oncidium*, IV, 127.  
*amboinensis*, *Cyclemys* I, 176.  
 —, *Cyclotus* II, 212.  
 —, *Lophura* I, 167.  
*Amphibien*, IV, 383.  
 — Verbreitung der IV, 409.  
*amphidroma*, *Nanina* II, 261.  
*Amphidromus adamsi*, II, 241, 261; III, 191.  
 — *annae*, II, 240.  
 — *contrarius*, II, 241; III, 208.  
 — *interruptus*, II, 262.  
 — *perversus*, II, 239, 261.  
 — *porcellanus*, II, 241, 262, III, 204.  
 — *sultanus*, II, 240.



- Amphidromus suspectus*, II, 241.  
*amplexicaudata*, *Cynonycteris*, I, 126.  
*ampullacea*, *Ampullaria*, IV, 17.  
*Ampullaria ampullacea*, IV, 17.  
—— *scutata*, IV, 18.  
*Anabas scandens*, III, 417.  
*Anas gibberifrons*, III, 285, 306.  
—— *superciliosa*, III, 306.  
*anastomosans*, *Cladophora*, I, 61.  
*Ancylus javanus*, IV, 15.  
*Anguilla mauritiana*, III, 428.  
—— *sidat*, III, 428.  
*angulifera*, *Corbicula*, IV, 116.  
*angulosa*, *Neritina*, IV, 80.  
*angustus*, *Siphonorrhinus*, III, 336.  
*Annae*, *Acmorhynchus*, III, 301.  
——, *Amphidromus*, II, 240.  
——, *Benhamia*, III, 32.  
*Annadrilus quadrangulus*, III, 44.  
*annectens*, *Microhyala*, IV, 404.  
*annulicornis* *Sira*, I, 87.  
*Anoa depressicornis*, I, 112.  
*anodon*, *Rhacophorus*, IV, 400.  
*Anomalochilus weberi*, I, 181.  
*Anomalomma lycosinum*, I, 200.  
*Anomalurus*, *Schuppen*, II, 13.  
*Anorrhinus galeritus*, III, 269.  
*Anthreptes celebensis*, III, 278.  
—— *malaccensis*, III, 300.  
*Anura fortis*, I, 91.  
*Aplysilla sulfurea*, I, 59.  
*apogon*, *Barbus*, III, 422.  
*Apterygota des Indischen Archipels*, I, 73.  
*arborea*, *Ostrea*, IV, 220.  
*Arca*, IV, 228.  
—— *granora*, IV, 228.  
—— *nodifera*, IV, 228.  
*Arcidae*, IV, 228.  
*arcuata*, *Plectana*, I, 193.  
*arcuatus*, *Armadillo* IV, 360.  
*Ardea novae hollandiae*, III, 306.  
—— *picata*, III, 283.  
—— *purpurea*, III, 283.  
*Ardeiralla flavicollis*, III, 284.  
*Ardeola speciosa*, III, 284.  
*Ardetta cinnamomea*, III, 269 II, 284.  
*arenaria*, *Teredo*, IV, 284.  
*argenteus*, *Therapon*, III, 407.  
*argentimaculatus*, *Mesoprion*, III, 407.  
*argillacea*, *Helix*, II, 237 I, 262; III, 171.  
*Argiope aemula*, I, 196.  
—— *aetherea*, I, 195.  
—— *catenulata*, I, 196.  
*Argiope crenulata*, I, 196.  
—— *Doleschallii*, I, 195.  
—— *opulenta*, I, 196.  
—— *trifasciata*, I, 195.  
*arguta*, *Nanina*, II, 261.  
*argyrotaenia*, *Rasbora*, III, 423.  
*Ariophanta Rumphii*, II, 230.  
*Armadillo albipes*, IV, 359.  
—— *arcuatus*, IV, 360.  
—— *brevicauda*, IV, 364.  
—— *coecus*, IV, 362.  
—— *floresianus*, IV, 361.  
—— *murinus*, IV, 359.  
—— *rectifrons*, IV, 361.  
—— *sarasinorum*, IV, 358.  
—— *velutinus*, IV, 363.  
—— *Weberi*, IV, 364.  
*armandvillei*, *Mus*, III, 79.  
*armatus*, *Achorutes*, I, 89.  
——, *Barbus*, III, 421.  
——, *Doratonotus*, III, 371.  
——, *Megascolex*, III, 71.  
*Artamides floris*, III, 299.  
*Artamus leucogaster*, III, 278, 286.  
*Asaphis rugosa*, IV, 252.  
*asper*, *Bufo*, IV, 406.  
*aspro*, *Platyptera*, III, 415.  
*assimilis*, *Circus*, III, 272.  
*Assimineae*, IV, 212.  
—— *borneensis*, IV, 215.  
—— *brevicula*, IV, 213.  
—— *carinata*, IV, 215.  
—— *cornea*, IV, 215.  
—— *lirata*, IV, 216.  
—— *miniata*, IV, 214.  
—— *Moussoni*, IV, 215.  
—— *radiata*, IV, 216.  
—— *variegata*, IV, 214.  
*Astur trinotatus*, III, 271.  
—— *sylvestris*, III, 289.  
*ater*, *Faunus*, IV, 191.  
*atra*, *Gagrella*, III, 7.  
*atrata*, *Soletellina*, IV, 233.  
*atro-roseum*, *Strongylosoma*, III, 368.  
*attenuatus*, *Cultellus*, IV, 266.  
*Attus cornutus*, I, 209.  
*aurea*, *Helix*, II, 239.  
*Auricula*, IV, 149.  
*Auricula australiana*, IV, 157.  
—— *dactylus*, IV, 157.  
—— *Dunkeri*, IV, 160.  
—— *fasciata*, IV, 160.  
—— *Judae*, IV, 154.

Auricula Midæ, IV, 150.  
 — Mörchi, IV, 153.  
 — ponderosa, IV, 157.  
 — reticulata, IV, 157.  
 — semiplicata, IV, 160.  
 — subnodosa, IV, 152.  
 — turrita, IV, 157.  
 Auriculastra subula, IV, 158.  
 auriculata, Neritina, IV, 71.  
 Auriculidae, IV, 129.  
 aurifasciatus, Ixalus, IV, 404.  
 aureifrons, Zosterops, III, 303.  
 auris-felis, Cassidula, IV, 141.  
 Austeni, Microparmarion, III, 109.  
 — Vaginulus II, 246.  
 australasiae, Hormurus, III, 96.  
 australiana, Auricula, IV, 157.  
 australis, Dactylochalina, I, 60.

## B

Ba I, IX.  
 bacha, Spilornis, III, 269.  
 Badjoa, I, VI.  
 Balangnipa, I, VI.  
 Bali, Süßwasserfische, III, 443.  
 baliodirus, Diadophis, I, 184.  
 baliuroides, Gobius, III, 413.  
 banjumas, Siphia, III, 277, 286.  
 banteng, Bibos, I, 112.  
 Bantimurong I, V.  
 baramica, Rana, IV, 399.  
 Barbichthys laevis, III, 423.  
 Barbus oligolepis, III, 423.  
 — apogon, III, 422.  
 — armatus, III, 421.  
 — douronensis, III, 422.  
 — goniosoma, III, 423.  
 — hampal III, 422.  
 — javanicus, III, 421.  
 — lateristriga, III, 422.  
 — maculatus, III, 422.  
 — obtusirostris, III, 422.  
 — repasson, III, 421.  
 — schwaneveldii, III, 421.  
 — soro, III, 422.  
 — tandra, III, 422.  
 — tambroides, III, 422.  
 Bari, I, VIII.  
 Batissa, IV, 101.  
 — javanica, IV, 103.  
 — jayensis, IV, 103.  
 — violacea, IV, 104.

Batjo-keke, I, V.  
 Baza subcristata, III, 290.  
 beccarii, Mermerus, III, 22.  
 Becki, Solen, IV, 275.  
 Beloniscus ochraceus, III, 19.  
 — pustulosus, III, 20.  
 — quinquespinosus, III, 19.  
 bengalensis, Alcedo, III, 286.  
 —, Symbranchus, III, 428.  
 Benhamia Annae, III, 32.  
 — floresiana, III, 34.  
 — malayana, III, 35.  
 bergii, Sterna, III, 285.  
 Betta pictum, III, 419.  
 biangulatus, Cyclotus, II, 214.  
 biangulata, Littorina, IV, 209.  
 Bibos banteng, I, 112.  
 bicolor, Cryptodesmus, III, 373.  
 —, Ennea, II, 261.  
 —, Phyllorhina, I, 127.  
 —, Sciurus, I, 115.  
 —, Trochomorpha, II, 261.  
 bidens, Platyrrhachus, III, 356.  
 bifasciatus, Acrobunus, III, 19.  
 bifasciatum, Cerithium, IV, 171.  
 Bima, I, VII.  
 biocellatus, Gobius, III, 410.  
 Bipalium claviforme, I, 141.  
 — dubium, I, 142.  
 — ehippium, I, 139.  
 — hasseltii, I, 142.  
 — gracile, I, 142.  
 — kuhlii, I, 142.  
 — nigrilumbe, I, 140.  
 — quadricinctum, I, 140.  
 — sexcinctum, I, 140.  
 — Verbreitung, von I, 135.  
 — weberi, I, 141.  
 biporcatus, Bufo IV, 406.  
 bipunctatus, Diadophis I, 184.  
 Bira, I, VI.  
 Birakeke, I, VI.  
 bisinuata, Melania, IV, 43.  
 Bithynia truncata, IV, 25.  
 bitorquata, Streptopelia, III, 305.  
 Bivalven, IV, 220.  
 bleekeri, Mugil, III, 416.  
 —, Vaginulus, II, 262.  
 Bocki, Melania, IV, 69.  
 bogorensis, Calamaria, I, 182.  
 —, Ephydatia, I, 33.  
 Bombang, I, IX.  
 Boni, I, VI.

Bontaeng, I, VII.  
 Bonthain, I, VII.  
 boutoni v. furcata, Ablepharus, I, 174.  
 borealis, Motacilla, III, 277.  
 —, Phylloscopus, III, 293.  
 borneensis, Assiminea, IV, 215.  
 —, Cyclophorus, II, 261.  
 —, Pythia, IV, 140.  
 Borni, Cerithium, IV, 173.  
 Bostrichthys sinensis, III, 414.  
 Bothrops erythrus, I, 192.  
 — puniceus, I, 192.  
 — wagleri, I, 192.  
 brachyproctus, Rhinocricus, III, 393.  
 brachyurus, Doryichthys, III, 428.  
 Brackwasser-Mollusken, IV, 1, 123, II, 299.  
 braminus, Typhlops, I, 180.  
 brevicauda, Armadillo, IV, 364.  
 brevicauda, Crocidura, I, 124.  
 brevicula, Assiminea, IV, 213.  
 breviculum, Cerithium, IV, 174.  
 brevilabiatus, Orphnaeus, III, 317.  
 brevipes, Totanus, III, 283.  
 brevispina, Neritina, IV, 79.  
 brevispina, Stanneoclavis, I, 195.  
 brevispira, Limnaea, IV, 2.  
 broderipi, Oriolus, III, 292.  
 bruneiceps, Munia, III, 250.  
 Bubalus bubalus, I, 112.  
 bubalus, Bubalus, I, 112.  
 Bubulcus coromandus, III, 284.  
 Buceros cassidix, III, 275.  
 buffonis, Hemiramphus, III, 426.  
 Bufo asper, IV, 406.  
 — biporcatus, IV, 406.  
 — celebensis, IV, 407.  
 — cruentatus, IV, 406.  
 — melanostictus, IV, 406.  
 buginensis, Melania, IV, 53.  
 Buitenzorg, I, IV.  
 bullata, Littorina, IV, 202.  
 Bungarus semifasciatus, I, 191.  
 buroënsis, Ambassis, III, 408.  
 buschi, Cyrena, IV, 93.  
 Butaster liventer, III, 271.  
 Butorides javanica, III, 284.

## C.

Cacatua parvula, III, 291.  
 — sulphurea, III, 273.  
 Cacomantis virescens, III, 276.

caerulescens, Psammobia, IV, 244.  
 Calamaria bogorensis, I, 182.  
 — linnaei, I, 182.  
 — pavimentata, I, 182.  
 — variabilis, I, 183.  
 — vermiformis, I, 182.  
 calathus, Planorbis, IV, 15.  
 caledonicus, Nycticorax, III, 284.  
 Caletor unguidentis, III, 15.  
 calidris, Totanus, III, 283.  
 Callithamnion membranaceum, I, 59.  
 callitrichus, Mus, I 120.  
 Callula pulchra, IV, 406.  
 Calommata sumatrana, I, 200.  
 — sundaica, I, 200.  
 Calorhynchus, Rhampnococyx, III, 275.  
 Calornis minor, III, 280.  
 Calotes celebensis, I, 167.  
 — cristatellus, I, 167.  
 — jubatus, I, 167.  
 calva, Cambala, III, 377.  
 Cambala calva, III, 377.  
 — cavernicola, III, 377.  
 — dentata, III, 378.  
 Campodeidae, I, 76.  
 candida, Strix, III, 272.  
 Canidia Helena, IV, 75.  
 caninus, Plotosus, III, 419.  
 Cantoris, Eleotris, III, 414.  
 capensis, Perichaeta, III, 62.  
 caprata, Pratincola, III, 277, 293.  
 Caprimulgus affinis, III, 292.  
 Caranx hippos, III, 409.  
 carinata, Assiminea, IV, 215.  
 carinatus, Otostigmus, III, 312.  
 carinifera, Littorina, IV, 198.  
 carinulata, Rhysida, III, 314.  
 carneum, Strongylosoma, III, 362.  
 Carpio, Cyprinus, III, 424.  
 Carpophaga aenea, III, 305.  
 cartilagineus, Trionyx, I, 176.  
 cavernicola, Cambala, III, 377.  
 cassidix, Buceros, III, 275.  
 Cassidula, IV, 140.  
 — auris-felis, IV, 141.  
 — flaveola, IV, 148.  
 — Gruneri, IV, 149.  
 — lutescens, IV, 147.  
 — multiplicata, IV, 142.  
 — mustelina, IV, 144.  
 — Sowerbyana, IV, 147.  
 — sulculosa, IV, 146.  
 — triparietalis, IV, 145.

- Cassidula turgida*, IV, 143.  
*Castor*, Schuppen, II, 15.  
*catenulata*, Argiope, I, 196.  
*caudatus*, Doryichtchys, III, 429.  
*cavernicola*, Chaerilus, III, 91.  
*celebensis*, Alycaeus, II, 217.  
——, *Anthreptes*, III, 278.  
——, *Bufo*, IV, 407.  
——, *Calotes*, I, 167.  
——, *Chaerilus*, III, 93.  
——, *Corbicula*, IV, 113.  
——, *Cuscus*, I, 114.  
——, *Haplochilus*, III, 426.  
——, *Isidora*, IV, 10.  
——, *Melania* IV, 69.  
——, *Oriolus*, III, 276.  
——, *Pythia*, IV, 138.  
——, *Rana*, IV, 395.  
——, *Sus*, I, 111.  
——, *Toradjia* IV, 365.  
*Celebes*, Fauna von III, 405 II, 468.  
——, *Fischfauna*, III, 429, 465.  
——, *Säugethiere*, III, 474.  
*celebicum*, Dicaeum, III, 279.  
*celebius*, Gobiis, III, 410.  
*celerrima*, Gagralla, III, 9.  
*Central-Celebes*, I, VII.  
*Centrocoecyx javanensis*, III, 276.  
*Centrodesmus typicus*, II, 370.  
*Centropus javanicus*, III, 292.  
*cephalica*, Toradjia, IV, 367.  
*Cercocebus cynamolagus*, I, 102.  
*Cerithidea*, IV, 185.  
*Cerithium*, IV, 168.  
—— *bifasciatum*, IV, 171.  
—— *Borni*, IV, 173.  
—— *breviculum*, IV, 174.  
—— *corallinum*, IV, 169.  
—— *inflatum* IV, 174.  
—— *Iannellei*, IV, 171.  
—— *Kenneri*, IV, 188.  
—— *morum*, IV, 172.  
—— *obesum*, IV, 175.  
—— *patulum*, IV, 170.  
—— *purpurascens*, IV, 173.  
—— *Schröteri*, IV, 173.  
——, *Trailli*, IV, 168.  
—— *tuberculatum*, IV, 170.  
—— *variegatum*, IV, 171.  
*chacunda*, Chatoessus, III, 427.  
*Chaerilus cavernicola*, III, 91.  
—— *celebensis*, III, 93.  
—— *variegatus*, III, 90.  
*chalcides*, Lygosoma, I, 174.  
*chalconota*, Rana, IV, 322.  
*Chalcophaps indica*, III, 305.  
*chamaeleontinus*, Gonyocephalus, I, 166.  
*Chanos salmoneus*, III, 427.  
*Charadrius fulvus*, III, 281, 305.  
—— *minor*, III, 282.  
*Charbonnieri*, Potamides, IV, 190.  
*Chatoessus chacunda*, III, 427.  
*Chelone mydas*, I, 176.  
*Chibia leucops*, III, 278, 286.  
*chilensis*, Temnocephale, I, 2.  
*chloris*, Halcyon, III, 269 II, 275, 286, 292.  
*chloroptera*, Myzomela, III, 279.  
*choerorhynchus*, Acanthopsis, III, 425.  
*Chroolepus*, I, 51.  
*chysodorus*, Spirobolletus, III, 399.  
*chrysogrammus*, Spirobolletus III, 400.  
*chrysoproctus*, Spirobolletus, III, 400.  
*cidaris*, Nanina, II, 224; III, 120.  
*ciliocinctus*, Lagochilus, II, 216.  
*cincta*, Lepisma, I, 80.  
*cinctella*, Philoscia, IV, 378.  
*cinerea*, Ortygometra, III, 282.  
—— *Spongilla*, I, 35.  
*cinereus*, Acridotheres, III, 280.  
—— *Parus*, III, 293.  
—— *Totanus*, III, 283.  
*cingulatus*, Potamides, IV, 183.  
*cinnamomea*, Ardetta, III, 269 II, 284.  
*Cinnyris frenatus*, III, 279.  
—— *pectoralis*, III, 301.  
—— *porphyrolaemus*, III, 279.  
—— *solaris*, III, 300.  
*Circus assimilis*, III, 272.  
*Cisticola exilis*, III, 277, 293.  
*Cladophora anastomosans*, I, 61.  
*Clarias*, Lagerung der Lunge I, 355.  
——, Lagerung der Niere, I, 355.  
—— *macrocephalus*, III, 419.  
—— *magur* III, 419.  
—— *nieuhofti*, III, 419.  
——, Schwimmblase, I, 356.  
—— *Teysmanni*, III, 419.  
*Clausilia moluccensis*, II, 245; III, 229.  
*Clausilia obesa* v. *gracilior*, II, 244; III, 224.  
*clava*, Teredo, IV, 286.  
*claviforme*, Bipalium I, 141.  
*clavus*, Melania, IV, 50.  
*coaxans*, Cyrena, IV, 98.  
*coeca*, Oncis, IV, 128.  
*coecus*, Alloniscus, IV, 375.

- coecus, Armadillo, IV, 362.  
 coelestinus, Glyphidodon, III, 416.  
 coerulea, Hypheotrix, I, 59.  
 Collembola, I, 83.  
 communis, Neritina, IV, 218.  
 compactus, Siphonocryptus, III, 340.  
 compressus, Planorbis, IV, 13.  
 concolor, Cryptodesmus, III, 376.  
 confluens, Neritina, IV, 81.  
 conica, Littorina, IV, 198.  
 connectens, Psammotellina, IV, 237.  
 consimilis, Neritina, IV, 83.  
 conspicuum, Strongylosoma, III, 368.  
 contrarius, Amphidromus II, 241, III, 208.  
 Coracias temminckii, III, 274.  
 corallium, Cerithium, IV, 169.  
 Corbicula, IV, 108.  
 — angulifera, IV, 116.  
 — celebensis, IV, 113.  
 — ducalis, IV, 114.  
 — gibba, IV, 121.  
 — javanica, I, 111.  
 — lacustris, IV, 118.  
 — Moltkeana, IV, 111.  
 — pulchella, IV, 120.  
 — pullata, IV, 117.  
 — rivalis, IV, 120.  
 — subplanata, IV, 112.  
 — sulcata, IV, 116.  
 — trapezoidea, IV, 115.  
 — tumida, IV, 113.  
 corethrurus, Pontoscolex, III, 57.  
 coriacea, Oncis, IV, 127.  
 cornea, Assiminea, IV, 215.  
 cornea, Neritina, IV, 218.  
 corneus, Potamides, IV, 190.  
 — Solen, IV, 276.  
 cornutus, Attus, I, 209.  
 coromandus, Bubulcus, III, 284.  
 Corvus enca, III, 280.  
 — macrorhynchus, III, 303.  
 costata, Vivipara, IV, 20.  
 costulata, Trochomorpha, II, 232; II, 159.  
 crassideus, Pythia, IV, 138.  
 crassula, Helix, II, 238, 261; III, 189.  
 crassus, Achorutes, I, 90.  
 crenulata, Argiope, I, 196.  
 —, Melania, IV, 45.  
 crepidinata, Melania, IV, 56.  
 crepidularia, Neritina, IV, 218.  
 criniger, Gobius, III, 413.  
 cristatellus, Calotes, I, 167.  
 Crocidura brevicauda, I, 124.  
 Crocidura orientalis, I, 124.  
 — weberi, I, 123.  
 Crocodilus porosus, I, 175.  
 cruentatus, Bufo, IV, 406.  
 Cryptodesmus bicolor, III, 373.  
 — concolor, III, 376.  
 — sumatranus, III, 376.  
 — Weberi, III, 374.  
 Cryptops ruficeps, III, 315.  
 Ctenus fimbriatus, I, 207.  
 cucullata, Ostrea, IV, 223.  
 Cuculus intermedius, III, 275.  
 Cultellus acuminatus, IV, 269.  
 — attenuatus, IV, 266.  
 — cultellus, IV, 270.  
 — javanicus, IV, 267.  
 — maximus, IV, 263.  
 — marmoratus, IV, 271.  
 — olivaceus, IV, 266.  
 — ovalis, IV, 269.  
 — scalprum, IV, 265.  
 Cumingi, Glaucomya, IV, 231.  
 curtus, Solen, IV, 272.  
 curvicauda, Epeira, I, 193.  
 curvicosta, Melania, IV, 36.  
 Cuscus celebensis, I, 114.  
 cuspidata, Marthana, III, 11.  
 cyanura, Pitta, III, 269.  
 Cyclemys amboinensis, I, 176.  
 Cyclestheria Hislopi, II, 118.  
 Cyclophorus borneensis, II, 261.  
 — eximius, II, 215.  
 — perdix, II, 216 I, 261.  
 — planorbis, II, 214.  
 Cyclops simplex, II, 125.  
 Cyclostomidae, II, 210.  
 Cyclotropus, IV, 215.  
 Cyclotus amboinensis, II, 212.  
 — biangulatus, II, 214.  
 — floresianus, II, 211.  
 — fulminulatus, II, 212.  
 — politus, II, 212.  
 — reticulatus, II, 262.  
 cylindracea, Melania, IV, 60.  
 Cylindrophis rufa v. melanota, I, 180.  
 cyanurum, Lygosoma, I, 174.  
 cynamoligus, Cercocebus, I, 102.  
 cynocephalum, Sicydium, III, 414.  
 Cynonycteris amplexicaudata, I, 126.  
 Cynopterus marginatus, I, 126.  
 cyprinoides, Cyrena, IV, 100.  
 Cyprinotus pyxidatus, II, 134.  
 Cyprinus carpio, III, 424.

*Cypris longiseta*, II, 133.

— *odiosa*, II, 131.

— *Richardi*, II, 130.

— *Sarsi*, II, 132.

— *Weberi*, II, 129.

*Cyrena*, I, 230 IV, 90.

— *buschi*, IV, 93.

— *coaxans*, IV, 98.

— *cyprinoides*, IV, 100.

— *eximia*, IV, 98.

— *expansa*, IV, 95.

— *impressa*, IV, 93.

— *moluccensis*, IV, 96.

— *Moussoni*, IV, 94.

— *sinuosa*, IV, 100.

— *suborbicularis*, IV, 94.

— *sumatrensis*, IV, 92.

— *triangularis*, IV, 93.

*Cyrenidae*, IV, 89, 230.

## D

*dactylus*, Auricula, IV, 157.

*Dactylochalina australis*, I, 60.

*Danau di atas*, I, IV.

— *di bahwa*, I, III.

— *gedang*, I, IV.

*daniconius*, Rasbora, III, 423.

*Daphnella excisa* II, 119.

*d'armandvillei*, *Gymnodactylus*, I, 163.

*Dasypus*, *Riechwülste*, II, 92.

*decipiens*, *Spongilla*, I, 40.

*decollatus*, *Potamides*, IV, 188.

*decollata*, *Quoyia*, IV, 192.

*decumanus*, *Mus*, I, 119.

*Delesserti*, *Solen*, IV, 279.

*Denikei*, *Psammobia*, IV, 243.

*densa*, *Nanina*, II, 261.

*dentata*, *Cambala*, III, 378.

*depressicornis*, *Anoa*, I, 112.

*Desmogaster*, III, 49.

*diadema*, *Phyllorhina*, I, 127.

*Diadophis baliodirus*, I, 184.

— *bipunctatus*, I, 184.

*Diaptomus orientalis* II, 127.

*Dibamus novae-guineae*, I, 175.

*Dicaeum celebicum* III, 229.

— *igniferum*, III, 301.

*dichotoma*, *Sanguinularia*, IV, 253.

—, *Spongocladia*, I, 58.

*dichotomum*, *Spongodendron*, I, 58.

*Didelphys*, *Schuppen*, II, 18.

*Dina Weberi*, IV, 353.

*Dino Weberi*, III, 17.

*diphos*, *Soletellina*, IV, 232.

*Djenemaedja* I, VII.

*Doleschallii*, *Argiope* I, 195.

*dolichopsis*, *Hyla*, IV, 407.

*Dolomedes albocinctus*, I, 207, 417.

*douronensis*, *Barbus* III, 422.

*Dona*, I, IX.

*Doratonotus armatus*, III, 371.

*Doryichthys brachyurus* III, 428,

— *caudatus*, III, 429.

*Draco lineatus*, I, 166.

— *volans*, I, 166.

*dubia*, *Neritina*, IV, 218.

—, *Perichaeta*, III, 68.

*dubium*, *Bipalium*, I, 142.

*ducalis*, *Corbicula*, IV, 114.

*duclosiana*, *Engina*, IV, 217.

*Dules marginatus*, III, 407.

*Dunkeri*, *Auricula*, IV, 160.

*Dussumieri*, *Equula*, III, 409.

## E

*eburnea*, *Psammobia*, IV, 242.

*echinata*, *Ostrea* IV, 221.

*Edentata*, *Charaktere*, II, 101.

—, *Gebiss*, II, 105.

*edentula*, *Lucina*, IV, 229.

*edentulus*, *Melampus*, IV, 167.

*Edoliisoma morio*, III, 278.

*edulis*, *Pteropus*, I, 125.

*Elanus hypoleucos*, III, 271.

*Elaps trilineatus*, I, 191.

*elegans*, *Mesarmadillo*, IV, 369.

—, *Siphonotus* III, 339.

*Eleotris cantor*, III, 414.

— *butis*, III, 415.

— *fusca*, III, 414.

— *gymnopomus*, III, 415.

— *gyrinoides*, III, 414.

— *hoedti*, III, 414.

— *melanosoma*, III, 415.

— *ophiocephalus*, III, 414.

*Elizia orbiculata*, IV, 233.

*elongata*, *Psammotaea*, IV, 240.

*emys*, *Testudo*, I, 176.

*enca*, *Corvus*, III, 280.

*Endeh*, I, IX.

*Engina duclosiana*, IV, 217.

*Engraulis indicus*, III, 427.

*Engystomatidae*, IV, 404.

*Ennea bicolor*, II, 261.

Ensiculus, IV, 269.  
 Entomobrya florensis, I, 86.  
 Entomostraca, II, 118.  
 Eonycteris spelaea, I, 126.  
 Epeira curvicauda, I, 193.  
 — inaurata, I, 197.  
 ephippium, Bipalium, I, 139.  
 Ephydatia bogorensis, I, 33.  
 — fluviatilis, I, 32.  
 — fluviatilis, Symbiose, I, 50.  
 Equula Dussumieri III, 409.  
 erythraea, Rana, IV, 390.  
 Erythra phoenicura III, 269, 282, 289.  
 erythropleurus, Thyropygus, III, 384.  
 erythrurus, Bothrops, I, 192.  
 Eudynamis orientalis, III, 292.  
 eumelanus, Rhinocricus III, 394.  
 Eurystomus orientalis, III, 274.  
 Everetti, Hyla, IV, 407.  
 —, Rana, IV, 394.  
 exaratum, Plecotrema, IV, 149.  
 excisa, Daphnella, II, 119.  
 exiguus, Solen, IV, 275.  
 exilis, Cisticola, III, 277, 293.  
 eximia, Cyrena, IV, 98.  
 eximius, Cyclophorus, II, 215.  
 exotica, Ligia, IV, 381.  
 expansa, Cyrena, IV, 95.  
 exserta, Helicina, II, 222.

## F

faba, Neritina, IV, 80.  
 falcinellus, Plegadis, III, 284.  
 fasciata, Auricula, IV, 160.  
 —, Rallina, III, 305.  
 —, Temnocephala, I, 26.  
 fasciatus, Melampus, IV, 160.  
 —, Nemachilus, III, 425.  
 Fauna von Celebes, III, 405, 468.  
 Faunus ater, IV, 191.  
 Felis minuta, I, 109.  
 — pardus, I, 108.  
 — tigris, I, 108.  
 ferrugineus, Gallus, III, 281.  
 fibulata, Reniera, I, 58.  
 filamentosus, Gerres, III, 408.  
 fimbriatus, Ctenus, I, 207.  
 fimetaria, Lipura, I, 90.  
 Finschi, Turdinus, III, 276.  
 Fischfauna von Celebes, III, 429, 465.  
 flabelliforme, Thamnoclonium, I, 58.  
 flava, Motacilla III, 293.

flaveola, Cassidula, IV, 148.  
 —, Geryogone, III, 278.  
 flaviceps, Siphonophora, III, 336.  
 flavicollis, Ardeiralla, III, 284.  
 flavicoxis, Strongylosoma, III, 366.  
 flavida, Melania, IV, 72.  
 flavimanus, Isometrus, III, 87.  
 flavisternus, Platyrrhachus, III, 346.  
 flavovirens, Neritina IV, 81.  
 florense, Lygosoma, I, 173.  
 florensis, Entomobrya, I, 86.  
 Flores, I, VII.  
 Flores, Süßwasserfische, III, 437.  
 floresiana, Alcedo, III, 292.  
 —, Benhamia, III, 34.  
 —, Helix, II, 235.  
 —, Nanina, II, 230.  
 floresianus, Alloniscus IV, 374.  
 —, Armadillo, IV, 361.  
 —, Cyclotus, II, 211.  
 floris, Artamides, III, 299.  
 —, Terpsiphone, III, 293.  
 —, Treron, III, 305.  
 Fluss Ba, I, IX.  
 — Dona, I, VIII.  
 — La Palupa, I, VI.  
 — Minralang, I, V, VI.  
 — Tjenrana, I, VI.  
 fluviatilis, Ephydatia, I, 32.  
 —, Hemiramphus, III, 427.  
 —, Meyenia, I, 32.  
 —, Spongilla I, 32.  
 foeda, Melania, IV, 32.  
 folium, Ostrea, IV, 222.  
 fontinalis, Melania, IV, 61.  
 formosus, Isometrus, III, 88.  
 —, Siphonotus, III, 338.  
 fornicata, Gasteracantha, I, 194.  
 fortis, Anura, I, 91.  
 frenatus, Cinnerys, III, 279.  
 frenatus, Hemidactylus, I, 163.  
 frontata, Gallinula, III, 282.  
 fulgidus, Monachalcyon, III, 292.  
 fulminulatus, Cyclotus, II, 212.  
 fulvus, Charadrius, III, 281, 305.  
 fulvizona, Nania, II, 228.  
 Furcella, IV, 283.  
 fusca, Eleotris, III, 414.  
 fuscomanus, Tarsius, III, 264.

## G

gachua, Ophiocephalus, III, 417.  
 Gagrella albicoxa, III, 10.

- Gagrella atra*, III, 7.  
 — *celerrima*, III, 9.  
 — *hasseltii*, III, 8.  
 — *monticola*, III, 8.  
 — *sepia*, III, 8.  
 — *tenuis*, III, 6.  
*Galeopithecus volans*, I, 111.  
*galeritus*, *Anorhinus*, III, 269.  
*gallinacea*, *Parra*, III, 306.  
*Gallinago megala*, III, 283.  
*Gallinula frontata*, III, 282.  
*Gallus ferrugineus*, III, 281.  
*Gasteracantha fornicata*, I, 194.  
 — *Kochii*, I, 194.  
 — *leuco-melas*, I, 194.  
 — *vittata*, I, 194.  
*Gazzola typica*, III, 280.  
*Gecko verticillatus*, I, 164.  
*Gehyra mutilata*, I, 163.  
*Geopelia striata*, III, 281.  
*Geoplana nasuta*, I, 133.  
 — *sondaica*, I, 133.  
 —, *Verbreitung von*, I, 131.  
*Gerres filamentosus*, III, 408.  
 —, *kapas*, III, 408.  
*Gerygone flaveola*, III, 278.  
*gibba*, *Corbicula*, IV, 121.  
*gibberifrons*, *Anas*, III, 285, 306.  
*giganteus*, *Hyllus*, I, 209.  
*giuris*, *Gobius*, III, 411.  
*gladiator*, *Sphaeropaeus*, III, 327.  
*glans*, *Melania*, IV, 30.  
*Glareola grallaria*, III, 282.  
*glareola*, *Totanus*, III, 282.  
*Glaucomya Cumingi*, IV, 231.  
 — *sumatrensis*, IV, 231.  
 — *virens*, IV, 230.  
*Glaucomyidae*, IV, 230.  
*Glaucanome*, IV, 230.  
*Glomerodesmus sumatranus*, III, 333.  
*Glomeris albicornis*, III, 323.  
 — *infuscatus*, III, 324.  
*gloriosa*, *Tortula*, I, 204.  
*Glossosiphonia Weberi*, IV, 332.  
*Glossosiphonidae*, IV, 332.  
*glottis*, *Totanus*, III, 283.  
*Glyphidodon coelestinus*, III, 416.  
*Glyphidrilus weberi*, III, 37.  
*Glyptosternum platypogon*, III, 420.  
*Gnathobdellidae*, IV, 335.  
*Gnomulus sumatranus*, III, 25.  
*Gobius baliuroides*, III, 413.  
 — *biocellatus*, III, 410.  
*Gobius celebius*, III, 410.  
 — *criniger*, III, 413.  
 — *giuris*, III, 411.  
 — *grammepomus*, III, 411.  
 — *javanicus*, III, 412.  
 — *lacrymosus*, III, 412.  
 — *reichei*, III, 413.  
*goësi*, *Trigoniulus*, III, 395.  
*Golf von Boni*, I, VI.  
*Gonibregmatus insularis*, III, 318.  
*Gonyocephalus chamaeleontinus*, I, 166.  
 — *grandis*, I, 166.  
 — *kuhlii*, I, 166.  
 — *tuberculatus*, I, 166.  
*goniosoma*, *Barbus*, III, 423.  
*Gordius sumatrensis*, II, 138.  
 — *Weberi*, II, 137.  
*gorgona*, *Toradjia*, IV, 366.  
*gracile*, *Bipalium*, I, 142.  
*gracilis*, *Helobdella*, IV, 334.  
 —, *Stenogyra*, II, 243, 261.  
*Gracula venerata*, III, 304.  
*Graculus sulcirostris*, III, 306.  
*graffi*, *Vaginulus*, II, 246, 262.  
*grallaria*, *Glareola*, III, 282.  
*grammepomus*, *Gobius*, III, 411.  
*grandis*, *Gonyocephalus*, I, 166.  
 —, *Jyngipicus*, III, 291.  
*granifer*, *Melampus*, IV, 166.  
*granifera*, *Melania*, IV, 71.  
*granosa*, *Arca*, IV, 228.  
*granularis*, *Littorina*, IV, 206.  
*granulosa*, *Limnatis*, IV, 338.  
*granum*, *Melania*, IV, 65.  
*grata*, *Psammobia*, IV, 242.  
*Graucalus leucopygius*, III, 278.  
*grayi*, *Tropidophorus*, I, 175.  
*griseicauda*, *Treron*, III, 287.  
*griseofusca*, *Oncidella*, IV, 128.  
*grossicosta*, *Vivipara*, IV, 25.  
*gruneri*, *Cassidula*, IV, 149.  
*grunewaldi*, *Perionyx*, III, 75.  
*guttatus*, *Mesarmadillo*, IV, 370.  
*gutturalis*, *Hirundo*, III, 293.  
*Gymnodactylus d'armandvillei*, I, 163.  
 — *marmoratus*, I, 163.  
*gyrinoides*, *Electris*, III, 414.

## II.

- Haare von Manis*, II, 21.  
*Haemodipsa sylvestris*, IV, 336.  
 — *zeylanica*, IV, 335.



- Haemadipsinae, IV, 335.  
 Haemopsis Weberi, IV, 353.  
 Halcyon chloris, III, 269, 275, 286, 292.  
 Haliaëtus leucogaster, III, 272, 286.  
 Halichondria, I, 61.  
 Halichondria, Symbiose de, I, 56.  
 hampal, Barbus, III, 422.  
 Haplochilus celebensis, III, 426.  
 — panchax, III, 426.  
 Hasseltii, Bipalium, I, 142.  
 —, Gaggrella, III, 8.  
 —, Lepidocephalichthys, III, 425.  
 —, Leptobranchium, IV, 408.  
 —, Osteochilus, III, 420.  
 —, Polyacanthus, III, 418.  
 —, Vaginulus, II, 261.  
 —, Vespertilio, I, 128.  
 Hautdrüsen, von Manis, II, 22.  
 Helena, Canidia, IV, 75.  
 Heliaster indus v. ambiguus, III, 271.  
 Helicarion adolfi, II, 223, III, 114.  
 Helicina exserta, II, 220.  
 — oxytropis, II, 262.  
 Helictis orientalis, I, 110.  
 Helix argillacea, II, 237, 262, III 171.  
 — aurea, II, 239.  
 — Crassula, II, 238, 261, III, 189.  
 — floresiana, II, 235.  
 — intumescens, II, 234.  
 — mendax, II, 237.  
 — quadrivalvis, II, 261.  
 — rotatoria, II, 234.  
 — similis, II, 236, 262.  
 — solorensis, II, 235, III, 169.  
 — sparsa, II, 227, III, 142.  
 — sumatrana, II, 235, III, 160.  
 — textoria, II, 236.  
 — tomentosa, II, 261.  
 — tuba, II, 238, III, 190.  
 — winteriana, II, 234, 261.  
 Helobdella gracilis, IV, 334.  
 Helostoma temminckii, III, 418.  
 Henicops albipes, III, 309.  
 Hemidactylus frenatus, I, 163.  
 — platyurus, I, 163.  
 Hemiramphus buffonis, III, 426.  
 — fluviatilis, III, 427.  
 — orientalis, III, 427.  
 — sumatranus, III, 426.  
 henrici, Mustela, I, 110.  
 hercules, Sphaeropaeus, III, 326.  
 Herennia multipuncta, I, 196.  
 Herpestes javanicus, I, 110.  
 Herpobdellidae, IV, 353.  
 Heterochordeuma monticola, III, 342.  
 Heteroglypha, IV, 244.  
 Heteropoda spec, I, 204.  
 — venatoria, I, 204.  
 hicksoni, Rhinocricus, III, 339.  
 —, Siphonotus, III, 339.  
 Himantopus leucocephalus, III, 283.  
 hippos, Caranx, III, 409.  
 Hirudineen, IV, 332, 336.  
 Hirundo javanica, III, 277, 293.  
 — gutturalis, III, 293.  
 Hislopi, Cyclestheria, II, 118.  
 hispidus, Tylognathus, III, 421.  
 hochstetteri, Alycaeus, II, 262.  
 hoedti, Eleotris, III, 414.  
 homalocephalum, Ptychozoon, I, 165.  
 Homaloptera pavonina, III, 424.  
 — wassincki, III, 425.  
 Hormurus australasiae, III, 96.  
 — weberi, III, 97.  
 hortensis, Trochus, II, 226.  
 Hosii, Rana, IV, 398.  
 Houletti, Perichaeta, III, 64.  
 humberti, Platyrhachus, III, 345.  
 humphreysiana, Nanina, II, 261.  
 hybrida, Hydrochelidon, III, 285.  
 Hydrochelidon hybrida, III, 285.  
 — nigra, III, 285.  
 Hyla dolichopsis, IV, 407, 417.  
 — Everetti, IV, 407.  
 Hyllus giganteus, I, 209.  
 Hylobates agilis, I, 99.  
 —, Aorta abdominalis, I, 424.  
 —, Arteria coeliaca, II, 185.  
 —, Art. hepatica, II, 185.  
 —, Art. lienalis, II, 185.  
 —, Art. mesenterica inf., II, 185.  
 —, Art. mesenterica sup., II, 185.  
 —, Art. renalis, II, 185.  
 —, Art. spermatica, II, 185.  
 —, Buccalfalten, II, 172.  
 —, Calcaneus secundarius, I, 343.  
 —, Carpale I, I, 338.  
 —, Cartilago triangularis, I, 338.  
 —, Chorda vocalis, II, 162.  
 —, Darmkanal, II, 174.  
 —, Diaphragma, II, 148.  
 —, Gaumenfalten II, 174.  
 —, Gebiss, II, 179.  
 —, Gehirn, II, 186.  
 —, Glandula parotis, II, 172.  
 —, Glandula sublingualis, II, 172.

- Hylobates, Glandula submaxillaris, II, 172.  
 —, Glandula, thymus, II, 182.  
 —, Glandula, thyreoidea, II, 182.  
 —, Herz, II, 183.  
 —, Kehlkopf, II, 161.  
 —, Leber, II, 181.  
 —, leuciscus, I, 99.  
 —, Ligament. coraco-cost., I, 225.  
 —, Ligament. Pouparti, I, 272.  
 —, Lungen, II, 182.  
 —, Milz, II, 181.  
 —, Mm. contrahentes, I, 256, 341.  
 —, Mm. extensores carpiradial., I, 237.  
 —, Mm. gemelli, I, 290.  
 —, Mm. interossei, I, 258, 313.  
 —, Mm. interspinales, I, 266.  
 —, Mm. ischio-cavernosi, I, 319.  
 —, Mm. lumbricales, I, 258, 309.  
 —, Mm. serrati postici, I, 270.  
 —, Mm. spinosi, I, 264.  
 —, Mm. transversi, I, 264.  
 —, Musc. abduct. digiti V, I, 255, 310.  
 —, Musc. abduct. halluc., I, 308.  
 —, Musc. abduct. pollicis, I, 257.  
 —, Musc. abductor pollic. brev., I, 257.  
 —, Musc. abduct. poll. long., I, 238.  
 —, Musc. adductor brevis, I, 284.  
 —, Musc. adductor halluc., I, 312.  
 —, Musc. adductor long., I, 283.  
 —, Musc. adduct. mag., I, 284, 293.  
 —, Musc. Ancon. ext. I, 233.  
 —, Musc. Ancon. int. I, 233.  
 —, Musc. biceps, I, 230.  
 —, Musc. biceps femoris, I, 292.  
 —, Musc. bivent. max. inf., II, 192.  
 —, Musc. brachial. int., I, 232.  
 —, Musc. bulbo-cavernos., I, 319.  
 —, Musc. constrict. pharyng. inf., II, 154.  
 —, Musc. constrict. pharyng. med., II, 153.  
 —, Musc. constrict. urethrae, I, 320.  
 —, Musc. coraco-brachial., I, 229.  
 —, Musc. crico-arytaen. lat., II, 159.  
 —, Musc. crico-arytaen. post., II, 158.  
 —, Musc. crico-thyreoid. ant., II, 156.  
 —, Musc. deltoides, I, 225.  
 —, Musc. diaphragmaticus, I, 320.  
 —, Musc. extens. brev. digit. et halluc., I, 298.  
 —, Musc. extensor carpi uln., I, 238.  
 —, Musc. extens. cruris quadriceps., I, 278.  
 Hylobates, Musc. extens. digiti mim., I, 241.  
 —, Musc. extens. digitor. long., I, 297.  
 —, Musc. extensor digit. prof., I, 243.  
 —, Musc. extensor digitor., subl. I, 237.  
 —, Musc. extensor hall. long., I, 298.  
 —, Musc. extens. pollic. brev., I, 239.  
 —, Musc. extens. pollic. long., I, 243.  
 —, Musc. flexor brevis digiti V, I, 255.  
 —, Musc. flexor brevis digiti V, I, 311.  
 —, Musc. flexor, brev. hall., I, 309.  
 —, Musc. flexor carpi radial., I, 247.  
 —, Musc. flexor carpi ulnar., I, 245.  
 —, Musc. flexor digitor. brev., I, 304, 308.  
 —, Musc. flexor digitor. long., I, 301.  
 —, Musc. flexor. digitor. profund., I, 249.  
 —, Musc. flexor. digitor. subl., I, 248.  
 —, Musc. flexor hall. long., I, 301.  
 —, Musc. flexor pollic. brev., I, 252.  
 —, Musc. flexor pollic. long., I, 251.  
 —, Musc. gastrocnemius, I, 308.  
 —, Musc. genio-glossus, II, 173.  
 —, Musc. genio-hyoid., II, 144.  
 —, Musc. glosso-epiglott., II, 173.  
 —, Musc. glosso-pharyng., II, 151.  
 —, Musc. glutaeus max., I, 286.  
 —, Musc. glutaeus med., I, 287.  
 —, Musc. glutaeus nimim., I, 287.  
 —, Musc. gracilis, I, 283.  
 —, Musc. hyo-glossus, II, 173.  
 —, Musc. ileo-costalis, I, 263.  
 —, Musc. ileopsoas, I, 277.  
 —, Musc. infraspinatus, I, 222.  
 —, Musc. interarytaenoideus, II, 160.  
 —, Musc. latissimo-condyloid., I, 233.  
 —, Musc. latissimus dorsi, I, 227.  
 —, Musc. levator scapulae, I, 218.  
 —, Musc. levator uvulae, II, 174.  
 —, Musc. levat. veli palatini, II, 174.  
 —, Musc. longissim. cervicis, I, 267.  
 —, Musc. longissim. dorsi, I, 264.  
 —, Musc. longissim. lumbor., I, 266.  
 —, Musc. long. capitis, II, 139.  
 —, Musc. long. colli, II, 139.  
 —, Musc. masseter, II, 140.  
 —, Musc. multifidus, I, 266, 268.  
 —, Musc. mylo-hyoideus, II, 144.  
 —, Musc. obliq. ab dom. ext., I, 271, 393.  
 —, Musc. obliq. abdom. int., I, 273.  
 —, Musc. obliq. capit. inf., I, 269.  
 —, Musc. obliq. capit. sup., I, 270.  
 —, Musc. obturator. ext., I, 285.  
 —, Musc. obturat. intern., I, 289.  
 —, Musc. omo-cervicalis, I, 218.

- Hylobatus, *Musc. omohyoideus*, II, 145.  
 —, *Musc. opponens digiti quinti*, I, 256.  
 311.  
 —, *Musc. opponens hallucis*, I, 310.  
 —, *Musc. opponens pollicis*, I, 253.  
 —, *Musc. palato-glossus*, II, 174.  
 —, *Musc. palato-pharyng.*, II, 152, 174.  
 —, *Musc. palmaris brev.*, I, 255.  
 —, *Musc. palmaris long.*, I, 246.  
 —, *Musc. pectineus*, I, 280.  
 —, *Musc. pectoral. major*, I, 223, 385, 387.  
 —, *Musc. pectoral. minor*, I, 224, 385, 391.  
 —, *Musc. peroneo-tibialis*, I, 306.  
 —, *Musc. peroneus brev.*, I, 294.  
 —, *Musc. peroneus long.*, I, 293.  
 —, *Musc. plantaris*, I, 301.  
 —, *Musc. popliteus*, I, 301.  
 —, *Musc. pronator quadrat.*, I, 251.  
 —, *Musc. pronator teres*, I, 247.  
 —, *Musc. psoas minor*, I, 276.  
 —, *Musc. pterygo-bucco-mylo-pharyng.*, II, 151.  
 —, *Musc. pterygoideus, ext.*, II, 141.  
 —, *Musc. pterygoideus, int.*, II, 141.  
 —, *Musc. pyramidalis*, I, 276.  
 —, *Musc. pyriformis*, I, 289.  
 —, *Musc. quadrat. femoris*, I, 290.  
 —, *Musc. quadratus lumbor.*, I, 276.  
 —, *Musc. rect. abdominis*, I, 274, 369.  
 —, *Musc. rectus capit. ant.*, II, 139.  
 —, *Musc. rectus capit. maj.*, I, 269.  
 —, *Musc. rectus capit. min.*, I, 269.  
 —, *Musc. rhomboides*, I, 222.  
 —, *Musc. sartorius*, I, 278.  
 —, *Musc. scalenus ant.*, I, 220.  
 —, *Musc. scalenus med.*, I, 221.  
 —, *Musc. scalenus post.*, I, 221.  
 —, *Musc. semimembranosus*, I, 292.  
 —, *Musc. semispinalis*, I, 268.  
 —, *Musc. semitendinosus*, I, 291.  
 —, *Musc. serrat. ant. maj.*, I, 228.  
 —, *Musc. soleus*, I, 300.  
 —, *Musc. sphincter ani*, I, 319, 320.  
 —, *Musc. spinalis capit.*, I, 268.  
 —, *Musc. spinal. cervic.*, I, 268.  
 —, *Musc. spino-caudalis*, I, 319.  
 —, *Musc. spinoso-caudalis*, I, 317.  
 —, *Musc. splenius capit. & cervic.*, I, 262.  
 —, *Musc. sterno-cleido-mastoideus*, I, 217.  
 Hylobatus, *Musc. sterno-hyoideus*, II, 144.  
 —, *Musc. sterno-thyreoideus*, II, 146.  
 —, *Musc. stylo-glossus*, II, 173.  
 —, *Musc. stylo-hyoideus*, II, 143.  
 —, *Musc. stylo-laryngo-pharyng.*, II, 152.  
 —, *Musc. subclavius*, I, 224.  
 —, *Musc. subscapularis*, I, 226.  
 —, *Musc. subscap. minor*, I, 226.  
 —, *Musc. supinator brev.*, I, 236.  
 —, *Musc. supinator long.*, I, 236.  
 —, *Musc. suprascapularis*, I, 223.  
 —, *Musc. supraspinatus*, I, 222.  
 —, *Musc. temporalis*, II, 140.  
 —, *Musc. tensor veli palat.*, II, 174.  
 —, *Musc. teres maj.*, I, 226, 227.  
 —, *Musc. thyreo-arytaenoid.*, II, 159, 164.  
 —, *Musc. thyreo-hyoid.*, II, 147.  
 —, *Musc. thyreo-pharyng.*, II, 154.  
 —, *Musc. thyreoid. transvers.*, II, 155.  
 —, *Musc. tibial. ant.*, I, 296.  
 —, *Musc. tibialis postic.*, I, 305.  
 —, *Musc. transverso-perinei superf.*, I, 324.  
 —, *Musc. transversus, abdom.*, I, 274.  
 —, *Musc. trapezius*, I, 217.  
 —, *Musc. triceps*, I, 233.  
 —, *Musc. tuberoso-caudal.*, I, 317.  
 —, *Muskeln*, I, 212.  
 —, *Nervi Mm. vasti*, I, 456.  
 —, *Nervi cutan. femor. lat.*, I, 451.  
 —, *Nervi musc. iliaci*, I, 455.  
 —, *Nervi musc. pectinei*, I, 456.  
 —, *Nervi musc. psoas*, I, 454.  
 —, *Nervi musc. rect. fem.*, I, 456.  
 —, *Nervi musc. sartorii*, I, 456.  
 —, *Nervus femoralis*, I, 452.  
 —, *Nervus ischiadicus*, I, 453.  
 —, *os centrale*, I, 331.  
 —, *Pankreas*, II, 181.  
 —, *Papillae circumvallat.*, II, 173.  
 —, *Papill. foliatae*, II, 173.  
 —, *periphere Nerven*, I, 212.  
 —, *Pisiforme*, I, 339.  
 —, *Pleurasäcke*, I, 410.  
 —, *Plexus brachialis*, I, 327.  
 —, *Plexus lumbalis*, I, 329.  
 —, *Praehallux*, I, 340.  
 —, *Praepollex*, I, 332.  
 —, *Proc. styloideus*, II, 143.  
 —, *Radiale*, I, 338.  
 —, *Rückenmark*, I, 424.

Hylobates, Rumpf, I, 366.  
 —, Sinus Morgagni, II, 162.  
 —, Spinalnerven, I, 429.  
 —, sternale Rippen, I, 396.  
 —, Sternum, I, 402.  
 —, syndactylus, I, 100.  
 —, thoraco-lumbale Nerven, I, 432.  
 —, thoraco-lumbale Wirbel, I, 422.  
 —, Thoraxskelet, I, 394.  
 —, Thoraxwand, I, 385.  
 —, Tonsillen, II, 173.  
 —, Trachea, II, 182.  
 —, Tuberositas scaphoidei, I, 342.  
 —, Unterzunge, II, 172.  
 —, Wirbelsäule, I, 343, II, 200.  
 —, Zähne, II, 197.  
 —, Zunge, II, 172.  
 —, Zungenbein, II, 149.  
 —, Systematische Stellung, I, 457.

## ■

igniferum, Dicaeum, III, 301.  
 llyocryptus longiremis, II, 123.  
 immaculata, Scolopendrella, III, 319.  
 immarginata, Rhysida, III, 314.  
 imperforata, Pythia, IV, 133.  
 imperforatum, Plecotrema, IV, 149.  
 impressa, Cyrena, IV, 93.  
 inaequidens, Platyrrhachus, III, 857.  
 inaequipes, Sarotes, I, 206.  
 inaurata, Epeira, I, 197.  
 indica, Chalcophaps, III, 305.  
 indica, Pachyura, I, 123.  
 indica, Perichaeta, III, 60.  
 indicus, Engraulis, III, 427.  
 indicus, Japyx, I, 77.  
 indicus, Scorpio, III, 95.  
 indus, var. ambiguus, Heliaster, III, 271.  
 infans, Microcystis, II, 261.  
 inflatum, Cerithium, IV, 174.  
 infuscatus, Glomeris, III, 324.  
 insignis, Phlogius, I, 203.  
 insignis, Psammobia, IV, 243.  
 insignis, Sciurus, I, 117.  
 insularis, Gonibregmatus, III, 318.  
 insularis, Taeniopygia, III, 303.  
 intermedia, Littorina, IV, 197.  
 intermedius, Cucculus, III, 275.  
 intermedius, Pygoplus, III, 23.  
 intermedius, Zosterops, III, 279, 303.  
 interruptus, Amphidromus, II, 262.  
 intumescens, Helix, II, 234.

iris, Neritina, IV, 77.  
 Isidora celebensis, IV, 10.  
 — minahassae, IV, 8.  
 — ovalina, IV, 8.  
 — stagnalis, IV, 11.  
 — sumatrana, IV, 8.  
 — timorensis, IV, 9.  
 Isometrus flavimanus, III, 87.  
 — formosus, III, 88.  
 — maculatus, III, 88.  
 — mucronatus, III, 85.  
 Isopodes terrestres, IV, 357.  
 Ixalus aurifasciatus, IV, 404.

## ■

jaculator, Toxotes, III, 409.  
 jagori, Alycaeus, II, 262.  
 Janellei, Cerithium, IV, 171.  
 —, Septaria, IV, 84.  
 Japygidae, I, 77.  
 Japyx indicus, I, 77.  
 jarbua, Therapon, III, 407.  
 javanensis, Centrocyx, III, 276.  
 —, Monopterus, III, 428.  
 —, Mygale, I, 202.  
 —, Selenoscomia, I, 202.  
 javanica, Batissa, IV, 103.  
 —, Butorides, III, 284.  
 —, Corbicula, IV, 111.  
 —, Hirundo, III, 277, 293.  
 —, Limnaea, IV, 3.  
 —, Limnatis, IV, 339.  
 —, Manis, I, 113.  
 —, Melania, IV, 43.  
 —, Rana, IV, 329.  
 —, Stenogyra, II, 262.  
 —, Tupaja, I, 122.  
 —, Vivipara, IV, 21.  
 javanicum, Acanthion, I, 121, III, 267.  
 javanicus, Barbus, III, 421.  
 —, Centropus, III, 292.  
 —, Cultellus, IV, 267.  
 —, Gobius, III, 412.  
 —, Herpestes, I, 110.  
 —, Lepidocyrtus, I, 85.  
 —, Thyropygus, III, 380.  
 javanus, Ancyclus, IV, 15.  
 —, Rhacophorus, IV, 402.  
 jayensis, Batissa, IV, 103.  
 jerboa, Rana, IV, 397.  
 jubatus, Calotes, I, 167.  
 Judae, Auricula, IV, 154.

*Jyngipicus grandis*, III, 291.

# K

Kadjang, I, VI.

kapas, Gerres, III, 408.

kapirat, Notopterus, III, 427.

Kenneri, Cerithium, IV, 188.

Keo, I, IX.

Kerivoula picta, I, 129.

— weberi, I, 129.

Kochii, Gasteracantha, I, 194.

Kotting, I, IX.

Kuhlii, Bipalium, I, 142.

—, Gonyocephalus, I, 166.

—, Nephila, I, 197.

—, Rana, IV, 385.

# L

lacrymosus, Gobius, III, 412.

lacustris, Corbicula, IV, 118.

—, Pachydrobia, IV, 26.

laeta, Tarentula, I, 208.

Lagochilus ciliocinctus, II, 216.

Lalage leucopygialis, III, 278.

—, timoriensis, III, 286.

lanceolatus, Spizaetus, III, 272.

Land-Evertebraten, I, II.

Landschnecken, II, 209.

laevis, Barbichthys, III, 423.

Lapadi, I, V.

La-Palupa, I, VI.

lata, Oncis, IV, 128.

lateristriata, Rasbora, III, 424.

lateristriga, Barbus, III, 422.

Lathrodectus scelio, I, 198.

laticollis, Platyrhachus, III, 349.

latidens, Otostigmus, III, 313.

Latinudjong, I, VII.

Leber, Lagerung bei Siluroiden, I, 355.

lempyi, Scops, III, 269.

Lepidocampa weberi, I, 76.

Lepidocephalichthys hasseltii, III, 425.

Lepidocyrtus javanicus, I, 85.

—, variabilis, I, 84.

Lepisma cincta, I, 80.

— nigra, I, 82.

Lepismidae, I, 80.

Leptobrachium Hasselti, IV, 408.

leptonyx, Lutra, I, 110.

Leptopoma moussoni, II, 217, 262.

— vitreum, II, 217, 262.

Leptosira, I, 54.

lepturus, Mus, I, 120.

Lepus nigricollis, I, 122.

leuciscus, Hylobates, I, 99.

leucocephalus, Himantopus, III, 283.

leucogaster, Artamus, III, 278, 286.

—, Haliaëtus, III, 272, 286.

leuco-melas, Gasteracantha, I, 194.

leucomystax, Paradoxurus, I, 109.

—, Rhacophosus, IV, 399.

leucops, Chibia, III, 278, 286.

leucopygialis, Lalage, III, 278.

leucopygius, Graucalus, III, 278.

leucosticta, Modiola, IV, 86.

Ligia exotica, IV, 381.

Lilla, I, IX.

lima, Oxyglossus, IV, 384.

limbifera, Nanina, II, 229.

Limnaea brevispira, IV, 2.

— javanica, IV, 3.

Limnaeidae, IV, 1.

Limnatis granulosa, IV, 338.

— javanica, IV, 339.

limnocharis, Rana, IV, 390.

Limosa, uropygialis, III, 306.

Lindu, I, IV.

linearis, Solen, IV, 277.

lineata, Melania, IV, 71.

—, Nerita, IV, 219.

—, Typhlina, I, 180.

lineatus, Draco, I, 166.

linnaei, Calamaria, I, 182.

Liocassis poeciopterus, III, 420.

Lipura fimetaria, I, 90.

Lipurinae, I, 89.

lirata, Assiminea, IV, 216.

Lithobius weberi, III, 310.

litigiosa, Melania, IV, 48.

Littorina albicans, IV, 199.

— biangulata, IV, 209.

— bullata, IV, 202.

—, carinifera, IV, 198.

— conica, IV, 198.

— granularis, IV, 206.

— intermedia, IV, 197.

— melanostoma, IV, 199.

— pagodus, IV, 201.

— pusilla, IV, 208.

— pyramidalis, IV, 205.

— scabra, IV, 194.

— subgranosa, IV, 208.

— undalata, IV, 199.

— ventricosa, IV, 207.

*Littorina vilis*, IV, 204.  
*Littoriniden*, IV, 193.  
*liurus*, *Tetrodon*, III, 429.  
*liventer*, *Butaster*, III, 271.  
*lobifera*, *Pupina*, II, 218.  
*Loka*, I, V, VII.  
*longicornis*, *Scutigera*, III, 309.  
*longiremis*, *Ilyocryptus*, II, 123.  
*longiseta*, *Cypriis*, II, 133.  
*Lophodesmus pusillus*, III, 372.  
*Lophura amboinensis*, I, 167.  
*Loriculus stigmatus*, III, 273.  
*Lucina edentula*, IV, 229.  
 — *philippinarum*, IV, 229.  
*Lucinidae*, IV, 228.  
*lucius*, *Ophiocephalus*, III, 417.  
*luctuosa*, *Myristicivora*, III, 281.  
*lutescens*, *Cassidula*, IV, 147.  
*luteum*, *Oncidium*, IV, 127.  
*luteus*, *Melampus*, IV, 163.  
*Lutra leptonyx*, I, 110.  
*luzonicus*, *Otoeryptops* III, 315.  
 —, *Solen*, IV, 280.  
*Lycosa*, I, 208.  
*lycosinum*, *Anomalomma*, I, 200.  
*Lygosoma chalcides*, I, 174.  
 — *cyanurum*, I, 174.  
 — *florense*, I, 173.  
 — *maculatum*, I, 172.  
 — *malayanum*, I, 170.  
 — *olivaceum*, I, 174.  
 — *sanctum*, I, 171.  
 — *smaragdinum*, I, 174.  
 — *striolatum*, I, 172.  
 — *sumatrense*, I, 174.  
 — *temminckii*, I, 174.  
 — *variegatum*, I, 173.

■

*Macacus maurus*, I, 103.  
*macassariensis*, *Macropygia*, III, 287.  
*Macha*, IV, 256.  
*macklotii*, *Pteropus*, I, 126.  
*macrocephalus*, *Clarias*, III, 419.  
*Macrochlamys minuta*, II, 231, III, 151.  
*macrodon*, *Rana*, IV, 385.  
*Macroglossus minimus*, I, 127.  
*Macrones nemurus*, III, 420.  
 — *nigriceps*, III, 419.  
 — *planiceps*, III, 420.  
*Macropteryx wallacei*, III, 275.  
*Macropygia macassariensis*, III, 287.

*Macropygia menadensis*, III, 281.  
*macrorhynchus*, *Corvus*, III, 303.  
*Macrothrix spinosa*, II, 123.  
*Macrotoma montana*, I, 84.  
*maculata*, *Nephelia*, I, 196.  
*maculatum*, *Lygosoma*, I, 172.  
*maculatus*, *Barbus*, III, 422.  
 —, *Isometrus*, III, 88.  
 —, *Mastacembelus*, III, 415.  
*Maevia*, I, 209.  
*magur*, *Clarias*, III, 419.  
*Makassar*, I, IV.  
*malabarensis*, *Nephilengys*, I, 197.  
*malaccensis*, *Anthreptes*, III, 300.  
 —, *Psammotellina*, IV, 236.  
 —, *Viverricula*, I, 109.  
*malayana*, *Benhamia*, III, 35.  
*malayanum*, *Lygosoma*, I, 170.  
*Malcolmsonii*, *Stenocypris*, II, 133.  
*Mabuia multifasciata*, I, 170.  
 — *rudis*, I, 170.  
*Mammalia from the Malay Archipelago*,  
 I, 93.  
*Manidae*, *Merkmale der*, II, 99.  
*Manindjau*, I, III.  
*Manis*, *Allantois*, II, 62.  
 —, *Analdrüsen*, II, 24.  
 —, *Anatomie*, II, 1.  
 —, *Auge*, II, 97.  
 —, *Augenlider*, II, 98.  
 —, *Centrale*, II, 76.  
 —, *Darmkanal*, II, 43.  
 —, *Descensus testicular.*, II, 48; 51.  
 —, *Dottersack*, II, 61.  
 —, *Entwicklung*, II, 1.  
 —, *Fussskelet*, II, 77.  
 —, *Gaumenfalten*, II, 36.  
 —, *Gebiss*, II, 33.  
 —, *Gehirn*, II, 86.  
 —, *Gehörorgan*, II, 96.  
 —, *Geruchsorgan*, II, 89.  
 —, *Geschlechtsorgane*, II, 45.  
 —, *Haare*, II, 21.  
 —, *Hautdrüsen*, II, 22.  
 —, *Hautskelet*, II, 75.  
 —, *Inguinalkörper*, II, 52.  
 —, *Integument*, II, 5.  
 —, *Jacobson. Organ*, II, 93.  
 —, *javanica*, I, 113.  
 —, *Kopfskelet*, II, 74.  
 —, *Leber*, II, 44.  
 —, *Magen*, II, 37.  
 —, *Maxillo-turbinale*, II, 91.

- Manis, Milchdrüsen, II, 30.  
 —, Nagelbildung, II, 27.  
 —, Nagelphalanx, II, 27.  
 —, Nahrung, II, 42.  
 —, Nervensystem, II, 86.  
 —, Ovarium, II, 46.  
 —, Penis, II, 49.  
 —, Pisiforme, II, 77.  
 —, Placenta, II, 57.  
 —, Scheide, II, 46.  
 —, Schuppen, II, 5.  
 —, Stensonsche Kanäle, II, 93.  
 —, Stensonsche Nasendrüse, II, 95.  
 —, Sternum, II, 79.  
 —, Thränendrüse, II, 98.  
 —, Uterus, II, 46.  
 —, Zitzen, II, 30.  
 —, Zunge, II, 35.  
 —, Zungenbein, II, 36.  
*Marchesettia spongoides*, Symbiose de,  
 I, 64.  
*marginatus*, *Cynopterus*, I, 126.  
 —, *Dules*, III, 407.  
*marmorata*, *Scytodes*, I, 198.  
*marmoratus*, *Cultellus*, IV, 271.  
 —, *Gymnodactylus*, I, 163.  
*Maros*, I, V.  
*Martensi*, *Parmarion*, III, 107.  
*Martesia*, IV, 281.  
*Marthana cuspidata*, III, 11.  
*Mäsepe*, I, V.  
*Mastacembelus maculatus*, III, 415.  
 — *unicolor*, III, 415.  
*Mauveri*, I, VIII.  
*mauritiana*, *Anguilla*, III, 428.  
*maurus*, *Macacus*, I, 103.  
 —, *Semnopithecus*, I, 102.  
*maximus*, *Cultellus*, IV, 263.  
*Mbawa*, I, IX.  
*Mecistocephalus punctifrons*, III, 317.  
 — *spissus*, III, 317.  
*megala*, *Gallinago*, III, 283.  
*Megalophrys montana*, IV, 409.  
*Megaderma spasma*, I, 128.  
*megalophthalmus*, *Rhynchodemus*, I, 134.  
*megaloproctus*, *Trigoniulus*, III, 397.  
*Megascolex armatus*, III, 71.  
*melalophus*, *Semnopithecus*, I, 101.  
*Melampus*, IV, 160.  
*Melampus edentulus*, IV, 167.  
 — *fasciatus*, IV, 160.  
 — *granifer*, IV, 166.  
 — *luteus*, IV, 163.  
*Melampus nucleolus*, IV, 164.  
 — *siamensis*, IV, 165.  
 — *singaporensis*, IV, 165.  
 — *sulculosus*, IV, 167.  
*melanauchen*, *Ptilopus*, III, 287.  
*Melania*, IV, 193.  
*Melania acutissima*, IV, 42.  
 — *Adonarae*, IV, 59.  
 — *amabilis*, IV, 45.  
 — *bisinuata*, IV, 43.  
 — *Bocki*, IV, 69.  
 — *buginensis*, IV, 53.  
 — *celebensis*, IV, 69.  
 — *clavus*, IV, 50.  
 — *crenulata*, IV, 45.  
 — *crepidinata*, IV, 56.  
 — *curvicosta*, IV, 36.  
 — *cylindracea*, IV, 60.  
 — *flavida*, IV, 72.  
 — *foeda*, IV, 32.  
 — *fontinalis*, IV, 61.  
 — *glans*, IV, 30.  
 — *granifera*, IV, 71.  
 — *granum*, IV, 65.  
 — *virgulata*, IV, 57.  
 — *javanica*, IV, 43.  
 — *lineata*, IV, 71.  
 — *litigiosa*, IV, 48.  
 — *monile*, IV, 44.  
 — *papillosa*, IV, 38.  
 — *perfecta*, IV, 51.  
 — *pinguicula*, IV, 74.  
 — *plicaria*, IV, 41.  
 — *pulchella*, IV, 61.  
 — *robusta*, IV, 52.  
 — *rustica*, IV, 44.  
 — *scabra*, IV, 62.  
 — *semicostata*, IV, 73.  
 — *semiornata*, IV, 46.  
 — *setosa*, IV, 66.  
 — *spectabilis*, IV, 69.  
 — *stricticosta*, IV, 39.  
 — *subplicata*, IV, 37.  
 — *sulcospira*, IV, 33.  
 — *sumatrensis*, IV, 34.  
 — *testudinaria*, IV, 31.  
 — *tuberculata*, IV, 56.  
 — *uniformis*, IV, 46.  
 — *Verbeekii*, IV, 38.  
 — *vineta*, IV, 54.  
 — *Wallacei*, IV, 52.  
 — *Wichmanni*, IV, 54.  
*melanocephalus*, *Ptilopus*, III, 305.

- melanogaster, Plotes, III, 285.  
 melanosoma, Eleotris, III, 415.  
 melanospilus, Ptilopus, III, 281.  
 melanostictus, Bufo, IV, 406.  
 melanostoma, Littorina, IV, 199.  
 Melarrhaphe, IV, 206.  
 meliceps, Mydaus, I, 110.  
 menadensis, Macropygia, III, 281.  
 mendax, Helix, II, 237.  
 meridionalis, Stoparola, III, 278.  
 Mermerus beccarii, III, 22.  
 Merops ornatus, III, 292.  
 — philippinus, III, 274, 291.  
 Mesarmadillo elegans, IV, 369.  
 — guttatus, IV, 370.  
 — orientalis, IV, 368.  
 Mesoprius argentimaculatus, III, 407.  
 Metoponorthus pruinus, IV, 374.  
 Meyenia fluviatilis, I, 32.  
 meyeri, Mastacembelus, III, 415.  
 microcephalus, Osteochilus, III, 421.  
 Microcystis infans, II, 261.  
 microdisca, Rana, IV, 388.  
 Microhyla achatina, IV, 404.  
 — annectens, IV, 404.  
 Microparmarion Austeni, III, 109.  
 — Strubelli, III, 108.  
 micropterus, Potamides, IV, 185.  
 Microstictus wallacei, III, 273.  
 microtympaanum, Rana, IV, 386.  
 Midae, Auricula, IV, 150.  
 Milvus affinis, III, 271.  
 minahassae, Isidora, IV, 8.  
 miniata, Assiminea, IV, 214.  
 minima, Siliqua, IV, 262.  
 minimus, Macroglossus, I, 127.  
 minor, Calornis, III, 280.  
 —, Charadrius, III, 282.  
 —, Temnocephala, I, 26.  
 Minralang, I, V, VI.  
 minuta, Felis, I, 109.  
 —, Macrochlamys, II, 231, III, 151.  
 —, Tringa, III, 306.  
 mirandus, Platyrrhynchus, III, 348.  
 mirus, Platybunus, III, 5.  
 mitratus, Semnopithecus, I, 102.  
 modesta, Rana, IV, 385.  
 modestus, Porcellio, IV, 373.  
 Modiola, IV, 86.  
 — leucosticta, IV, 86.  
 — striatula, IV, 226.  
 — subramosa, IV, 226.  
 Mollusken, Brackwasser-, IV, 123, 299.  
 Mollusken-Verbreitung, IV, 291.  
 —, Vertheilung, IV, 300.  
 Moltkeana, Corbicula, IV, 111.  
 molucca, Munia, III, 280.  
 moluccensis, Clausilia, II, 245, III, 229.  
 —, Cyrena, IV, 96.  
 —, Tinnunculus, III, 289.  
 Monacanthus tomentosus, III, 429.  
 Monachalcyon fulgidus, III, 292.  
 Moina, Weberi, II, 120.  
 monile, Melania, IV, 44.  
 Moniligaster, III, 46.  
 Monopterus javanensis, III, 428.  
 montana, Macrothoma, I, 84.  
 —, Megalophrys, IV, 409.  
 monticola, Gagrella, III, 8.  
 —, Heterochordeuma, III, 342.  
 —, Platyrrhynchus, III, 353.  
 —, Rhacophorus, IV, 403.  
 Mörchi, Auricula, IV, 153.  
 morio, Edoliisoma, III, 278.  
 Moussoni, Assiminea, IV, 215.  
 —, Cyrena, IV, 94.  
 —, Leptopoma, II, 217, 262.  
 —, Stenothyra, IV, 210.  
 morsitans, Scolopendra, III, 312.  
 morum, Cerithium, IV, 172.  
 Motacilla flava, III, 293.  
 mucronatus, Isometrus, III, 85.  
 Mugil Bleekeri, III, 416.  
 — Meyer, III, 415.  
 — Troscheli, III, 416.  
 Mülleri, Tanygnathus, III, 273.  
 multicaudata, Trochonanina, II, 232.  
 multifasciata, Mabuia, I, 170.  
 multiplicata, Cassidula, IV, 142.  
 multipuncta, Herennia, I, 196.  
 Munia bruceiceps, III, 280.  
 — molucca, III, 280.  
 — oryzirostris, III, 280.  
 — propinqua, III, 303.  
 muricola, Vespertilio, I, 128.  
 murinus, Armadillo, IV, 359.  
 Mus alexandrinus, I, 119.  
 — armandvillei, III, 79.  
 — callitrichus, I, 120.  
 — decumanus, I, 119.  
 — lepturus, I, 120.  
 — rattus, I, 119.  
 —, Schuppen von, II, 18.  
 — setifer, I, 118, III, 82.  
 — wichmanni, I, 120.  
 musanga, Paradoxurus, I, 109.



musica, *Perichaeta*, III, 59.  
*musschenbrockii*, *Paradoxurus*, I, 110.  
*Mustela henricii*, I, 110.  
*mustelina*, *Cassidula*, IV, 144.  
*mutilata*, *Gehyra*, I, 163.  
*mydas*, *Chelone*, I, 176.  
*Mydaus meliceps*, I, 110.  
*Mygale javanensis*, I, 202.  
*Myristicivora luctuosa*, III, 281.  
*Myrmecophaga*, *Schuppen*, II, 16, 17.  
*Mystacoleucus padangensis*, III, 423.  
*Mytilidae*, IV, 86.  
*mytiloides*, *Ostrea*, IV, 220.  
*Mytilus*, IV, 225.  
*Myzomela chloroptera*, III, 279.

## N.

*Naja tripudians*, I, 191.  
*Nanga Dona*, I, IX.  
*Nanina amphidroma*, II, 261.  
 — *arguta*, II, 261.  
 — *cidaris*, II, 224, III, 120.  
 — *densa*, II, 261.  
 — *floresiana*, II, 230.  
 — *fulvizona*, II, 228.  
 — *humphreysiana*, II, 261.  
 — *limbifera*, II, 229.  
 — *nemorensis*, II, 224, 262, III, 123.  
 — *umbilicaria*, II, 261.  
 — *rareguttata*, II, 227.  
 — *rugata*, II, 229.  
 — *rumphi*, II, 229, III, 146.  
 — *trochus*, II, 226, 262.  
 — *vomer*, II, 236, III, 147.  
 — *wallacei*, II, 224, III, 119,  
*napu*, *Tragulus*, I, 111.  
*Nassa olivacea*, IV, 217.  
*nasuta*, *Geoplana*, I, 133.  
*neglectus*, *Tropidorhynchus*, III, 303.  
*Nemachilus fasciatus*, III, 425.  
*nematoides*, *Rhynchodemus*, I, 135.  
*nemorensis*, *Nanina*, II, 224, 262, III, 123.  
*nemurus*, *Macrones*, III, 420.  
*neocaledonica*, *Spongocladia*, I, 58.  
*Nephilengys malabarensis*, I, 197.  
 — *rhodostemon*, I, 197.  
*Nephila Kuhl*, I, 197.  
 — *maculata*, I, 196.  
 — *Piepersii*, I, 197.  
*Nerita lineata*, IV, 219.  
 — *planospira*, IV, 219.  
*Neritiden*, IV, 218.

*Neritina angulosa*, IV, 80.  
 — *auriculata*, IV, 76.  
 — *brevispina*, IV, 79.  
 — *communis*, IV, 218.  
 — *confluens*, IV, 81.  
 — *consimilis*, IV, 83.  
 — *cornea*, IV, 218.  
 — *crepidularia*, IV, 218.  
 — *dubia*, IV, 218.  
 — *fabia*, IV, 80.  
 — *flavovirens*, IV, 81.  
 — *iris*, IV, 77.  
 — *pulligera*, IV, 77.  
 — *squarrosa*, IV, 80.  
 — *ualanensis*, IV, 82, 218.  
 — *variegata*, IV, 78.  
 — *ziczac*, IV, 79.  
*Neritodryas*, IV, 218.  
*Nicoletia phytophila*, I, 80.  
*Niere*, *Lagerung bei Siluroidea*, I, 355.  
*nieuhoi*, *Clarias*, III, 419.  
*nigra*, *Hydrochelidon*, III, 285.  
 — *Lepisma*, I, 82.  
*nigriceps*, *Macrones*, III, 419.  
 — *Zephronia*, III, 329.  
*nigricollis*, *Lepus*, I, 122.  
*nigricorne*, *Strongylosoma*, III, 364.  
*nigrilumbe*, *Bipalium*, I, 140.  
*nigro-albus*, *Typhlops*, I, 180.  
*nigromarginata*, *Ostrea*, IV, 221.  
*nigrum*, *Oncidium*, IV, 127.  
*Ninox scutulata*, III, 272.  
*nitidus*, *Pteromys*, I, 115.  
*Noctiluca miliaris*, *Symbiose de*, I, 69.  
*nodifera*, *Arca*, IV, 228.  
*Nodilittorina*, IV, 204.  
*notatus*, *Sciurus*, I, 116.  
*Nothippus affinis*, III, 22.  
*Notopterus kapirat*, III, 427.  
*novae-guineae*, *Dibamus*, I, 175.  
*novae-hollandiae*, *Ardea*, III, 306.  
 — *Scythrops*, III, 292.  
*novae-zelandiae*, *Temnocephala*, I, 26.  
*nucleolus*, *Melampus*, IV, 164.  
*nudata*, *Pythia*, IV, 139.  
*Nycticebus tardigradus*, I, 108.  
*Nycticorax caledonicus*, III, 284.  
 — *nycticorax*, III, 306.  
*nycticorax*, *Nycticorax*, III, 306.

## O.

*obesa v. gracilior*, *Clausilia*, II, 244, III, 224.

obesum, *Cerithium*, IV, 175.  
 obtusus, *Potamides*, IV, 186.  
 occidents, *Psammobia*, IV, 241.  
 ochraceus, *Beloniscus*, III, 19.  
 octomaculatus, *Plathythomiscus*, I, 207.  
 octona, *Stenogyra*, II, 244, 262 III, 210.  
 odiosa, *Cypris*, II, 131.  
 olfax, *Osphromenus*, III, 418.  
*Oligodon subquadratus*, I, 183.  
 oligolepis, *Barbus*, III, 423.  
 olivacea, *Nassa*, IV, 217.  
 olivaceum, *Lygosoma*, I, 174.  
 olivaceus, *Cultellus*, IV, 266.  
*Oncidella griseofusca*, IV, 128.  
*Oncidiidae*, IV, 125.  
*Oncidium*, IV, 126.  
 ——— *aberrans*, IV, 127.  
 ——— *ambiguum*, IV, 127.  
 ——— *Amboinae*, IV, 127.  
 ——— *luteum*, IV, 127.  
 ——— *nigrum*, IV, 127.  
 ——— *palaense*, IV, 127.  
 ———, *Peronii*, IV, 126.  
 ——— *tumidum*, IV, 126.  
 ——— *verruculatum*, IV, 126.  
*Oncis coeca*, IV, 128.  
 ——— *coriacea*, IV, 127.  
 ——— *lata*, IV, 128.  
*opercularis*, *Polyacanthus*, III, 418.  
*Ophidia Malay Archipelago*, I, 178.  
*ophiocephalus*, *Eleotris*, III, 414.  
 ——— *gachua*, III, 417.  
 ——— *lucius*, III, 417.  
 ——— *polylepis*, III, 417.  
 ——— *striatus*, III, 416.  
*Opilioniden*, III, 1.  
*Opisthoporus rostellatus*, II, 261.  
*Optediceros*, IV, 212.  
*opulenta*, *Argiope*, I, 196.  
*orbiculata*, *Elizia*, IV, 233.  
*orientalis*, *Acrocephalus*, III, 277.  
 ———, *Crocidura*, I, 124.  
 ———, *Diaptomus*, II, 127.  
 ———, *Eudynamis*, III, 292.  
 ———, *Eurystomus*, III, 274.  
 ———, *Helictis*, I, 110.  
 ———, *Hemiramphus*, III, 427.  
 ———, *Mesarmadillo*, IV, 368.  
 ———, *Otostigmus*, III, 312.  
*Oriolus broderipi*, III, 292.  
 ——— *celensis*, III, 276.  
*ornatus*, *Merops*, III, 292.  
 ———, *Potamides*, IV, 189.

*ornatus*, *Trichoglossus*, III, 273.  
*orphea*, *Pachycephala*, III, 286.  
*Orphnaeus brevilabiatus*, III, 317.  
*Ortygometra cinerea*, III, 282.  
*oryzivora*, *Munia*, III, 280.  
*Orycteropus*, *Riechwülste*, II, 92.  
*Oscillaria spongelliae*, I, 59.  
*Osphromenus olfax*, III, 418.  
 ——— *trichopterus*, III, 418.  
 ——— *striatus*, III, 418.  
*Osteochilus hasseltii*, III, 420.  
 ——— *microcephalus*, III, 421.  
 ——— *vittatus*, III, 421.  
*Ostracoden*, II, 129.  
*Ostrea arborea*, IV, 220.  
 ——— *cucullata*, IV, 223.  
 ——— *echinata*, IV, 221.  
 ——— *folium*, IV, 222.  
 ——— *nigromarginata*, IV, 221.  
 ——— *mytiloides*, IV, 220.  
*Ostreidae*, IV, 220.  
*otahetica*, *Spongia*, I, 58.  
*Otocryptops luzonicus*, III, 315.  
*Otopoma politum*, II, 213.  
*Otostigmus carinatus*, III, 312.  
 ——— *latidens*, III, 313.  
 ——— *orientalis*, III, 312.  
 ——— *spinosus*, III, 312.  
*ovalina*, *Isidora*, IV, 8.  
*ovalis*, *Cultellus*, IV, 269.  
*Oxyglossus lima*, IV, 384.  
*Oxyopes striolatus*, I, 209.  
*oxytropis*, *Helicina*, II, 262.

## P

*Pachycephala orphea*, III, 286.  
 ——— *teysmani*, III, 286.  
*Pachydrobia lacustris*, IV, 26.  
 ——— *parva*, IV, 26.  
*Pachyura indica*, I, 123.  
*pachyurus*, *Thyropygus*, III, 385.  
*padagensis*, *Mystacoleucus*, III, 423.  
*pagodus*, *Littorina*, IV, 201.  
*palaense*, *Oncidium*, IV, 127.  
*Palamnaeus spinifer*, III, 96.  
*Palima*, I, VI.  
*pallens*, *Psammotellina*, IV, 235.  
*pallescent*, *Spongellia*, I, 59.  
*pallida*, *Philoscia*, IV, 380.  
*pallidipennis*, *Porcellio*, IV, 372.  
*pallipes*, *Siphonorhinus*, III, 335.  
*palmetta*, *Rhodymenia*, I, 59.

- Palopo, I, VII.  
 Paloweh, I, VIII.  
 Paludinella, IV, 212.  
 palustris, Potamides, IV, 176.  
 Pampanua, I, VI.  
 panayensis, Stenogyra, II, 243, 261, III, 223.  
 panchax, Haplochilus, III, 426.  
 Pandjana, I, V.  
 pantherina, Pythia, IV, 136.  
 papillosa, Melania, IV, 38.  
 Paracryptops Weberi, III, 316.  
 Paradoxurus leucomystax, I, 109.  
 — musanga, I, 109.  
 — musschenbrockii, I, 110.  
 Parasit von Tenmocephala, I, 27.  
 pardus, Felis, I, 108.  
 Pare-Pare, I, V.  
 Parmarion Martensi, III, 107.  
 — pupillaris, III, 106, 111.  
 — reticulatus, II, 221, III, 111.  
 — taeniatus, II, 222, III, 111.  
 —, Weberi, III, 105.  
 Parra gallinacea, III, 306.  
 Parus cinereus, III, 293.  
 parva, Pachydrobia, IV, 26.  
 parvula, Cacatua, III, 291.  
 patulum, Cerithium, IV, 170.  
 pavimentata, Calamaria, I, 182.  
 pavonina, Homaloptera, III, 424.  
 pectoralis, Cinnerys, III, 301.  
 Pelitnus, segnipes, III, 25.  
 Pelobatidae, IV, 408.  
 perdix, Cyclophorus, II, 216, 261.  
 perfecta, Melania, IV, 51.  
 Perichaeta capensis, III, 62.  
 — dubia, III, 68.  
 — Houletti, III, 64.  
 — indica, III, 60.  
 — musica, III, 59.  
 — posthuma, III, 61.  
 — sangirensis, III, 68.  
 — sumatrana, III, 69.  
 Perionyx grunewaldi, III, 75.  
 — violaceus, III, 72.  
 Periscyphus Weberi, IV, 371.  
 Perna vitrea, IV, 224.  
 Peroni, Oncidium, IV, 126.  
 perversus, Amphidromus, II, 239, 261.  
 phayri, Trionyx, I, 176.  
 Pholadidae, IV, 280.  
 Pharella, IV, 266.  
 philippinarum, Lucina, IV, 229.  
 philippinarum, Solecurtus, IV, 256.  
 philippinus, Merops, III, 274, 291.  
 Philomycus striatus, II, 233.  
 Philoscia alba, IV, 381.  
 — cinctella, IV, 378.  
 — pallida, IV, 380.  
 — sundaica, IV, 379.  
 — truncata, IV, 376.  
 — variegata, IV, 377.  
 — Weberi, IV, 378.  
 Phlogius insignis, I, 203.  
 phoenicura, Erythra, III, 269, 282, 289.  
 Pholas rivicola, IV, 282.  
 — striata, IV, 281.  
 phryniiformis, Plathythomismus, I, 207.  
 Phyllorhina bicolor, I, 127.  
 — diadema, I, 127.  
 Phylloscopus borealis, III, 293.  
 phythophila, Nicoletia, I, 80.  
 picata, Ardea, III, 283.  
 picta, Kerivoula, I, 129.  
 pictum, Betta, III, 419.  
 pictus, Solen, IV, 278.  
 Piepersii, Nephila, I, 197.  
 pinguicula, Melania, IV, 74.  
 pinguis, Scolopendra, III, 312.  
 Pirata piraticus, I, 208.  
 piraticus, Pirata, I, 208.  
 piscatrix, Sula, III, 285.  
 Pisidium sumatranum, IV, 121.  
 Pistius spectabilis, I, 207.  
 Pithophora, I, 55.  
 Pitta cyanura, III, 269.  
 Planorbis calathus, IV, 15.  
 — compressus, IV, 13.  
 — proclivis, IV, 12.  
 — sumatranus, IV, 12.  
 — tondanensis, IV, 14.  
 planorbis, Trochomorpha, II, 232, 261, III 152.  
 planorbulus, Cyclophorus, II, 214.  
 planospira, Nerita, IV, 219.  
 Plotosus caninus, III, 419.  
 Platybunus mirus, III, 5.  
 platypogon, Glyptosternum, III, 420.  
 Platyptera aspro, III, 415.  
 Platyrrhynchus aequidens, III, 357.  
 — bidens, III, 356.  
 — flavisternus, III, 346.  
 — humberti, III, 345.  
 — inaequidens, III, 357.  
 — laticollis, III, 349.  
 — mirandus, III, 348.

- Platyrhachus monticola*, III, 353.  
 — subalbus, III, 347.  
 — submissus, III, 355.  
 — subspinosus, III, 352.  
 — verrucosus, III, 354.  
 — Weberi, III, 351.  
 — xanthopus, III, 350.  
*platyrhyncha*, *Tringa*, III, 283.  
*Platythomisus octomaculatus*, I, 207.  
 — phryniiformis, I, 207.  
*platyurus*, *Hemidactylus*, I, 163.  
*Plecotrema*, IV, 149.  
 — exaratum, IV, 149.  
 — imperforatum, IV, 149.  
 — punctatostriatum, IV, 149.  
 — punctigerum, IV, 149.  
*Plectana arcuata*, I, 193.  
*Plegadis falcinellus*, III, 284.  
*plicaria*, *Melania*, IV, 41.  
*plicata*, *Pythia*, IV, 131.  
*Plotes melanogaster*, III, 285.  
*Poecilobdella*, IV, 337.  
*poecilopterus*, *Liocassis*, III, 420.  
*polita*, *Stenothyra*, IV, 211.  
*politum*, *Otopoma*, II, 213.  
*politus*, *Cyclotus*, II, 212.  
*pollex*, *Pythia*, IV, 139.  
*Polyacanthus hasseltii*, III, 418.  
 — opercularis, III, 418.  
*polylepis*, *Ophiocephalus*, III, 417.  
*ponderosa*, *Auricula*, IV, 157.  
*Pontoscolex corethrurus*, III, 51.  
*porcellanus*, *Amphidromus*, II, 241, 262, III, 204.  
*Porcellio modestus*, IV, 373.  
 — pallidipennis, IV, 372.  
 — sundaicus, IV, 372.  
*porosus*, *Crocodilus*, I, 175.  
*porphyrolaemus*, *Cinnyris*, III, 279.  
*posthuma*, *Perichaeta*, III, 61.  
*Potamides*, IV, 175.  
*Potamides alatus*, IV, 185.  
 — Charbonnieri, IV, 190.  
 — cingulatus, IV, 183.  
 — corneus, IV, 190.  
 — decollatus, IV, 188.  
 — micropterus, IV, 185.  
 — obtusus, IV, 186.  
 — ornatus, IV, 189.  
 — palustris, IV, 176.  
 — quadratus, IV, 187.  
 — rhizophorarum, IV, 189.  
 — semistriatus, IV, 177.  
 — sulcatus, IV, 178.  
 — telescopium, IV, 180.  
 — tenerrimus, IV, 180.  
 — Tenkatei, IV, 190.  
*praestans*, *Psammobia*, IV, 250.  
*Pratincola caprata*, III, 277, 293.  
*proclivis*, *Planorbis*, IV, 12.  
*proboscideus*, *Rhynchoproctus*, III, 386.  
*propinqua*, *Munia*, III, 303.  
*Prosobranchien*, IV, 168.  
*pruinosis*, *Metoponorthus*, IV, 374.  
*Psammoclema ramosum*, I, 59.  
*Psammocola*, IV, 241.  
*Psammobia caerulescens*, IV, 244.  
 — Denikei, IV, 243.  
 — eburnea, IV, 242.  
 — grata, IV, 242.  
 — insignis, IV, 243.  
 — occidens, IV, 241.  
 — praestans, IV, 250.  
 — radiata, IV, 244.  
 — Reevei, IV, 247.  
 — scabra, IV, 248.  
 — squamosa, IV, 251.  
 — striatella, IV, 246.  
 — tristis, IV, 242.  
 — truncata, IV, 245.  
 — virgata, IV, 250.  
*Psammobiiden*, IV, 231.  
*Psammotaea*, *elongata*, IV, 240.  
 — radiata, IV, 238.  
 — solida, IV, 240.  
 — tenuis, IV, 240.  
 — violacea, IV, 239.  
*Psammotellina*, IV, 122.  
 — connectens, IV, 232.  
 — malaccensis, IV, 236.  
 — pallens, IV, 235.  
 — Semmelinki, IV, 236.  
 — serotina, IV, 234.  
*Pseudo-Chlorophyllkörper*, I, 49.  
*Pseudorhabdion torquatum*, I, 183.  
*Psittuteles weberi*, III, 290.  
*Pterocyclus sumatranus*, II, 211, 261.  
 — tenuilabiat, II, 262.  
*Pteromys nitidus*, I, 115.  
*Pteropus alecto*, I, 125.  
 — edulis, I, 125.  
 — hypomelanus, I, 125.  
 — macklotii, I, 126.  
*Ptilopus melanauchen*, III, 287.  
 — melanocephalus, III, 305.  
 — melanospilus, III, 281.

Ptychozoon homalocephalum, I, 165.  
 puella, Hypothyneus, III, 278.  
 pulchella, Corbicula, IV, 120.  
 —, Melania, IV, 61.  
 pulchra, Callula, IV, 406.  
 pullata, Corbicula, IV, 117.  
 pulligera, Neritina, IV, 77.  
 Pulmonaten, XI, 125.  
 punctatostriatum, Plecotrema, IV, 149.  
 punctifrons, Mecistocephalus, III, 317.  
 punctigerum, Plecotrema, IV, 149.  
 puniceus, Bothrops, I, 192.  
 Puntius, III, 422.  
 pupillaris, Parmarion, III, 106, 111.  
 Pupina lobifera, II, 218.  
 purpurascens, Cerithium, IV, 173.  
 purpurea, Ardea, III, 283.  
 pusilla, Littorina, IV, 208.  
 pusillus, Lophodesmus, III, 372.  
 pustulosus, Beloniscus, III, 20.  
 pygmaeum, Strongylosoma, III, 360.  
 Pygoplus intermedius, III, 23.  
 pyramidalis, Littorina, IV, 205.  
 Pythia, IV, 130.  
 Pythia albovaricosa, IV, 138.  
 — borneensis, IV, 140.  
 — celebensis, IV, 138.  
 — crassidens, IV, 138.  
 — imperforata, IV, 133.  
 — nudata, IV, 139.  
 — pantherina, IV, 136.  
 — plicata, IV, 131.  
 — pollex, IV, 139.  
 — Reeveana, IV, 138.  
 — scarabaeus, IV, 133.  
 — semisulcata, IV, 139.  
 — striata, IV, 138.  
 — trigona, IV, 130.  
 pyxidatus, Cyprinotus, II, 134.

### Q

quadrangulus, Annadrilus, III, 44.  
 quadratus, Potamides, IV, 187.  
 quadricinctum, Bipalium, I, 140.  
 quadricornis, Temnocephala, I, 26.  
 quadrilineatus, Therapon, III, 408.  
 quinquespinosus, Beloniscus, III, 19.  
 Quoyia decollata, IV, 192.

### R

radiata, Assiminea, IV, 216.

radiata, Psammobia, IV, 244.  
 —, Psammotaea, IV, 238.  
 —, Siliqua, IV, 260.  
 Rallina fasciata, III, 305.  
 ramosum, Psammoclema, I, 59.  
 Rana, baramica, IV, 399.  
 — celebensis, IV, 395.  
 — chalconota, IV, 392.  
 — erythraea, IV, 390.  
 — everetti, IV, 394.  
 —, Hosei, IV, 398.  
 — javanica, IV, 392.  
 — jerboa, IV, 397.  
 — Kuhli, IV, 385.  
 — limnocharis, IV, 390.  
 — macrodon, IV, 385.  
 — microdisca, IV, 388.  
 — mycrotympanum, IV, 386.  
 — modesta, IV, 385.  
 — tigrina, IV, 388.  
 Ranidae, IV, 384.  
 rareguttata, Nanina, II, 227.  
 Rasbora argyrotaenia, III, 423.  
 — daniconius, III, 423.  
 — lateristriata, III, 424.  
 — sumatrana, III, 424.  
 rattus, Mus, I, 119.  
 rectifrons, Armadillo, IV, 361.  
 reeveana, Pythia, IV, 138.  
 Reevei, Psammobia, IV, 247.  
 Reichei, Gobius, III, 413.  
 Reinwardti, Rhacophorus, IV, 404.  
 Reniera fibulata, I, 58.  
 —, Symbiose de, I, 64.  
 Reo, I, VIII.  
 reonus, Trigonius, III, 396.  
 repasson, Barbus, III, 421.  
 Reptilia Malay Archipelago, I, 159.  
 reticulata, Auricula, IV, 157.  
 —, Tubella, I, 31.  
 reticulatus, Cyclotus, II, 262.  
 —, Draco, I, 166.  
 —, Parmarion, II, 221, III, 111.  
 Rhachioglossa, IV, 216.  
 Rhacophorus anodon, IV, 400.  
 — javanus, IV, 402.  
 — leucomystax, IV, 399.  
 — monticola, IV, 403.  
 — Reinwardti, IV, 404.  
 Rhamphococcyx calorhynchus, III, 275.  
 Rhipidoglossa, IV, 218.  
 Rhipidura teysmani, III, 278.  
 Rhinocricus brachyproctus, III, 393.

*Rhinocricus emulans*, III, 394.  
 — *Hicksoni*, III, 394.  
 — *semicinctus*, III, 392.  
 —, *Weberi*, III, 391.  
 — *xanthozonus*, III, 393.  
*rhizophorarum*, *Potamides*, IV, 189.  
*rhodosternon*, *Nephilengys*, I, 197.  
*rhodostoma*, *Trigonocephalus*, I, 191.  
*Rhodymenia palmetta*, I, 59.  
*rhombus*, *Solecurtus*, IV, 257.  
*Rhynchodemus megalophthalmus*, I, 134.  
 — *nematoides*, I, 135.  
 —, *Verbreitung von*, I, 134.  
*Rhynchoproctus proboscideus*, III, 386.  
*Rhysida carinulata*, III, 314.  
 — *immarginata*, III, 314.  
 — *rugulosa*, III, 314.  
*Richardi*, *Cypris*, II, 130.  
*Rissoiden*, IV, 193.  
*rivalis*, *Corbicula*, IV, 120.  
*rivicola*, *Pholas*, IV, 282.  
*robusta*, *Melania*, IV, 52.  
*Rokka*, I, IX.  
*rosenbergi*, *Strix*, III, 272.  
*roseo-limbata*, *Stanneoclavis*, I, 195.  
*rostellatus*, *Opisthoporus*, II, 261.  
*rostrata*, *Soletellina*, IV, 232.  
*rotatoria*, *Helix*, II, 234.  
 —, *Trochomorpha*, II, 262.  
*Rotti*, *Süßwasserfische*, III, 438.  
*rubro-cinctus*, *Thyropygus*, III, 382.  
*rubro-limbatus*, *Thyropygus*, III, 381.  
*rudis*, *Mabuia*, I, 170.  
*rufa v. melanota*, *Cylindrophis*, I, 180.  
*ruficeps*, *Cryptops*, III, 315.  
*rufilatus*, *Turnix*, III, 281.  
*rufipectus*, *Spilornis*, III, 271.  
*rufipes*, *Zephronia*, III, 331.  
*rugata*, *Nanina*, II, 229.  
*rugosa*, *Asaphis*, IV, 252.  
*rugosus*, *Acrochordonichthys*, III, 420.  
*rugulosa*, *Rhysida*, III, 314.  
*Rumpf der Hylobatiden*, I, 366.  
*rumphii*, *Ariophanta*, II, 230.  
 —, *Nanina*, II, 229, III, 146.  
*Rusa Radja*, I, VIII.  
*Russa russa*, I, 112.  
*russa*, *Russa*, I, 112.  
*rustica*, *Melania*, IV, 44.

## S.

*saccolaimus*, *Taphozous*, I, 130.

*Saley*, I, IV, VII.  
*salmoneus*, *Chanos*, III, 427.  
*salvator*, *Varanus*, I, 169.  
*Samau*, *Süßwassererfische*, III, 438.  
*sanctum*, *Lygosoma*, I, 171.  
*sangirensis*, *Perichaeta*, III, 68.  
*Sanguinolaria dichotoma*, IV, 253.  
*sarasinorum*, *Armadillo*, IV, 358.  
*Sareminja*, I, V.  
*Sarotes inaequipes*, I, 206.  
*Sarsi*, *Alona*, II, 124.  
 —, *Cypris*, II, 132.  
*Säugethiere*, *Celebes*, III, 474.  
*scabra*, *Littorina*, IV, 194.  
 —, *Melania*, IV, 62.  
 —, *Psammobia*, IV, 248.  
*scalprum*, *Cultellus*, IV, 265.  
*scandens*, *Anabas*, III, 417.  
*scarabaeus*, *Pythia*, IV, 133.  
*scelio*, *Lathrodictus*, I, 198.  
*Scheepmakeri*, *Solecurtus*, IV, 259.  
*schlegeli*, *Tomistoma*, I, 176.  
*Schröteri*, *Cerithium*, IV, 173.  
*Schuppen v. Anomalurus*, II, 13.  
 — *v. Castor*, II, 15.  
 — *v. Didelphys*, II, 18.  
 — *von Manis*, II, 5.  
 —, *Mus*, II, 18.  
 — *von Myrmecophaga*, II, 16, 17.  
*schwanefeldii*, *Barbus*, III, 421.  
*Schwimmlase*, *Siluroiden*, I, 361.  
*Sciurus bicolor*, I, 115.  
 — *insignis*, I, 117.  
 — *notatus*, I, 116.  
 — *tenuis*, I, 115.  
 — *weberi*, I, 115.  
*Scolopendra morsitans*, III, 312.  
 — *pingius*, III, 312.  
 — *subspinipes*, III, 312.  
*Scolopendrella immaculata*, III, 319.  
*Scops lempyi*, III, 269.  
*Scorpio indicus*, III, 95.  
*Scotophilus temminckii*, I, 128.  
*scutata*, *Ampullaria*, IV, 18.  
*Scutigera longicornis*, III, 309.  
*scutulata*, *Ninox*, III, 272.  
*Scythrops novae hollandiae*, III, 292.  
*Scytodes marmorata*, I, 198.  
*Scytonema*, I, 58.  
*See Danau di atas*, I, IV.  
*See Danau di bahru*, I, III.  
*See Danau di bahwa*, I, III.  
*See Danau gedang*, I, IV.

- See Manindjau, I, III.  
 See Singkarah, I, III.  
 See Situ bagendit, I, IV.  
 See Telago apabilo, I, IV.  
 segnipes, Pelitnus, III, 25.  
 Selenoscomia javanensis, I, 202.  
 semicarneum, Strongylosoma, III, 363.  
 semicinctus, Rhinocricus, III, 392.  
 semicostata, Melania, IV, 73.  
 semifasciatus, Bungarus, I, 191.  
 semiornata, Melania, IV, 46.  
 semiplicata, Auricula, IV, 160.  
 semistriatus, Potamides, IV, 177.  
 semisulcata, Pythia, IV, 139.  
 Semmelinki, Psammotellina, IV, 236.  
 Semnopithecus maurus, I, 102.  
 —, melalophus, I, 101.  
 —, mitratus, I, 102.  
 Semperi, Temnocephala, I, 26.  
 sepia, Gagrella, III, 8.  
 Septaria, IV, 83.  
 —, Janellei, IV, 84.  
 —, suborbicularis, IV, 84.  
 —, tessellata, IV, 86, 218.  
 serotina, Psammotellina, IV, 234.  
 setifer, Mus, I, 118, III, 82.  
 setosa, Melania, IV, 66.  
 sexcinctum, Bipalium, I, 140.  
 sexlineatus, Tachydromus, I, 169.  
 siamensis, Melampus, IV, 165.  
 Sicydium cynocephalum, III, 414.  
 —, macrostetholepis, III, 414.  
 —, wichmanni, III, 413.  
 sidat, Anguilla, III, 428.  
 Sidenreng, I, V.  
 Sikka, I, IX.  
 Siliqua minima, IV, 262.  
 —, radiata, IV, 260.  
 —, Winteriana, IV, 262.  
 Siluroiden, Lagerung der Leber, I, 355.  
 —, Lagerung der Niere, I, 355.  
 —, Schwimmblase, I, 361.  
 similis, Helix, II, 236, 262.  
 Simotes trilineatus, I, 184.  
 simplex, Cyclops, II, 125.  
 sinensis, Bostrichthys, III, 414.  
 Singalang, I, IV.  
 Singalang-Tandikat, I, IV.  
 singaporensis, Melampus, IV, 165.  
 Singkarah, I, III.  
 Sinis vagus, III, 13.  
 sinuosa, Cyrena, IV, 100.  
 Siphia banyumas, III, 277, 286.  
 Siphonocryptus compactus, III, 340.  
 Siphonojulus albus, III, 341.  
 Siphonophora flaviceps, III, 336.  
 —, vittata, III, 337.  
 Siphonorhinus angustus, III, 336.  
 —, pallipes, III, 335.  
 Siphonotus elegans, III, 339.  
 —, formosus, III, 338.  
 —, hicksoni, III, 339.  
 Sira annulicornis, I, 87.  
 —, sumatrana, I, 88.  
 Situ bagendit, I, IV.  
 smaragdinum, Lygosoma, I, 174.  
 solaris, Cinnerys, III, 300.  
 Solecurtus, IV, 255.  
 Solecurtus philippinarum, IV, 256.  
 —, rhombus, IV, 257.  
 —, Scheepmakeri, IV, 259.  
 Solen Becki, IV, 275.  
 —, corneus, IV, 276.  
 —, curtus, IV, 272.  
 —, Delesserti, IV, 279.  
 —, exiguus, IV, 275.  
 —, linearis, IV, 277.  
 —, luzonicus, IV, 280.  
 —, pictus, IV, 278.  
 —, timorensis, IV, 275.  
 —, Woodwardi, IV, 279.  
 Soleniden, IV, 255.  
 Soletellina atrata, IV, 233.  
 —, diphos, VI, 232.  
 —, rostrata, IV, 232.  
 solida, Psammotaea, IV, 240.  
 solorensis, Helix, II, 235, III, 169.  
 sondaica, Geoplana, I, 133.  
 Sonpigilliden des Indischen Archipels,  
 I, 30.  
 soro, Barbus, III, 422.  
 Sowerbyana, Cassidula, IV, 147.  
 spasma, Megaderma, I, 128.  
 speciosa, Ardeola, III, 284.  
 spectabilis, Melania, IV, 69.  
 —, Thomisus, I, 207.  
 —, Pistius, I, 207.  
 spectrum, Tarsius, III, 262.  
 spelaea, Eonycteris, I, 126.  
 Sphaeropaues gladiator, III, 327.  
 —, hercules, III, 326.  
 Sphasus, I, 209.  
 spicifer, Syngnathus, III, 428.  
 Spilopelia tigrina, III, 305.  
 Spilornis bacha, III, 269.  
 —, rupepectus, III, 271.

- spinifer, Palamnaeus, III, 96.  
 spinifera, Spongelia, I, 59.  
 spinosa, Macrothrix, II, 123.  
 spinosus, Otostigmus, III, 312.  
 Spirobolletus chryodirus, III, 399.  
 — chrysogrammus, III, 400.  
 — chryoproctus, III, 400.  
 Spirostreptus vittatus, III, 387.  
 spissus, Mecistocephalus, III, 317.  
 Spizaetus lanceolatus, III, 272.  
 spongelliae, Oscillaria, I, 59.  
 Spongelia pallescens, I, 59.  
 — spinifera, I, 59.  
 Spongia otahetica, I, 58.  
 Spongilla cinerea, I, 35.  
 — decipiens, I, 40.  
 — fluviatilis, I, 32.  
 — sumatrana, I, 38.  
 — vesparium, I, 31, 45.  
 Spongiocladia dichotoma, I, 58.  
 — neocaledonica, I, 58.  
 — vaucheriaeformis, I, 57.  
 Spongodendron dichotomum, I, 58.  
 squamosa, Psammobia, IV, 251.  
 squarrosa, Neritina, IV, 80.  
 stagnalis, Isidora, IV, 11.  
 Stanneoclavis brevispina, I, 195.  
 — roseo-limbata, I, 195.  
 Stenocypris Malcolmsonii, II, 133.  
 Stenogyra acutissima, II, 243.  
 — gracilis, II, 243, 261.  
 — javanica, II, 262.  
 Stenogyra achatinacea, II, 243, 261.  
 — octona, II, 244, 262, III, 210.  
 — panayensis, II, 243, 261, III, 223.  
 Stenothyra Moussoni, IV, 210.  
 — polita, IV, 211.  
 — strigilata, IV, 211.  
 Sterna bergii, III, 285.  
 stigmatus, Loriculus, III, 273.  
 Stoparola meridionalis, III, 278.  
 Streptocitta albicollis, III, 280.  
 Streptopelia bitorquata, III, 305.  
 striata, Geopelia, III, 281.  
 —, Pholas, IV, 281.  
 —, Pythia, IV, 138.  
 striatella, Psammobia, IV, 246.  
 striatula, Modiola, IV, 226.  
 striatus, Ophiocephalus, III, 416.  
 —, Philomycus, IV, 233.  
 stricticosta, Melania, IV, 39.  
 strigilata, Stenothyra, IV, 211.  
 striolatum, Lygosoma, I, 172.  
 striolatus, Oxyopes, I, 209.  
 Strix candida, III, 272.  
 — rosenbergii, III, 272.  
 Strongylosoma atro-roseum, III, 368.  
 — carneum, III, 362.  
 — coarctatum, III, 366.  
 — conspicuum, III, 368.  
 — flavicoxis, III, 366.  
 — nigricorne, III, 364.  
 — pygmaeum, III, 360.  
 — semicarneum, III, 363.  
 — subalbum, III, 360.  
 — subflavum, III, 365.  
 — subnigrum, III, 365.  
 — vinosum, III, 361.  
 — weberi, III, 367.  
 Strubelli, Microparmarion, III, 108.  
 —, Vaginulus, II, 247.  
 Struvea delicatula, I, 61.  
 — delicatula, Symbiose de, I, 56.  
 Stylocellus sumatranus, III, 26.  
 subalbum, Strongylosoma, III, 360.  
 subalbus, Platyrrhynchus, III, 347.  
 subcristata, Baza, III, 290.  
 subflavum, Strongylosoma, III, 365.  
 subgranosa, Littorina, IV, 208.  
 submissus, Platyrrhynchus, III, 355.  
 subnigrum, Strongylosoma, III, 365.  
 subnodosa, Auricula, IV, 152.  
 suborbicularis, Cyrena, IV, 94.  
 suborbicularis, Septaria, IV, 84.  
 subplanata, Corbicula, IV, 112.  
 subplicata, Melania, IV, 37.  
 subquadratus, Oligodon, I, 183.  
 subramosa, Modiola, IV, 226.  
 subspinipes, Scolopendra, III, 312.  
 subspinosus, Platyrrhynchus, III, 352.  
 subula, Auriculastra, IV, 158.  
 Süd-Celebes, I, IV.  
 suillus, Hylomys, I, 123.  
 Sula piscatrix, III, 285.  
 sulcata, Corbicula, IV, 116.  
 sulcatus, Potamides, IV, 178.  
 sulcirostris, Graculus, III, 306.  
 sulcospira, Melania, IV, 33.  
 sulculosa, Cassidula, IV, 146.  
 sulculosus, Melampus, IV, 167.  
 sulfurea, Aplysilla, I, 59.  
 sulphurea, Cacatua, III, 273.  
 sultanus, Amphidromus, II, 240.  
 sumatrana, Calommata, I, 200.  
 —. Helix, II, 235, III, 160.  
 —, Isidora, IV, 8.



- sumatrana, Perichaeta, III, 69.  
 —, Rasbora, III, 424.  
 —, Sira, I, 88.  
 —, Spongilla, I, 38.  
 —, Trochomorpha, II, 261.  
 sumatranum, Pisidium, IV, 121.  
 sumatranus, Cryptodesmus, III, 376.  
 —, Glomeridesmus, III, 333.  
 —, Gnomulus, III, 25.  
 —, Hemiramphus, III, 427.  
 —, Planorbis, IV, 12.  
 —, Pterocyclus, II, 211, 261.  
 —, Stylocellus, III, 26.  
 sumatrense Lygosoma, I, 174.  
 Sumatrensis, Cyrena, IV, 92.  
 —, Glaucomya, IV, 231.  
 —, Gordius, II, 138.  
 —, Melania, IV, 34.  
 —, Vaginulus, II, 246.  
 —, Vivipara, IV, 24.  
 Sumba, Süswasserfische, III, 438.  
 Sumbawa, I, VII.  
 sundaica, Calommata, I, 200.  
 —, Philoscia, IV, 379.  
 sundaicus, Porcellio, IV, 372.  
 superciliosa, Anas, III, 306.  
 Sus celebensis, I, 111.  
 — verrucosus, I, 111.  
 — vittatus, I, 111, III, 267.  
 suspectus, Amphidromus, II, 241.  
 Süswasser-Fauna, I, 1.  
 Süswasserfische, III, 405, 445.  
 —, Ambon, III, 439.  
 —, Bali, III, 443.  
 —, Celebes, III, 429.  
 —, Flores, III, 437.  
 —, Rotti, III, 438.  
 —, Samau, III, 438.  
 —, Sumba, III, 438.  
 —, Timor, III, 438.  
 Süswasser-Mollusken, IV, 1, 291.  
 sylvestris, Astur, III, 289.  
 —, Haemadipsa, IV, 336.  
 Symbiose de l'Ephydatia fluviatilis, I, 50.  
 — de Halichondria, I, 56.  
 — de Marchesettia spongioides, I, 64.  
 — de Noctiluca miliaris, I, 69.  
 — quelques nouveaux cas de, I, 48.  
 — de Reniera, I, 64.  
 — de Struvea delicatula, I, 56.  
 — de Trentepohlia spongophila, I, 50.  
 Symbranchus bengalensis, III, 428.  
 syndactylus, Hylobates, I, 100.  
 Syngnathus spicifer, III, 428.

## T

- Tabeh di Arian, I, IV.  
 Tachydromus sexlineatus, I, 169.  
 tachypus, Trigonululus, III, 397.  
 taeniatus, Parmarion, II, 222, III, 111.  
 Taeniopygia insularis, III, 303.  
 tambra, Barbus, III, 422.  
 tambroides, Barbus, III, 422.  
 tana, Tupaja, I, 122.  
 Tanette, I, V.  
 tangalunga, Viverra, I, 109.  
 Tanygnathus mülleri, III, 273.  
 Taphozous saccolaimus, I, 130.  
 tardigradus, Nycticebus, I, 108.  
 Tarentula laeta, I, 208.  
 Tarsius fuscomanus, III, 264.  
 — spectrum, III, 262.  
 Tectus, IV, 201.  
 Telago apabilã, I, IV.  
 Telescopium, IV, 180.  
 telescopium, Potamides, IV, 180.  
 temmincki, Coracias, III, 274.  
 —, Helostoma, III, 418.  
 —, Lygosoma, I, 174.  
 —, Scotophilus, I, 128.  
 Temnocephala, I, 1.  
 — chilensis, I, 2, 26.  
 —, Darmapparat, I, 20.  
 —, Ei, I, 17.  
 —, Entwicklung, I, 17.  
 —, Excretorischer Apparat, I, 9.  
 — fasciata, I, 26.  
 —, Hautdecke, I, 5.  
 —, Hautdrüsen, I, 6.  
 —, Männliche Geschlechtsorgane, I, 12.  
 — minor, I, 26.  
 —, Muskulatur, I, 5.  
 —, Nervensystem, I, 21.  
 — novae-zelandiae, I, 26.  
 — quadricornis, I, 26.  
 — Semperi, I, 26.  
 —, Spermatogenese, I, 13.  
 — Vorkommen, I, 3.  
 —, Weibliche Geschlechtsorgane, I, 14.  
 Temnocephalidae, I, 25.  
 Tempe, I, V, VI.  
 Templetonia, I, 89.  
 Templetoniinae, I, 83.  
 tenerrimus, Potamides, IV, 180.  
 Tenkatei, Potamides, IV, 190.

- tenuis*, *Gagrella*, III, 6.  
 —, *Psammotaea*, IV, 240.  
 —, *Sciurus*, I, 115.  
*Teredo arenaria*, IV, 284.  
 — *clava*, IV, 286.  
*tenuilabiat*, *Pterocycl*, II, 262.  
*Terpsiphone floris*, III, 293.  
*Testudo emys*, I, 176.  
*testudinaria*, *Melania*, IV, 31.  
*tessellata*, *Septaria*, IV, 86, 218.  
*Teteadji*, I, V, VI.  
*Tetrodon liurus*, III, 429.  
*textoria*, *Helix*, II, 236.  
*teysmani*, *Clarias*, III, 419.  
 —, *Pachycephala*, III, 286.  
 —, *Rhipidura*, III, 278.  
*Thamnoclonium flabelliforme*, I, 58.  
*Therapon argenteus*, III, 407.  
 — *jarbua*, III, 407.  
 — *micracanthus*, III, 408.  
 — *quadrilineatus*, III, 408.  
*Thomisus spectabilis*, I, 207.  
*Thyropygus erythropleurus*, III, 384.  
 — *javanicus*, III, 380.  
 — *pachyurus*, III, 385.  
 — *rubro-cinctus*, III, 382.  
 — *rubro-limbatus*, III, 381.  
 — *Weberi*, III, 382.  
 — *xanthonotus*, III, 381.  
 — *xanthurus*, III, 382.  
*Thysanura*, I, 73, 76.  
*tigrina*, *Rana*, IV, 388.  
 —, *Spilopelia*, III, 305.  
*tigris*, *Felis*, I, 108.  
*Tinnunculus moluccensis*, III, 289.  
*Timor*, *Süsswasserrische*, III, 438.  
*timorensis*, *Isidora*, IV, 9.  
 —, *Solen*, IV, 275.  
 —, *Lalage*, III, 286.  
*Tjenrana*, I, VI.  
*Tjibodas*, I, IV.  
*Tjipanas*, I, IV.  
*togianus*, *Varanus*, I, 169.  
*tomentosa*, *Helix*, II, 261.  
*tomentosus*, *Monacanthus*, III, 429.  
*Tomistoma schlegeli*, I, 176.  
*tondanensis*, *Planorbis*, IV, 14.  
*Toradjia celebensis*, IV, 365.  
 — *cephalica*, IV, 367.  
 — *gorgona*, IV, 366.  
*torquatum*, *Pseudorhabdion*, I, 183.  
*Tortula gloriosa*, I, 204.  
*Totanus brevipes*, III, 283.  
*Totanus calidris*, III, 283.  
 — *cinereus*, III, 283.  
 — *glareola*, III, 282.  
 — *glottis*, III, 283.  
 — *hypoleucos*, III, 282, 289.  
*Toxotes jaculator*, III, 409.  
*Tragulus napu*, I, 111.  
*Trailli*, *Cerithium*, IV, 168.  
*trapezoidea*, *Corbicula*, IV, 115.  
*Trentepohlia spongophila*, *Symbiose de*, I, 50.  
*Treron floris*, III, 305.  
 — *griseicauda*, III, 287.  
 — *vernans*, III, 281.  
*triangularis*, *Cyrena*, IV, 93.  
*Trichoglossus ornatus*, III, 273.  
*trichopterus*, *Osphromenus*, III, 418.  
*trifasciata*, *Argiope*, I, 195.  
*trigona*, *Pythia*, IV, 130.  
*Trigoniulus goëssii*, III, 395.  
 — *megalopectus*, III, 397.  
 — *reonus*, III, 396.  
 — *tachypus*, III, 397.  
*Trigonocephalus rhodostoma*, I, 191.  
*trilineatus*, *Elaps*, I, 191.  
 —, *Simotes*, I, 184.  
*trinotatus*, *Astur*, III, 271.  
*Tringa minuta*, III, 306.  
 — *platyrhyncha*, III, 213.  
*Trionyx cartilagineus*, I, 176.  
 — *phayrii*, I, 176.  
*triparietalis*, *Cassidula*, IV, 145.  
*tripudians*, *Naja*, I, 191.  
*tristis*, *Psammobia*, IV, 242.  
*Trochomorpha bicolor*, II, 261.  
 — *costulata*, II, 232, III, 159.  
 — *planorbis*, II, 232, 261, III, 152.  
 — *rotatoria*, II, 262.  
 — *sumatrana*, II, 261.  
*Trochonanina multicaudata*, II, 232.  
*Trochus hortensis*, II, 226.  
*trochus*, *Nanina*, II, 226, 262.  
*Tropidophorus grayi*, I, 175.  
*Tropidorhynchus neglectus*, III, 303.  
*trosceli*, *Mugil*, III, 416.  
*truncata*, *Bithynia*, IV, 25.  
 —, *Philoscia*, IV, 376.  
 —, *Psammobia*, IV, 245.  
*tuba*, *Helix*, II, 238, III, 190.  
*Tubella reticulata*, I, 31.  
*tuberculata*, *Melania*, IV, 56.  
*tuberculatum*, *Cerithium*, IV, 170.  
*tuberculatus*, *Gonioccephalus*, I, 166.

tumida, Corbicula, IV, 113.  
 tumidum, Oncidium, IV, 126.  
 Tupaja javanica, I, 122.  
 — tana, I, 122.  
 Turdinus finschi, III, 276.  
 turgida, Cassidula, IV, 143.  
 Turnix rufilatus, III, 281.  
 turrita, Auricula, IV, 157.  
 Tylognathus hispidus, III, 421.  
 Tympanotonus, IV, 183.  
 Typhlina lineata, I, 180.  
 Typhlops braminus, I, 180.  
 — nigro-albus, I, 180.  
 typica, Gazzola, III, 280.  
 typicus, Centrodesmus, III, 370.

## U

Umbilicaria, Nanina, II, 261.  
 undulata, Littorina, IV, 199.  
 unguident, Caletor, III, 15.  
 unicolor, Mastacembelus, III, 415.  
 unicolor, Xenopeltis, I, 182.  
 uniformis, Melania, IV, 46.  
 Unio Verbeeki, IV, 89.  
 Unioniden, IV, 88.  
 Uperotis, IV, 286.  
 uropygialis, Limosa, III, 306.  
 urotaenia, Ambassis, III, 408.

## V

Vaginulus Austeni, II, 246.  
 — bleekeri, II, 262.  
 — graffi, II, 246, 262.  
 — hasselti, II, 261.  
 — Strubelli, II, 247.  
 — sumatrensis, II, 246.  
 — viviparus, II, 246.  
 — Weberi, II, 246.  
 vagus, Sinis, III, 13.  
 Varanus salvator, I, 169.  
 — togianus, I, 169.  
 variabilis, Calamaria, I, 183.  
 —, Lepidocyrtus, I, 84.  
 variegata, Assiminea, IV, 214.  
 —, Neritina, IV, 78.  
 —, Philoscia, IV, 377.  
 variegatum, Cerithium, IV, 171.  
 —, Lygosoma, I, 173.  
 variegatus, Chaerilus, III, 90.  
 vaucheriaeformis, Spongocladia, I, 57.  
 velutinus, Armadillo, IV, 363.

venatoria, Heteropoda, I, 204.  
 venerata, Gracula, III, 304.  
 ventricosa, Littorina, IV, 207.  
 Verbeeki, Melania, IV, 38.  
 —, Unio, IV, 89.  
 Verbreitung der Amphibien, IV, 409.  
 — der Mollusken, IV, 291.  
 vermiformis, Calamaria, I, 182.  
 vernans, Treron, III, 281.  
 verrucosus, Plathyhachus, III, 354.  
 —, Sus, I, 111.  
 verruculatum, Oncidium, IV, 126.  
 Vertheilung der Mollusken, IV, 300.  
 verticillatus, Gecko, I, 164.  
 vesparium, Spongilla, I, 31, 45.  
 Vespertilio hasseltii, I, 128.  
 — muricola, I, 128.  
 Vesperugo abramus, I, 128.  
 Viciria, I, 209.  
 vilis, Littorina, IV, 204.  
 vineta, Melania, IV, 54.  
 vinosum, Strongylosoma, III, 361.  
 violacea, Batissa, IV, 184.  
 —, Psammotaea, IV, 239.  
 violaceus, Perionyx, III, 72.  
 virens, Glaucomya, IV, 230.  
 virescens, Cacomantis, III, 276.  
 virgata, Psammobia, IV, 250.  
 virgulata, Melania, IV, 57.  
 vitrea, Perna, IV, 224.  
 vitreum, Leptopoma, II, 217, 262.  
 vittata, Gasteracantha, I, 194.  
 —, Siphonophora, III, 337.  
 vittatus, Osteochilus, III, 421.  
 —, Spirostreptus, III, 387.  
 —, Sus, I, 111, III, 267.  
 Viverra tangalunga, I, 109.  
 Viverricula malaccensis, I, 109.  
 Vivipara costata, IV, 20.  
 — grossicosta, IV, 25.  
 — javanica, IV, 21.  
 — sumatrensis, IV, 24.  
 viviparus, Vaginulus, II, 246.  
 volans, Draco, I, 166.  
 —, Galeopithecus, I, 111.  
 vomer, Nanina, II, 230, III, 147.

## W

Wadjo, I, VI.  
 wagleri, Bothrops, I, 192.  
 Wallacei, Macropteryx, III, 275.  
 —, Melania, IV, 52.

Wallacei, *Microstictus*, III, 273.  
 —, *Nanina*, II, 224, III, 119.  
 wassinki, *Homaloptera*, III, 425.  
 Weberi, *Anomalochilus*, I, 181.  
 —, *Armadillo*, IV, 364.  
 —, *Bipalium*, I, 141.  
 —, *Crocidura*, I, 123.  
 —, *Cryptodesmus*, III, 374.  
 —, *Cypris*, II, 129.  
 —, *Dina*, IV, 353.  
 —, *Dino*, III, 17.  
 —, *Glossosiphonia*, IV, 332.  
 —, *Glyphidrilus*, III, 37.  
 —, *Gordius*, II, 137.  
 —, *Haemopsis*, IV, 353.  
 —, *Hormurus*, III, 97.  
 —, *Kerivoula*, I, 129.  
 —, *Lepidocampa*, I, 76.  
 —, *Lithobius*, III, 310.  
 —, *Moina*, II, 120.  
 —, *Paracryptops*, III, 316.  
 —, *Parmarion*, III, 105.  
 —, *Periscyphus*, IV, 371.  
 —, *Philoscia*, IV, 378.  
 —, *Platyrhachus*, III, 351.  
 —, *Psitteuteles*, III, 290.  
 —, *Rhinocricus*, III, 391.  
 —, *Sciurus*, I, 115.

Weberi, *Strongylosoma*, III, 367.  
 —, *Thyropygus*, III, 382.  
 —, *Vaginulus*, II, 246.  
 Wichmanni, *Melania*, IV, 54.  
 —, *Mus*, I, 120.  
 —, *Sicydium*, III, 413.  
 winteriana, *Helix*, II, 234, 261.  
 —, *Siliqua*, IV, 262.  
 Woodwardi, *Solen*, IV, 279.  
 Wukur, I, IX.

# X

Xanthonotus, *Thyropygus*, III, 381.  
 xanthopus, *Platyrhachus*, III, 350.  
 xanthozonus, *Rhinocricus*, III, 393.  
 Xenopeltis unicolor, I, 182.

# Z

Zeylanica, *Haemadipsa*, IV, 335.  
 Zephronia nigriceps, III, 329.  
 — *rufipes*, III, 331.  
 Ziezac, *Neritina*, IV, 79.  
 Zoochlorella, I, 49.  
 Zooxanthella, I, 49.  
 Zosterops aureifrons, III, 303.  
 — *intermedius*, III, 279, 303.

## BERICHTIGUNG.

Teil I Seite 121 lies unter *Acanthion javanicum* Cuv.: South-Celebes: **Manudju** statt Manindjau.



## SUPPLEMENT

ZUM

### Gesamtregister zu den vier Bänden der „Zoologischen Ergebnisse“.

Durch ein bedauernswertes Versehen fehlen in obengenanntem Gesamtregister die Namen der Genera und Species der Crustaceen, die im 2. Bande auf Seite 265 bis 571 behandelt wurden. Dieses Supplement möge einen Ersatz dafür bieten.

#### A

Actaea, II, 277.  
Actaeodes, II, 278.  
acuminata, Caridina, II, 371.  
acutirostris, Palaemon, II, 454.  
acutus, Gelasimus, II, 306.  
Admete, Thalamita, II, 285.  
Aega interrupta, II, 553.  
africana, Telphusa, II, 301.  
Alcironidae, II, 551.  
Alitropus typus, II, 553.  
alphonsianus, Palaemon, II, 437.  
Alpheus, II, 404.  
Amphipoden, II, 529, 562.  
anchoralis, Penaeus, II, 515.  
angulhasensis, Merhippolyte, II, 407.  
angustifrons, Sesarma, II, 342, 347.  
anisodon, Goniosoma, II, 285.  
annulipes, Gelasimus, II, 307.  
anomala, Thalassina, II, 354.  
Apus, II, 537.  
Argulus indicus, II, 544.  
armata, Atya, II, 357.  
Átergatis, II, 277.  
atkinsoniana, Telphusa, II, 297.  
Atya, II, 355, 541.  
Aubryi, Sesarma, II, 327.

#### B

Banksii, Matuta, II, 351.

barbatus, Pseudograpsus, II, 317.  
bariensis, Palaemon, II, 496.  
bidens, Sesarma, II, 330.  
bisulcata, Atyoida, II, 360, 363.  
Bornneri, Palaegyge, II, 558.  
Bopyridae, II, 555.  
Borrei, Palaegyge, II, 557.  
Branchipus, II, 537.  
brevicarpalis, Caridina, II, 397.  
— var. endehensis, Caradina, II, 399.  
brevicarpus, Palaemon, II, 418.  
brevirostris, Alpheus, II, 405.  
—, Atya, II, 360.  
—, Caridina, II, 371.  
brevitarsis, Dotilla, II, 313.  
Burgeri, Palinurus, II, 354.

#### C

canaliculatus, Penaeus, II, 510.  
carcinus, Palaemon, II, 421.  
Cardisoma, II, 285.  
Caridina, II, 363, 541.  
carnifex, Cardisoma, II, 285.  
celebensis, Telphusa, II, 297.  
— var. lokaensis, Telphusa, II, 300.  
— var. pareparensis, Telphusa, II, 301.  
chiragra, Gonodactylus, II, 518.  
chlorodopsis, II, 278.  
Clibanarius, II, 352.  
coarctatus, Gelasimus, II, 308.  
concinus, Leander, II, 506.

convexa, Paratelpusa, II, 302.  
 cordinana, Ocypode, II, 305.  
 crassipes, Tachaea, II, 552.  
 —, Metaplax, II, 325.  
 crassus, Pseudograpsus, II, 317.  
 crenata, Thalamita, II, 285.  
 Crustaceen d. Süßwassers, II, 528, 535, 543.  
 custos, Diogenes, II, 352.  
 Cymothoinae, II, 537.

**D**

Danae, Palaemon, II, 438.  
 —, Thalamita, II, 285.  
 dasypus, Palinurus, II, 355.  
 debilis, Leander, II, 507.  
 Decapoden, II, 541, 543.  
 Decazei, Telpusa, II, 302.  
 Dehaanii, Geotelpusa, II, 289.  
 dentata, Porcellana, II, 351.  
 dentatus, Ptychognathus, II, 318.  
 denticulata, Telpusa, II, 290.  
 denticulatifrons, Remipes, II, 351.  
 dentipes, Metaplax, II, 327.  
 diaphanus, Pagurus, II, 352.  
 Diogenes, II, 352.  
 dispar, Palaemon, II, 427.  
 distinctus, Metaplax, II, 326.  
 dolichodactylus, Alpheus, II, 407.  
 —, Palaemon, II, 477.  
 Dotilla, II, 308.  
 Dussumieri, Gelasimus, II, 306.

**E**

Edwardsii, Alpheus, II, 407.  
 —, var. brevipes, Sesarma, II, 330.  
 elegans, Metaplax, II, 325.  
 —, Palaemon, II, 440.  
 endehensis, Palaemon, II, 465.  
 Entomostraca, II, 528, 537.  
 equidens, Palaemon, II, 453, 456.  
 esculentus, Palaemon, II, 477.  
 Euruppellia, II, 278.  
 euryrhynchus, Palaemon, II, 477.  
 exaratus, Leptodius, II, 278.  
 exilirostris, Caridina, II, 369.

**F**

fasciatus, Palinurus, II, 354.  
 fenestrata, Dotilla, II, 311, 313.  
 floresiana, Orchestia, II, 562.

floridus, Atergatis II, 277.  
 fluviatilis, Palaegyge, II, 559.  
 —, Telpusa, II, 290, 293.  
 forcipatus, Gelasimus, II, 306.  
 Forskålii, Pilumnus, II, 283.  
 fossarum, Caridina, II, 397.  
 frontalis, Cardisoma, II, 286.  
 —, Sesarma, II, 334.

**G**

Gelasimus, II, 305.  
 Geosesarma, II, 341.  
 Geotelpusa, II, 288, 541.  
 Giardi, Probopyrus, II, 557.  
 glaber, Ptychognathus, II, 324.  
 Goniosoma, II, 285.  
 Gonodactylus, II, 518.  
 gracilidigitus, Alpheus, II, 406.  
 gracilipes, Utica, II, 316.  
 gracilirostris, Caridina, II, 399.  
 gracilis, Leptodius, II, 278.  
 grandimanus, Palaemon, II, 487.  
 grandirostris, Caridina, II, 390, 399.  
 granulata, Telpusa, II, 290.  
 granulosus, Pyxidognathus, II, 317.

**H**

hirtimanus, Palaemon, II, 486, 500.  
 Horstii, Palaemon, II, 460.  
 humicola, Orchestia, II, 569.

**I**

Ichthyoxenus, Jellinghausii, II, 537, 545.  
 —, montanus, II, 537.  
 Idae, Palaemon, II, 422, 437.  
 impressa, Sesarma, II, 330, 336.  
 incerta, Tachaea, II, 552.  
 indicum, Sarmatium, II, 350.  
 indicus, Argulus, II, 544.  
 —, Leander, II, 507.  
 —, Penaeus, II, 511.  
 —, var. longirostris, Penaeus, II, 511.  
 intermedia, Dotilla, II, 311, 313.  
 —, Sesarma, II, 331, 337.  
 intermedius, Diogenes, II, 354.  
 —, Ptychognathus, II, 322.  
 interrupta, Aega, II, 553.  
 Isopoden, II, 529, 537, 540.

**J**

japonicus, Palaemon, II, 462.

javanicus, Palaemon, II, 457.  
Jellinghausii, Ichthyoxenus, II, 537, 545.

# K

Kuhlii, Geotelphusa, II, 288.  
—, Ocypode, II, 304.

# L

laevis, Caridina, II, 376.  
—, Sesarma, II, 333.  
Lafondi, Sesarma, II, 331.  
Lamarckii, Xanthodes, II, 278.  
lampropus, Palaemon, II, 493.  
lanceifrons, Palaemon, II, 437.  
lar, Palaemon, II, 445.  
Larnaudii, var. brevimarginata, Telphusa, II, 294.  
lata, Euruppellia, II, 283.  
latidactylus, Palaemon, II, 501, 504.  
latifrons, Metopograpsus, II, 314.  
latimanus, Palaemon, II, 477.  
Leander, II, 506.  
lepidactylus, Palaemon, II, 487, 500.  
lepidactyloides, Palaemon, II, 497.  
Leptodius, II, 278.  
limula, Telphusa, II, 297.  
lineolata, Atya, II, 357.  
literata, Varuna, II, 315.  
lacustris, Tachaea, II, 537, 538, 557.  
longicarpus, Leander, II, 506.  
longicornis, Pilumnus, II, 284.  
longimanus, Palaemon, II, 445.  
longirostris, Caridina, II, 395.  
longitarsus, Clibanarius, II, 352.  
Lucasii, Philonicus, II, 516.  
Lysiosquilla, II, 518.

# M

Macrophthalmus, II, 308.  
maculata, Lysiosquilla, II, 518.  
—, Paratelphusa, II, 303.  
—, Sesarma, II, 347.  
maculatus, Metopograpsus, II, 314.  
madagascariensis, Palaemon, II, 447.  
de Mani, Palaegyge, II, 560.  
Martensii, Orchestia, II, 564.  
Mastersii, Penaeus, II, 513.  
Matuta, II, 351.  
mayottensis, Palaemon, II, 445.  
melanochira, Chlorodopsis, II, 278.

melissa var. moluccensis, Sesarma, II, 328.  
merguiensis, Diogenes, II, 352.  
—, Penaeus, II, 511.  
Merhippolyte, II, 407.  
messor, Metopograpsus, II, 314.  
Metaplex, II, 325.  
Metasesarma, II, 350.  
Metopograpsus, II, 314.  
miles, Diogenes, II, 352.  
modestus, Palaemon, II, 469.  
Moeschii, Sesarma, II, 331, 336.  
moluccensis, Atya, 357.  
monoceros, Penaeus, II, 513.  
montana, Orchestia, II, 567.  
montanus, Ichthyoxenus, II, 537.  
Mülleri, Philonicus, II, 516.  
multidentata, Caridina, II, 380.  
myctiroides, Dotilla, II, 313.

# N

natator, Goniosoma, II, 285.  
Nauticaris, II, 409.  
nepa, Squilla, II, 518.  
Neptunus, II, 284.  
nilotica, Caridina, II, 395.  
nipponensis, Palaemon, II, 441.  
nodulifera, Sesarma, II, 342.

# O

obtusipes, Geotelphusa, II, 290.  
Ocypode, II, 304.  
Orchestia, II, 540, 562.  
— floresiana, II, 562.  
— humicola, II, 569.  
— Martensii, II, 564.  
— montana, II, 567.  
— parvispinosa, II, 566.  
Orchestidae, II, 562.  
orientalis, Merhippolyte, II, 407.  
ornatus, Palaemon, II, 445.

# P

Palaegyge, II, 557.  
— Bonnierii, II, 558.  
— Borrei, II, 557.  
— fluvialis, II, 559.  
— de Mani, II, 560.  
Palaemon, II, 410, 541.  
Palinurus, II, 354.  
Paratelphusa, II, 302, 541.



pareparensis, Caridina, II, 379.  
 parvirostris, Caridina, II, 375.  
 parvispinosa, Orchestia, II, 566.  
 pectinatus, Philonicus, II, 515.  
 pelagicus, Neptunus, II, 284.  
 Penaeus, II, 510.  
 perplexus, Gelasimus, II, 308.  
 Philonicopsis, II, 517.  
 Philonicus, II, 515.  
 pictus, Metopograpsus, II, 315.  
 pilimanus, Palaemon, II, 471.  
 — var. leptodactylus, Palaemon, II, 476.  
 pilipes, Ptychognathus, II, 318, 325.  
 Pilumnus, II, 283.  
 placidulus, Palaemon, II, 489.  
 placidus, Palaemon, II, 483.  
 Plagusia, II, 317.  
 Porcellana, II, 351.  
 Probopyrus, II, 557.  
 — Giardi, II, 557.  
 prymna, Thalamita, II, 285.  
 Pseudograpsus, II, 317.  
 Ptychognathus, II, 318.  
 pusillus, Ptychognathus, II, 325.  
 Pyxidognathus, II, 317.

## Q

quadrata, Sesarma, II, 328.  
 quadratum, Cardisoma, II, 287.

## R

rapax, Alpheus, II, 404.  
 Remipes, II, 351.  
 reunionensis, Palaemon, II, 454.  
 Riedelii, Ptychognathus, II, 321.  
 — var. pilosa, Ptychognathus, II, 323.  
 Rocinela typus, II, 537, 553.  
 Rousseauxi, Metasesarma, II, 350.  
 ruber, Palaemon, II, 445.  
 rudis, Palaemon, II, 440.  
 rugata, Actaea, II, 277.

## S

sanguinolentus, Neptunus, II, 285.  
 Sarmatium, II, 350.  
 scabriculus, Palaemon, II, 462.  
 scrabiulus, Pilumnus, II, 284.  
 scorpio, Squilla, II, 518.  
 Scylla, II, 285.  
 semisulcatus, Penaeus, II, 510.

Semmelinkii, Leander, II, 507.  
 serrata, Atya, II, 363.  
 —, Scylla, II, 285.  
 serratiostris, Caridina, II, 382.  
 — var. celebensis, Caridina, II, 385.  
 Sesarma, II, 327.  
 siamensis, Caridina, II, 367.  
 sinuatifrons, Telphusa, II, 296.  
 Sluiteri, Pilumnus, II, 283.  
 spathulirostris, Caridina, II, 374.  
 spectabilis, Palaemon, II, 446.  
 Spencebatei, Caridina, II, 371.  
 spinipes, Chlorodopsis, II, 278.  
 Squilla, II, 518.  
 sulcata, Dotilla, II, 309.  
 sumatrensis, Telphusa, II, 289, 296.  
 sundaicus, Palaemon, II, 437.  
 Süßwasser-Crustaceen, II, 528, 535, 543.  
 sylvicola, Sesarma, II, 345, 350.

## T

Tachaea crassipes, II, 552.  
 — incerta, II, 552.  
 — lacustris, II, 537, 538, 551.  
 taeniolata, Sesarma, II, 330.  
 tahitensis, Atyoida, II, 363.  
 Telphusa, II, 290, 541.  
 testudinarius, Remipes, II, 351.  
 Thalamita, II, 285.  
 Thalassina, II, 354.  
 tomentosus, Actaeodes, II, 278.  
 transversus, Macrophthalmus, II, 308.  
 trapezoidea, Sesarma, II, 338.  
 triangularis, Gelasimus, II, 307.  
 tridentata, Paratelphusa, II, 302.  
 tuberculata, Plagusia, II, 317.  
 typus, Alitropus, II, 553.  
 —, Caridina, II, 367.  
 — var. longirostris, Caridina, II, 369.  
 —, Rocinela, II, 537, 553.

## U

Urvillei, Cardisoma, II, 286.  
 Utica, II, 316.

## V

vagus, Palaemon, II, 445.  
 Varuna, II, 315.  
 Verschleppung von Süßwassertieren  
 . II, 530.

verspertilio, Pilumnus, II, 283.  
 vixtrix var. crebrepunctata, Matuta,  
 II, 351.  
 vinosa, Euruppellia, II, 278.  
 vocans, Gelasimus, II, 305.

**W**

Weberi, Caridina, II, 371.  
 — var. sumatrensis, Caridina, II, 375.

Weberi, Palaemon, 421.  
 —, Sesarma, II, 338.  
 Wichmanni, Dotilla, II, 308.  
 Wyckii, Caridina, II, 386.  
 — var. gracilipes, Caridina, II, 393.

**X**

Xanthodes, II, 278.





К

34  
16











